

## Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuerzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

### 4. Abschnitt.

*Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.*

(Fortsetzung)

1047. *sobrinata* Hb. Mojstrana Licht; Rakek 22. VIII.; Seno-setsch 10. VIII.; Nanos 30. VII. (Hafn. F. Kr.); Preth am Licht, August (Sicher, W. Ent. Ver. 1897, p. 45); Triest, gemein, September, Lichtfang (Carr.); Triest 8. X. zwei Stück am Köder (Str.); Sesana, im Karst sehr häufig August, September; Raupe in großer Zahl von Wacholder geklopft, sie waren verschiedenartig gefärbt und gezeichnet, grün, braun, fleischfarben, lichtbraun mit dunkelbrauner Gitterung; auch bei Divača die Raupe häufig (Lbl.); Triest, Boschetto 8. IX.; Opcina 28. IX. von Pappeln geklopft und um Juniperus gemein (Galv.); Pisino 24. IX. (Galv.); Pola **1** 2. V. (Hirschke); Südabhang des Mte. Maggiore, aus Juniperus gescheucht, auch am Köder und Licht 8. IX.; Mattuglie geleuchtet am 22. IX. und 20. X. (Rbl. M. M. II).

Weiter südlich im Gebiete nicht mehr gemeldet, wohl aber in Bosnien (Trebevic) gefunden.

Sonst in Kroatien, Ungarn, in den Alpenländern; vermutlich orientalisches; nach Zerny nordisch.

1048. *extremata* F. (= *glauconictata* Mn., cfr. Seitz, Bd. IV, p. 282) Mitteldalmatien, Castel Sucurac 8. V. (Rbl. in Verh. zool.-bot. Ges. 1919, p. 109!).

1049. *ericata* Rbr. B. Rbl. IX: Österr. Küstenland (Lovrana) September, Oktober. Rigmanje, Herpelje, Reifenberg, Portorose, Anfang bis 20. IX. mehrfach (Naufock); Pola, März, im Kaiserwald (Hirschke); Lovrana Oktober (Rbl. M. M. II); Triest häufig (Carr.); Wippach, Burgruine, Licht 15. VIII. (Hafn. F. Kr.); Zengg 10.—12. X. (Dobiasch); Insel Brioni, Rp. an *Erica arborea*, e. 1. September, Oktober (Klos); Mostar 2. X. (Schaw. B. H. X).

Sonst strichweise in Südeuropa; mediterran.

1050. *pumilata* Hb. Senosetsch, Wippach ganzen Sommer (Hafn. F. Kr.); Görz vom März bis August nicht selten, auch am Köder (Hafn. F. Görz); Wippachtal, Mai, bei Oberfeld und Haidenschaft einige aus Hecken gescheucht (Mn. Kstld.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Triest 27. IX. ein Stück am Licht; auch St. Lucia 22. V. (Stdr.); Miramar im Schloßpark April (Galv. B. A. I.); Nennform und *tempestivata* Z. Abbazia Jänner, 3.—21. VI., 16. bis 24. VII., 1. VIII.; Mattuglie 29. V.; Lovrana November ein ♂ am Köder (Rbl. M. M. I und II); Nennform nicht selten am Licht Lovrana; beim Schutzhause des M. Maggiore 2. VII. und abgeflogen 1. VIII. Draga di Lovrana (Schaw. M. M.); Fiume 5. VI. (Mändl); Fiume April und Juni aus Dornhecken gescheucht (Mn.); Istrien (Hirschke); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Zengg 24. IV., 19. V.—7. VI., 2. VII., 14. IX. (Dobiasch); Sebenico Mai abgeflogen (Rückert); Spalato, Dernis, Sinj, am Licht schon Anfang März (Stdr.); Kučiste Mai, einzeln im Juni, Juli häufig, an Mauern (Werner); Herzegowina Juni, August, Oktober, Dezember; *tempestivata* im Juni (Schaw. B. H. III, V, IX); Prenj in 1300 m, Lastva 20. VIII.; Bilek (Rbl. Stud. II); Insel Brioni 26. IV., 25. V. frisch (Rbl. Brioni gr.); Insel Lussin: Lussingrande 8. IV., S. Andrea 23.—26. VIII. an Feigenblättern saugend, häufig; subsp. *tempestivata*, Cigale 15. XI.—20. XII. (Galv. Ausb. Lussin); Insel Lissa, häufig am Licht Ende Mai, Anfang Juni (Galv. Dalm. Ins.); Insel Brazza zwei Stück (Stdr.).

Auch in Kroatien, Slavonien, Bosnien, Banat; orientalisches.

1052. *limbata* Stgr. Mostar 20. III. (Schaw. B. H. XI).

Sonst Monastir, Pontus, Armenien; orientalisches.

### Chloroclystis Hb.

1053. *coronata* Hb. Wippach 18. VI. (Hafn. F. Kr.); Görz, Kalvarienberg Ende Mai an Kastanienstämmen nicht häufig (Hafn. F. Görz); Lovrana Anfang Juli (Schaw. Verh. zool.-bot. Ges. 1916, p. 108).

Auch in Slavonien, Bosnien (Sarajevo), Banat; sibirisches.

1054. *rectangulata* L. Crna Prst 8. VIII.; Assling 19. VII.; Mojstrana Ende Juni; Adelsberg 18. VI. (Hafn. F. Kr.); bei Wippach Juni an einer Mauer (Mn. Kstld.); bei Salcano am Isonzoufer, f. *subaerata* Hb. Ende Mai (Hafn. F. Görz); Canale, Görz, Triest mehrfach Mai, Juni (Stdr.); Fiume Juni einzeln an Baum-

stämmen (Mn.); Zengg, darunter *subaerata* und *cydoniata* Bkh., 20. V., 11. VI. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato (Stdr.); *subaerata* Hb. von Gacko (Schaw. B. H. IX).

Sonst aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Siebenbürgen; sibirisch.

1055. *chloerata* Mab. Crna Prst 3. VII.; Mojstrana 12. VII. (Hafn. F. Kr.).

Sonst Alpenländer, Kroatien-Slavonien; europäisch.

1056. *Collix sparsata* Tr. Wippach 7. VI. (Hafn. F. Kr.); Canale 15. VI. (Prinz); Mitteldalmatien (*Cidaria sparsaria* Hb., Mn. 3 R. Dalm.).

Auch in Slavonien, Bosnien; sibirisch.

### Phibalapteryx Stph.

1057. *polygrammata* Bkh. Görz 11. X. ein Stück (Hafn. F. Görz); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Fiume Mai, Juni einige an Mauern (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Zengg 30. V. ♂ ♀ (Dobiasch); Umgebung Spalato subsp. *conjunctaria* Ld. (V. Geiger, Verh. zool.-bot. Ges. 1873). Stolac 20. V. (Rbl. Stud. II).

Auch in Slavonien, Siebenbürgen; nach Rebel mediterran, nach Skala orientalisches.

1058. *vitalbata* Schiff. Oberfeld, Haidenschaft, Gradišče und Heiligenkreuz Juni aus Hecken gescheucht, auch an Steinen (Mn. Kstld.); überall in der Umgebung Görz April, Mai und Juli, August nicht selten, auch am Licht (Hafn. F. Görz); St. Lucia, Podbrdo, Woltschach, Canale, Plava sehr häufig; Görz vielfach; Triest 7. IV. ein ♂; Pinguente, Rozzo Ende Mai und Anfang August (Stdr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); daselbst Mitte September (Galv.); Sesana 13. V. einige und 11. VIII. (Lbl.); *vitalbata* und f. *variegata* Stgr. Volosca 10. V., Abbazia 30. V., Mattuglie 8. VI., 8., 30. VII. (Rbl. M. M. I); Fiume 5. VI. (Mändl); Hraszt, Martinischza, Draga Juni, Juli in Gebüsch (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Sebenico Mai zwei ♀ ♀ 13 mm und 16 mm (Rückert); Marjan, Dernis, Sinj, Castelvecchio 30. V. (Stdr.); Insel Brioni 24. V. zwei typische ♀ ♀ (Rbl. Brioni gr.); Lussingrande Anfang Juni und Anfang September, Lichtfang (Galv. Verh. zool.-bot. Ges. 1916); Insel Brazza (Stdr.). Domanovic (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1059. *corticata* Tr. Fiume beim Pulverturm und Podhum Juni in Dornhecken (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien (Jaice); orientalisches.

1060. *tersata* Hb. Crna Prst, 1500 m, 20. VI. an Felsen; Umgebung Wippach häufig in Hecken; f. *tersulata* Stgr. Wochein-Feistriz (Hafn. F. Kr.); bei Gradišče und Görz Juni (Mn. Kstld.); Görz Mai, Juni in Hecken nicht selten (Hafn. F. Görz); Hudajužna, einzeln bei Canale; Görz, mehrfach Ende Mai und Juni; Triest 30. V. ein Stück verfliegen, Miramar (Stdr.); Sesana, Mitte Mai zwei Stück am Licht (Lbl.); Abbazia 30. V., 9. VI., Lovrana August (Rbl. M. M. I); Mattuglie Mai, Veprinaz 9. VI., Mte. Maggiore-Gipfel 6. VII. Lichtfang (Rbl. M. M. II); Fiume Juni häufig aus Brombeerhecken gescheucht (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato, Marjan (Stdr.); Mostar (Schaw. B. H. VIII); Jablanica, Prenj, 600 m, 2. VIII.; f. *tersulata* Stgr. von Tassovic September (Rbl. Stud. II).

Überall in Osteuropa und Westasien verbreitet; sibirisch.

1061. *calligraphata* H. S. B. Rbl. IX: Istrien Juni, Juli (Raupe auf *Thalictrum foetidum*). Crna Prst ab Ende Mai bis Ende Juni, noch bei 1400 m; Wippach 10. VI. Lichtfang (Hafn. F. Kr.); im Juni an Felsen des Nanos bei Gradišče zwei ♀♀ (Mn. Kstld.); Neuming in der Wochein 2. VI. ein Stück; Triest 29. VI. ein Stück (Stdr.); Triest, selten, Juli, Lichtfang (Carr.); Napoleonstraße Opicina - Prosecco 10.—12. VI. (Bohatsch); Abbazia Ende Juli, Mattuglie April (Rbl. M. M.); bei Hraszt an Felswänden Juni sehr selten (Mn. Fiume); Zengg 11. V., 24. V., 20. VI. (Dobiasch).

Herzegowina (Kamena) großes schönes Stück mit 3 cm Flügelspitzenabstand (Schaw. B. H. V); Gacko Anfang Juli (Schaw. B. H. VIII). Jo.

Auch in Kroatien; orientalisches.

1062. *Orthostixis cribaria* Hb. Jablanica, Nevesinje (Rbl. Stud. II). Suha 11. VII. Anzahl (Schaw. B. H. VII). Alle Orte in der Herzegowina.

### Abraxas Leach.

1063. *grossulariata* L. Sovič bei Adelsberg Ende Juni, Anfang Juli; Slap ob Wippach (Hafn. F. Kr.); Slap Juni; Rp. an Stachelbeeren häufig (Mn. Kstld.); Grojnatal im Gebüsch Ende Juni, Anfang Juli nicht selten (Hafn. F. Görz); Plava, Cepovan, Görz-Grojna, Kronberg, Monfalcone, Miramar Juni, Juli; Pisino 3. VI. (Stdr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Fiume Juni, Juli (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato, Stobrec Juni, Juli (Stdr.). Trebinje, Vucijabara (Rbl. Stud. II).

Auch aus allen Nebenländern bekannt; sibirisch.

1064. *pantaria* L. Görz Lichtfang (Hafn. F. Görz); Aquileja, Nennform, 22. V. (Galv.); Triest, Lichtfang, Ende Mai (Stdr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Mitteldalmatien (Mn.).

Insel Grado, subsp. *cataria* Gn. (Galv. B. A. I.).

Orientalisch; nach Galvagni mediterran.

1065. *marginata* L. Crna Prst; Übergänge zu *pollutaria* Hb. nicht selten; bei Wippach auch *nigrofasciaria* Schoyen (Hafn. F. Kr.); bei Wippach Juni an Bächen und Wiesen, abends häufig um Weiden geflogen (Mn. Kstld.); Isonzoufer bei Lucinico April, Mai in Erlengebüsch (Hafn. F. Görz); Bača- und oberes Isonzotal nicht selten ab Ende Mai; sonst im Gebiete nirgends so häufig wie in Mitteleuropa. Görz, Kronberg, Haidenschaft mehrfach, Triest sehr selten, ab und zu auch *pollutaria* Hb. und Übergänge hiezu (Stdr.). Sesana 26. VI. einige am Licht (Lbl.).

Dalmatien, den Inseln, scheinbar auch Istrien gänzlich fehlend (Stdr.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1066. *adustata* Schiff. Ganze Gegend um Wippach Mai, Juni nicht selten (Mn. Kstld.); Podgora April, Mai, Juli, August in Ahorngebüsch (Hafn. F. Görz); Triest, gemein März und Juli, August aus Gebüsch; auch am Licht (Carr.); Sesana 25. IV. an Baumstämmen (Lbl.); Podmelec, Woltschach, Mte. Matajur, Canale, Korada, Plava, Mte. Santo, Trnowanerwald, überall im Wippachtale, Umgebung Görz, in der fruchtbaren Ebene wie im Karste; bei Triest sehr häufig, 23. III. Karsthänge, Scorcola 29. III. frisch, aus Epheu gescheucht, zwei Stück; Napoleonstraße 26. V. zwei ♂♂; auch in Inneristrien fast überall, soweit Gebüschformation vorhanden (Stdr.); Abbazia 21. IV., 1. VIII. (Rbl. M. M. I); Abbazia 31. III., Veprinaz 9. VI. und Lovrana (Rbl. M. M. II); Fiume Mai bis Juli (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Knin, Dernis, Perkovic, Riviera Sette Castelli, Spalato, Almissa, Sinj, Inseln Brazza, Bua, Solta. — Die ganze Zeit von Ende März ab bis Ende Oktober, wohl in drei Generationen. Vertritt im Süden die seltenere Art *marginata* L. (Stdr.); Kučiste Ende Mai ein Stück (Werner). Insel Brioni 26. IV. (Rbl.). Velez und Tassovic September (Rbl. Stud. II).

Auch Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

### Bapta Stph.

1067. *pictaria* Curt. Mostar 27. IV. ein auffallend hellgraues großes Stück (Schaw. B. H. VIII).

1068. *bimaculata* F. Crna Prst, 800 m, 31. V., defekt (Hafn. F. Kr.); Hudajužna Anfang Juni ein Stück (Stdr.); Grojna Mitte Juni einige Stücke aufgescheucht: 11. VII. (Hafn. F. Görz); Sesana **┴** Juni (Lbl.).

Sonst noch aus Slavonien, Bosnien (Derwent), Banat, auch Alpenländer; sibirisch.

1069. *temerata* Hb. Grahovo im Bačatale Ende Juni ein Stück, Görz 20. IV. (Stdr.); Canale 10. V. (Prinz); Görz 6. VIII. (Hafn. F. Görz); bei Draga **┴** (Mn. Fiume).

Auch Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

### **Stegania Dup.**

1080. *trimaculata* Vill. Görz, Isonzoufer, Weidengebüsch 8. V. bis 5. VI., Cehovini im Branccatale 12. VI., Kloster Kostagnevizza 19. VII. ein ♀ der II. Gen. selten (Hafn. F. Görz); bei Wippach, Bachufer, Ahornhecken und von Bäumen gescheucht, Anfang bis Ende Mai (Mn. Kstld.). Mitteldalmatien (v. *cognataria* Hb.) (Mn.), Stobrec bei Spalato *cognataria* Mitte Mai (Stdr.).

Eine mediterrane Art.

1071. *cararia* Hb. Grojna 29. VI. und 6. VII. aus Gebüsch in der Nähe von Pappeln gescheucht, abgeflogen (Hafn. F. Görz).

Sonst in Steiermark, Krain (nach Skala), Ungarn; sibirisch.

### **Deilinia Hb.**

1072. *pusaria* L. Überall im Gebiete, doch nicht so häufig wie mancherorts in Zentraleuropa; ist offenbar an große Feuchtigkeit gebunden. Bei Wippach Ende Mai an Bachufern nicht selten (Mn. Kstld.). Görz, überall im Mai (Hafn. F. Görz); Fiume Mai nicht selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Knin, Cetinaebene, Stobrec und Almissa; April, Mai und wieder Juni, Juli; im Gebirge einbrütig (Stdr.); Mostar, Vucija bara bei 1400 m (Schaw. B. H. VIII). Jablanica (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 359-364](#)