

Neue Phrixothrix-Arten. (Col. Malacodermata.)

Von M. Pic.

In einer Mitteilung unseres verehrten Kollegen, Herrn R. Hicker, bekam ich mehrere neue Formen der seltsamen Gattung *Phrixothrix* E. Oliv. zur Untersuchung. Ich glaube wohl zu tun, einen speziellen Artikel über diese Tiere zu schreiben und es freut mich, dem Entomologen, welchem ich die Kenntnis dieser Tiere verdanke, eine der Neuheiten freundlichst widmen zu können.

Phrixothrix piceipennis n. sp.

Minutus, parum robustus, subnitidus, grisco-hirsutus, testaceus, capite antice rufo, postice nigro, thorace scutelloque rufis, elytris nigro-piceis, antennis piceis, articulis primis rufis, pedibus testaceis. Antennis brevibus, capite breve, sat lato, sat fortiter et dense punctato, inter oculos impresso, oculis parum prominulis; thorace breve et lato, capite paulo latiore, mediocre sat sparse punctato, fere opaculo, lateraliter medio paulo arcuato; scutello fortiter punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, apice dehiscentibus et attenuatis, mediocre sat sparse et pro parte ruguloso-punctatis; alis obscuris.

Long. 6 mill. Bolivia.*)

Nähert sich durch seine Färbung dem *P. atricornis* Pic, unterscheidet sich jedoch von diesem durch den dunklen, weniger stark punktierten Kopf, den glanzlosen Halsschild und die kürzeren Flügeldecken.

Phrixothrix Hickeri n. sp.

Sat minutus, elongatus, nitidus, grisco-pubescent et hirsutus, testaceo-aurantiacus, oculis, antennis, articulis primis rufis exceptis, tarsisque nigris, tibiis plus minusve piceis, elytris testaceis, apice pallidioribus, pro parte piceo marginatis. Antennis brevibus; capite breve et lato, mediocre sat sparse punctato, oculis prominulis; thorace parum breve, antice attenuato et subarcuato; capite minus latiore, diverse punctato; scutello fortiter punctato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, apice dehiscentibus et attenuatis,

*) Außer den Tieren in der Hicker'schen Sammlung, befindet sich ein Stück dieser sowie der folgenden neuen Art in meiner eigenen Sammlung.

minute sat sparse ruguloso-punctatis; alis griseis, costis externis nigris; pedibus pro parte testaceis, pro parte piceis.

Long. 8 mill. Paraguay.

Mit *P. unicolor* Pic nahe verwandt, deutlich von diesem zu unterscheiden durch den mehr glänzenden Halsschild, die nicht so blasse Färbung und die Flügeldecken, welche dunkel gerandet sind.

***Phrixothrix impressus* n. sp.**

Major, sat robustus sed elongatus, nitidus, grisco-pubescent et hirsutus, testaceus, capite nigro, antennis testaceis, pro parte et paulo piceis. Antennis paulo brevibus; capite breve et lato, inter oculos concavo, minute et sparse punctato, oculis valde prominulis; thorace breve et lato, lateraliter antice et postice valde impresso, ad basim medio marginato plicato, minute et sparse punctato; scutello punctato; elytris thorace non latioribus, ad medium arcuate dilatatis, postice valde attenuatis et acuminatis, in disco postice longe impressis, antice minute et sparse punctatis, postice pro parte granulosis; pedibus testaceis, valde depresso.

Long. 22 mill. Bolivia.

Durch seine Größe und seine Färbung dem *P. hirtus* E. Oliv. nahestehend, unterscheidet sich aber von diesem durch die weniger starke Punktierung des Kopfes, die Form und die Skulptur der Flügeldecken.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Neue Phrixothrix-Arten \(Col. Malacodermata.\). 375-376](#)