

nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß sich *Salvia pratensis* sehr gut zur Aufzucht von *Acidalien*-Raupen eignet. In der Literatur findet man bei den *Acidalia*-Arten meist angegeben „die Raupe lebt an niederen Pflanzen“. Dieser Ausdruck „niedere Pflanzen“ sollte endlich aus der Literatur verschwinden, es gibt keine Raupe, die derart polyphag ist, daß sie mit sämtlichen niederen Pflanzen erzogen werden könnte.

Ich erzog, meist e. o., mit Erfolg an Wiesensalbei: *Acidalia immorata* L., *marginipunctata* Goeze; *Ptychopoda ochrata* Scop., *muricata* Huf., *seriata* Schrk., hievon auch die f. *australis* Zell ex Italien, *biselata* Huf., *humiliata* Huf., *degeneraria* Hbn. ex Südtirol und *aversata* L. mit den verschiedenen Formen.

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuerzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, *Nolidae*, *Syntomidae*, *Arctiidae*, *Zygaenidae*, *Psychidae*, *Sesiidae*, *Cossidae*.

(Fortsetzung)

1073. *exanthemata* Sc. Bei Wippach Anfang Juni in Weidengebüsch nicht selten (Mn. Kstld.); Pođbrdo Ende Juni; Bačatal, Isonzotal vielfach; Wippachtal wohl allenthalben, bei Triest selten im Mai, Juni; scheint an Erle und Weide gebunden; zweibrütig, Mai, Juni und Ende Juli bis Anfang September (Strd.). Isonzoufer bei Lucinico Ende Mai aus Erlengebüsch (Hafn. F. Görz); Fiume Mai, Juni (Mn.). Lastva (Schaw. B. H. IX). Jablanica (Rbl. Stud. II).

Auch Kroatien-Slavonien. Bosnien; sibirisch.

Numeria Dup.

1074. *pulveraria* L. Crna Prst. 1000 m. 29. VI. (Hafn. F. Kr.); Görz, Kalvarienberg, Grojna, Paludawiesen und im Rosental bei Görz nicht selten im Mai mit f. *violacearia* Graes., welcher Form alle Falter der II. Gen. angehören; auch am Köder (Hafn. F. Görz);

Görz 12. und 26. IV. vielfach am Licht; f. *passetii* Th. 24. IV. und trs. ad ab. *violacearia* 26. IV. auch aus Görz (Stdr.); Vucija bara Juni (Schaw. B. H. IX).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1075. *capreolaria* F. Crna Prst, I. Terrasse, 1100 m, in Anzahl aus Fichten und Buchen gescheucht, 7.—30. VIII. Mojstrana Lichtfang (Hafn. F. Kr.); Volujak in Anzahl 5. IX. (Schaw. B. H. VI).

Auch in Kroatien, Bosnien; vielleicht noch alpin.

1076. *Ellopija prosapiaria* L. Diese aus den Karawanken, dann von Mojstrana, Vratatal, Wochein - Feistritz, Wocheiner See und auch von Adelsberg (Juni, Juli), durch Hafner festgestellte Art wird sicher noch in den angrenzenden Teilen des Gegenstandsgebietes angetroffen werden (Stdr.). In der Form *prasinaria* Hb. aus der Herzegowina (Prenj, 1300 m, und Vucija bara) festgestellt.

Auch in Bosnien (*prasinaria*); sibirisch.

Metrocampa Latr.

1077. *margaritata* L. Crna Prst, 6—700 m, und bei 1200 m 31. VII., 7. VIII.; Nanos 30. VII. aus Weißbuchen gescheucht; Veldes 24. VI. (Hafn. F. Kr.); Abhänge bei Salcano ein Stück 6. VI. von einem Kastanienbaum (Hafn. F. Görz); Mte. Maggiore 23. VII. (Rbl. M. M.); M. Maggiore-Haus 2. VII. (Schaw. M. M.); Fiume Juli Eichengebüsch (Mn.); Mostar 29. VII. (Schaw. B. H. VIII); Jablanica, Prenj (1050—1300 m), Vucija bara 19. VII.; Volujak (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1078. *honoraria* Schiff. Bei Zengg Juni (Mn. Fiume); Mittel-dalmatien (Mn.).

Sonst Südeuropa selten im Mai und Juli; mediterran.

Ennomos Tr.

1079. *quercinaria* Hufn. Bei Oberfeld Mitte Juni ein ♀ an Eichen (Mn. Kstld.); f. *carpinaria* Hb. vom Mte. Maggiore 8. IX. an Buchenstämmen (Rbl. M. M. II); Fiume, beim Pulverturm selten im Juni (Mn.). Herzegowina, Prenj in 1500 m Nennform, in 600 m, 2. VIII. auch *carpinaria* Hb. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1080. *fuscantaria* Hw. Gacko (Schaw. B. H. VII).

Auch in Bosnien (Sarajevo); europäisches.

1081. *erosaria* Hb. Mojstrana, Lichtfang; f. *tiliaria* Hb. Mojstrana. Lichtfang, Präwald 11. VII. (Hafn. F. Kr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Mattuglie Oktober (Rbl. M. M. I). Mostar 4. X. (Schaw. B. H. VIII).

Auch in Kroatien-Slavonien, Ungarn; orientalisches.

1082. *quercaria* Hb. Bei Oberfeld Mitte Juni an Eiche ein frisches ♀ (Mn. Kstld.); Triest 22. IX. ein frisches ♀ am Licht (Stdr.); Abbazia 31. VII., Mattuglie 24. VII. bis Ende August (Rbl. M. M. I); Fiume Juni beim Pulverturm einige, selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Domanovic (Rbl. Stud. II).

Auch in Oberungarn; orientalisches.

1083. *Eumera regina* Stgr. Zara ziemlich häufig, Raupe an Mandelbaum (Stdr.); erste Stände Verh. zool.-bot. Ges. 1905, pp. 1/3. f. *decoronata* Stdr. mit den fehlenden veilrotgeränderten Fleckchen in Zelle 2 und 3 der Vorderflügel-Oberseite aus Zara (Stdr. Boll. Soc. Adr. Trieste XXVII, P. I, p. 164).

Sonst noch in Griechenland; Pontus, Palästina; pontisch-orientalisches.

Selenia Hb.

1084. *bilunaria* Esp. Crna Prst, 1200 m, 19. VI.; Senosetsch am Karst (Hafn. F. Kr.); Görz April Lichtfang, gen. aest. *juliaria* Hw. Ende Juni, Anfang Juli (Hafn. F. Görz); *juliaria* nicht selten Kronberg 6. VII.; bei Triest sehr selten (Conconello, Cologna); *bilunaria* Görz 15.—26. IV. sehr häufig am Licht (Stdr.); Canale, *juliaria*, 15. VI. (Prinz); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Mattuglie April, Abbazia (Rbl. M. M. II); Fiume Mai (*illunaria* Hb.) aus Hecken gescheucht (Mn.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisches.

1085. *lunaria* Schiff. Crna Prst, 700 m, 29. VII., Mojstrana; gen. aest. *delunaria* Hb. Wippach (Hafn. F. Kr.); Görz Mitte April bis Mitte Mai; *delunaria* Mitte Juli (Hafn. F. Görz); *delunaria* Canale 23. VII. (Prinz); Triest, häufig August Gebüsch (Carr.); ebenda (Moser); Mattuglie 20. V.; *delunaria* Abbazia 8. VII., Mattuglie 18. VII., 5. VIII. (Rbl. M. M. I); Abbazia 31. III. am Licht (Rbl. M. M. II); August Abbazia mehrfach am Licht — klein, matt gezeichnet (Pffizner). Zengg, *delunaria*, 12. VII., 8. VIII. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.). Gacko, *delunaria*, August (Schaw. B. H. III, IX); Nevesinje (Rbl. Stud. II).

Insel Brioni 25. IV. ein großes dunkles ♂ (Rbl.).

Auch aus Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1086. *tetralunaria* Hufn. Nennform und g. a. *aestiva* Stgr. Mojstrana und Wippach April bis August (Hafn. F. Kr.); Anfang Mai bei Wippach ein Stück (Mn. Kstld.); Noghera Ende April ein ♀ (Stdr.); bei Volosca und Castua (*illustraria* Hb.) an Wald-rändern (Mn. Fiume); Mitteldalmatien 1 (Mn.), woselbst die Art eine Südgrenze erreicht; sibirisch.

1087. *Hygrochroa syringaria* L. Im Gebiete selten. Triglav, Voßhütte, 1400 m, 5. VII.; Wippach 19. VI. Lichtfang in zwei Gen. (Hafn. F. Kr.); Grojna 1 26. VI., 29. VIII. je ein Stück am Lichte (Hafn. F. Görz); bei Triest und südlich davon nicht festgestellt (Stdr.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1088. *Gonodontis bidentata* Cl. Voßhütte am Triglav 1. VII.; Mojstrana Mai, Wippach 1. VI. (Hafn. F. Kr.). Sonst im Gebiete nicht gemeldet.

Auch in Kroatien, Bosnien; sibirisch.

1089. *Himera pennaria* L. Podmelec, Woltschach, Canale, überall in und um Görz, Dutovlje, Repentabor; Triest Licht gemein Spätherbst und Winteranfang, oft sehr dunkle Stücke; Borst, Herpelje-Kozina (alle Stdr.); Görz Ende Oktober bis Ende November am Licht nicht selten in schönen dunkelrotbraun gefärbten Stücken (Hafn. F. Görz); Triest gemein Oktober, November, Raupe auf Birnbäumen (Carr.); Mattuglie (Rbl. M. M. I); Zengg 7.—16. X. (Dobiasch); Mostar 7. XI. (Schaw. B. H. VII); f. *obscura* Aign, Mostar 5. XI. (Schaw. B. H. XI).

Auch Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1090. *Dasycephala modesta* Stgr. Mostar 20. und 28. VII. (Schaw. B. H. VIII) F. I.

Dürfte Dalmatien nicht fehlen; orientalisches.

Crocallis Tr.

1091. *tusciaria* Bkh. Sporadisch und selten, Flugzeit nach Rebel und Spuler im Juli, nach Hafner Ende September bis Mitte Oktober. Görz trs. ad f. *geigeri* Stgr. 22. X. Lichtfang (Hafn. F. Görz); Mattuglie im Oktober *geigeri* (Rbl. M. M. I); Nennform und *geigeri* Mattuglie Oktober, neben normalen Stücken ein auffallend dunkles ♂ (Rbl. M. M. II); Mostar 27. X. *geigeri* (Schaw. B. H. VII); Nennform Mostar 27. X. (Schaw. B. H. XI).

Auch in Südtirol, Kroatien, Ungarn, Mittelitalien; orientalisches.

1092. *elinguaria* L. Mojstrana 20. VII., Senosetsch auf dem Karste (Hafn. F. Kr.); Triest selten September; Raupe im Sommer auf Eichen (Carr); Boschetto Mitte Oktober Licht (Moser); Triest aus Raupen mehrfach gezogen e. l. 14. VIII.; Rakitovic Mitte August sehr eintönig gehaltene, blasse Tiere, durchwegs ohne Saumpunkte (Stdr.); Mattuglie September (Rbl. M. M. II); Fiume Mai in Eichengebüsch (Mn.), dürfte wohl die Raupe gemeint sein; Zengg 12. IX. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste ein ♂ Juni (Werner); Gacko (Schaw. B. H. VII).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1093. *Angerona prunaria* L. Mojstrana, Vratatal Ende Juni, Juli; Birnbaumerwald 6. VII.; Slap ob Wippach Juni; f. *sordata* Fueßl. selten am Licht in Wippach 6. VI. (Hafn. F. Kr.); Görz-Grojnatal zweite Hälfte Juni und September (Hafn. F. Görz); bei Slap Juni einige aus Hecken (Mn. Kstld.); *sordata* Fueßl. Mattuglie 30. VII. (Rbl. M. M. I); Lovrana Juli die Nennform (Schaw. Verh. zool.-bot. Ges. 1916, p. 108); Fiume Juni in Eichengebüsch (Mn.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1094. *Ourapteryx sambucaria* L. Mojstrana 15. VII.; Wippach 9. VI. (Hafn. F. Kr.); Gradišče 29. VI. an Ahornbaum (Mn. Kstld.); Görz 19. VI. (Hafn. F. Görz); Flitsch 2. VII.; Heiligenkreuz 18. VI.; Görz 19. VI.; Reifenberg Ende Juni; überall einzeln und selten (Stdr.); Fiume Juni an Syringushecken selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Gacko (Schaw. B. H. IX).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien (nur Dervent); sibirisch.

1095. *Eurymene dolabraria* L. Crna Prst, 1000 m, 29. VI., Krmasattel 28. VI. (Hafn. F. Kr.); Grahova, Podbrdo je ein Stück Ende Mai (Stdr.); Kalvarienberg 11. V.; August am Köder; Tschaun bei 1200 m am 22. VI. (Hafn. F. Görz); Abbazia 11. VI. verfliegen (Rbl. M. M.); Fiume **1** Juni in Eichengebüsch (Mn.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1096. *Opisthograptis luteolata* L. Wochein-Feistritz 11. VI.; Wocheiner See 26. VI.; Mojstrana; Sovič bei Adelsberg 18. VI.; Wippach, Nanos ob Präwald 14. V.—13. VII. (Hafn. F. Kr.); um Wippach Mitte Mai aus Dornhecken (Mn. Kstld.); Dolsattel 15. VII. mehrfach, auch noch oberhalb Heiligenkreuz-Cesta (Stdr.); Predmeje ob Haidenschaft 22. VI. (Hafn. F. Görz); Abbazia, Mattuglie Juni, Juli (Rbl. M. M. I); Fiume (*Rumia crataegata* L.) Mai bis Juli (Mn.); Lovrana 22. VII. (Schaw. M. M.); Mitteldalmatien (Mn.); Plaša 5. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien, Serbien; sibirisch.

Epione Dup.

1097. *apiciaria* Schiff. Mojstrana, Senosetsch am Karst, Wip-pach Juni, Juli (Hafn. F. Kr.); Grojna Mitte Juli, abgeflogen (Hafn. F. Görz); Fiume Juni selten (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1098. *parallelaria* Schiff. Mojstrana 1. VIII. (Hafn. F. Kr.); Flitsch 2. VII., Woltschach 18. VI. (Stdr.).

Weiter südlich nicht vorgefunden, auch nicht von Bosnien oder Herzegowina bekannt; sibirisch.

1099. *advenaria* Hb. Grojnatal, Juni bis Anfang Juli in Ge-büsch, ziemlich häufig (Hafn. F. Görz); Podbrdo, Canale, St. Lucia, Salcano, Kronberg, Görz, Grojnatal, Reifenberg, Monfal-cone, Triest **1** ab und zu aus Gebüsch im Hochsommer (Stdr.).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1100. *Hypoplectis adpersaria* Hb. Fiume, beim Pulverturm, Juni (Mn.). Trebevic südlich Sarajevo (Rbl. Stud. II).

Sonst noch im Banat, Siebenbürgen; sibirisch.

1101. *Hypoplectis adpersaria* Hb. Fiume F₁, Juni beim Pulver-turm einige (Mn. Fiume!).

Sibirisch. *)

(Fortsetzung folgt.)

Die aus Bosnien bekanntgewordene *Caustoloma flavicaria* Hb. wurde in der Herzegowina noch nicht gefunden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 379-384](#)