

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

Boarmia Tr.

1130. *perversaria* B. Auf dem Nanos um Juniperus Juni Nennform und *correptaria* Z. im Juli (Mn. Kstld.); letztere Abbazia 28. VI. Abbazia (Rbl. M. M. I), bei Martinischza Mai selten (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Herzegowina: Mostar *correptaria* 21. V. (Schaw. B. H. IX), Tassovic bei Capljina September drei auffällig schwärzlich verdunkelte kleine ♀♀ (Rbl. Stud. II), Belegstücke im Wiener Museum. Inselfunde: Lissa *correptaria* (Galv. Dalm. I.); Brioni in gleicher Form mehrfach Mai (Rbl. Br. gr.).

Sonst auch Krain, Ungarn; orientalisches.

1131. *cinctaria* Schiff. Wippachtal April, Anfang Mai öfters, sehr variable Stücke (Hafn. F. Kr.); Görz Lichtfang selbe Zeit, auch Salcano (Hafn. F. Görz); bei Wippach Mai an Mauern, Felsen und Baumstämmen (Mn. Kstld.); Salcano Mai, St. Lucia, Görz, Dutvolje, Repentabor April, Mai, Triest-Cologna 30. IV. vielfach (Stdr.); Abbazia Mai ein helles ♀ (Rbl. M. M. I), ebenda 31. III. zwei ♂♂; Mattuglie April, Mai (Rbl. M. M. II); Fiume April und Mai (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Marjan 8. IV. mehrfach an Felsen (Stdr.); Kučiste, nicht selten an Olivenstämmen (Werner); Bjelina 28. IV. Nordostbosnien (Schaw. B. H. VIII); f. *pasquaria* Brahm. Sarajevo 23. IV. (Schaw. B. H. IX); Stolac (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1132. *gemmaria* Brahm. Im Gebiete sehr verbreitet, in zwei Gen. Mai, Juni und September. Wippachtal Mitte Mai bis September häufig (Hafn. F. Kr.); Görz, Ende Mai, Juni und wieder August überall; auch auf Pfirsichbäumen und am Köder (Hafn. F. Görz); Wippachtal, von St. Veit bis Heiligenkreuz Juni nicht

selten an Felswänden, Mauern und Baumstämmen (Mn. Kstld.); am Karste bei St. Daniel, Dutovlje gemein; Triest Mitte bis Ende Oktober, häufig am Licht (Stdr.); Triest, sehr gemein August und September an Baumstämmen (Eichen) und an Felsen (Carr.); Boschetto, Contovello, Opcina, Rojano, Barcola, Prosecco, zweite Gen. nicht selten (Galv.); Prosecco (Napoleonstraße) 18. V. ein ♀ frisch; Leme 4. VI. ein ♀ abgeflogen; Scorcola 9. IV. (Stdr.); Pola (Klos); Reifenberg-Daniel 5. VI.; Triest 18. und 29. IX. (Naufock); Volosca 21. IV.; Abbazia 8. VI.; Lovrana August, Mattuglie 10. VI., 30. VII. (Rbl. M. M. I); Veprinaz 9. VI. Köder; Mattuglie 9. und 22. IX. (Rbl. M. M. II); Fiume (*Rhomboidaria* S. V.) Mai, Juni (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Sebenico Mai abgeflogen (Rückert); Castelvecchio bei Spalato 12. V. (Stdr.). Herzegowina, Mai, Juni, September (Schaw. B. H. VI, VIII); Jablanica, Velež; Tassovic September sehr kleine Stücke der II. Generation; Domanovic (Rbl. Stud. II). Insel Brioni Mai, August bis Oktober sehr häufig (Rbl. Brioni). Arbe (Dundowald) 8. IX. am Köder (Galv. B. A. I.); Lussin-grande Mitte Juni (Galv. Ausb. Lussin).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1133. *ilicaria* H. G. Mitteldalmatien (Mn.); Von ihm auch für Brussa und Amasia angeführt.

Sonst lokal im westlichen Europa; mediterran.

1134. *secundaria* Esp. Crna Prst, untere Waldregion, 600 bis 700 m, aus Fichten gescheucht, 31. VII. frisch; Kronau (Hafn. F. Kr.); im Gegenstandsgebiete selbst bis jetzt nicht festgestellt (Stdr.).

Auch in Bosnien, Ungarn; orientalisches.

1135. *ribeata* Cl. Weißenfelder See 19. VII.; Kouk 9. VIII. (Hafn. F. Kr.); ein Stück (♂) dieser schönen Art erhielt ich aus dem Trentagebiet Mitte Juli; leider etwas abgeflogen (Stdr.).

Weiter südlich nicht beobachtet worden; sibirisch.

1136. *umbraria* Hb. B. Rbl. IX: Istrien, lokal, April und September; Rp. im März und Juli auf Oliven. Ein ganz frisches ♀ der f. *decoasteraria* Obth. an einer Steinsäule des Hofes im See-arsenal von Pola in der Nähe von Evonymus-Gebüsch am 13. X. (Stdr.); Mattuglie September; Lovrana, gezogen von Pistacia (Rbl. M. M. II); Zengg 26. V., 7. VI. zwei ♂♂ (Dobiasch); Mostar 26. V. (Schaw. B. H. X). Insel Lissa (Galv. Dalm. Ins.).

Auch in Südtirol, Ungarn; orientalisches.

1137. *repandata* L. Im nördlichen Teile des Gebietes verbreitet, im Gebirge und in Tälern, noch bei 1700 m angetroffen.

Südlichster Fundort im Gebiete Fiume; dürfte auch in Inneristrien nicht fehlen. — Einbrütig. Hinter Oberfeld und auf dem Kouk in Laubwaldungen im Juni (Mn. Kstld.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Fiume 5. VI. (Mändl); daselbst Juni einzeln (Mn.). In der Herzegowina und in Bosnien überall in Gebirgswäldern häufig. Jablanica, Plaša, Prenj, Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch in allen Nachbarländern verbreitet; sibirisch.

1138. *consortaria* F. Bei Wippach Mai an Baumstämmen (Mn. Kstld.); Görz April, Mai und Juli, August (Hafn. F. Görz); Triest Juni an Eichenstämmen häufig, darunter selten *consobrinaria* Bkh., in zwei Gen. April, Mai und Juli, August (Stdr.); Triest, gemein Juni an Eichenstämmen (Carr.); Abbazia Mai (Rbl. M. M. I); Fiume Mai aus Hecken gescheucht (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Bjelina 28. IV., Nordostbosnien (Schaw. B. H. VIII); Mostar 22. VI. (Schaw. B. H. VI); Jablanica 14. VII., Prenj, Velež, Stolac 22. IV. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; sibirisch.

1139. *angularia* Thnbg. Tschaun, 1200 m, 22. VI. (Hafn. F. Görz); Mte. Maggiore-Gipfel 2. VII. (Schaw.) und 23. VII., 16. VI. (Rbl. M. M.); Mte. Maggiore (*viduata* S. V.) Juni (Mn. Fiume); Zengg 6.—11. VI. (Dobiasch). Herzegowina Juli, Maglič, Zelengora (Schaw. B. H. III); unter dem Orjensattel (Schaw. B. H. IX), Plaša, Prenj (1000—1300 m), Velež (Rbl. Stud. II).

Auch aus Kroatien-Slavonien, Bosnien; europäisch.

1140. *lichenaria* Hufn. Ein Stück am Gipfel des Mte. Maggiore (Rbl. M. M.); Radmannsdorf in Krain 29. VII. (Hafn. F. Kr.); Vucija bara bei Gacko, Lakat 22. VII. (Rbl. Stud. II).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien; orientalisches.

1141. *selenaria* Hb. Über das ganze Gebiet verbreitet in zwei Gen. April, Mai und Ende Juni, Juli, August; auch noch Mitte Oktober; im südlichen Teile stellenweise ziemlich häufig, vielfach zu *dianaria* Gn. gehörend. Bei Wippach Mai an alten Weidenstämmen (Mn. Kstld.); Görz, von Mitte April bis Anfang September, an Baumstämmen nicht selten. Eine Raupe auf Sambucus gefunden und damit weitergefüttert (Hafn. F. Görz); Canale 15. VI. (Prinz); Triest April, Juli und September; Raupe Mai von Wiesen und Gebüsch geholt (Carr.); Boschetto Mitte Oktober Lichtfang (Moser); Pola (Klos); *dianaria* Gn. Mattuglie 20. V., 18. VI., 30. VII.; Abbazia 4. V., 8.—24. VII. (Rbl. M. M. I); Abbazia August Lichtfang (Pfitzner); Fiume Mai, Juni an Felswänden (Mn.); *selenaria*

und *dianaria* aus Mitteldalmatien (Mn.); Mostar Juni und 2. X. *dianaria* (Schaw. B. H. VI, VII); Insel Meleda Mai (Galv. B. A. I.). Insel Brioni, *dianaria*, 23. V. (Rbl.).

Auch in Kroatien-Slavonien, Bosnien, den nördlichen Nachbargebieten; sibirisch.

1142. *crepuscularia* Hb. Auf dem Nanos um Buchen Mai (Mn. Kstld.); Trnowanerwald 12. VI. und Čepovan im Buchenwald (Stdr.); Görz, Lichtfang, Mitte März und Mitte Juli, nicht selten (Hafn. F. Görz); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Abbazia (Rbl. M. M. II); Fiume Mai im Gebüsch (Mn.); fehlt in Dalmatien; erst wieder in der Herzegowina, selten. Olovo, 11. IV. f. *bistortata* Goeze (sonst aus England) (Schaw. B. H. VIII).

Sonst in Kroatien-Slavonien, Bosnien und den nördlicheren Nachbarländern; sibirisch.

1143. *luridata* Bkh. Sovič bei Adelsberg 18. VI. (Hafn. F. Kr.); Grojnatal, zweite Junihälfte aus Gebüsch (Hafn. F. Görz); bei Kamenjak (*extersaria* Hb.) im Juni (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.). Fehlt weiter südlich; in den nördlichen Randgebieten, in den Alpen; sibirisch.

1144. *punctularia* Hb. Mehrfach bei Görz, St. Lucia, Triest, Mitterburg-Pisino von Anfang April bis Juli, offenbar in zwei Gen. Ein auffallend dunkles Stück aus Görz (Stdr.); Görz 5. IV., 3. V. (Hafn. F. Görz); Scorcola 9. VII. ein ♂ verfliegen, Lichtfang, zweite Gen. (Stdr.); bei Fiume (*punctulata* S. V.) April in Eichengebüsch (Mn.). Weiter südlich nicht mehr beobachtet.

Auch in den Alpenländern, Kroatien-Slavonien, Bosnien (Rbl. Stud. II); sibirisch.

Tephronia Hb.

1145. *sepiaria* Hufn. Bei Clana F₁, (*cineraria* S. V.) Juli an Mauern (Mn. Fiume); Mostar 5. VII. (Schaw. B. H. IX).

Sonst auch in Tirol, Kroatien, Ungarn; mediterran.

oppositaria Mn. Nach Rebel in Dalmatien, Juli, August. Nähere Daten unbekannt.

Sonst im Kaukasus, Kleinasien; orientalisches.

1146. *Pachycnemis hippocastanaria* Hb. Mitteldalmatien (Mn.). Kučiste Juni, sehr selten (Werner); Pola März; Gravosa 28. VII.; Insel Meleda (Blata) 12. IV., Govedjari 11. IV., Lichtfang; Mte. Vipera 14. IV., Lissa 29. VIII.; in zwei Gen. (Galv. B. A. I.); Lastva 20. VIII. (Rbl. Stud. II).

Auch in Griechenland, Kleinasien; orientalisches.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 420-423](#)