

## Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

### *Pterostichus (Poecilus) Koyi* ssp. *venetus* Schaub.

Gestreckte Gestalt, lange gestreckte, ziemlich paralleelseitige, gegen die Schultern nur in flacher Kurve verengten Fld., tief eingeschnitten, Fldstreifen tief eingeschnitten, ziemlich kräftig punktiert, die beiden ersten Fühlerglieder größtenteils rotbräunlich. Einfärbig schwarz. Lg. 12·5—14 mm. Col Santo, Südtirol. Ent. Anz. III, 129.

### *Pterostichus (Lyperophorus) Ziegleri* Duft. ssp. *extraneus* Schaub.

Von *Ziegleri* verschieden durch kürzere, flachere Stirngruben, etwas stärker gewölbten Hsch. und kaum angedeuteten äußeren Basaleindruck. Steyr, Oberösterreich. Ent. Anz. I, 127.

ssp. *obirensis* Schaub. Unterschieden durch flachere Gestalt, Körperform viel schlanker, mehr paralleelseitig, der Hsch. im Verhältnis zu den Fld. kleiner. Diese sind an der Spitze noch breiter abgerundet als bei *noricus*, die Seiten des Hsch. sind wie bei diesem geformt, der äußere Basaleindruck fehlt. Obir, Kärnten.

ssp. *culminicola* Schaub. *obirensis* äußerst ähnlich, ebenso flach und gestreckt, paralleelseitig. Stirnfurchen regelmäßig kürzer und seichter als bei den übrigen Rassen, der innere Basaleindruck des Hsch. etwas kürzer, zur Basis stärker grubig vertieft und erreicht den Basalrand nicht, der äußere Basaleindruck fehlt. Die Punkte auf den Zwischenräumen der Fldstreifen sind zahlreicher. Grünlichschwarz bis dunkelviolett. Forcepsspitze einfach wie bei *Ziegleri*, die obere Paramere einfach kolbenförmig mit glattem Seitenrand. Col Santo, Südtirol. Ent. Anz. I, 128.

### *Pterostichus (Cheporus) Burmeisteri* ssp. *zebianus* Schaub.

Körperform auffallend breit und kurz, Hsch. breit nach vorne normal verengt, zur Basis aber fast garnicht verengt, die Seiten verlaufen nach hinten fast paralleelseitig und sind vor den Htecken kaum ausgeschweift. Fld. auffallend kurz und breit, vorne sehr breit und nach rückwärts ziemlich stark verengt, die größte Breite liegt im vorderen Viertel, wodurch die Fld. nach hinten stärker zugespitzt erscheinen. Die Streifung und Punktierung der Fld. ist ähnlich wie bei *Palae*.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 463](#)