

zelenen, von REITTER darunter gestellten Arten, gehören gut getrennten Gattungen an. Die „Großgattung“ platzt endgültig, wenn man bedenkt, daß die dazugehörigen Arten bzw. Gattungen zu zwei verschiedenen Tribus gehören. Bestimmungstabellen, die vorwiegend für Nicht-Berufszoologen gedacht sind, sollten in größerem Umfang als bisher möglichst präzise ökologische bzw. bionomische Angaben zur Erleichterung der Diagnose enthalten. Der Rezensent ist sich über die große Schwierigkeit, eine solche Forderung zu realisieren – insbesondere bei den Coleoptera – im klaren. Grundsätzlich kommen in nahezu allen Bestimmungswerken die Insektenlarven äußerst schlecht weg, obwohl sie dem Benutzer in der Natur mindestens ebenso auffallen, wie die Imagines (gleichsinniges gilt für Eier, Puppen, Fraßbilder usw.). Dies ist keine Kritik am BROHMER, nur ein Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Arbeit auf diesem Gebiet.

Die angeführten Hinweise sollen die Vorzüglichkeit und die Brauchbarkeit der bewährten Tabellen nicht vergessen lassen. Man kann dieses Buch warm empfehlen, aber man kann auch einige Wünsche zur Verbesserung aussprechen.

Bernhard Klausnitzer

### Berichtigung

In der Arbeit R. MIKŠIĆ: Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Protaetia* BURM. (Ent. Nachrichten, XIII, 12, pp. 137–147) kam es auf zwei Stellen zu sinnstörenden Fehlern, welche auf folgende Weise zu berichtigen sind:

S. 141

Die Fußnote gehört auf S. 142 und bezieht sich auf *P. (P.) cuprea bourgini* (RUTER).

S. 143

Die Zeilen 13 bis 15 von oben müssen durch folgenden Text ersetzt werden: Farbe äußerst veränderlich. Die Oberseite bläulichgrün, dunkelgrün, goldgrün, mit rötlichgoldigen Schimmer, rotgoldig, purpurrot, tief und etwas violett purpurn bis schwarz. Die Unterseite dunkel . . .

---

*Inhalt:* MOUCHA, Nachträge zur Faunistik der Bremsen (Dipt., Tabanidae), S. 49; KLAUSNITZER, Zur Kenntnis der Larven der palaearktischen *Brumus*-Arten (Col. Coccinellidae), S. 52; MIKŠIĆ, Zwei interessante Scarabaeiden-Funde im Küstenland der Crna Gora, S. 55; HEESE, Zur Unterscheidung und zum Vorkommen von *Chrysotoxum octomaculatum* CURTIS und *Chr. veralli* COLLIN (Dipt., Syrphidae), S. 57; SKELL, Köderfang im Unterharz (Lep.), S. 60; Buchbesprechungen, S. 63.

---

Erscheint unter Lizenznummer 255 des Rates des Bezirkes Dresden

Herausgeber: Deutscher Kulturbund, Bezirksleitung Dresden

Redaktion: Dr. Werner Ebert und Dr. Bernhard Klausnitzer

Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Gerrit Friese, Dr. Heinz Hiebsch, Manfred Koch,

Prof. Dr. Fritz-Paul Müller und Prof. Dr. Ulrich Sedlag

Manuskripte, Zuschriften und Bestellungen an Dr. Werner Ebert, 13 Eberswalde, R.-Breitscheid-Straße 58 – In zwangloser Folge jährlich 12 Hefte. Bezugspreis 10,- M, einzuzahlen auf Postscheckkonto: Dresden 9945, Deutscher Kulturbund, Fachgruppe Entomologie. – Bei Manuskripten über 5 Seiten und Buchbesprechungen über eine Seite ist vor dem Einreichen bei der Redaktion anzufragen. – Die Verfasser sind für den Inhalt ihrer Artikel selbst verantwortlich. – Die Schriftleitung behält sich eine redaktionelle Bearbeitung vor. – Anzeigenaufnahme kostenlos.

III-4-9-975-1

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Berichtigung 64](#)