

M. SIEBER, Ostritz

Funde von Cryptophagidae aus der Oberlausitz (Col.)

Summary It is given a list of findings of the family Cryptophagidae (without genus *Cryptophagus*) from Oberlausitz. It contains 48 species, some of them new for G.D.R.

Résumé Une liste de découverte du Cryptophagidès est donnée (sans genus *Cryptophagus*) de la Lusace Supérieur. Elle contient 48 espèces, quelques de celles sont annoncées la première fois pour la RDA.

Mit der vorliegenden Arbeit soll die faunistische Bearbeitung von ausgewählten Käfergruppen für das Gebiet der Oberlausitz weitergeführt werden. Die Cryptophagidae sind durch ihre geringe Größe und die schwierige Determination weniger beachtet worden, und es wurde auch weniger über sie publiziert. Viele der hier belegten Arten sind Erstnachweise für das Gebiet der DDR!

Durch Vermittlung von Herrn Dr. L. DIECKMANN hatte ich die Möglichkeit, seit 1971 jedes Jahr eine umfangreiche Serie, besonders der Gattung *Atomaria*, zu Herrn Dr. COLIN JOHNSON zu senden. Ich möchte auch an dieser Stelle Freund COLIN JOHNSON ganz herzlich für seine umfangreiche Hilfe und Zuverlässigkeit danken! In diesem ersten Teil sind bis auf die Gattung *Cryptophagus* alle bisher nachgewiesenen Arten der Cryptophagidae behandelt. Bei *Cryptophagus* ist noch viel Material unbestimmt, bisher sind von dieser Gattung für die Oberlausitz 20 Arten nachgewiesen.

Es ist verständlich, daß bei einer faunistischen Bearbeitung die meisten Belege aus der näheren Umgebung des Wohnortes des Sammlers stammen, deshalb wurden die östlichen Gebiete des Bezirkes Dresden, die im wesentlichen die heutige Oberlausitz umfassen, nicht gleichmäßig intensiv besammelt. Rund 90 Prozent der Fundpunkte liegen im Vorland des Zittauer Gebirges. Gesammelt wurde in den Kreisen Zittau, Görlitz und Löbau sowie in der Umgebung der ehemaligen Biologischen Station bei Guttau. Die Fangdaten der älteren Funde aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden (MTD) und dem Staatlichen Museum für Naturkunde Görlitz (MNG) suchte Herr R. PESCHEL heraus, diese Käfer wurden nicht

überprüft. Außer meinen Aufsammlungen konnte ich noch die Sammlung W. RICHTER (Niederoderwitz, Kreis Zittau) auswerten, beiden Kollegen auch hier meinen Dank!

Viele Cryptophagidae kann man über das ganze Jahr finden, oft in großer Anzahl in Pflanzenabfällen, einige an Pilzen, in Nestern von Hautflüglern oder an totem Holz. Die seltenen Arten kann man schwärmend gleich nach dem Winter fangen, sobald die Temperatur über +12 °C liegt und es windstill ist, z. B. *Atomaria atrata*, *A. procerula* und *A. ihsseni*.

Telmatophilus caricis OLIV.

5. 6. 1932, Königswartha, Kr. Bautzen, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 2. 6. 1933, Kamenz „Rodelandteich“, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 2 Exemplare 5. 6. 1933, Königswartha, Kr. Bautzen, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 29. 3. 1938, Weißig, Kr. Kamenz, „Großteich“, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 6. 6. 1937, Döbra, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT, coll. MTD; E. 7. 1970, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 22. 7. 1982, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 12. 6. 1983, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 13 Exemplare 19. 5. 1984, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER.

Telmatophilus sparganii AHR.

5. 6. 1933, Königswartha, Kr. Bautzen, leg. SCHMIDT, coll. MTD.

Telmatophilus schönherri GYLLH.

5. 6. 1933, Königswartha, Kr. Bautzen, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 13. 9. 1933, Cunnersdorf, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 14. 4. 1936, Döbra, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT, in coll. MNG; 1. u. 7. 6. 1938, Groß-Baselitz, Kr. ?, „Groß-Teich“, leg. SCHMIDT, coll. MTD;

2 Exemplare 27. 5. 1978, Commerau, Kr. Bautzen, Jesor, leg. SIEBER; 30. 5. 1978, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 18. 9. 1988, Commerau, Kr. Bautzen, Jesor, leg. RICHTER; M. 7. 1988 Hainewalde, Kr. Zittau, Kiesgrube, leg. SIEBER.

Telmatophilus brevicollis AUBÉ

2. 7. 1972, Hartau, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 16. 6. 1974, Kodersdorf, Kr. Niesky, leg. PESCHEL; 2 Exemplare 13. 6. 1983, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER.

Telmatophilus typhae FALL.

5. 6. 1933, Königswartha, Kr. Bautzen, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 17. 8. 1933, Hennersdorf, Kr. Kamenz, „Rodelandteich“, leg. SCHMIDT, coll. MTD; E. 7. 1970, Guttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 27. 7. 1971, Großhennersdorf, Kr. Löbau, leg. Sieber; 2 Exemplare 2. 7. 1973, Hartau, Kr. Zittau, Tongrube, leg. SIEBER; 11. 8. 1973, Jonsdorf, Kr. Zittau, Fischteiche, leg. SIEBER; 16. 2. 1974, Hartau, Kr. Zittau, „Hartauer Teiche“, gesiebt, leg. SIEBER; 28. 5. 1978, Lieske, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER; 23. 2. 1980, Großschönau, Kr. Zittau, „Jägerwäldchen“, leg. SIEBER; 2. 4. 1986, Görlitz, Wasserwerk, leg. VOGEL; 27. 6. 1987, Kleinsaubernitz, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 17. 5. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Steinberg, leg. SIEBER.

Paramecosoma melanocephala HERBST

2 Exemplare 31. 1. 1971, Großschönau, Kr. Zittau, „Poche“, leg. SIEBER; 18. 2. 1971, Hainewalde, Kr. Zittau, „Mandau“, leg. SIEBER; 19. 2. 1971, Mittelherwigsdorf, Kr. Zittau, „Mandau“, leg. SIEBER; 2 Exemplare 24. 3. 1971, Hainewalde, Kr. Zittau, „Mandau“, leg. SIEBER; 3 Exemplare 30. 3. 1974, Hirschfelde, Kr. Zittau, „Kammlitztal“, leg. SIEBER; 25. 4. 1980, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 3. 6. 1982, Jonsdorf, Kr. Zittau, Autokäscher, leg. SIEBER; 3. 3. 1982, Großschönau, Kr. Zittau, „Poche“, leg. SIEBER; 13. 3. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, Neisse „Klosterwiese“, leg. SIEBER; 19. 12. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 26. 3. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER.

Weitere Belege vom Neißeufer und den zuführenden Bächen innerhalb des LSG Neißetal liegen vor.

Emphylyus glaber GYLL.

7 Exemplare 8. 2. 1981, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, „Hofebusch“, leg. SIEBER; 9 Exemplare 3. 1. 1982, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau,

„Hofebusch“, leg. SIEBER; 11 Exemplare 27. 2. 1985, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, „Hofebusch“, leg. SIEBER; 2 Exemplare 6. 11. 1985, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, „Hofebusch“, leg. SIEBER; 2 Exemplare 25. 11. 1979, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 6 Exemplare 27. 2. 1981, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 2 Exemplare 21. 11. 1981, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER; 3 Exemplare 6. 3. 1982, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER.

Pteryngium crenatum GYLL.

28. 9. 1986, Obercunnersdorf, Kr. Löbau, leg. RICHTER.

Antherophagus nigricornis F.

8. 1941, Hirschfelde Kr. Zittau, „Neißetal“, leg. JORDAN; 2. 6. 1969, Großschönau, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 23. 6. 1969, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, „Hofebusch“, leg. SIEBER; 4. 7. 1970, Großschönau, Kr. Zittau, „Poche“, leg. SIEBER; 24. 7. 1970, Mittelherwigsdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 4 Exemplare E. 7. 1970, Lömischau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER; 29. 8. 1970, Waltersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 10. 7. 1973, Großschönau, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 15. 7. 1974, Großschönau, Kr. Zittau, „Breiteberg“, leg. SIEBER; M. 7. 1974, Guttau, Kr. Bautzen, NSG „Eisenberg“, leg. SIEBER; E. 6. 1975, Großschönau, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 2 Exemplare 4. 7. 1976, Lückendorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; M. 7. 1976, Großschönau, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 2 Exemplare 2. 7. 1977, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 20. 7. 1980, Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“, leg. SIEBER; 1. 6. 1981, Großhennersdorf, Kr. Löbau, leg. SIEBER; 8. 8. 1981, Großschönau, Kr. Zittau, leg. RICHTER.

Antherophagus pallens OL.

Je 1 Exemplar Umgebung von Großschönau, Kr. Zittau, 15. 5. 1969, 6. 6. 1970, 20. 6. 1973, 22. 6. 1974, 1. 8. 1974, Umgebung von Waltersdorf, Kr. Zittau, 11. 6. 1969, 3. 7. 1971, 20. 6. 1972 (2 Exemplare); 14. 7. 1938, Königsbrück, „Tiefes Tal“, leg. SCHMIDT, in coll. MTD; 14. 6. 1970, Spitzkunnersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 12. 6. 1976, Seifhennersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 8. 6. 1969, Jonsdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 17. 6. 1974, Kodersdorf, Kr. Niesky, leg. PESCHEL; 6. 6. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, leg. SIEBER; 15. 6. 1988, Waltersdorf, Kr. Zittau, NSG Lausche, leg. SIEBER.

Antherophagus canescens GROUV.

M. 7. 1974, Gutttau, Kr. Bautzen, NSG „Eisenberg“, leg. SIEBER.

Caenoscelis subdeplanata BRIS.

M. 8. 85, Lieske, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER; 2 Exemplare 24. 4. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 31. 7. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; A. 9. 1986, Putzkau, Kr. Bischofswerda, „Forsthaus Klunker“, leg. SIEBER; 4 Exemplare 24. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 25. 4. 1987, Rietschen, Kr. Niesky, NSG „Niederspree“, leg. SIEBER; 19. 8. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald, leg. SIEBER; 8 Exemplare 24. 5. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER.

Caenoscelis fleischeri RTT.

7 Exemplare 13. 4. 1980, Spitzkunnersdorf, Kr. Zittau, Schuttplatz, leg. SIEBER; 9. 4. 1983, Großschönau, Kr. Zittau, FND „Forstenkuppe“, leg. SIEBER.

Caenoscelis ferruginea SAHLB.

28. 3. 1982, Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“, leg. SIEBER; 12. 3. 1986, Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“, leg. SIEBER.

Atomaria munda ER.

26. 2. 1978, Niederoderwitz, Kr. Zittau, an Holz, leg. RICHTER; 11. 2. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, unter Heu, leg. RICHTER; 13. 2. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Landwasser“ Gernist, leg. RICHTER; A. 9. 1980, Gutttau, Kr. Bautzen, leg. SIEBER.

Atomaria impressa ER.

9. 5. 1971, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 28. 5. 1978, Milkel, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER; 28. 5. 1978, Lieske, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER; 23. 2. 1980, Großschönau, Kr. Zittau, „Pochebach“, leg. SIEBER; 25. 4. 1987, Rietschen, Kr. Niesky, NSG „Niederspree“, leg. SIEBER; 6. 2. 1988, Niederoderwitz, Kr. Zittau, Königsholz, leg. RICHTER; 30. 4. 1988, Großschönau, Kr. Zittau, Hofebusch, leg. SIEBER.

Atomaria ornata HEER (= *cantaminata* ER.)

Bei uns eine recht häufige Art an Wildfutterstellen, sonst kaum gefunden.

7. 12. 1970, Waltersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; in Anzahl 7. 4. 1971, Waltersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 11. 9. 1971, Waltersdorf, Kr. Zit-

tau, leg. SIEBER; 2 Exemplare 17. 9. 1971, Großschönau, Kr. Zittau, „Folge“, leg. SIEBER; 7. 10. 1973, Jonsdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 16. 5. 1976, Waltersdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 4 Exemplare 5. 5. 1985, Jonsdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 13. 5. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, Autokäscher, leg. SIEBER; 10. 11. 1979, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER; 4 Exemplare 8. 11. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER; 12. 1987, 1. 1988, in Anzahl, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER.

Atomaria pusilla SCHÖNH.

Eine recht häufige Art, 56 Belege liegen vor, einige ausgewählte Funddaten:

16. 12. 1978, Görlitz, NSG „Landeskronen“, leg. VOGEL; 29. 5. 1978, Baruth, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER; 25. 7. 1985, Jonsdorf, Kr. Zittau, leg. SIEBER; 20. 6. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 15. 6. 1986, Königshain, Kr. Görlitz, LSG „Königshainer Berge“, leg. SIEBER; 10. 8. 1975, Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“, leg. SIEBER.

Atomaria peltata KR.

25. 3. 1978, Spitzkunnersdorf, Kr. Zittau, Schuttplatz, leg. SIEBER.

Atomaria lewisi RTT.

Eine häufige Art, 106 Belege liegen vor.

Atomaria clavigera GGLB.

26. 5. 1979, Jonsdorf, Kr. Zittau, Autokäscher, leg. SIEBER.

Atomaria atricapilla STEPH.

Eine häufige Art, aus allen besammelten Gebieten liegen Belege vor, 65 Exemplare.

Atomaria berolinensis KR.

Vereinzelt: Herrnhut, Kr. Löbau, NSG „Hengstberg“; Lieske, Kr. Bautzen; Waltersdorf, Kr. Zittau; Großschönau, Lückendorf, Kr. Zittau; Großenhensdorf, Kr. Löbau; Walddorf, Kr. Löbau, „Kottmar“; Görlitz, NSG „Landeskronen“, leg. VOGEL; Niederoderwitz, Kr. Zittau, mehrfach, leg. RICHTER; insgesamt 23 Exemplare.

Atomaria fuscata SCHÖNH.

Bei uns die häufigste Art der Gattung, 220 Exemplare liegen vor.

Atomaria mesomelaena HERBST

10. 4. 1936, Königswartha, Kr. Bautzen, leg.

LEHMANN coll. MNG; 2 Exemplare 14. 4. 1936, Döbra, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT coll. MTD; 9. 3. 1967, Großschönau, Kr. Zittau, „Goldfabionsteich“, leg. SIEBER; 20. 2. 1971, Großschönau, Kr. Zittau, „Goldfabionsteich“, leg. SIEBER; 4 Exemplare 18. 3. 1971, Großschönau, Kr. Zittau, „Goldfabionsteich“, leg. SIEBER; 23. 10. 1971, Görlitz, Gelände am Wasserwerk, leg. SIEBER; E. 5. 1973, Guttau, Kr. Bautzen, Teichgebiet, leg. SIEBER; 16. 3. 1974, Hartau, Kr. Zittau, Fischteiche, leg. SIEBER; 28. 2. 1976, Hartau, Kr. Zittau, Fischteiche, leg. SIEBER; 2 Exemplare 5. 11. 1978, Hartau, Kr. Zittau, Fischteiche, leg. RICHTER.

Atomaria gutta STEPH.

30. 5. 1981, Großschönau, Kr. Zittau, „Breiteberg“, leg. SIEBER.

Atomaria turgida RTT.

14. 2. 1972, Waltersdorf, Kr. Zittau, „Buchberg“, leg. SIEBER.

Atomaria apicalis ER.

Bei uns eine weniger häufige Art, rund 35 Exemplare konnten ausgewertet werden, z. B. Jonsdorf, Waltersdorf „Lausche“, Großschönau, Lückendorf, alle Kr. Zittau, Görlitz leg. VOGEL, Bischdorf, NSG „Rotstein“, Kr. Löbau, Jauernick, Kr. Görlitz, leg. VOGEL, Ostritz, Kr. Görlitz, leg. SIEBER, Gersdorf, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT.

Atomaria ruficornis MARSH.

Eine ebenfalls häufige Art, von der wir 90 neuere Belege für die Oberlausitz haben.

Atomaria analis ER.

Etwas weniger häufig, aber überall, 65 Funde sind belegt.

Atomaria fimetarii HERBST

19. 5. 1974, Niederoderwitz, Kr. Zittau, Dr.-Friedrich-Straße, schwärmend, leg. SIEBER; 24. 7. 1977, Hörnitz, Kr. Zittau, Scheibenberg, leg. SIEBER.

Diese wenigen Nachweise sind nur Zufallsfunde, bei gezielter Suche am „Tintenpilz“ sicher leicht mehrfach zu finden.

Atomaria pulchra ER.

2 Exemplare 16. 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz LSG Neißetal, leg. SIEBER; 5 Exemplare 7. 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald, leg. SIEBER.

Atomaria fuscicollis MANNH.

Sicher mit die häufigste Art der Familie, rund 260 Exemplare sind in unseren Sammlungen.

Atomaria alpina HEER

2 Exemplare 7. 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald, leg. SIEBER.

Atomaria umbrina GYLLH.

1. 4. 1973, Waltersdorf, Kr. Zittau, Bachufer, leg. SIEBER; 11. 4. 1974, Waltersdorf, Kr. Zittau, NSG „Lausche“, leg. SIEBER; 25. 1. 1986, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER; 1. 5. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 28. 6. 1987, Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“, leg. SIEBER.

Atomaria nigriventris STEPH.

3. 4. 1932, Gersdorf, Kr. Kamenz, leg. SCHMIDT, coll. MTD; 2. 8. 1974, Großschönau, Kr. Zittau, „Breiteberg“, leg. SIEBER.

Die Einstufung als „überall häufig“ in FREUDE – HARDE – LOHSE konnte für unser Gebiet nicht bestätigt werden.

Atomaria puncticolis THOMS.

7. 7. 1971, Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“, leg. SIEBER; 13. 4. 1980, Spitzkunnersdorf, Kr. Zittau, Schuttplatz, leg. SIEBER; 23. 2. 1980, Großschönau, Kr. Zittau, „Poche“, leg. SIEBER; 10. 3. 1982, Großschönau, Kr. Zittau, „Neuschöner Busch“, leg. SIEBER, in coll. Dr. F. SANDER, Jena).

Atomaria diluta ER.

4. 11. 1971, 2 Exemplare 1. 12. 1971, 5 Exemplare 7. 4. 1971, 2 Exemplare 10. 4. 1972, 3 Exemplare 23. 5. 1972, 2 Exemplare 17. 4. 1976, 4 Exemplare 6. 11. 1976 – diese Käfer fand ich alle in faulem Heu einer Wildfutterstelle Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“; 30. 4. 1978 und 2. 11. 1978, Görlitz, NSG „Landeskronen“, in Fallen, leg. VOGEL; 10. 11. 1985, Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“, Gipfel an weißfauler Buche, leg. SIEBER.

Atomaria linearis STEPH.

Häufige Art, oft im offenen Gelände in Menge schwärmend, 85 Exemplare wurden präpariert.

Atomaria procerula ER.

23. 3. 1973, Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, „Hofebusch“, leg. SIEBER; 22. 3. 1981, Jonsdorf, Kr. Zittau, NSG „Felsenstadt“, leg. SIEBER; 19. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“,

leg. SIEBER; 28. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 1. 5. 1987, Deschka, Kr. Niesky, „Biehainer Forst“, leg. SIEBER; 19. 4. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. SIEBER; 5. 4. 1980, Jonsdorf, Kr. Zittau, leg. RICHTER; E. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, mehrere Exemplare, leg. RICHTER; 6. 5. 1988, Dittersbach, Kr. Görlitz, Kleiner Nonnenwald, leg. SIEBER; 2 Exemplare 30. 4. 1988, Großschönau, Kr. Zittau, Hofebusch, leg. SIEBER; in Anzahl 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“ u. Klosterwald, leg. SIEBER.

Atomaria atrata RTT.

1. 12. 1971, Großschönau, Kr. Zittau, „Neuschöner Busch“, Wildfütterung, leg. SIEBER; 6. 1. 1974, Großschönau, Kr. Zittau, „Folge“, leg. SIEBER; 13. 7. 1980, Waltersdorf, Kr. Zittau, NSG „Lausche“, leg. SIEBER; 22. 3. 1981, Jonsdorf, Kr. Zittau, NSG „Felsenstadt“, leg. SIEBER; 10. 3. 1982, Großschönau, Kr. Zittau, „Neuschöner Busch“, leg. SIEBER; 23. 12. 1985, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, leg. RICHTER; 24. 4. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 13. 5. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 1. 10. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 8. 9. 1986, Putzkau, Kr. Bischofswerda, „Forsthaus Kluncker“, leg. RICHTER; 19. 4. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, Autokäscher, leg. SIEBER; 28. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 1. 5. 1987, Deschka, Kr. Niesky, „Biehainer Forst“, leg. SIEBER (dieser Fund außerhalb des Berglandes).

Folgende *Atomaria*-Arten wurden nach Erscheinen des FREUDE – HARDE – LOHSE, „Die Käfer Mitteleuropas“ Bd. 7/1967, beschrieben oder sind aus einem anderen Grund dort nicht berücksichtigt:

Atomaria elongatula ER.

13. 5. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 29. 6. 1986, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 30. 3. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER.

Atomaria consanguinea JOHNS.

24. 8. 1980, Döbra, Kr. Kamenz, Autokäscher, leg. VOGEL.

Atomaria lohsei JOHNS. et STR.

2 Exemplare 28. 5. 1978, Milkell, Kr. Bautzen, Autokäscher, leg. SIEBER (1 Exemplar in coll.

C. JOHNSON, Manchester); 15. 9. 1979, Quolsdorf, Kr. Niesky, NSG „Niederspree“, leg. SIEBER; 8. 6. 1980, Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“, leg. SIEBER; 11. 5. 1981, Niederoderwitz, Kr. Zittau, leg. RICHTER; 5. 6. 1982, Niederoderwitz, Kr. Zittau, „Königsholz“, Autokäscher, leg. SIEBER; 1. 6. 1984, Waltersdorf, Kr. Zittau, „Buchberg“ nördl. Waldrand gekäschert, leg. SIEBER; 23. 6. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, Autokäscher „Siegfriedweg“, leg. SIEBER; 2. 7. 1986, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, Autokäscher „Siegfriedweg“, leg. SIEBER; 5. 7. 1986, Königshain, Kr. Görlitz, LSG „Königshainer Berge“, leg. SIEBER; 29. 6. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 6. 7. 1987, Ostritz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 2 Exemplare 23. 7. 1988, Großschönau, Kr. Zittau, Hofebusch, leg. SIEBER; 19. 8. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald, leg. SIEBER; 18. 8. 1988, Niederoderwitz, Kr. Zittau, Königsholz, leg. RICHTER.

Atomaria ihsseni JOHNS.

19. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, Autokäscher, leg. SIEBER; 19. 4. 1987, Niederoderwitz, Kr. Zittau, Königsholz, Autokäscher, leg. SIEBER; 28. 4. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, Autokäscher, leg. SIEBER, in coll. C. JOHNSON, Manchester; 2. 5. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“, leg. SIEBER, in coll. C. JOHNSON, Manchester; 13 Exemplare 7. 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald, leg. SIEBER; 20 Exemplare 12. u. 16. 4. 1988, Ostritz, Kr. Görlitz, Klosterwald und LSG „Neißetal“, leg. SIEBER; 2 Exemplare 30. 4. 1988, Großschönau, Kr. Zittau, Hofebusch, leg. SIEBER.

Atomaria atra HBST.

21. 6. 1938, Prietitz, leg. SCHMIDT, in coll. MTD (ob damit Prittitz, 4851, bei Weißenfels, gemeint ist, ist unsicher, auch müßte dieser Käfer überprüft werden!).

Ootypus globosus WALTL.

6. 6. 1987, Ostritz, Kr. Görlitz, LSG „Neißetal“ auf Waldwiese an der Neiße gekäschert, leg. SIEBER.

Ephistemus globulus PAYK.

Eine häufige Art, in faulenden Pflanzenabfällen, auch schwärmend.

Da doch selten über diese Käferfamilie faunistische Angaben veröffentlicht werden, möchte

ich noch einige Funde von bemerkenswerten Arten aus anderen Gebieten der DDR anführen, die mir bekannt wurden.

Atomaria atra HBST.

17. 5. 1964 und 4. 6. 1973 je ein Exemplar im „Schraden“ südlich von Lauchhammer, leg. H. RESSLER.

Atomaria nigriventris STEPH.

7. 1962, Quedlinburg, leg. RESSLER.

Atomaria plicata RTT.

22. 3. 1983, Bad Blankenburg/Thür., „Schwarzatal“, det. u. leg. F. SANDER.

Atomaria pseudatra RTT. (= *reitteri* LÖVEND.)

M. 4. 1977, Graal-Müritz bei Rostock an einem Waldtümpel, westlich vom Zeltplatz, gesiebt, leg. SIEBER.

Atomaria basalis ER.

23. 7. 1973, Perlin, Kr. Gadebusch, „Dümmer See“, leg. SIEBER; 3. 5. 1974, Kallinchen, Kr. Zossen, leg. SIEBER; A. 7. 1983, Joachimstal, Kr. Eberswalde, leg. SIEBER.

Atomaria gutta STEPH.

21. 9. 1976, Neustrelitz Umgebung, leg. SIEBER, STÖCKEL.

Atomaria gibbula ER.

16. 10. 1971, Bad Köstritz, Teichufer, gesiebt, leg. SIEBER.

Atomaria rubricollis BRIS.

12. 5. 1979, Eisleben, „Süßer See“, leg. MARTSCHAT.

Atomaria nigriventris STEPH.

4. 7. 1975, Bad Frankenhausen, „Hainleite“, leg. SIEBER.

Atomaria atrata RTT.

1. 5. 1974, Bad Frankenhausen, „Kosakenberg“, leg. SIEBER, in coll. SCHILLER, Grenzach-Wyhlen, BRD.

Atomaria barani BRIS.

14.–28. 7. 1983, Jena, Porstendorf, det. u. leg. F. SANDER.

Atomaria puncticollis THOMS.

M. 4. 1980, Kallinchen, Kr. Zossen, leg. SIEBER. *Caenoscelis ferruginea* SAHLB. 2 Exemplare 4. 7. 1975, Bad Frankenhausen, „Hainleite“, leg. SIEBER.

Atomaria gravidula ER.

Eine Serie dieser seltenen Art köderte Koll. W. APFEL in 5. u. 6. 1988 am Hörselufer bei Eisenach mit faulenden Rüben!

Für das Gebiet der Oberlausitz konnten (außer *Cryptophagus*) 48 Arten nachgewiesen werden, bei weiteren seltenen Arten ist ein Nachweis möglich.

L i t e r a t u r

FREUDE, H., HARDE, K. W., & G. A. LOHSE (1967): Die Käfer Mitteleuropas, Band 7, 55. Familie. — Krefeld.

Anschrift des Verfassers:

Max Sieber
Klosterstraße 71
Ostritz
DDR - 8906

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Sieber Max

Artikel/Article: [Funde von Cryptophagidae aus der Oberlausitz \(Col.\). 33-38](#)