

Ematurga atomaria L. (Heidespanner)

Die für diese Art vorliegenden Daten lassen die Deutung zu, daß sie im Gebiet vermutlich nur in einer Generation von Ende April bis Anfang August fliegt. Der späteste Nachweis im Gebiet liegt am 2. August. Ich vermute für den Landkreis Uecker-Randow nur eine Generation von 24. April bis 2. August. KOCH räumt für höhere Lagen auch nur eine Generation von Mitte Mai bis Mitte Juli ein. Die bei ihm beschriebene zweite Generation von Mitte Juni bis Anfang September wird als mehr oder weniger unvollständig charakterisiert.

Literatur

- KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge. Ausgabe in einem Band. - Neumann-Verlag Radebeul.
 REINHARDT, R. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Rhopalocera et Hesperidae II. - Ent. Nachr. Ber. 26, Beiheft Nr. 2.
 HEINICKE, W. & C. NAUMANN (1980-1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera-Noctuidae. - Beitr. Ent. 30-32.
 WEIDEMANN, H. J. & J. KÖHLER (1996): Nachtfalter (Spinner und Schwärmer). - Naturbuch Verlag Augsburg.
 WEIDEMANN, H. J. (1995): Tagfalter beobachten, bestimmen. - Naturbuch Verlag Augsburg.

Eingangsdatum: 31. 5. 2000

Anschrift des Verfassers:

Manfred Henricke
 Ende 38
 D-17375 Ahlbeck

FAUNISTISCHE NOTIZEN

695.

Zur Verbreitung der Gattung *Lesteva* LATR. (Col., Staphylinidae) im Vogtland

ERMISCH & LANGER (1935-36) meldeten aus dem Vogtland nur *Lesteva longelytrata* (GOEZE) mit folgenden Angaben: III (jeweils 5 bis 10 Exemplare) / 3 (5 bis etwa 10 Fundorte); V VI, X (Monate). Dabei waren die Nachweise überwiegend auf das obere Vogtland beschränkt. In den verschiedenen Nachträgen zu ERMISCH & LANGER (1935-36) wurden ebenfalls keine neuen *Lesteva*-Funde angeführt.

Für Sachsen geben KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) 5 *Lesteva*-Arten an. Daraufhin wurde das Vorkommen der Gattung im Vogtland genauer betrachtet, und es ergaben sich die anschließend genannten Nachweise.

Lesteva punctata ER.

Zwota, ca. 660 m NN, 23.05.1998, 1 Ex., Wald, im Pflanzenwerk eines Teichufers, det. ZANETTI

Lesteva longoelytrata (GOEZE)

Von dieser Art liegen Funde von vielen Orten (wie etwa Adorf, Großzöbern, Muldenberg, Oelsnitz, Schönberg, Tirschendorf, Werda, Zwota) vor; auch Zahlen von etwa 100 Exemplaren, zum Beispiel an verschiedenen Bachufern, sind keine Seltenheit.

Lesteva monticola KIESW.

Kottenheide, ca. 760 m NN, Anfang 05.1993, 1 Ex., im Pflanzenwerk eines sumpfigen Teichufers, det. ZANETTI
 Muldenberg, ca. 720 m NN, Anfang 08.1989, 1 Ex., im sumpfigen Nadelwald, det. ZANETTI

Werde, ca. 600 m NN, Ende 09.1989, 1 Ex., an einem Talsperrenufer, det. ZANETTI

Zwota, ca. 660 m NN, Anfang 06.1987, 1 Ex., det. ZANETTI

Lesteva pubescens MANNH.

Klingenthal, Mühlleithen, Bergwald, 900 m, 1 Ex., 22.05.1998

Herrn Dr. RENNER, Bielefeld, gebührt herzlicher Dank für die Mitteilung des Fundes von *Lesteva pubescens* MANNH. und der Genehmigung zur Publikation sowie Herrn Dr. ZANETTI, Verona, für die Überprüfung der Artbestimmungen entsprechend Angabe im Text.

Literatur

- ERMISCH, K., & W. LANGER (1935-36): Die Käfer des sächsischen Vogtlandes in ökologischer und systematischer Darstellung. I. Teil 1935: 1 - 22; 2. Teil 1935: 1 120; 3. Teil 1936: 1 196. - Mitteil. Vogtl. Ges. f. Naturf. 2.
 KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber., Beiheft 4.
 RENNER, K. (1999): Für Sachsen und Bayern neue und bemerkenswerte Käferarten. - Ent. Nachr. Ber., 43: 8.
 ZANETTI, A. (1987): Fauna d'Italia Coleoptera Staphylinidae Omaliinae. - Bologna.

Anschrift des Verfassers:

Volker Gollkowsky, Oststraße 8, D-08606 Oelsnitz i. V.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2001/2002

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Gollkowski Volker

Artikel/Article: [Faunistische Notizen. 26](#)