

J. LORENZ, Tharandt

Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Col.) für die Fauna Sachsens sowie weitere faunistisch bemerkenswerte Käfernachweise 2001-2005

Zusammenfassung Neben 32 Neu- und 31 Wiederfinden für die Käferfauna Sachsens werden weitere faunistisch bemerkenswerten Arten gemeldet.

Summary **New findings, rediscoveries and noteworthy faunistical records of beetles (Col.) in Saxony, 2001-2005.** - 32 new findings, 31 rediscoveries, and noteworthy faunistical records of beetles from Saxony are presented.

Es konnten auch einige schwer bestimmbare Käfergruppen, z. T. aus älterem Sammlungsmaterial durch Spezialisten überprüft werden. In eckigen Klammern ist der bisherige Status nach KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) angegeben (sofern nicht extra erwähnt: leg./coll. LORENZ).

Hydrophilidae

Helophorus strigifrons THOMSON, 1868 [bisher: •]

2 Ex., 30.05.1993 Bobritzschtal bei Reinsberg südöstlich von Siebenlehn im Tümpel Nähe Bobritzschufer (TK10: 4946SW), (leg., det. O. JÄGER, MTD) sowie 1 Ex., 17.05.2003, FND „Salweidenfeuchtgebiet bei Medingen“ südlich von Radeburg (TK10: 4848NO), (vid. O. JÄGER, MTD).

Helophorus griseus HERBST, 1793 [neu für Sachsen !]

1 Ex., 24.09.1987, zwischen Tharandt und Grumbach ca. 15 km südwestlich von Dresden (TK10: 4947SW) in einer Kiesgrube, die Anfang der 1990er Jahre verfüllt wurde (vid. O. JÄGER, MTD). Einen noch älteren Fund meldet U. LEHMANN (in litt): 1984 Großenhain (det. RESSLER). Nach JÄGER (in litt.) inzwischen an mehreren Lokalitäten nachgewiesen und offenbar nicht allzu selten.

Leiodidae

Hydnobius punctatus (STURM, 1807) [bisher: -]

1 Ex., Juli 2004, Osterzgebirge bei Bärenstein im NSG „Weicholdswald“ (TK10: 5248NO), Buchenmischwald, Gelbschale.

Agathidium bohemicum REITTER, 1884 [bisher: -]

1 Ex., Mai 2004, Osterzgebirge bei Bärenstein im NSG „Weicholdswald“ (TK10: 5248NO), mesophiler Buchenmischwald, Bodenfallenbeifang.

Scydmaenidae

Cephennum gallicum GANGLBAUER, 1899 [neu für Sachsen !]

25 Ex., April-Juni 2005, Tharandt, NSG „Weißeritztalhänge“ (TK10: 5047NO), Bodenfallen an südexponierten mit Eichen, Buchen, Linden und Hainbuchen bestockter Hang (vid. W. APFEL).

Staphylinidae

Oxyporus maxillosus FABRICIUS, 1792 [bisher: -]

Mehrfach im Juni 2005 an Holzpilzen, Sächsische Schweiz einseits bei Hohnstein (TK10: 5050NO), an Stockschwämmchen andererseits bei Schmilka NSG „Großer Winterberg“ (TK10: 5151NW), an Austernsaitling sowie Schluchtwald im Brauselochtal bei Helsdorf (5042/4), 280m ü. NN, 2 Ex., am 08.07.2004, aus Mulm gesiebt (leg./coll. Apfel).

Euaestethus superlatus PEYERIMHOFF, 1937 [bisher: -]

Je 1 Ex., April und Juni 1998, NSG „Heller“ im Norden von Dresden (TK10: 4948NO), Bodenfallenbeifang auf sandiger, spärlich bewachsener Ruderalflur (vid. J. VOGEL).

Platydacus chalconcephalus (FABRICIUS, 1801) [bisher: -]

6 Ex., Juni 2004, NSG „Kleiner Berg“ bei Hohburg nordöstlich Wurzen (TK10: 4542SO), Bodenfallenbeifang. (vid. J. VOGEL).

Cypha seminula (ERICHSON, 1839) [bisher: ?]

1 Ex., 11.04.1997, NSG „Windberg“ in Freital westlich von Dresden (TK10: 4947SO), unter morscher, verpilzter Rinde (det. J. VOGEL).

Leptusa ruficollis (ERICHSON, 1839) [bisher: -]

Zahlreich von April-September 2003/2004 Buchenmischwald im NSG „Weicholdswald“, Osterzgebirge nördlich Altenberg (TK10: 5248NO), v. a. mit Stammeklektoren. Die Art konnte bei vielen Untersuchungen zur xylobionten Käferfauna fast nie an Totholz nachgewiesen werden. Offenbar lebt sie v. a. auf der Rinde stehender, lebender Bäume, an denen die Stammeklektoren befestigt waren.

Thamiaraea hospita (MÄRKEL, 1844) [bisher: -]

1 Ex., Juni 1999, NSG „Waldmoore bei Großdittmannsdorf“ östlich Radeburg (TK10: 4748SO), in Zwischenmoor in Bodenfalle (det. J. VOGEL).

Phloeopora teres (GRAVENHORST, 1802) [bisher: -]

1 Ex., 22.06.1994, NSG „Seußflitzgrund“ bei Diesbar-Seußflitz nordwestlich von Meißen (TK10: 4746SO); 1 Ex., 11.04.1997, NSG „Windberg“ bei Freital (TK10: 4947SO); 2 Ex., Juni 1996 in der Dresdner Heide (TK10: 4948NO); mehrfach Juni/Juli 2004/05 Tharandt, NSG „Weißeritztalhänge“ (TK10: 5047NO); 1 Ex., Waldgebiet Schildholz südlich Beucha bei Bad Lausick (TK10: 4841SO), alle Nachweise unter und auf relativ frischer, teilweise bereits verpilzter Rinde von Laubbäumen, vor allem Rot-Buche (vid. J. VOGEL).

Homoeusa acuminata (MÄRKEL, 1842) [bisher: -]

1 Ex., Ende April 2004, NSG „Weißeritzalhänge“, südlich exponierter Laubmischwald zwischen Tharandt und Freital (TK10: 5047NO); Bodenfallenbeifang (vid. J. VOGEL).

Pselaphidae*Biblopectus minutissimus* (AUBE, 1833) [bisher: •]

1 Ex., Juni 1991, Sächsische Schweiz bei Leupoldishain (östlich Pima), (TK10: 5050SW), bewaldetes Bachtälchen, Bodenfälle, (vid. BRACHAT).

Plectophloeus fleischeri MACHULKA, 1929 [neu für Sachsen !]

1 Ex., Juni 2004, Osterzgebirge bei Bärenstein im NSG „Weicholdswald“ (TK10: 5248NO), Buchenmischwald, Gelbschale, (vid. W. APFEL).

Plectophloeus rhenanus (REITTER, 1881) [neu für Sachsen !]

2 Ex., Juni 1997, Moritzburger Wald östlich Moritzburg (TK10: 4848NW), Buchenmischwald, Stammeklektor (det. BRACHAT).

Batrissodes buqueti (AUBE, 1833) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 24.05.1996, Dresden, Dresdner Heide (TK10: 4948NO), Buchen-Altholzbestand (vid. BRACHAT).

Batrissodes unisexualis (BESUCHET, 1988) [neu für Sachsen !]

1 Ex., Juni 1997, Moritzburger Wald östlich Moritzburg (TK10: 4848NW), Buchenmischwald, Bodenfälle (det. BRACHAT).

Lycidae*Platyctis cosnardi* (CHEVOLAT, 1829) [neu für Sachsen !]

1 Ex., Ende Mai 2004, Tal der Wilden Weißeritz zwischen Obercunnersdorf und Dorfhain, Ahorn-Eschen-Schlucht- und Schatthangwald (TK10: 5047SW), sowie 1 Ex., Ende April 2005 Tharandt, NSG „Weißeritzalhänge“ südexponierter mit Eichen, Buchen, Linden und Hainbuchen bestockter Hang (TK10: 5047NO), Bodenfallenbeifang (vid. A. WEIGEL).

Melyridae*Aplocnemus tarsalis* (SAHLBERG, 1822) [bisher: -]

1 Ex., Juni 1991, mittleres Erzgebirge bei Olbernhau (TK10: 5346NO), Borkenkäferpheromonfalle. (vid. A. KOPETZ).

Eucnemidae*Isoorhipis melasoides* (CASTELNAU, 1835) [bisher: •]

3 Ex., 07. und 11. Juni 2004, Zabeltitz bei Großenhain (TK10: 4647NW). Gemeinsam mit *Melasis buprestoides* (LINNAEUS, 1761), an geschlagener Eiche (leg. U. LEHMANN).

Clambidae*Calyptomerus alpestris* REDTENBACHER, 1849 [bisher: •]

2 Ex., 30.08.2005 Brunnhöbra NSG „Goldberg“ südlich Plauen (Vogtland), (TK10: 5638NW); aus verpilzten Fichtenreisig geklopft (leg., det., coll. H.-P. REIKE).

Nitidulidae*Cydramus variegatus* (HERBST, 1792) [bisher: -]

1 Ex., Ende September 2003, leg. KADEN & REIKE, Osterzgebirge, Dippoldiswalder Heide nördlich Dippoldiswalde (TK 5048SW), im Fichtenforst an Hallimasch sowie 1 Ex., 5.10.

2004, edellaubholzreicher Wald am östlich exponierten Hang im NSG „Weißeritzalhänge“ südlich von Tharandt (TK10: 5047SW), an Hallimasch. In der Sächsischen Schweiz an mehreren Lokalitäten einerseits im Juni 2005 aus verwelkten Ahornblättern von frisch abgebrochenen Zweigen geklopft und im August 2005 massenhaft an Hallimasch und anderen Holzpilzen. Je 2 Ex., am 29.06. und 01.09.2005 mittleres Erzgebirge, Zöblitz, Knesenbachtal (TK10: 5345NW), Eklektor an Buche in Tannen-Fichten-Buchenwald (leg. WEIGEL, coll. APFEL, WEIGEL).

Cryptophagidae*Cryptophagus micaceus* REY, 1889 [neu für Sachsen !]

14 Imagines und 27 Larven 16.11.2003, Zabeltitz bei Großenhain (TK10: 4647NW), aus Hornissennest, leg. U. LEHMANN, det. J. ESSER. Im NSG „Eichelgarten“ bei Gutttau/Oberlausitz (4753NW), 140m ü. NN, einen naturnahen Hartholz-Auwald mit zahlreichen alten Eichen, konnte am 12.08.2004 ein Exemplar mittels Lufteklektor gefangen werden (leg./coll. WEIGEL, det. ESSER).

Cryptophagus nitidulus MILLER, 1858 [bisher: •]

1 Ex., 28.09.2000, Stadtgebiet von Dresden, Park „Großer Garten“ (TK10: 4948SO), Lichtfang, an rindenloser Stelle am Stammfuß einer alten Eiche (det. J. ESSER).

Atomaria badia ERICHSON, 1846 [neu für Sachsen !]

1 Ex., Juni 1995, Trebnitzgrund bei Dittersdorf südwestlich von Glashütte (Osterzgebirge), (TK10: 5148SO), (det. J. ESSER).

Phalacridae*Phalacrus coruscus* (PANZER, 1797) [neu für Sachsen !]

2 Ex., 14.06.2001, auf südwestexponiertem Trockenhang zwischen Prossitz und Wächtritz westlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang.

Laemophloeidae*Notolaemus castaneus* (ERICHSON, 1845) [bisher: •]

1 Ex., 1.06.2005, Tauer, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet, (TK10: 4653SO), von trockenen Eichenästen geklopft.

Lathridiidae*Enicmus testaceus* (STEPHENS, 1830) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 17.06.2005, Sächsische Schweiz, Lichtenhain, Knechtsbachtal (TK10: 5051SW), von trockenem Kiefernast geklopft, der im vorangegangenen Winterhalbjahr abgebrochen war (vid. H.-P. REIKE).

Stephostethus alternans (MANNERHEIM, 1844) [bisher: -]

3 Ex., 12.07.2005, Freital-Hainsberg, NSG „Weißeritzalhänge“ (TK10: 5047NO), Klopffang (vid. H.-P. REIKE). 1 Ex., 17.08.2005, Waldgebiet Schildholz südlich Beucha bei Bad Lausick (TK10: 4841SO). 1 Ex., 8.07.2005 mittleres Erzgebirge, Zöblitz, Knesenbachtal (TK10: 5345NW), Eklektor an Buche in Tannen-Fichten-Buchenwald (leg. WEIGEL).

Melanophthalma taurica (MANNERHEIM, 1844) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 21.06.2002, Streuobstwiese nördlich Zehren bei Meißen (TK10: 4746SW), Streifsackfang. (vid. W. RÜCKER).

Mycetophagidae

Mycetophagus multipunctatus FABRICIUS, 1792 [neu für Sachsen !]

1 Ex., 2.08.2005, Sächsische Schweiz, Schmilka NSG „Großer Winterberg“ (TK10: 5151NW), an Austernsaitling und 1 Ex., Sächsische Schweiz, Hausberg (TK10: 5051SW), an Schwefelkopf.

Colydiidae

Synchita separanda (REITTER, 1882) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 10.09.2003, Dresdner Heide nördlich Dresden (TK10: 4948NO), unter verpilzter Lindenrinde (vid. A. WEIGEL). Die Bäume stammen aus dem Stadtzentrum von Dresden von der Stübelallee und wurden am Rand der Dresdner Heide zu Totholzlagerplätzen aufgeschichtet, da es sich um Brutbäume von *Osmoderma eremita* handelt. 1 Ex., 19.08.2005 Freital-Hainsberg, NSG „Weißeritztalhänge“ (TK10: 5047NO), von einem mit schwarzen, flachen Rindenpilzen bewachsenen Rot-Buchen-Hochstubben gebürstet.

Coccinellidae

Scymnus doriai (CAPRA, 1924) [neu für Sachsen !]

1 Ex., im Juni 2003, Bergbaufolgelandschaft nördlich Hoyerswerda (TK10: 4551NO), Gelbschalenbeifang (leg. A. SCHOLZ, vid. B. KLAUSNITZER et W. ZIEGLER).

Cisidae

Cis lineatocribratus MELLIMAN, 1848 [bisher: -]

2 Ex., im Juni 2004, Buchenaltholz im NSG „Rungstock“ bei Olbernhau (mittleres Erzgebirge), (TK10: 5345NO), Bodenfallenbeifang; 1 Ex., 13.07.2005 Lausche, Waltersdorf, Zittauer Gebirge (TK10: 5153NO); 1 Ex., 31.08.2005 Hintere Sächsische Schweiz, Schmilka, Großer Winterberg (TK10: 5151NW).

Hadreule elongatum (GYLLENHAL, 1827) [neu für Sachsen !]

1 Ex., im Juni 2005, Hintere Sächsische Schweiz, Hinterhermsdorf, Kirmitschklamm, (TK10: 5152NW), Luftkolektor.

Lyctidae

Lyctus pubescens PANZER, 1793 [bisher: •]

1 Ex., 10.06.2004, Tharandt, Ortslage (TK10: 5047NW), schwärmend, Zufallsfang, eventuelle Verschleppung mit Holz?

Anobiidae

Gastrallus laevigatus (OLIVIER, 1790) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 06.08.2002, Zöthain, Käbschützbachtal westlich von Meißen bzw. Zehren (TK10: 4846NW), auf einer Streuobstwiese von trockenen Ästen eines Walnusssbaumes geklopft.

Anobium costatum ARRAGON, 1830 [neu für Sachsen !]

3 Ex., Mai 2004, Oberlausitzer Bergland nördlich Cunewalde (TK10: 4853SW), Buchenaltholz am Steinberg sowie mehrfach von Mai-Juni 2003, Osterzgebirge bei Bärenstein im NSG „Weicholdswald“ (TK10: 5248NO), in Luft-, Stamm- und Totholzlektoren.

Ptinidae

Sphaericus gibboides BOIELDIEU, 1854 [neu für Sachsen !]

1 Ex., 20.08.2003, in der Wohnung in Tharandt westlich Dresden (TK10: 5047NW). Offenbar eingeschleppt, allerdings lag mein letzter Auslandsaufenthalt (La Palma), als einem potentiellen Ursprungsgebiet einer solchen Art, reichlich 1 Jahr zurück, so dass das(die) Tier(e) mehr als 1 Jahr überlebt haben müsste(n).

Oedemeridae

Anognodes ustulata (FABRICIUS, 1787) [bisher: •]

Mehrfach von Mai-September 2003, Bergbaufolgelandschaft bei Laubusch nordwestlich von Hoyerswerda (TK10: 4650NO), in Bodenfallen und Gelbschalen. [bisher: •]

Ischnomera caerulea (LINNEAUS, 1758) [bisher: ?]

Mehrfach im Mai 2003, Bärenstein NSG „Weicholdswald“ (Osterzgebirge), (TK10: 5248NO), in Totholz- und Stammlektoren sowie Klopffang, (durch Genitalpräparation vermutetes sächsisches Vorkommen bestätigt).

Scaptiidae

Anaspis bohemica SCHILSKY, 1898 [neu für Sachsen !]

2 Ex., im Juni 2002, NSG „Georgenfelder Hochmoor“ (oberes Osterzgebirge), südwestlich von Zinnwald (TK10: 5248SW), in Malaisefalle (leg. C. KEHLMAYER, MTD).

Anthicidae

Cordicomus gracilis (PANZER, 1797) [bisher: -]

4 Ex., am 17. März 2005, NSG „Frauenteech“ nördlich Moritzburg (TK10: 4848NW), im Verlandungsbereich aus Blattscheiden von Typha und Grasbüten geklopft.

Mordellidae

Mordellochroa abdominalis (FABRICIUS, 1775) [bisher: -]

3 Ex., Juni 1997, NSG „Weißeritztalhänge“ bei Tharandt, westlich von Freital bzw. Dresden (TK10: 5047NO); 2 Ex., Mai 2002, Osterzgebirge, NSG „Müglitzhänge Schlottwitz“ nordöstlich Glashütte (TK10: 5148NO), auf Doldenblüten in strukturreichen Buchenmischwäldern; 2 Ex., Juni 2003, Osterzgebirge, NSG „Weicholdswald“ bei Bärenstein (TK10: 5248NO), in Gelbschale (leg. A. SCHOLZ); 1 Ex., 02.06.2005 NSG „Eichelgarten“ bei Guttau/Oberlausitz (4753NW), 140 m ü. NN, naturnaher Hartholz-Auwald, Eklektor; 1 Ex., 15.05.2003 Langenreinsdorf, Koberbachtal (5239NO), 300 m, Eklektor an Eiche, Ei-Hbu-Wald (leg. WEIGEL); 1 Ex., 02.06.2003 Luftkolektor an Eiche, Laubwald im Tal der Weißen Elster, Rentzschmühle bei Ruppertsgrün (5438NO), 300 m ü. NN (leg. BURGER).

Scarabaeidae

Omalopecta nigromarginata (KÜSTER, 1849) [bisher: -]

Mehrfach im Juli 2002, wärmebegünstigte Trockenhänge im Ketzerbach- und Käbschützbachtal westlich von Meißen (TK10: 4845NO und 4846NW), Streifsackfang.

Chrysomelidae

Longitarsus symphyti HEIKERTINGER, 1912 [bisher: -]

2 Ex., Juni 1991, Struppen östlich von Pirna (Elbsandsteingebirge), (TK10: 5050SW). Bachtälchen Streifsackfang (vid. M. DÖBERL).

Longitarsus monticola KUTSCHERA, 1863 [neu für Sachsen !]

3 Ex., Oktober 2004, Osterzgebirge südlich Geising, Hochstaudenflur im Erdbachtal (TK10: 5248SO), Bodenfalle (det. F. FRITZLAR).

Longitarsus quadriguttatus (PONTOPPIDAN, 1765) [neu für Sachsen !]

3 Ex., 14.06.2001, Trockenhänge im Ketzerbachtal bei Wachtwitz westlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang (vid. F. FRITZLAR).

Crepidodera lamina BEDEL, 1901 [bisher: -]

1 Ex., 14.06.2001, Trockenhänge im Ketzerbachtal bei Proszitz westlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang (vid. F. FRITZLAR).

Dibolia timida (ILLIGER, 1803) [bisher: -]

1 Ex., August 1978, Trockenhänge bei Zadel, Elbtal nordwestlich von Meißen (TK10: 4846NO), Streifsackfang (leg. C. ZIRKEL).

Cassida rufovirens SUFFRIAN, 1844 [neu für Sachsen !]

1 Ex., 14.06.2001, Trockenhänge im Ketzerbachtal bei Wachtwitz westlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang (vid. F. FRITZLAR).

Bruchidae

Spermophagus calystegiae (LUKJANOVITSH et TER-MI-NASSIAN, 1958) [neu für Sachsen !]

3 Ex., Mai 1993, Kleinkuppenlandschaft nördlich von Dresden (TK10: 4848NO), Streifsackfang (vid. H. WENDT).

Scolytidae

Gnathotrichus materiarius (FITCH, 1855) [neu für Sachsen !]

3 Ex., 3.6.2004, NSG „Schwarzbachtal“ südwestlich von Dipoldiswalde (TK10: 5148NW), auf harzenden Fichtenstümpfen (vid. A. WEIGEL).

Apionidae

Protapion gracilipes (DIETRICH, 1857) [neu für Sachsen !]

1 Ex., Mai 2001, NSG „Schwarzbachtal“ südwestlich von Dipoldiswalde (TK10: 5148NW), Bodenfallenbeifang (leg. C. ZIRKEL, vid. L. BEHNE).

Stenopteration tenue (KIRBY, 1808) [bisher: -]

2 Ex., Juli 1993, Kleinkuppenlandschaft nördlich Dresden, Umg. (TK10: 4848SW), Kescherfang auf sandiger Ruderalflur. 1995 mehrfach auf Ruderal- und Brachflächen im Stadtgebiet von Dresden

Nanophyes globulus (GRAVENHORST, 1802) [bisher: •]

1 Ex., 03.10.2002, FND „Salweidenfeuchtgebiet bei Medingen“ südlich von Radeburg (TK10: 4848NO), Gesiebe aus Bodenstreu (vid. L. BEHNE). Der letzte bekannte Fund aus der Region stammt vom 01.09.1901 aus Dresden-Rochwitz (leg. KOKSCH, in: coll. MTD).

Curculionidae

Lixus albomarginatus (BOHEMAN, 1813) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 14.06.2003, Sand-Magerrasen-Ruderalflur-Mosaik in der Bergbaufolgelandschaft nördlich von Hoyerswerda (TK10: 4650NO), Gelbschale.

Minyops carinatus (LINNEAUS, 1767) [bisher: -]

2 Ex., Mai 2004, Trockenrasen, südlich exponierter Elbhänge bei Zadel nordwestlich von Meißen (TK10: 4846NO), Bodenfallenbeifang.

Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS, 1792) [neu für Sachsen !]

1 Ex., 19. Juli 2003, Umg. Stadtpark von Großenhain, (TK10: 4747NW), abends am Licht (leg. U. LEHMANN, det. P. SPRICK).

Gymnaetron pascuorum (GYLLENHAL, 1813) [neu für Sachsen !]

2 Ex., 14.06.2001, Trockenhang zwischen Schieritz und Piskowitz westlich von Zehren bzw. nordwestlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang (vid. L. BEHNE). Nach BEHNE (in litt.) gehört *Gymnaetron pascuorum* ebenso wie der unten erwähnte *Miarus ajugae* zu den häufigen Arten in Mitteleuropa, die aus allen Bundesländern bekannt sind.

Als faunistisch interessant können folgende Arten genannt werden:

Carabidae

Cicindela hybrida (LINNEAUS, 1758)

Eine Kolonie von mindestens 50 Tieren konnte 2002 und 2003 im Osterzgebirge bei Altenberg auf einer seit Anfang der 1990er Jahre stillgelegten Bergbauhalde in 720 m ü. NN gefunden werden. Das Bodensubstrat besteht aus einem im Zuge der Zinnerzverarbeitung entstandenen feinkiesigen Material. Die östlich exponierte Halde ist aus mehreren Terrassen aufgebaut, wobei die obere mit der Kolonie von *C. hybrida* noch vegetationsfreie Stellen aufwies (TK10: 5248NO). Die Art kommt zusammen mit *C. campestris* vor. Die für diese montane Lagen eher zu erwartende *C. silvicola* konnte nicht gefunden werden (vid. J. GEBERT). 2004 wurde etwa 3,5 km nördlich von oben genannten Fundort ein weiteres Vorkommen von *C. hybrida* nachgewiesen. Es handelt sich um das noch weitestgehend vegetationsfreie Ufer der ehemaligen Zinnerz-Bergbau-Spülkippe nördlich vom Geisingberg in ca. 630 m ü. NN. Auch diese Population kann auf mindestens 50 Tiere geschätzt werden.

Leistus montanus ssp. *kultinanus* FARKAC & FASSATI, 1999

1 Ex., Juni 2004, Elbsandsteingebirge, Kleingießhübel, Großer Zschirnstein (TK10: 5151NW), in Bodenfalle an der südlich exponierten Felsoberkante (vid. J. GEBERT, vid. FARKAC).

Elaphropus diabrachys KOLENATI, 1845

1 Ex., 23.8.2000 und 1 Ex., 20.3.2004, Tharandt, Ortslage, besonnte Hausmauer (TK10: 5047NW).

Patrobus assimilis CHAUDOIR, 1844

1 Ex., Mitte August 2003 und 1 Ex., Mai 2004, Westerbirge, Fichten-Moorwald südwestlich Carlsfeld (TK10: 5541SW), Bodenfalle in Sphagnumbestand.

Anisodactylus signatus (PANZER, 1797)

1 Ex., Mitte Oktober 2005, Grumbach bei Wilsdruff, lehmige Ruderalflur Steinbruchoberkante (TK10: 4947SW), Bodenfalle (vid. J. GEBERT).

Laemostenus terricola (HERBST, 1783)

1 Ex., 22.09.2003, Meißen, bewaldetes Tälchen nördlich Ort, Chitin-Fragmente in einem vom ? Dachs ausgeräumten Wespenerdnest (TK10: 4846NO).

Agonum ericeti (PANZER, 1809)

3 Ex., Mitte Mai 2004, Westertalgebirge, regenerierendes Hochmoor bei Weitersglashütte südöstlich Carlsfeld (TK10: 5541SW), Bodenfalle in Sphagnumbestand. Weitere Einzelnachweise im gleichen Gebiet in Bodenfallen im Mai, Juli und September 2005 (leg./coll. WEIGEL).

Staphylinidae**Eucnecosum brachypterum** (GRAVENHORST, 1802)

1 Ex., am 17. März 2005, NSG „Fraunteich“ nördlich Moritzburg (TK10: 4848NW), Gesiebe im Verlandungsbereich des Teiches (vid. J. VOGEL).

Ocypus macrocephalus (GRAVENHORST, 1802)

Mehrfach 2001 in Bodenfallen im Osterzgebirge bei Altenberg im NSG „Geisingberg“ (TK10: 5248NO), 1 Ex., 2001 in Bodenfallen im Bahretal südlich Pirna (TK10: 5049SW), mehrfach 2004 und 2005 in Bodenfallen im Osterzgebirge bei Tharandt im NSG „Weißeitztalhänge“ (TK10: 5047NW), (vid. J. VOGEL).

Agaricochara latissima (STEPHENS, 1832)

Weitere Nachweise unter ähnlichen Fundumständen wie bei LORENZ (2003) beschrieben (...im Herbst an Rötender Tramete), gelangen am 13.10.2005 in der Sächsischen Schweiz bei Hohnstein sowie am 27.10.2005 im NSG „Weißeitztalhänge“ bei Tharandt (TK10: 5047NW). Ende August/Anfang September 2005 in der Sächsischen Schweiz aber auch an anderen Holzpilzen gefunden.

Scydmaenidae**Stenichmus bicolor** (DENNY, 1825)

1 Ex., August 2004, Osterzgebirge bei Bärenstein im NSG „Weicholdswald“ (TK10: 5248NO), Buchenmischwald, (det. W. APFEL).

Cantharidae**Cantharis cryptica** ASHE, 1947

Mehrfach im Juni 1994, Kleinkuppenlandschaft nördlich von Dresden (TK10: 4848NO), auf Feuchtwiesen (vid. A. Kopetz).

Peltidae**Ostoma ferruginea** (LINNAEUS, 1758)

1 Ex., Mitte Juni 2004, Mittleres Erzgebirge südlich von Marienberg, NSG „Buchenwälder bei Steinbach“, am Glösenstein in ca. 800 m ü. NN (TK10: 5444SO), unter verpilzter Rinde einer frisch umgebrochenen, weißfaulen Buche (flächiges, weißes Mycel) und 2 Ex., 20.10.2003 Osterzgebirge, NSG „Weicholdswald“ bei Bärenstein (TK10: 5248NO), unter Rinde einer morschen Weiß-Tanne (leg. A. SCHOLZ). Alle bisherigen Funde dieser Art aus Sachsen gelangen an verpilztem Fichtenholz (Sächsische Schweiz: leg. KRAUSE; Osterzgebirge: NSG „Rabenauer Grund“ bei Freital sowie NSG „Hemmschuh“ bei Rehefeld-Zaunhaus, leg. LORENZ).

Elateridae**Porthmidius austriacus** (SCHRANK, 1781)

Mehrfach im Juni 2004, NSG „Kleiner Berg“ bei Hohburg nordöstlich Würzen (TK10: 4542SO), Klopfschirmfang von trockenen Weißdorn- Eichen- und Hainbuchenästen in strukturreichen Eichen-Mischwald an südlich exponierten Hang.

Lissomidae**Drapetes cinctus** (PANZER, 1796)

1 Ex., 18.06.2005 Osterzgebirge, Tharandter Wald bei Edle Krone, Buchenaltholz im NSG „Weißeitztalhänge“ (TK10: 5047SW), auf besonnten Buchenstumpf unter alten Zinnoberchwamm.

Scirtidae**Hydrocyphon deflexicollis** (MÜLLER, 1821)

1 Ex., Juli 2002 im NSG „Fürstenauer Heide“, oberes Osterzgebirge (TK10: 5249SW), in Malaisefalle (leg. C. KEHLMAYER, MTD). Aus der Region Oberes Elbtal/ Osterzgebirge war diese seltene Art bisher noch nicht aktuell bekannt (KLAUSNITZER, mündl. Mitt.).

Prionocyphon serricornis (MÜLLER, 1821)

1 Ex., 9.07.2003 Umg. NSG „Schwarzbachtal“ südlich Dippoldiswalde, Osterzgebirge (TK10: 5147NO), auf Rot-Buchen-Stumpf sowie 2 Ex., Mai-Juni 2003 Osterzgebirge, NSG „Weicholdswald“ bei Bärenstein (TK10: 5248NO), in Luftlektor (leg. A. SCHOLZ).

Psephenidae**Eubria palustris** GERMAR, 1818

1 Ex., 25.06.2001 Osterzgebirge bei Geising (TK10: 5248SO) und 1 Ex., 10.07.2001 Osterzgebirge bei Oelsen; Saugfänge auf Bergwiesen (leg. S. WALTER).

Phloeostichidae**Phloeostichus denticollis** REDTENBACHER, 1842

3 Ex., Oktober 2004 Osterzgebirge bei Bärenstein, NSG „Weicholdswald“ in Stammlektoren und 1 Ex., 10.05.2005 Zittauer Gebirge, Waltersdorf, NSG „Lausche“ aus verpilztem Stammriss einer Rot-Buche gebürstet.

Erotylidae**Triplax rufipes** (FABRICIUS, 1775)

Mehrfach Juni-August 2005, Hintere Sächsische Schweiz, Buchenaltholzbestände, an verschiedenen Holzpilzen, v. a. Austerseiteiling (oft zusammen mit *T. russica*).

Cryptophagidae**Cryptophagus deubeli** GANGLBAUER, 1897

HORNIG (2000) meldet die Art aus der Oberlausitz. Hier können weitere Fundorte aus dem Osterzgebirge genannt werden, wobei die ersten Funde von einer ausgesprochen montanen Lokalität stammen (600-700 m ü. NN), der letztgenannte Fundort jedoch ca. 350 m ü. NN liegt: 1 Ex., Juni 1989 in einem Fichten-Altalholzbestand nordwestlich von Altenberg (TK10: 5248NW) und 2 Ex., Mai 2003 in Buchenwäldern im NSG „Weicholdswald“ westlich Bärenstein sowie Juni 2001 im NSG „Schwarzbachtal“ südwestlich von Dippoldiswalde (TK10: 5148NW). 1 Ex., 23.09.1998 Hartenstein, Muldenaue (TK10: 5342SW), (leg. BREINL, coll. WEIGEL), alles Bodenfallenbeifänge (det. J. ESSER).

***Caenoscelis sibirica* REITTER, 1889**

1 Ex., 17.06.2004 Osterzgebirge bei Oelsen, Umg. Talsperre Bad Gottleuba, edellaubholzreicher Schlucht- und Schatthangwald (vid. J. ESSER).

Languriidae***Cryptophilus integer* (HEER, 1838)**

1 Ex., 11.05.2001, Räuberhüttenwiese bei Moritzburg (TK10: 4848NW), (leg. REIKE, det. J. ESSER) sowie 1 Ex., September 2003 nordöstlich Dresden, Waldgebiet Dresdner Heide, unter verpilzter Lindenrinde (TK10: 4948NO), (vid. J. ESSER).

Latridiidae***Corticaria alleni* JOHNSON, 1974**

1 Ex., 18.08.2003, „Kleiner Berg“ bei Hohburg nordöstlich von Wurzen (TK10: 4542SO), Baumpilz an Eiche in strukturreichen Eichen-Hainbuchenwald. Nach dem Erstfund von REIKE et al. (2002) in Kiefernforsten bei Torgau handelt es sich nun um den zweiten bekannten Nachweis in Sachsen (vid. REIKE).

***Corticaria obfuscata* STRAND, 1934**

Insgesamt 240 ! Ex., 2003-04, Bärenstein NSG „Weicholdswald“ (Osterzgebirge (TK10: 5248NO), mit unterschiedlichen Eklekfortypen (Boden-, Stamm-, Totholz- Luftklektoren) sowie Gelbschalen (vid. REIKE). 2004 auch in der Lausnitzer Heide östlich Radeburg sowie im östlichen Osterzgebirge bei Bad Gottleuba sowie 2005 in der Hinteren Sächsischen Schweiz gefunden. Entweder wurde die Art bisher übersehen oder sie breitet sich stark aus.

Mycetophagidae***Mycetophagus decempunctatus* FABRICIUS, 1801**

1 Ex., 17.06.2005, Hintere Sächsische Schweiz, südlich Lichtenhain, Buchenaltholzbestände am Hausberg. An einem Buchenstumpf mit dichtem Holzpilzbewuchs („Schwefelkopf“).

Coccinellidae***Clitostethus arcuatus* (MÜLLER, 1821)**

1 Ex., Juli 2002 im NSG „Fürstenaue Heide“, oberes Osterzgebirge (TK10: 5249SW), in Malaisefälle (leg. C. KEHLMAYER, MTD, vid. B. KLAUSNITZER). Waren nach PÜTZ et al. (2000) noch keine Nachweise aus Sachsen bekannt, gelang der sächsische Erstnachweis in der Oberlausitz (KEITEL & KLAUSNITZER 2002). Aus der Region Oberes Elbtal/ Osterzgebirge war die Art bisher noch nicht bekannt (KLAUSNITZER, mündl. Mitt.). Bemerkenswert ist der Fund in einer Höhe von ca. 700 m ü. NN. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die flugfreudige Art eventuell passiv (Windverdriftung) ausbreitet, auch über die Mittelgebirge und nicht nur aktiv entlang der klimatisch wärmebegünstigten Gebiete.

***Scymnus ater* KUGELANN, 1794**

1 Ex., im Juni 2003, Bergbaufolgelandschaft nördlich von Hoyerswerda (TK10: 4650NO), in Gelbschale (leg. A. SCHOLZ).

***Tytthaspis sedecimpunctata* (LINNEAUS, 1761)**

FÜRSCH (1967) schreibt: „Nicht über 400 bis 500 m emporsteigend“ Nach KLAUSNITZER & KLAUSNITZER (1996) werden Trockenrasen und warme Ödländer als bevorzugte Habitate angegeben. 2001 konnte die Art im oberen Osterzgebirge auf einer Bergwiese in ca. 750 m ü. NN nachgewiesen werden. Ein weiteres Indiz für die Klimaerwärmung?

Anobiidae***Ernobius pini* (STURM, 1837)**

1 Ex., 4.06.2004, Lausnitzer Heide bei Großdittmannsdorf (östlich Radeburg), (TK10: 4748SO), von Kiefernästen geklopft.

Aderidae***Euglenes pygmaeus* (DEGEER, 1774)**

1 Ex., Juli 2004 Osterzgebirge bei Bärenstein, NSG „Weicholdswald“ in Luftklektor und 2 Ex., 14.07.2005 Dresdner Heide nordöstlich von Dresden, Prießnitzgrund, Lichtfang.

***Euglenes oculatus* (PAYKULL, 1799)**

4 Ex., Juli/August 2004 Osterzgebirge, Tharandter Wald bei Edle Krone, Buchenaltholz im NSG „Weißeritztalhänge“ (TK10: 5047SW), Luftklektor.

Meloidae***Meloe violaceus* MARSHAM, 1802**

1 Ex., Mai 2004, Mittleres Erzgebirge südlich von Marienberg, NSG „Buchenwälder bei Steinbach“, ca. 710 m ü. NN (TK10: 5444SO), Bodenfallenbeifang in mäßig dichten Buchen-Altbestand (die nächst gelegenen Bergwiesen befinden sich reichlich 1 km nordwestlich).

***Meloe proscarabaeus* LINNEAUS, 1758**

1 Ex., April 2004, FND „Winzerwiesen“ bei Neudörfel nordöstlich Diera (TK10: 4846NO), Bodenfallenbeifang in Pfeifengraswiese. Im März 2002 von U. LEHMANN in Anzahl am nördlichen Stadtrand von Großenhain gefunden.

***Meloe rugosus* MARSHAM, 1802**

3 Ex., Sept. 2001, Osterzgebirge, NSG „Geisingbergwiesen“ nördlich (TK10: 5248NO), Bodenfallenbeifang in artenreicher Bergwiese an östlich exponiertem Hang in 750 m ü. NN.

Mordellidae***Mordellistena neuwaldeggiana* (PANZER, 1796)**

Mehrfach im Juni/Juli 1993, Kleinkuppenlandschaft nördlich von Dresden (TK10: 4848NO), auf Blüten an strukturreichen Säumen von Feldgehölzen.

Melandryidae***Xylita laevigata* (HELLÉ, 1786)**

1 Ex., 16.06.2005, Hintere Sächsische Schweiz, Hinterhermsdorf, Kirmitzschklamm (TK10: 5152NW), an trockener, rindenloser, stehender Fichte.

Tenebrionidae***Neomida haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1787)**

1 Ex., 30.06.2005, Hintere Sächsische Schweiz, Lichtenhain, Knechtsbachtal (TK10: 5051SW), (leg. H.-P. REIKE), aus altem, durchlöchernten Zunderschwamm geklopft.

Cerambycidae***Axinopalpis gracilis* (KRYNICKI, 1832)**

1 Ex., 14.06.2001, bewaldeter, trockener Hang bei Zöthain im Käbschützachtal westlich von Meißner (TK10: 4846NW), von Eiche geklopft.

Cortodera humeralis (SCHALLER, 1783)

1 Ex., 10.05.2004, NSG „Kleiner Berg“ bei Hohburg nordöstlich Wurzen (TK10: 4542SO), auf Weißdornblüte in strukturreichen Eichen-Mischwald an südlich exponierten Hang.

Ropalopus femoralis (LINNEAUS, 1758)

1 Ex., 22.05.2002, Streuobstwiese im Ketzerbachtal zwischen Schieritz und Piskowitz westlich von Zehren bzw. nordwestlich von Meißen (TK10: 4846NW), von Kirsche geklopft.

Anaethetis testacea (FABRICIUS, 1799)

1 Ex., 17.06.2003, wärmebegünstigter, trockener Hang, z.T. Streuobstwiese, z.T. Laubwald bei Boxdorf nördlich von Dresden (TK10: 4848SW), von Eiche geklopft.

Pedostrangalia pubescens (FABRICIUS, 1787)

Mehrfach im Juni/Juli 2005, Hintere Sächsische Schweiz, Hinterhermsdorf, Kirmitzschklamm (TK10: 5152NW), auf Brombeerblüten.

Acmaeops septentrionis (THOMSON, 1866)

2 Ex., Juni/Juli 2005, Hintere Sächsische Schweiz, Hinterhermsdorf, Kirmitzschklamm (TK10: 5152NW), Luftflecktor.

Saphanus piceus (LAICHARTING, 1784)

1 Ex., 24.06.2005, Linkselbische Hänge westlich Dresden, Niederwartha, Burgberg (TK10: 4947NO), Lichtfang.

Necydalis major (LINNEAUS, 1758)

1 Ex., 21.06.2003, Ketzerbachtal bei Graupzig westlich von Meißen (TK10: 4845NO), aus morscher Schwarz-Erle gezogen.

Callidium coriaceum (PAYKULL, 1800)

1 Ex., 17.06.2005, Hintere Sächsische Schweiz, Lichtenhain, Knechtsbachtal (TK10: 5051SW), an absterbender, dünner Fichte umherlaufend und 1 Ex., 13.07.2005 Hintere Sächsische Schweiz, Schmilka, Kleiner Winterberg (TK10: 5051SW), an frisch abgestorbener (Blitzschlag) und stark vom Specht zerhackter Lärche!

Monochamus saltuarius GEBLER, 1830

1 Ex., 1.09.2005, Hintere Sächsische Schweiz, Hinterhermsdorf, Kirmitzschklamm (TK10: 5152NW), von den noch grünen Zweigen einer frisch umgebrochener Fichte geklopft.

Oberea erythrocephala (LINNEAUS, 1758)

1 Ex., 23.06.2003, Kuppen- und Teichlandschaft nördlich von Moritzburg (TK10: 4848NW), von Zypressenwolfsmilch gekäsert.

Chrysomelidae

Cryptocephalus janthinus GERMAR, 1824

3 Ex., Mitte Juli 2004, Nasswiesen um Moritzburg (TK10: 4848NW), Streifsackfang.

Cryptocephalus octomaculatus ROSSI, 1790

1 Ex., 28.07.2005, Linkselbische Hänge zwischen Meißen und Dresden, Batzdorf (TK10: 4847SW), Lichtfang am Rand eines wärmebegünstigten Eichenwaldes.

Chrysomela lapponica LINNEAUS, 1758

1 Ex., Ende April/Anfang Mai 2003 Osterzgebirge bei Bärenstein, NSG „Weicholdswald“ in Stammeklektor und 1 Ex., 26.05.2005 mittleres Erzgebirge westlich Marienberg „Moosheide“, von jungen Birken auf einer Pfeifengraswiese geklopft. 14 Tage später konnte an gleicher Lokalität *Cryptocephalus decemmaculatus* geklopft werden.

Minota obesa (WALTL, 1839)

2 Ex., im August/September 2003, West erzgebirge südlich von Carlsfeld in ca. 900 m ü. NN (TK10: 5541SO), in Bodenfallen in Fichten-Moorwald sowie montanen Woll-Reitgras-Fichtenwald.

Bruchidae

Acanthoscelides pallidipennis (MOTSCHULSKY, 1874)

1 Ex., 14.06.2001, Trockenhänge im Ketzerbachtal bei Proszitz westlich von Meißen (TK10: 4846NW), Streifsackfang (det. H. WENDT).

Curculionidae

Notaris aterrimus (HAMPE, 1850)

4 Ex., im Mai 2004 Mittleres Erzgebirge südlich von Marienberg, NSG „Buchenwälder bei Steinbach“, am Glösenstein in ca. 800 m ü. NN (TK10: 5444SO), in Bodenfallen im lichten Buchen-Altholz mit viel Wolligem Reitgras (*Calamagrostis villosa*) in der Bodenflora sowie 2 Ex., im Juni 2004, West erzgebirge südlich von Carlsfeld in ca. 900 m ü. NN (TK10: 5541SO), in Bodenfallen in montanem Woll-Reitgras-Fichtenwald. 1 Ex., 12.09.2005 Tharandt, NSG „Weißeitzalhängen“ (TK10: 5047NO), Gesiebe an nordexponiertem, felsigen mit Laubmischwald bestockten Hang.

Adexius scrobipennis GYLLENHAL, 1834

1 Ex., 1.04.2001, östliches Erzgebirgsvorland südlich Pirna, Bahretal (TK10: 5049SW), Gesiebe in aufgelassenen Steinbruch (leg. H.-P. REIKE) sowie mehrfach Mai/Juni 2004 Osterzgebirge, Seidewitztal (TK10: 5149SW), in Gesiebe und Bodenfallen an kalkhaltigen Felsen.

Scleropterus serrates (GERMAR, 1824)

Vereinzelte im Mai/Juni 2001, oberes Osterzgebirge südlich Geising (TK10: 5248SO), Bodenfallen in feuchten Hochstaudenfluren.

Miarus ajugae (GRAVENHORST, 1802)

Mehrfach von 1992-94 in der Kleinkuppenlandschaft nördlich von Dresden, 1995 auf Ruderalflächen in Dresden, 2000 in einem Garten in Singwitz bei Bautzen (Oberlausitz), (leg. A. SCHOLZ), 2001 auf Streuobstwiesen nordwestlich von Meißen, 2001 Osterzgebirge Umgebung Geisingberg usw. Alle bisher von mir von Glockenblumen, vor allem Wiesen-Glockenblume (*Campanula patula*) gesammelten Tiere waren *M. ajugae* (vid. L. BEHNE), während *M. campanulae* bisher nicht gefunden werden konnte.

Danksagung

Für die Überprüfung einiger Arten sowie für die Erlaubnis der Verwendung ihrer Funddaten bzw. für Hinweise zu deren Verbreitung bedanke ich mich recht herzlich bei Frau Dr. HELLA WENDT (Berlin) und Frau Dr. SABINE WALTER (Kurort Hartha) sowie bei folgenden Herren: W. APFEL (Eisenach), L. BEHNE (Münchenberg), J. ESSER (Berlin), Dr. F. FRITZLAR (Erfurt), J. GEBERT (Rohne), U. HORNIG (Oppach), O. JÄGER (Dresden), Prof. Dr. B. KLAUSNITZER (Dresden), A. KOPETZ (Kerspleben), U. LEHMANN (Großenhain), F. KÖHLER (Bornheim), J. REIBNITZ (Stuttgart), Dr. H.-P. REIKE (Dresden), W. RÜCKER (Neuwied), Dr. P. SPRICK (Hannover), Dr. A. SCHOLZ (Singwitz), M. SIEBER (Großschönau), J. VOGEL (Görlitz), A. WEIGEL (Wernburg), W. ZIEGLER (Biberach).

Literatur

- FÜRSCH, H. (1967): 62. Familie: Coccinellidae. - In: FREUDE, HARDE & LOISE: Die Käfer Mitteleuropas. Band 7. - Goecke & Evers, Krefeld.
- HORNIG, U. (2000): Notiz zu einer montanen *Cryptophagus*-Art in der Oberlausitz (Col., Cryptophagidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44 (3): 203.
- KEITEL, M. & B. KLAUSNITZER (2002): *Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794) in der Oberlausitz - neu für Sachsen (Col., Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (2): 133-134.
- KLAUSNITZER, B. & KLAUSNITZER, H. (1997): Marienkäfer (Coccinellidae). 4. überarbeitete Auflage. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 451, Westarp Wissenschaften Magdeburg. 175 Seiten, 96 Abbildungen, 2 Farbtafeln.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ - Entomologische Nachrichten und Berichte 44 (1): 60-84.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4.
- LORENZ, J. (2001): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 (3/4): xx - yy.
- LORENZ, J. (2003): Zwei bemerkenswerte pilzbewohnende Käferarten aus Sachsen (Col., Nitidulidae, Staphylinidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47 (1): 44.
- PÜTZ, A., KLAUSNITZER, B., SCHWARTZ, A. & J. GEBERT (2000): Der Bogen-Zwergmarienkäfer *Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794) - eine mediterrane Art auf Expansionskurs (Col., Coccinellidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 44 (3): 193-197.
- REIKE, H.-P., JÄKEL, A., & U. M. RATSCHIKER (2002): Erstnachweise von vier Käferarten in Sachsen (Col., Latridiidae, Elateridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (2): 127.

Manuskripteingang: 6. 11. 2005

Anschrift des Verfassers:

Dr. Jörg Lorenz
Talmühlenstraße 4
D-01737 Tharandt
eMail: lorenz.col@t-online.de

BUCHBESPRECHUNGEN

STUCKI, P. & ZAUGG, B. (2005): **Decapoda. Fauna Helvetica 15. 56 S. ISBN 2-88414-027-1, CSCF/SEG, Neuchâtel.**

Der vorliegende Band ist den Flusskrebse gewidmet, Tiere, denen auch der Entomologe begegnet, vor allem, wenn er sich mit der Untersuchung aquatischer Lebensräume befasst. Die wenigsten Leser haben aber eine Bestimmung versucht, vielleicht auch deshalb, weil die entsprechende Literatur nicht so einfach zu handhaben ist. Dem wird nun gleich mit einem für den Exkursionsgebrauch geeigneten wasserfesten Bildbestimmungsschlüssel für 8 Arten abgeholfen. Das ist aber nicht der einzige Inhalt. Wir finden allgemeine Abhandlungen (immer französisch und deutsch) über die Morphologie, Vermehrung, Verhalten, Ernährung, Krankheiten, Feinde und Schutz.

Der Hauptteil befasst sich mit der ausführlichen Darstellung jeder einzelnen Art (allgemeine Verbreitung, Biologie, aktuelle Situation in der Schweiz einschließlich Hilfsmaßnahmen) zuzüglich hervorragender Abbildungen (Zeichnungen und Farbfotos) und einer zeitlich gestaffelten Verbreitungskarte. Die Basis ist eine Datenbank, die zum Zeitpunkt der Publikation 3240 Einträge umfasste. Beigefügte Felderhebungsblätter unterstützen die weitere Mitarbeit an der Erforschung der Flusskrebse der Schweiz. Bereits jetzt wird eine große Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genannt.

In der Schweiz sind 3 Arten heimisch: Edelkrebs, Dohlenkrebs und Steinkrebs. Die beiden letztgenannten gelten als stark gefährdet. Die anderen Arten sind Neozoen aus SO-Europa und Kleinasien (Galizierkrebs) sowie Nordamerika (3 Arten). Eine weitere Art aus Australien könnte in Zukunft noch im Freiland auftreten.

Der Rezensent möchte dieses Buch sehr empfehlen. Es ist gründlich und genau gearbeitet und wird sicher dazu anregen, sich mit der jeweils heimischen Flusskrebsfauna näher zu befassen.

BERNHARD KLAUSNITZER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2005/2006

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Lorenz Jörg

Artikel/Article: [Neu- und Wiederfunde von Käferarten \(Col.\) für die Fauna Sachsens sowie weitere faunistisch bemerkenswerte Käfernachweise 2001-2005. 195-202](#)