

FAUNISTISCHE NOTIZEN

825.

Anmerkungen zur sächsischen Fauna der Speckkäfer (Col., Dermestidae)

KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) registrierten für Sachsen 30 Arten Speckkäfer. Inzwischen wurden die nicht seltenen *Attagenus punctatus* (SCOPOLI, 1772), sowie die sich ausbreitenden *Attagenus smirnovi* und *Anthrenocerus australis* nachgetragen (HORNIG 2001, LORENZ 2002a, 2002b, WEIGEL 2005). Mit den hier gebrachten Ergänzungen und Korrekturen erhöht sich die sächsische Artenzahl der Dermestidae um fünf weitere auf jetzt 38, wobei auch für zwei irrtümlich gemeldete Arten (*Dermestes ater*; *Trogoderma versicolor*) Nachweise bekannt wurden. Für 30 Arten liegen Belege seit 1945 vor, für fünf meines Wissens nur ältere von 1900-1945 (*Dermestes ater*; *D. olivieri*; *Trogoderma megatomoides*; *Globicornis corticalis*; *Anthrenus olgae*) und für zwei Arten lediglich einzelne historische Belege vor 1900 (*Dermestes gyllenhalii*; *D. erichsoni*), fraglich bleibt das Vorkommen von *Attagenus pantherinus*.

Im Folgenden seien einige bemerkenswerte, vorwiegend ältere Belege sächsischer Dermestidae mitgeteilt, welche sich in verschiedenen Sammlungsbeständen fanden. Teils waren die Tiere noch unbestimmt, teils steckten sie unter verwandten Arten oder wurden aus anderen Gründen bisher nicht berücksichtigt.

Abkürzungen: MTD = Museum für Tierkunde, Dresden; MNG = Museum für Naturkunde Görlitz.

Dermestes gyllenhalii CASTELNAU, 1840

Bisher für Sachsen nicht publiziert.

Dresden, ohne Jahr [vor 1900], 1 Ex., ex coll. KIRSCH (Museum für Tierkunde Dresden [MTD]).

Dermestes erichsoni GANGLBAUER, 1904

Für Sachsen nur historische Meldung für Leipzig publiziert (HORION 1955).

Dresden, ohne Jahr [vor 1900], 1 Ex., ex coll. KIRSCH (MTD).

Dermestes ater DEGEER, 1774

Für Sachsen in KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) irrtümlich gemeldet (*D. ater* OLIVIER nec DEGEER ist synonym zu *D. olivieri*, siehe da).

Dresden-Blasewitz, 27.01.1921, 1 Ex., ex coll. KOKSCH (MTD).

Dermestes olivieri LEPESMÉ, 1939

Für Sachsen nur historische Meldung für Umgebung Annaberg (als „*D. ater* OL. Sehr selten“) publiziert (LANGE 1886 [nicht 1883]), diese nach HORION (1955) aber zweifelhaft. In KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) insgesamt nur Nachweis vor 1900 für Bayern, Sachsen wegen Verwechslung nicht verzeichnet (siehe *D. ater* DEG.).

Dresden, ohne Jahr [wohl um/nach 1900], 1 Ex., ex coll. HÄNEL (MTD), damit erscheint die Meldung LANGES etwas weniger zweifelhaft (obgleich er nur diese sehr seltene *Dermestes*-Art neben *D. lardarius* nennt).

Attagenus smirnovi ZHANTIEV, 1973

Die bei LOHSE (1979) noch fehlende, importierte, sich ausbreitende Art bereits als neu für Sachsen von LORENZ (2002b) aus Dresden gemeldet.

Weitere aktuelle Belege: Dresden-Neustadt, Altbauwohnung, 04.2005, 3 Ex., leg. TRALLS (MNG).

Attagenus pantherinus (AHRENS, 1814)

Für Sachsen von HORION 1951, nicht aber 1955 erwähnt. Am MTD 3 historische Belege (Deutschland, Schlesien, Thüringen), ein weiterer mit sächsischem Fundort gehörte nicht hierher. Die Art ist in Sachsen sicher vorhanden (gewesen), bleibt aber auf Grund der Beleglage einstweilen unsicher, da nicht erkennbar ist, welche Meldung HORION (1951) vorlag, er sich andererseits 1955 aber auch nicht, wie z. B. für Hessen, explizit korrigierte.

Trogoderma angustum (SOLIER, 1849)

Die bei REITTER (1911) noch fehlende, importierte, sich ausbreitende Art bereits für Sachsen, Dresden, gemeldet (HORNIG 1995).

Weitere aktuelle Belege sowohl am MTD (Dresden, 10.1987, über 40 Ex., an Rehschädeln im MTD), in coll. SIEBER (Großschönau, 06.1996, 1 Ex., im Haus), als auch am MNG (Görlitz, 04.2000, 1 Ex., auf Wohnungsteppich).

Trogoderma megatomoides REITTER, 1880

Für Sachsen mir nur Literaturhinweis nach ZACHER (1939, zitiert in HORION 1951) bekannt.

Leipzig-Stadt, in Insektensammlung, 1931, 3 Ex.; Dresden-Blasewitz, 07.1941, 1 Ex., leg. KOKSCH, ex coll. LINKE; Dresden-Blasewitz, o. J., 1 Ex., leg. ERHARDT, ex coll. LINKE (alle MTD).

Trogoderma cf. granarium EVERTS, 1898

Bisher für Sachsen nicht publiziert.

Rackel, Getreidelager, Mitte 07.1974, zahlreich, leg. SCHUSCHK (coll. SIEBER, coll. m.), alle Belege abgerieben und ohne Fühler.

Trogoderma versicolor (CREUTZER, 1799)

Für Sachsen bereits aktuell von LORENZ (2001) aus der Laußnitzer Heide gemeldet. Vorher nur die ältere Angabe von HORION (1955) für Waldheim (1937, 1 Ex., leg. DETZNER) bekannt, doch dieses Exemplar und alle anderen sächsischen Belege unter dieser Art am MTD (Leipzig, Döbeln) erwiesen sich als *T. glabrum* (HERBST).

Dresden-Blasewitz, ohne Jahr, 1 Ex., ex coll. LINKE (MTD); aktuelle Funde (alle LORENZ in litt.): Dresden, Rähnitzer Höhe, 07.1997, 4 Ex., leg. LORENZ, Limbach-Oberfrohna, 06.1999, 4 Ex., verlassenes Hymenopterennest unter Styroporplatte in Gartenlaube, leg. LORENZ, Laußnitzer Heide, NSG Waldmoore bei Großdittmannsdorf, Winterhalbjahr 1999/2000, 1 Ex., Bodenfalle, leg. LORENZ.

***Globicornis nigripes* (FABRICIUS, 1792)**

Für Sachsen mir nur aktuelle Meldung von BÖHME (in litt.) für Moritzburg, 06.1973, 1 Ex., bekannt, diese Quelle auch in KÖHLER & KLAUSNITZER (1998).

Leipzig, 1905-1941, mehrfach, ex coll. LINKE (MTD).

***Globicornis corticalis* (EICHHOFF, 1863)**

Bisher für Sachsen nicht publiziert. Gelegentlich mit *Globicornis marginata* (PAYKULL, 1798) verwechselt, die historisch und aktuell für Sachsen belegt ist.

Am MTD mehrere Belege: Leipzig (ex coll. LINKE), Torgau (ex coll. FUCHS), Dresden (ex coll. KIRSCH), Moritzburg, leg. v. MINCKWITZ (ex coll. HÄNEL), Dresden Heide, Sächsische Schweiz, Kleinröhrsdorf (alle ex coll. LINKE), Häslach, Preuschwitz, leg. JORDAN (beide ex coll. SCHMIDT), alle vor 1945.

***Anthrenus olgae* KALIK, 1946**

Bisher für Sachsen nicht publiziert. Die Art war von ESSER & MÖLLER (1998) und damit in KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) übersehen worden, worauf ESSER (2000) mit aktuellen Berliner Funden hinwies.

Dresden-Blasewitz, 01.05.1912, 1 Ex., ex coll. LINKE (MTD). Außerdem: Františkova Lázně (Franzensbad, 6 km entfernt von Sachsen und Deutschland), 03.1980, 04.1984, 05.1987, insgesamt 5 Ex., leg. KRÁL (coll. RICHTER, coll. m.).

***Orphilius niger* (Rossi, 1790)**

Bisher für Sachsen und fast alle anderen Bundesländer nicht oder als Falschmeldung publiziert (vgl. KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), analog steckten unter den Museumsserien dieser Art einzelne historische deutsche Belege, auch aus Sachsen (ex coll. HÄNEL), die sich aber als völlig abgeriebene, vom Habitus her ähnliche *Trogoderma* erwiesen.]

***Anthrenocerus australis* (HOPE, 1843)**

Die importierte, sich ausbreitende Art wurde als neu für Sachsen von WEIGEL (2005) für Weißwasser 2004 gemeldet.

Bereits belegt für: Görlitz, 30.04.2000, zahlreich auf Wohnungsteppich, leg. SEIDEL (MNG).

Für hilfreiche Diskussionen danke ich JENS ESSER (Berlin), JIŘÍ HÁVA (Prag) und ANDREAS HERRMANN (Stade).

Literatur

ESSER, J. (2000): Zum Vorkommen verschiedener Käferarten in einem Berliner Mietshaus. - Märkische Entomologische Nachrichten 2 (2): 45-50.

ESSER, J. (2001): Zum Vorkommen von *Attagenus smirnovi* ZHANTIEV, 1973 in Berlin und Potsdam nebst einer genauen Beschreibung dieser Art (Coleoptera: Dermestidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 3 (2): 59-63.

ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Brandenburg. In: Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Hrsg. F. KÖHLER & B. KLAUSNITZER). - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beifl. 4.

HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. - Stuttgart.

HORION, A. (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: *Sternoxia* (Buprestidae), *Fossipedes*, *Microdactyla*, *Brachymera*. - München.

HORNIG, U. (1995): Einige bemerkenswerte Käferfunde aus der Stadt Dresden. Entomologische Nachrichten und Berichte 39 (3): 148-149.

HORNIG, U. (2001): Beitrag zur Käferfauna im Grenzbereich des Oberlausitzer Berglandes zu Böhmen. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 9:131-133.

KALIK, V. (1992): Dermestidae. In: Die Käfer Mitteleuropas, 2. Supplementband (Hrsg.: G. A. LOHSE & W. H. LUCHT). - Goecke & Evers, Krefeld.

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beifl. 4.

LANGE, C. (1886): Verzeichnis der in der Umgebung Annabergs beobachteten Käfer. - 7. Jahresbericht des Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde: 76-99.

LOHSE, G. A. (1979): Dermestidae. In: Die Käfer Mitteleuropas, Band 6 (Hrsg.: H. FREUDE, K. W. HARDE & G. A. LOHSE). - Goecke & Evers, Krefeld.

LORENZ, J. (2001): Bemerkenswerte Käferfunde im Südwesten der Laubnitzer Heide (Sachsen) (Coleoptera). - Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 23: 77-88.

LORENZ, J. (2002a): Die Holz- und Pilzkäferfauna in Dresden (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001] (3/4): 205-220.

LORENZ, J. (2002b): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsen (Col.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 45 [2001] (3/4): 230-234.

REITTER, E. (1911): Fauna Germanica, III. Band. - Stuttgart.

WEIGEL, A. (2005): Neu- und Wiederfunde sowie weitere bemerkenswerte Nachweise von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Sachsen. - Entomologische Nachrichten und Berichte 49: 161 - 170.

ZACHER, F. (1939): Verschleppung und Einbürgерung von Vorrats schädlingen. - Verhandlungen 7. Internationaler Entomologenkongress Berlin, 4. Bd.: 2919-2926.

Anschrift des Verfassers:

Uwe Hornig
Lindenberger Straße 24
D-02736 Oppach/OL

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2006/2007

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Hornig Uwe

Artikel/Article: [Faunistische Notizen. 89-90](#)