

R. GAEDIKE, Bonn

## Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera)

**Zusammenfassung** Die seit dem Erscheinen der Deutschlandliste (GAEDIKE & HEINICKE 1999) in der Literatur veröffentlichten Nachträge und Berichtigungen werden zusammengestellt. Erfasst werden Neufunde für Deutschland, für einzelne Bundesländer, aktuelle Funde (nach 1980), Streichungen aus dem Verzeichnis sowie nomenklatorische Änderungen. Die folgenden 47 Arten sind Neufunde für Deutschland:

117 *Stigmella sanguisorbae* (WOCKE, 1865); 265 *Ectoedemia amani* SVENSSON, 1966; 272 *Ectoedemia klimeschi* (SKALA, 1933); 577 *Lichenotinea maculata* PETERSEN, 1957; 592 *Karsholtia marianii* (REBEL, 1936); 1180 *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979; 1261 *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963); 1617 *Leucoptera genistae* (M. HERING, 1933); 1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877); 1751 *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879); 1986 *Elachista occidentalis* FREY, 1882; 2005a *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855); 2005b *Elachista tengstromi* KAILA, BENGSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001; 2023 *Elachista svenssoni* TRAUGOTT-OLSEN, 1988; 2066 *Haplochrois ochraceella* (REBEL, 1903); 2214 *Enolmis acanthella* (GODART, 1824); 2442 *Goniodoma limoniella* (STAINTON, 1884); 2589a *Coleophora variicornis* TOLL, 1952; 2701 *Coleophora maritimella* NEWMAN, 1863; 2707a *Coleophora virgaureae* STAINTON, 1857; 2721a *Coleophora jaernaensis* BJÖRKLUND & PALMQVIST, 2002; 2764 *Coleophora adelogrammella* ZELLER, 1849; 2899 *Blastobasis huemeri* SINEV, 1993; 2937 *Oegoconia caradai* POPESCU-GORJ & CAPUŞE, 1965; 2939b *Oegoconia novimundi* (BUSCK, 1915); 3106 *Pancalia nodosella* (BRUAND, 1851); 3156 *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847); 3228 *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879); 3295 *Ptocheuusa paupella* (ZELLER, 1847); *Monochroa parvulata* GOZMÁNY, 1957; 3349 *Eulamprotes helotella* (STAUDINGER, 1859); 3754 *Sophronia ascalis* GOZMÁNY, 1951; 4385a *Acleris effractana* (HÜBNER, 1799); 4460 *Eana cyanescana* (RÉAL, 1953); 4550 *Philedonides rhombicana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851); 4625 *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847); 4794a *Lobesia virulenta* ssp. *mieana* FALCK & KARSHOLT, 1998; 4887 *Crocidosema plebejana* ZELLER, 1847; 4938 *Eucosma flavispeculana* KUZNETSOV, 1964; 4939a *Eucosma parvulana* (WILKINSON, 1859); 5031 *Blastesthia tessulatana* (STAUDINGER, 1871); 5034 *Retinia perangustana* (SNELLEN, 1883); 5268 *Anthophila abhasica* DANILEVSKY, 1969; 5283 *Choreutis nemorana* (HÜBNER, 1799); 5805 *Hypocalcia decorella* (HÜBNER, 1810); 6354 *Pediasia pedriolellus* (DUPONCHEL, 1836); 6380 *Ancylolomia tentaculella* (HÜBNER, 1796); 6686 *Duponchelia fovealis* ZELLER, 1847.

Die nachfolgenden 13 Arten sind aus der Deutschlandliste gestrichen:

1066a *Bucculatrix albipedella* HOFMANN, 1874; 1195 *Parornix pfaffenbrenzelli* (FREY, 1856); 2005 *Elachista regificella* SIRCOM, 1849; 2077 *Scythris productella* (ZELLER, 1855); 2244 *Fabiola pokornyi* (NICKERL, 1865); 2664a *Coleophora infibulatella* HOFMANN, 1874; 3132 *Eteobalea intermediella* (RIEDL, 1965); 3605 *Scrobipalpa halonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854); 3800 *Iwaruna biguttella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854); 4939 *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893); 5808 *Hypocalcia ghilianii* STAUDINGER, 1870; 6113 *Ephestia parasitella* STAUDINGER, 1859; 6386 *Talis quercella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

Gegenwärtig sind 2267 Arten für Deutschland nachgewiesen.

**Summary Additions and corrections to the: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).** - Additions and corrections to the German list („Deutschlandliste“, GAEDIKE & HEINICKE, 1999) were compiled from publications. They concern new records for the country or for individual states, recent (post 1980) state records, deletions from the country list as well as nomenclatorial changes. The following 47 species are new for the country:

117 *Stigmella sanguisorbae* (WOCKE, 1865); 265 *Ectoedemia amani* SVENSSON, 1966; 272 *Ectoedemia klimeschi* (SKALA, 1933); 577 *Lichenotinea maculata* PETERSEN, 1957; 592 *Karsholtia marianii* (REBEL, 1936); 1180 *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979; 1261 *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963); 1617 *Leucoptera genistae* (M. HERING, 1933); 1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877); 1751 *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879); 1986 *Elachista occidentalis* FREY, 1882; 2005a *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855); 2005b *Elachista tengstromi* KAILA, BENGSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001; 2023 *Elachista svenssoni* TRAUGOTT-OLSEN, 1988; 2066 *Haplochrois ochraceella* (REBEL, 1903); 2214 *Enolmis acanthella* (GODART, 1824); 2442 *Goniodoma limoniella* (STAINTON, 1884); 2589a *Coleophora variicornis* TOLL, 1952; 2701 *Coleophora maritimella* NEWMAN, 1863; 2707a *Coleophora virgaureae* STAINTON, 1857; 2721a *Coleophora jaernaensis* BJÖRKLUND & PALMQVIST, 2002; 2764 *Coleophora adelogrammella* ZELLER, 1849; 2899 *Blastobasis huemeri* SINEV, 1993; 2937 *Oegoconia caradai* POPESCU-GORJ & CAPUŞE, 1965; 2939b *Oegoconia novimundi* (BUSCK, 1915); 3106 *Pancalia nodosella* (BRUAND, 1851); 3156 *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847); 3228 *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879); 3295 *Ptocheuusa paupella* (ZELLER, 1847); *Monochroa parvulata* GOZMÁNY, 1957; 3349 *Eulamprotes helotella* (STAUDINGER, 1859); 3754 *Sophronia ascalis* GOZMÁNY, 1951; 4385a *Acleris effractana* (HÜBNER, 1799); 4460 *Eana cyanescana* (RÉAL, 1953); 4550 *Philedonides rhombicana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851); 4625 *Clepsis dumicolana*

(ZELLER, 1847); 4794a *Lobesia virulenta* ssp. *mieana* FALCK & KARSHOLT, 1998; 4887 *Crocidosema plebejana* ZELLER, 1847; 4938 *Eucosma flavispeculana* KUZNETSOV, 1964; 4939a *Eucosma parvulana* (WILKINSON, 1859); 5031 *Blastesthia tessulatana* (STAUDINGER, 1871); 5034 *Retinia perangustana* (SNELLEN, 1883); 5268 *Anthophila abhasica* DANILEVSKY, 1969; 5283 *Choreutis nemorana* (HÜBNER, 1799); 5805 *Hypochalcia decorella* (HÜBNER, 1810); 6354 *Pediasia pedriolellus* (DUPONCHEL, 1836); 6380 *Ancylolomia tentaculella* (HÜBNER, 1796); 6686 *Duponchelia fovealis* ZELLER, 1847.

The following 13 species are deleted from the German list:

1066a *Bucculatrix albipedella* HOFMANN, 1874; 1195 *Parornix pfaffenzelleri* (FREY, 1856); 2005 *Elachista regificella* SIRCOM, 1849; 2077 *Scythris productella* (ZELLER, 1855); 2244 *Fabiola pokornyi* (NICKERL, 1865); 2664a *Coleophora infibulatella* HOFMANN, 1874; 3132 *Eteobalea intermediella* (RIEGL, 1965); 3605 *Scrobipalpa halonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854); 3800 *Iwaruna biguttella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854); 4939 *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893); 5808 *Hypochalcia ghilianii* STAUDINGER, 1870; 6113 *Ephestia parasitella* STAUDINGER, 1859; 6386 *Talis quercella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

Presently, 2267 species are known from Germany.

## 1. Einleitung

Mit der 1999 erfolgten Veröffentlichung des o. g. Verzeichnisses (im Folgenden Deutschlandliste genannt) wurde erstmals eine komplette Übersicht über die Lepidoptera Deutschlands vorgelegt. Damit war es möglich geworden, sich an einer Stelle einen raschen Überblick über die gegenwärtig in Deutschland nachgewiesenen Schmetterlinge zu verschaffen. Drei Zeithorizonte ermöglichen es zusätzlich, Anhaltspunkte zu Veränderungen in der Fauna zu finden. Die Aufschlüsselung der Fundmeldungen nach den Bundesländern diente einer regionalen Faunenermittlung und -beurteilung. Diese Aufteilung zeigte gleichzeitig die gegenwärtig noch vorhandenen Defizite in der faunistischen Erfassung.

Schon bald nach dem Erscheinen wurden erste Arbeiten veröffentlicht, in denen die nun sichtbar gewordenen Erkenntnislücken in den einzelnen Bundesländern Anlass zu gezielten faunistischen Untersuchungen wurden. Parallel dazu wurden Fehler, die sich in die Deutschlandliste eingeschlichen hatten, berichtigt.

Da die Deutschlandliste für viele seit 1999 erschienenen Arbeiten zur Bezugsbasis für die Beurteilung der faunistischen Ermittlungen wurde, erscheint es sinnvoll, die zahlreichen Änderungen, die seitdem erschienen sind, zusammenzufassen, um den Überblick über den aktuellen Stand nicht zu verlieren.

Nachfolgend sind die bis zum Redaktionsschluss (01.11.2007) erschienenen und mir zugänglich gewordenen Publikationen ausgewertet worden, in denen Änderungen zur Deutschlandliste veröffentlicht wurden. Diese Änderungen umfassen:

- Neumeldungen für Deutschland oder für einzelne Bundesländer;
- aktuelle Fundmeldungen für Bundesländer, für die bisher nur ältere Meldungen bekannt waren;
- Korrekturen von Fehlbestimmungen;
- Streichungen aus der Deutschlandliste;
- Nomenklatorische Korrekturen.

Die Nummern vor dem Artnamen sind die aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996). Die jeweilige Abkürzung für das

Bundesland ist **fett** gesetzt, wenn bisher kein Fund in der Deutschlandliste gemeldet wurde, sonst handelt es sich um aktuelle Wiederfunde nach 1980. Es werden jeweils nur die Fundorte genannt, bei mehreren Fundorten erfolgt keine Einzelnennung, weitere Einzelheiten (Funddatum und -umstände, Sammler) sind der Originalliteratur zu entnehmen.

Das Literaturverzeichnis ist zweigeteilt. Im ersten Teil findet sich die Literatur, die für die nachfolgende Auflistung ausgewertet wurde. Die Zitate sind fortlaufend nummeriert, diese Nummer findet sich in [ ] hinter jeder Meldung. Im zweiten Teil steht die Literatur, die in der Auflistung genannt ist.

Zur Erleichterung der Benutzung der nachfolgenden Zusammenstellung werden nachfolgend die verwendeten Abkürzungen und ihre Bedeutung aufgeführt:

D	Deutschland
SH	Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg
NI	Niedersachsen einschließlich Bremen
NW	Nordrhein-Westfalen
HE	Hessen
RP	Rheinland-Pfalz
BW	Baden-Württemberg
BY	Freistaat Bayern
SL	Saarland
MV	Mecklenburg-Vorpommern
BB	Brandenburg einschließlich Berlin
SN	Freistaat Sachsen
ST	Sachsen-Anhalt
TH	Freistaat Thüringen

## 2. Danksagung

Die Arbeit wäre ohne die große Unterstützung zahlreicher Entomologen nicht möglich gewesen. Allen, die mir Hinweise auf erschienene Veröffentlichungen gaben und ihre Arbeiten zur Auswertung zur Verfügung gestellt haben, sei hiermit herzlich gedankt. Besonderer Dank gebührt Herrn SWOBODA/Leverkusen, der mir die Zeitschrift „Melanargia“ zur Auswertung zur Verfügung stellte.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch zukünftig mit dieser Unterstützung rechnen kann, damit die weiteren Nachträge immer dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen.

### 3. Die wichtigsten Ergebnisse.

#### Neufunde für Deutschland und nomenklatorische Änderungen

(Darunter sind auch einige Arten, die bisher in der Deutschlandliste ohne Bundeslandzuordnung standen, weil sie aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) übernommen wurden.)

##### **3 Micropterix HÜBNER, 1825**

= *Micropteryx* ZELLER, 1839; = *Eriocphala* CURTIS, 1839; = *Micropterica* ZAGLAJEV, 1983: Synonymieliste [125]

##### **5 Micropterix allionella (FABRICIUS, 1794)**

= *tricinctella* COSTA, 1836; = *rothenbachii* auct. nec FREY, 1856: Synonymieliste [125]

##### **7 Micropterix aruncella (SCOPOLI, 1763)**

= *podevinella* HÜBNER, 1813; = *concinella* STEPHENS, 1834; = *eximiella* ZELLER, 1850; = *nuraghella* AMSEL, 1936: Ergänzung der Synonymieliste [125]

##### **8 Micropterix aureatella (SCOPOLI, 1763)**

= *paykullella* THUNBERG, 1794, nec *paykullella* FABRICIUS, 1794: Ergänzung zur Synonymieliste [125]

##### **9 Micropterix aureoviridella (HÖFNER, 1898)**

= *liogierella* RÉAL, 1987: Synonymieliste [125]

##### **10 Micropterix calthella (LINNAEUS, 1761)**

= *urticella* COSTA, 1834; = *sulcatella* BENTLEY, 1845: Ergänzung zur Synonymieliste [125]

##### **33 Micropterix paykullella (FABRICIUS, 1794)**

= *anderschella* HÜBNER, 1813; = *paykullella* [sic] f. *rosarum* MÜLLER-RUTZ, 1927: Synonymieliste [125]

##### **35 Micropterix rothenbachii FREY, 1856**

= *vallabonnella* [nicht: *vallabonella*] RÉAL, 1988: Ergänzung zur Synonymieliste [125]

##### **36 Micropterix schaefferi HEATH, 1975**

= *anderschella* (HÜBNER, 1813), sensu HERRICH-SCHÄFFER, 1851; = *ammanella* auct., nec HÜBNER, 1813: Synonymieliste [125]

##### **117 Stigmella sanguisorbae (WOCKE, 1865)**

In die Deutschlandliste ohne Bundeslandzuordnung aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) übernommen, nachfolgend der erste eindeutige Nachweis:

BY: Umgebung Dießen/Ammertal, leg. SEGERER [104]; Norderfer des Ammersees, leg. FUCHS [86]

##### **265 Ectoedemia amani SVENSSON, 1966**

BY: Lkr. Passau: Rambachtal, Untergriesbach, leg. LICHTMANNECKER [85]

##### **272 Ectoedemia klimeschi (SKALA, 1933)**

In der Deutschlandliste fehlend, obwohl von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) für Deutschland genannt:

SH: Wrohe, Mühlbektal, leg. SAVENKOV [97]; BB: Jänschwalde-Ost, leg. STÜBNER [50]; SN: Lieske/Spree (STARKE 1942); Bautzen, leg. MÖBIUS [56]

##### **577 Lichenotinea maculata PETERSEN, 1957**

RP: Rheinland, Burg Kate, 1895 (Fundort des Holotypus); bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

##### **592 Karsholtia mariannii (REBEL, 1936)**

SH: Schierensee, Bollhusen, leg. HAUSENBLAS; SL: Felsberg, östl. Steinbruch, leg. WERNO [48]

##### **1180 Parornix atripalpella WAHLSTRÖM, 1979**

RP: Bornich; Dörscheid, alle leg. BIESENBAUM [9]

##### **1261 Phyllonorycter issikii (KUMATA, 1963)**

BB: Jänschwalde-Ost und Brandenburg, Groß Gastrose, alle leg. STÜBNER [57]; BY: Zahlreiche Funde aus dem Landkreis Landshut, leg. LICHTMANNECKER, leg. KOLBECK [74]; SN: Rade-

beul-Zitschewig, leg. NUSS; Ebersbach und Kottmarsdorf bei Löbau, leg. WAUER, Großhennersdorf bei Zittau und Zittau-Weinaupark, leg. LEUTSCH [49]

##### **1617 Leucoptera genistae (M. HERING, 1933)**

SL: Hammelsberg bei Perl, leg. WERNO [121]

##### **1742 Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877)**

BB: Mildenberg bei Zehdenick/Havel, leg. GERSTBERGER [50]

##### **1751 Agonopterix oinochroa (TURATI, 1879)**

In der Deutschlandliste fehlend, obwohl schon von JÄCKH (1942) gemeldet:

NW: Bad Müntereifel; Gilsdorf, leg. BIESENBAUM, leg. SCHMITZ [25]; HE: Lorch (Nollig), leg. GROSS [25]; RP: Lennig (bei Bornich), leg. FUCHS (JÄCKH 1942)[25]; BW: Schelingen, Blattenbuck, leg. NUSS et al., [78]

##### **1986 Elachista occidentalis FREY, 1882**

In die Deutschlandliste ohne Bundeslandzuordnung aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) übernommen, nachfolgend der erste eindeutige Nachweis:

BY: Regensburg, leg. SÄLZL [74]

Die bisher unter: **2005 Elachista regificella SIRCOM, 1849** aufgeführten Funde müssen alle überprüft werden, da es sich bei den deutschen Faltern und die beiden nachfolgend aufgeführten Arten handelt.

##### **2005a Elachista geminatella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)** (Gesicherte Meldungen):

SH: Sylt: List, leg. TIEDEMANN [96]; NW: Drachenfels/Siebengebirge, leg. HERING; Nidegggen, leg. SCHOLZ [15]; RP: Boppard, leg. BRATSCH [15]; BW: Baden-Baden, leg. LINACK; Bad Wildbad/Schwarzwald, leg. SÜSSNER; Heidelberg, leg. WÖRZ; Sindelfingen, leg. WÖRZ; Stuttgart-Rohr, Stuttgart-Vaihingen, leg. WÖRZ [15]

##### **2005b Elachista tengstromi KAILA, BENGTSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001** (Gesicherte Meldungen):

NI: Goslar, leg. BAUER [15]; NW: Kierberg/Ville, leg. BRATSCH [15]; BW: Schwarzwald; Freiburg [15]; BY: Erlangen, leg. HÖFMAN [15]; BB: Berlin-Spaniadi, leg. BRATSCH; Bredow, leg. BRATSCH; Potsdam [15]; TH: Bad Blankenburg, leg. STEUER [15]

##### **2023 Elachista svenssoni TRAUGOTT-OLSEN, 1988**

BY: schon 1984 von PRÖSE gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen, seitdem mehrere Nachweise (PRÖSE i. l.); Naturwaldreservate [59]

##### **2066 Haplochrois ochraceella (REBEL, 1903)**

BY: Regensburg, NSG Fellinger Berg, leg. KOLBECK [86]; Lkr. Schweinfurt: Oberschwarzach; Lkr. Lichtenfels: Klosterlangheim, alle leg. HACKER, weitere Funde [74]

##### **2214 Enolmis acanthella (GODART, 1824)**

SL: Nennig, leg. WERNO [121]

##### **2442 Goniodoma limoniella (STAINTON, 1884)**

SH: Westerhever; St. Peter-Ording; Hamburger Hallig, alle leg. RICKERT [97]

##### **2589a Coleophora variicornis TOLL, 1952**

Bisher als Synonym von *C. hieronella* ZELLER, 1849 aufgefasst, durch NUSS & STÜBNER (2003) als gültige Art wieder eingeführt.

BB: Jänschwalde-Ost; Jänschwalde, alle leg. STÜBNER; Potsdam-Wilhelmshorst, Coll. ERNST [64]; Döberitzer Heide und Umgebung Zossen, leg. THEIMER; [109]; SN: Burg bei Hoyerswerda, leg. WAUER [109]

##### **2701 Coleophora maritimella NEWMAN, 1863**

SH: Fehmarn, leg. ROWECK & SAVENKOV; Sylt: Puan Klent, leg. WEGNER [97]

**2707a Coleophora virgaureae STANTON, 1857**

In der Deutschlandliste als Synonym von *obscenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 aufgeführt, nach BALDIZZONE & TABELL (2002) eigenständige Art.

SH: Büchen, leg. RILL; Kiel und Kiel-Stift, leg. RILL [96]

**2721a Coleophora jaernaensis BJÖRKLUND & PALMQVIST, 2002**

SH: Hofsee in Ritzerau [97]

**2764 Coleophora adelogrammella ZELLER, 1849**

BB: Wilhelmshorst bei Potsdam, Coll. ERNST [58]

**2899 Blastobasis huemeri SINEV, 1993**

BW: West-Dossenheim bei Heidelberg, leg. TRABOLD; „Unterer Dossenwald“ bei Friedrichsfeld (Mannheim), leg. HAUSENBLAS [64]

**2937 Oegoconia caradjai POPESCU-GORJ & CAPUŞE, 1965**

(früher meist als *O. quadripuncta* (HAWORTH, 1828) gemeldet).

NW: Zahlreiche Funde [14]; Prummern bei Heinsberg, leg. STEEGERS; Erkelenz-Borschemich und Mönchengladbach, leg. WITTLAND [112]; RP: Zahlreiche Funde [14]; Neustadt/Pfalz, leg. ROESLER; Speyer, leg. DISQUE; Schloßböckelheim, leg. KLEIN [112]; HE: Lorch, leg. GROSS [14]; BW: Rheinfelden, leg. O. MÜLLER; Heidelberg, leg. RUTTEN [112]; NSG Rheinhald: Burkheim, leg. BIESENBAUM, aktueller Fund [22]

**2939b Oegoconia novimundi (BUSCK, 1915)**

BW: Heidelberg-Kirchheim, leg. RUTTEN [112]

**3106 Pancalia nodosella (BRUAND, 1851)**

BB: Neuenhagen/Oderberg, leg. GERSTBERGER (als *P. schwarziella* (FABRICIUS, 1798) gemeldet) [50]

**3156 Pyroderces argyrogrammos (ZELLER, 1847)**

BW: Achkarren (Kaiserstuhl), leg. BIESENBAUM [4]; NSG Badberg: Schelingen, leg. BIESENBAUM [22]; SL: Hammelsberg bei Perl, leg. WERNO [121]

**3228 Aristotelia decoratella (STAUDINGER, 1879)**

HE: Lorch (Nollig), leg. GROSS [20]; RP: St. Goarshausen (FUCHS, 1899); Klotten/Moseltal, leg. BIESENBAUM [2]

**3295 Ptocheuusa paupella (ZELLER, 1847)**

NW: Brühl und Kierberg/Ville, leg. BRATSCH [20]

**Monochroa parvulata GOZMÁNY, 1957**

Die Art fehlt in der Europaliste von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels), leg. BIESENBAUM [21]

**3349 Eulamprotes helotella (STAUDINGER, 1859)**

NW: Essen, leg. BIESENBAUM [20]

**3754 Sophronia ascalis GOZMÁNY, 1951**

TH: „Kessel“ bei Großgöllitz, leg. STEUER [108]

**4385a Acleris effractana (HÜBNER, 1799)**

SH: Kiel, Meimersdorfer Moor, leg. MEDER [97]; NI: Braunschweig [70]; MV: Neustrelitz [70]; SN: Bautzen [70]

**4460 Eana cyanescana (RÉAL, 1953)**

BY: Lkr. Main-Spessart: Umgebung Karlstadt, leg. PRÖSE & NOWAK [70]; TH: Schwarzauf zu zwischen Bad Blankenburg und Schwarza, leg. STEUER [108]

**4550 Philedonides rhombicana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

SN: nördlich Boxberg, Hochhalde, leg. GRAF [58]

**4625 Clepsis dumicolana (ZELLER, 1847)**

BW: Verschiedene Stadtteile von Stuttgart, leg. HAUSENBLAS [50]

**4794a Lobesia virulenta ssp. mieana FALCK & KARSHOLT, 1998**

BW: Aulendorf (LK Ravensburg), leg. A. WÖRZ; Wental (Bartholomä), leg. A. WÖRZ; Württ. Oberland: Umgebung Bad Waldsee (LK Ravensburg), Steinacher Ried, leg. A. SCHOLZ [61]; BY: Höllenthal, Oberfranken, leg. PRÖSE [70]; TH: Krs. Hildburghausen: Wiedersbach; Kyffhäuser: Rottleben, alle leg. SUTTER [111]; leg. STEUER [108]

**4887 Crocidosema plebejana ZELLER, 1847**

BY: Lkr. Landshut: Adlkofen Dorf, leg. LICHMANNECKER [74]

**4938 Eucosma flavispeculana KUZNETSOV, 1964**

BB: Berlin-Marienfelde, leg. THEIMER [50]

**4939a Eucosma parvulana (WILKINSON, 1859)**

BY: Lkr. Bad Tölz-Wolfrathshausen: Ascholdinger Au, leg. HACKER; Lkr. Erding: Zengermoos, leg. PRÖSE. Die in der Deutschlandliste unter 4939: *E. scutana* (CONSTANT, 1893) aufgeführten Angaben beziehen sich auf diese Art. (AGASSIZ & LANGMAID, 2004) [85]

**5031 Blastesia tessulatana (STAUDINGER, 1871)**

NW: Dalheim, leg. WITTLAND [93]

**5034 Retinia perangustana (SNELLEN, 1883)**

SN: Krs. Löbau-Zittau: NSG Hengstberg bei Herrnhut, leg. LEUTSCH & WAUER [114]

**5268 Anthophila abhasica DANILEVSKY, 1969**

BY: Alpen (KURZ & HUEMER, 2000) [86]

**5283 Choreutis nemorana (HÜBNER, 1799)**

BW: Neuershausen, leg. G. KRUMM [34]

**5805 Hypochalkia decorella (HÜBNER, 1810)**

SN: „Sachsen“ (SORHAGEN 1886), bisher kein aktueller Beleg [58]

**6354 Pediasia pedriolellus (DUPONCHEL, 1836)**

BY: Bayerische Alpen: Naturwaldreservate [59]

**6380 Aencylooma tentaculella (HÜBNER, 1796)**

BY: Oberpfalz: Weiden, leg. PRÖSE [84]

**6686 Duponchelia fovealis ZELLER, 1847**

NI: Hallig Gröde; Lkr. Lüneburg: Radbruch und Adendorf, leg. WEGNER [119]; NW: Mönchengladbach, leg. WITTLAND; Doren, leg. SELIGER [124]; BY: Gauting-Buchdorf, leg. FUCHS; München, Laim, leg. OSWALD: eingeschleppte Art [86]; SN: Dresden, Großer Garten, leg. VOIGT [58]

**Aus der Deutschlandliste gestrichene Arten****1066a Bucculatrix albipedella HOFMANN, 1874**

Ist zu streichen, da synonym zu Nr. 1083: *B. nigricomella* (ZELLER, 1839) [63]

**1195 Parornix pfaffenzelleri (FREY, 1856)**

Der einzige Hinweis auf ein Vorkommen in D bezieht sich auf einen bayerischen Fund, der nicht verifizierbar ist, deshalb wird die Art aus der Deutschlandliste gestrichen [86]

**2005 Elachista regificella SIRCOM, 1849**

Nach KAILA et al., (2001) ein Artenkomplex aus *E. regificella* SIRCOM, 1849, *E. geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) und *E. tengstromi*, KAILA, BENGSSON, ŠULCS & JUNNLAINEN, 2001. Die bisherigen Meldungen unter dem Namen *regificella* müssen alle überprüft werden.

*E. regificella* ist bisher nur aus Großbritannien bekannt.

**2077 Scythris productella (ZELLER, 1855)**

Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]

**2244 Fabiola pokornyi (NICKERL, 1865)**

Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]

**2664a Coleophora infibulatella HOFMANN, 1874**

Ist zu streichen, da synonym zu Nr. 2618: *C. flaviella* MANN, 1857 [63]

**3132 *Eteobalea intermediella* (RIEDEL, 1965)**

BY: Die Meldungen von Frauendorf bei Staffelstein (PRÖSE, 2001) sind eine Fehlbestimmung, es handelt sich um *E. anomella* (RIEDEL, 1965), die Art ist deshalb aus der Deutschlandliste zu streichen [74]

**3605 *Scrobipalpa halonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

Bei STEUDEL & HOFMANN (1882) und bei WÖRZ (1954) werden Funde dieser Art (unter *Lita pauperella* bzw. *Lita halonella f. pauperella*) für BW genannt. Die Überprüfung der Falter zeigte, dass es sich um drei verschiedene andere Arten handelt: *Bryotrophia terrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *B. senectella* (ZELLER, 1839), *Scrobipalpa acuminatella* (SIRCOM, 1850). Damit ist die Art aus der Deutschlandliste zu streichen [61]

**3800 *Iwaruna biguttella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

Die in der Literatur (WÖRZ 1955; REUTTI 1898) genannten Falter erwiesen sich als *Aproaerema anthylidella* (HÜBNER, 1813) bzw. *Syncopacma coronillella* (TREITSCHKE, 1833), die Angabe bei LINACK (1955) konnte bisher nicht überprüft werden.. Es wird auch hier von einer Fehlbestimmung ausgegangen, die Art ist aus der Deutschlandliste zu streichen. [61]

**4939 *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893)**

Die Angaben beziehen sich auf *E. parvulana* (WILKINSON, 1859) (Nr. 4939a) [85]

**5808 *Hypochalcia ghilianii* STAUDINGER, 1870**

Ist nach LERAUT (2002) synonym zu *H. ahenella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Nr. 5811), deshalb aus der Deutschlandliste zu streichen [86]

**6113 *Ephestia parasitella* STAUDINGER, 1859**

Kommt nach LERAUT (2002) nicht in Deutschland vor, deshalb aus der Liste zu streichen [86]

**6386 *Talis querella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]

**Nachträge und Korrekturen zur Deutschlandliste****7 *Micropterix aruncella* (SCOPOLI, 1763)**

HE: Wüstensachsen [110]

**8 *Micropterix aureatella* (SCOPOLI, 1763)**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]; SN: Ostrau; Hinterhermsdorf [56]

**10 *Micropterix calthella* (LINNAEUS, 1761)**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]

**28 *Micropterix mansuetella* ZELLER, 1844**

SN: Niederoderwitz [56]

**32 *Micropterix osthelderi* HEATH, 1975**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]; SN: Mehrere Erstfunde [58]

**36 *Micropterix schaefferi* HEATH, 1975**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110] SN: Zahlreiche Erstfunde zwischen 1893 und 2002 [49]; ST: Harz, Stolberg; Alter Stolberg, Heimkehle [56]

**38 *Micropterix thunbergella* (FABRICIUS, 1787)**

HE: Wüstensachsen, Tannenhof; Sandberg, Kaskadenschlucht [110] ST: Alter Stolberg, Heimkehle [56]; TH: Kyffhäuser [56]

**55 *Eriocrania sangii* (WOOD, 1891)**

SN: Rötha, Stöhnaer Becken [58]

**60 *Gazorycta ganna* (HÜBNER, 1804)**

BY: Allgäu: Mädelegabel, Nebelhorn [86]

**86 *Enteuchia acetosae* (STAINTON, 1856)**

NW: Keldenich [27]

**89 *Stigmella lapponica* (WOCKE, 1862)**

SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1930); Großhennersdorf bei Zittau [56]

**90 *Stigmella confusella* (WOOD & WALSINGHAM, 1894)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**92 *Stigmella freyella* (HEYDEN, 1858)**

SN: Zittau, Mittelherwigsdorf, Scheibeberg [57]

**98 *Stigmella sakhalinella* PUPLESIS, 1984**

SN: Oderwitz [55]

**101 *Stigmella alnetella* (STAINTON, 1856)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**104 *Stigmella aceris* (FREY, 1857)**

NW: Keldenich (NSG Tanzberg) [28]

**105 *Stigmella malella* (STAINTON, 1854)**

SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902); Niederoderwitz [56]

**106 *Stigmella rhamnella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1860)**

BY: Mehrere aktuelle Funde aus dem Kreis Landshut [74]

**110 *Stigmella anomella* (GOEZE, 1783)**

NW: Alendorf und Keldenich [27]; RP: Birresborn [27]

**113 *Stigmella ulmivora* (FOLOGNE, 1860)**

SN: Belgershain [56]

**117 *Stigmella sanguisorbae* (WOCKE, 1865)**

In die Deutschlandliste nur aus der Europaliste übernommen, ohne Bundeslandzuordnung, nachfolgend der erste eindeutige Nachweis:

D: BY: Umgebung Dießen/Ammertsee [104]; Nordufer des Ammersees [86]

**118 *Stigmella thuringiaca* (PETRY, 1904)**

NW: Bad Münstereifel [27]

**123 *Stigmella terminalis* (WOOD, 1890)**

NW: Alendorf [27]

**125 *Stigmella regiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

SN: Belgershain [49]

**129 *Stigmella nylandriella* (TENGSTRÖM, 1848)**

SN: Schon von SCHÜTZE (1902) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend; NSG Hengsberg bei Herrnhuth [58]

**132 *Stigmella minusculella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

BY: Umgebung von Regensburg, zahlreiche Minenfunde [86]

**134 *Stigmella hybnerella* (HÜBNER, 1796)**

SN: Belgershain [49]

**141 *Stigmella myrtillella* (STAINTON, 1857)**

NW: Hochsauerland: bei Niedersfeld [93]; SN: SCHÜTZE (1902); Ostritz [55]

**149 *Stigmella plagicolella* (STAINTON, 1854)**

NW: Bad Münstereifel [27]

**152 *Stigmella aurella* (FABRICIUS, 1775)**

BY: Riedenburg, Lintberg; Girmitztal bei Duggendorf [86]

**154 *Stigmella splendidissimella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

RP: Olzheim [27]

**161 *Stigmella poterii* (STAINTON, 1857)**

NW: Alendorf und Blankenheim [27]; BY: Mehrere aktuelle Funde [86]

**163 *Stigmella ulmariae* (WOCKE, 1879)**

BY: Dießen am Ammersee [104]

**166 *Stigmella perpygmaeella* (DOUBLEDAY, 1859)**

SN: Belgershain [49]

- 169 *Stigmella hemargyrella* (KOLLAR, 1832)**  
HE: Wüstensachsen, Ritterhof [110]; SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902); NSG Rotstein bei Bischofswerda [56]
- 170 *Stigmella speciosa* (FREY, 1857)**  
SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902); Großhennersdorf bei Zittau: Langer Berg [56]
- 173 *Stigmella basiguttella* (HEINEMANN, 1862)**  
SN: Dresden-Klotzsche [57]
- 178 *Stigmella dorsiguttella* (JOHANSSON, 1971)**  
BB: Jänschwalde-Ost [49]; SN: Oberlausitz [55]
- 180 *Stigmella atricapitella* (HAWORTH, 1828)**  
NW: Keldenich [27]; BY: Stettfeld, Kohlberg; Leipheim [86]; BB: Jänschwalde-Ost [50]
- 181 *Stigmella samiatella* (ZELLER, 1839)**  
SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902); Kreis Zittau: Heinewalde, und NSG Rotstein bei Bischofswerda, [56]
- 182 *Stigmella roborella* (JOHANSSON, 1971)**  
SH: Kiel; Plön [96]; SN: Dittersbach bei Zittau, Knorrberg, Großhennersdorf bei Zittau, Umgebung Leubnerteich [58]
- 196 *Trifurcula headleyella* (STAINTON, 1854)**  
BY: Rolleberg bei Harburg [85]
- 198 *Trifurcula thymi* (Szöcs, 1965)**  
In der Deutschlandliste ohne Zuordnung nur aus KARSHOLT & RAZOWSKI übernommen, hier der sichere Fundort:  
ST: Halle(Saale), Terrassen bei Bennstedt, leg. BUHR, leg. HAASE: das Material ist Teil der Typenserie von *Fedalma thymi* BORKOWSKI, 1970, gültig ist aber die 1965 erfolgte Nennung des Namens durch Szöcs [33]
- 207 *Trifurcula cryptella* (STAINTON, 1856)**  
NW: Marmagen [27]
- 208 *Trifurcula eurema* (TUTT, 1899)**  
NW: Marmagen [27]
- 239 *Bohemannia pulverosella* (STAINTON, 1849)**  
SN: Sächsische Schweiz: Altendorf, Dorfbachklamm [57]
- 244 *Ectoedemia sericopeza* (ZELLER, 1839)**  
HE: Fulda-Eichenzell [110]; SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902); Niederoderwitz [56]
- 245 *Ectoedemia louisella* (SIRCOM, 1849)**  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]; SN: Hinterhermsdorf [56]
- 246 *Ectoedemia decentella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**  
SH: Geestacht; Hamburg [96]
- 247 *Ectoedemia albibimaculella* (LARSEN, 1927)**  
D: SH: Husum [96]
- 253 *Ectoedemia weaveri* (STAINTON, 1855)**  
NW: Hochsauerland: bei Kirchhundem und bei Niedersfeld [93]
- 254 *Ectoedemia septembrella* (STAINTON, 1849)**  
NW: Mehrere aktuelle Funde [27]
- 260 *Ectoedemia aurifrontella* (STAINTON, 1851)**  
SN: NSG Niederspree bei Rietschen; Kreis Zittau: Mittelherwigsdorf, Scheibeberg [56]
- 262 *Ectoedemia longicaudella* (KLIMESCH, 1953)**  
SN: Oberlausitz: Weißenberg [56]
- 265 *Ectoedemia amani* SVENSSON, 1966**  
D: BY: Lkr. Passau: Rambachtal, Untergriesbach [85]
- 268 *Ectoedemia intimella* (ZELLER, 1848)**  
RP: Oberstadtteil [27]
- 269 *Ectoedemia hannoverella* (GLITZ, 1872)**  
HE: Wüstensachsen, Ritterhof [110]; RP: Rockeskyll [27]

- 272 *Ectoedemia klimeschi* (SKALA, 1933)**  
D: SH: Wrohe, Mühlbektal [97]; BB: Jänschwalde-Ost [50]; SN: Lieske/Spree (STARKE, 1942); Bautzen [56]; In der Deutschlandliste fehlend, obwohl von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) für Deutschland genannt.
- 273 *Ectoedemia argyropeza* (ZELLER, 1839)**  
NW: Bad Münstereifel und Blankenheim [27]
- 293 *Ectoedemia heringi* (TOLL, 1934)**  
SN: Mittelherwigsdorf bei Zittau, Scheibeberg [56]
- 301 *Ectoedemia angulifasciella* (STAINTON, 1849)**  
NW: Altendorf [27]; RP: Birresborn und Kerpen (Eifel) [27]
- 302 *Ectoedemia atricollis* (STAINTON, 1857)**  
NW: Bad Münstereifel [27]; RP: Birresborn und Gerolstein [27]; SN: SCHÜTZE (1902); mehrere aktuelle Funde [55]
- 304 *Ectoedemia rubivora* (WOCKE, 1860)**  
NW: Marmagen [27]; RP: Gerolstein und Oberstadtteil [27]
- 305 *Ectoedemia spinosella* (JOANNIS, 1908)**  
NW: Bad Münstereifel [27]; SN: NSG Niederspree [56]
- 307 *Ectoedemia occultella* (LINNAEUS, 1767)**  
RP: Oberstadtteil [27]
- 308 *Ectoedemia minimella* (ZETTERSTEDT, 1839)**  
RP: Oberstadtteil [27]
- 318 *Pseudopostega auritella* (HÜBNER, 1813)**  
SN: Sprey bei Boxberg und Kreis Bautzen: Baruth, Schafberg [57]
- 326 *Antispila metallella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BY: Stadt Landshut, Obere Isarauen [74]
- 327 *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1843)**  
NI: Hannover (FÜGE et al., 1930), in der Deutschlandliste fehlend; Nordhorn [113]; NW: Weserbergland: Lage [88]; BY: München-Allach [56]; SN: Belgershain [56]
- 329 *Heliozela sericiella* (HAWORTH, 1828)**  
MV: Aktuelle Funde [40]
- 342 *Nemophora ochsenheimerella* (HÜBNER, 1813)**  
RP: Gerolstein [27] SN: Ostrau [56]
- 351 *Nemophora prodigellus* (ZELLER, 1853)**  
(= *auricellus* RAGONOT, 1874; = *splendidus* STAUDINGER, 1880); siehe KOZLOV, 2004.
- 352 *Nemophora mollella* (HÜBNER, 1813)**  
Die Meldungen in der Literatur (STEUDEL & HOFMANN 1882; WÖRZ 1858) für BW können nicht bestätigt werden [61]
- 356 *Nemophora minimella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Kreis Bautzen: Mulkwitz [57]
- 371 *Adela croesella* (SCOPOLI, 1763)**  
BW: Schelingen, Blattenbuck [78]; SN: Belgershain [56]; ST: Altmark [66]
- 375 *Cauchas rufifrontella* (TREITSCHKE, 1833)**  
SH: Amrum [96]; BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]
- 387 *Nematopogon schwarziella* ZELLER, 1839**  
HE: Mehrere Erstfunde [110]; ST: Alter Stolberg, Heimkehle [56]
- 388 *Nematopogon magna* (ZELLER, 1878)**  
BY: München (mehrere Fundorte); Isarauen bei Landshut; bei Niederachbach [105]; TH: Herrenberg bei Gösseldorf [108]

- 389 *Nematopogon adansoniella* (VILLERS, 1789)**  
ST: Alter Stolberg, Heimkehle [56]; TH: Kyffhäuser [56]
- 393 *Nematopogon robertella* (CLERCK, 1759)**  
HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]; BW: Schelingen, Degenmatt [78]
- 397 *Lampronia capitella* (CLERCK, 1759)**  
SN: Kleinsaubernitz [49]
- 398 *Lampronia luzella* (HÜBNER, 1817)**  
RP: Gerolstein [27]
- 400 *Lampronia morosa* ZELLER, 1852**  
BY: Gambach/Ufr., Kalbenstein [86]
- 406 *Lampronia rupella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]
- 407 *Lampronia fuscatella* (TENGSTRÖM, 1848)**  
SN: Belgershain [56]
- 431 *Incurvaria koernerella* (ZELLER, 1839)**  
ST: Alter Stolberg, Heimkehle [56]
- 433 *Phylloporia bistrigella* (HAWORTH, 1828)**  
HE: NSG Rotes Moor [110]
- 440 *Tischeria ekebladella* (BJERKANDER, 1795)**  
BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]
- 441 *Tischeria dodonaea* STANTON, 1858**  
MV: Aktuelle Funde [40]
- 446 *Emmetia szoecsi* (KASY, 1961)**  
BY: Dießen am Ammersee [104]
- 447 *Emmetia heinemanni* (WOCKE, 1871)**  
SL: Reitscheid (Hofberg) [121]
- 480 *Cephalimallota crassiflavella* BRUAND, 1851**  
BW: Achkarren; Burkheim [22]
- 499 *Eudarcia pagenstecherella* (HÜBNER, 1825)**  
NW: Wesertalhang bei Höxter [88]; SL: Perl (Hammelsberg) [121]
- 542 *Infurcitinea roesslerella* (HEYDEN, 1865)**  
BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS i. l.); NSG Badberg; Schelingen und Altvogtsburg [22]; SL: Dreisbach (Saarschleife) [121]
- 545 *Infurcitinea ignicomella* (ZELLER, 1852)**  
BW: Schelingen (NSG Badberg) [22]; BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]
- 565 *Infurcitinea albicomella* (STANTON, 1851)**  
BW: NSG Badberg; Schelingen, Altvogtsburg [21]
- 577 *Lichenotinea maculata* PETERSEN, 1957**  
D: RP: Rheinland, Burg Kate, 1895 (Fundort des Holotypus); diese Art wurde bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.
- 590 *Stenoptinea cyaneimarmorella* (MILLIÈRE, 1854)**  
NW: Wahner Heide [103]; SL: Saarhölzbach (NSG Hundscheid) [121]; SN: Weißenberg, NSG Gröditzer Skala [57]
- 591 *Karsholtia gaedikei*, 1986**
- 592 *Karsholtia mariannii* (REBEL, 1936)**  
D: SH: Schierensee, Bolthausen [48]; Umgebung Westensee bei Kiel [97]; SL: Felsberg, östl. Steinbruch [48]
- 594 *Agnathosia mendicella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SH: Lübecker Stadtwald (Ritterau) [97]; NW: Bad Münstereifel [27]; BY: Lkr. Schwandorf: Dachsbau bei Stefling [86]; Stadtwald Iphofen; Lkr. Tirschenreuth, FoA Mitterteich [74]; SL: Perl (Hammelsberg) [121]; SN: Rabenau; schon von Mö-

- BIUS (1937) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [57], es handelt sich um den Hololectotypus von „*Tinea propulsatella*“ REBEL, 1892 [49]; Herrnhut, NSG Hengstberg; Königsholz bei Niederoderwitz [57]
- 605 *Montescardia tessulatella* (ZELLER, 1846)**  
BW: Baden: Überlingen (REUTTI 1898); Hardtwald bei Kleinaspach (SÜSSNER 1983); zahlreiche weitere aktuelle Fundmeldungen zwischen 1981 und 2006 [61]
- 607 *Scardia boletella* (FABRICIUS, 1794)**  
BY: Lkr. Regen, Nationalpark Bayerischer Wald, Malaisefallen [74]
- 621 *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1787)**  
SN: Belgershain [56]
- 625 *Nemapogon wolffiella* KARSHOLT & NIELSEN, 1976**  
SH: Mehrere Erstfunde [65]; SL: Nohn [121]
- 630 *Nemapogon ruricolella* (STAINTON, 1849)**  
SL: Saarhölzbach (Wolfsbach; Vogelfelsen) [121]
- 635 *Nemapogon gliriella* (HEYDEN, 1865)**  
BY: Stadtwald Iphofen [74]
- 642 *Nemapogon fungivorella* (BENANDER, 1939)**  
SN: Kreis Bautzen: Lömischa [56]
- 648 *Nemapogon falstriella* (BANG-HAAS, 1881)**  
SN: Ostritz [55]
- 650 *Triaxomasia caprimulgella* (STAINTON, 1851)**  
BW: Durlach (REUTTI 1898); Stuttgart; Stuttgart, aus Eichenkallus [61]; BY: NWR Wolfsee [59]; SN: Kreis Kamenz: Biehla und Schmorkau [58]
- 669 *Tineola bisselliella* (HUMMEL, 1823)**  
SN: Kreis Zittau: Oberseifersdorf [56]
- 671 *Tinea pellionella* (LINNAEUS, 1758)**  
SN: Niederoderwitz; Kreis Bautzen: Crosta [56]
- 674 *Tinea translucens* MEYRICK, 1917**  
BW: Hegnach (Waiblingen), aus einem ausländischen Teppich [61]
- 675 *Tinea dubiella* STAINTON, 1859**  
MV: Aktuelle Funde [42]
- 680 *Tinea pallescentella* (STAINTON, 1851)**  
SN: Ebersbach [56]
- 683 *Tinea columbariella* (WOCKE, 1877)**  
SN: Buchholz bei Weißenberg; Ebersbach [56]
- 689 *Niditinea fuscella* (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [40]
- 701 *Monopis weaverella* (SCOTT, 1858)**  
MV: Aktuelle Funde [42]
- 704 *Monopis obviella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 707 *Monopis imella* (HÜBNER, 1813)**  
NW: Bad Münstereifel [27] SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 724 *Euplocamus anthracinalis* (SCOPOLI, 1763)**  
HE: Aktuelle Funde [68]
- 742 *Lupusa maurella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BW: Karlsruhe und Kniebis (REUTTI 1898); Karlsruhe, HW [=Hardtwald] [61]
- 1030 *Roeslerstamnia erxlebella* (FABRICIUS, 1787)**  
SH: Kiel-Meimersdorf [65]; Lübecker Stadtwald (Ritterau) [97]

- 1031 *Roeslerstamnia pronubella* ([DENIS & SCHIFFMÜLLER], 1775)**  
SN: Belgershain [56]
- 1034 *Tinagma perdicellum* ZELLER, 1839**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [16]
- 1037 *Tinagma ocnerostomellum* (STAINTON, 1850)**  
SH: Kiel; Mölln [96]; BY: Lkr. Tirschenreuth: Naturwaldreservat Gitschger [85]
- 1039 *Tinagma anchusellum* (BENANDER, 1936)**  
SH: Groß Grönau/RZ [60]
- 1045 *Klimeschia transversella* (ZELLER, 1839)**  
BY: Lkr. Kelheim: Dürnbucher Forst [86]
- 1052 *Bucculatrix albedinella* ZELLER, 1839**  
BY: NWR Schwengbrunnen [86]; MV: Mehrere Erstfunde [44]
- 1060 *Bucculatrix bechsteinella* (BECHSTEIN & SCHAFFNERBERG, 1805)**  
BW: Oberbergen, Ortslage [78]; MV: Aktuelle Funde [42]
- 1065 *Bucculatrix cidarella* (ZELLER, 1839)**  
MV: Aktuelle Funde [44]
- 1066 *Bucculatrix cristatella* (ZELLER, 1839)**  
NW: Keldenich [27]; MV: Aktuelle Funde [44]
- 1066a *Bucculatrix albipedella* HOFMANN, 1874**  
Ist zu streichen, da synonym zu Nr. 1083: *B. nigricomella* (ZELLER, 1839) [63]
- 1067 *Bucculatrix demaryella* DUPONCHEL, 1840**  
BW: Mehrere Erstfunde; die älteren Belege fälschlich als *B. crataegi* [jetzt: *bechsteinella*] determiniert [61]
- 1071 *Bucculatrix gnaphaliella* (TREITSCHKE, 1833)**  
SH: Büchen [96]; MV: Aktuelle Funde [44]
- 1081 *Bucculatrix maritima* (STAINTON, 1851)**  
ST: Sülldorf [52]; TH: Auleben (RAPP, 1936); Artern (Salzstelle) [53]
- 1083 *Bucculatrix nigricomella* (ZELLER, 1839)**  
= *aurimaculata* STAINTON, 1849; = *albipedella* HOFMANN, 1874; Synonymie nach [63]  
HE: Wüstensachsen [110]; RP: Ofterdingen [11-12 km nördlich von Tübingen](Typus von *albipedella*) [63]; MV: Aktuelle Funde [44]
- 1084 *Bucculatrix noltei* PETRY, 1912**  
BW: Hütten (Schelkingen); Lautern (Blaustein, LK Alb-Donaub-Kreis) [61]
- 1093 *Bucculatrix thoracella* (THUNBERG, 1794)**  
HE: Fulda-Eichenzell [110]; BW: Schelingen, Degenmatt; südöstlich Vogtsburg, Totenkopf [78]
- 1095 *Bucculatrix ulmifoliae* M. HERING, 1931)**  
MV: Aktuelle Funde [44]
- 1100 *Parectopa ononidis* (ZELLER, 1839)**  
SN: Hainewalde bei Zittau [58]
- 1104 *Micrurapteryx kollarieiella* (ZELLER, 1839)**  
NI: Niederrohe; Neuhohe [56]; Mehrere aktuelle Funde [73]
- 1106 *Aristaea pavoniella* (ZELLER, 1847)**  
HE: bei Frankfurt/Main (RÖSSLER 1881) [61]; BW: Mehrere Erstfunde (REUTTI 1898) [61]
- 1111 *Caloptilia azaleella* (BRANTS, 1913)**  
NI: Leer-Loga [73]; BY: Lkr. Passau: Rambachtal bei Untergriesbach, [85]
- 1117 *Caloptilia falconipennella* (HÜBNER, 1813)**  
NI: Alvern; Wietzendorf; Leer-Loga [73]
- 1118 *Caloptilia fidella* (REUTTI, 1853)**  
NI: Braunschweig (SORHAGEN, 1886) [49]; BY: Lkr. Freising; Dietersheimer Brenne; Dießen am Ammersee [86]; SN: Baruth, Schafberg; Großenhain [49]
- 1120 *Caloptilia fibrigerensis* (FRITZSCHE, 1871)**  
SL: Nohn [121]
- 1128 *Caloptilia roscipennella* (HÜBNER, 1796)**  
SN: Dubrauke, Kreis Bautzen [49]
- 1130a *Caloptilia onustella* (HÜBNER, 1813)**  
BY: NWR Donauhänge [59]
- 1131 *Caloptilia stigmatella* (FABRICIUS, 1781)**  
MV: Aktuelle Funde [42]
- 1132 *Caloptilia suberinella* (TENGSTRÖM, 1848)**  
TH: Schwarzatal (Schieferbruch) [108]
- 1139 *Aspilapterix tringipennella* (ZELLER, 1839)**  
BW: Alt-Vogtsburg, Badberg [78]
- 1147 *Calybites phasianipennella* (HÜBNER, 1813)**  
NI: Zahlreiche aktuelle Funde [73]
- 1148 *Calybites quadrisignella* (ZELLER, 1839)**  
BB: Berlin; Forst Bredow; Oderberg und Lebus [50]
- 1152 *Sauterina hofmanniella* (SCHLEICH, 1867)**  
Die Meldung für SN in der Deutschlandliste ist zu streichen, sie geht auf eine Fehlbestimmung von *Leucospilapteryx omisella* (STAINTON, 1848) zurück [56]
- 1161 *Spulerina simploniella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1844)**  
BW: Creglingen, Mine in Birkenrinde [61]; SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]
- 1167 *Leucospilapteryx omissella* (STAINTON, 1848)**  
SH: Büchen [96]; NI: Wietzendorf; Müden/Örtze [73]
- 1169 *Ornixola caudulatella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Lübecker Stadtwald (Ritterau) [97]
- 1172 *Callisto denticolella* (THUNBERG, 1794)**  
NI: Leer-Loga; Wietzendorf [73] HE: Wüstensachsen [110]
- 1178 *Parornix anglicella* (STAINTON, 1850)**  
SL: Mimbach (NSG Badstube) [121]
- 1179 *Parornix anguliferaella* (ZELLER, 1847)**  
BY: Lkr. Landshut: Adlkofen Dorf [74]; SN: Belgershain [56]
- 1180 *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979**  
D: RP: Bornich; Dörscheid [9]
- 1181 *Parornix betulae* (STAINTON, 1854)**  
SL: Nohfelden (Elsenfels) [121]
- 1182 *Parornix carpinella* (FREY, 1861)**  
SL: Freisen (Hellerberg) [121]
- 1184 *Parornix devoniella* (STAINTON, 1850)**  
BW: NSG Büchsenberg: Achkarren [22]
- 1186 *Parornix sagivora* (FREY, 1861)**  
SL: Hilbring (NSG Nackberg) [121]
- 1187 *Parornix finitimella* (ZELLER, 1850)**  
SL: Wolfersweiler (Flachshübel) [121]
- 1195 *Parornix pfaaffenzelleri* (FREY, 1856)**  
Der einzige Hinweis auf ein Vorkommen in D bezieht sich auf einen bayerischen Fund, der nicht verifizierbar ist, deshalb wird die Art aus der Deutschlandliste gestrichen [86]
- 1197 *Parornix scoticella* (STAINTON, 1850)**  
SL: Nunkirchen [121]
- 1200 *Parornix torquillella* (ZELLER, 1850)**  
BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**1206 *Phyllonorycter acerifoliella* (ZELLER, 1839)**

SL: Siersburg (NSG Gauberg) [121]

**1213 *Phyllonorycter anderidae* (W. FLETCHER, 1885)**

SH: Nortorf/RD und Eiderthal bei Grevenkrug/RD [60]; NI: Königsmoor bei Veenhusen [73]

**1214 *Phyllonorycter apparella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

BY: Seit langem aus BY bekannt, wurde in der Deutschlandliste vergessen [86]; SN: Für die Meldung von SCHÜTZE (1902) konnte bisher kein Beleg gefunden werden [79]

**1224 *Phyllonorycter coryli* (NICELLI, 1851)**

Die Nr. wurde fälschlich als 1234 angegeben. SL: Nennig (Steinbruch) [121]

**1225 *Phyllonorycter cerasinella* (REUTTI, 1852)**

NW: Keldenich [27]

**1233 *Phyllonorycter connexella* (ZELLER, 1846)**

NW: Bad Müstereifel und Nettersheim [27]; SL: Nunkirchen [121]

**1235 *Phyllonorycter corylifoliella* (HÜBNER, 1796)**

SL: Fechingen (NSG Birzberg) [121]

**1236 *Phyllonorycter cydoniella* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775)**SN: Die Meldung beruht auf einer Fehlbestimmung von *P. mespilella* (HÜBNER, 1805), die Art ist für SN zu streichen [79]**1240 *Phyllonorycter distentella* (ZELLER, 1846)**

TH: Ostufer der Saale bei Zeigerheim [108]

**1241 *Phyllonorycter dubitella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**Die bisher als Synonym von *dubitella* geführte *P. jaeckhi* (M. HERING, 1937) gehört nach DAVIS & DESCHKA (2001) als Synonym zu *P. salicella* (ZELLER, 1846) (Nr. 1301) [86]**1242 *Phyllonorycter emberizaepenella* (BOUCHÉ, 1834)**

MV: NSG „Dünenkiefernwald am Landhagensee“ [40]

**1244 *Phyllonorycter esperella* (GOEZE, 1783)**

SL: Nohn [121]

**1246 *Phyllonorycter fraxinella* (ZELLER, 1846)**

SN: SCHÜTZE (1902): „Im Oberlande nicht selten, nach M[ÖSCHLER] bei Kronförstchen“; Umgebung Bautzen: Blösa und Rachlau; in der Deutschlandliste fehlend [79]

**1254 *Phyllonorycter heegeriella* (ZELLER, 1846)**

SL: Siersburg (NSG Gauberg) [121]

**1257 *Phyllonorycter hilarella* (ZETTERSTEDT, 1839)**

NW: Sistig-Krekel [27]; HE: Wüstenachsen [110]

**1259 *Phyllonorycter insignitella* (ZELLER, 1846)**

NW: Keldenich [27]; SL: Fechingen (NSG Birzberg) [121]

**1261 *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963)**

D: BB: Jänschwalde-Ost und Brandenburg, Groß Gastrose [57]; BY: Zahlreiche Erstfunde aus dem Landkreis Landsberg [74]; SN: Radebeul-Zitschewig; Ebersbach; Kottmarsdorf bei Löbau; Großhennersdorf bei Zittau; Zittau-Weinaupark [49]

**1265 *Phyllonorycter kleemannella* (FABRICIUS, 1791)**

NI: Erlenseegebiet bei Nesseborg [73]; HE: Wüstenachsen, Herrenwasser [110]

**1267 *Phyllonorycter lantanella* (SCHRANK, 1802)**

NI: Leer-Loga [73]; SL: Siersburg (NSG Gauberg); Nohn [121]

**1268 *Phyllonorycter lautella* (ZELLER, 1846)**

SL: Nunkirchen; Nohn [121]

**1269 *Phyllonorycter leucographella* (ZELLER, 1850)**

SH: Kieler Stadtgebiet [97]; NI: Hannover; Celle [89]; Mehrere Erstfunde [72]; [73]; HE: Bad Karlshafen [89]; TH: Mehrere Funde [36]; Erstfund Bad Blankenburg (STEUER 1998), in der Deutschlandliste fehlend [37]

**1270 *Phyllonorycter maestingella* (MÜLLER, 1764)**

HE: Wüstenachsen; NSG Ulsterquelle [110]; MV: Aktuelle Funde [40]

**1272 *Phyllonorycter medicaginella* (GERASIMOV, 1930)**

SN: Belgershain [79]

**1273 *Phyllonorycter mespilella* (HÜBNER, 1805)**

SN: Belgershain [79]

**1277 *Phyllonorycter muelleriella* (ZELLER, 1839)**

NI: Rodehorst; Wietzendorf [73]

**1280 *Phyllonorycter nigrescentella* (LOGAN, 1851)**

SN: Tharandt (MÖBIUS 1936), der Beleg ist nicht auffindbar, fehlt in der Deutschlandliste für SN [79]; ST: Straßberg, Frankensteich und Thale, Pfeilsdenkmal [57]

**1285 *Phyllonorycter pastorella* (ZELLER, 1846)**

BY: Lkr. Regensburg; NSG Mattinger Hänge [86]

**1288 *Phyllonorycter platanoidella* (JOANNIS, 1920)**

NI: Unterlüß [73]; SL: Nunkirchen [121]

**1292 *Phyllonorycter quercifoliella* (ZELLER, 1839)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**1293 *Phyllonorycter quinqueguttella* (STAINTON, 1851)**

SN: Kreis Bautzen: Hermsdorf [58]

**1294 *Phyllonorycter rajella* (LINNAEUS, 1758)**

HE: NSG Stirnberg - Hohe Rhön [110]

**1296 *Phyllonorycter robiniella* (CLEMENS, 1859)**

SH: Kiel [60]; [97]; NI: Celle [89]; SL: Saarbrücken [121]; SN: Leipzig; Belgershain [79]; TH: (STEUER 1998) [60]

**1297 *Phyllonorycter roboris* (ZELLER, 1839)**

NI: Wietzendorf [73]

**1299 *Phyllonorycter sagitella* (BJERKANDER, 1790)**

NW: Bad Müstereifel [27]

**1301 *Phyllonorycter salicella* (ZELLER, 1846)**Nach DAVIS & DESCHKA (2001) gehört als Synonym hierher *P. jaeckhi* (M. HERING, 1937) [86]**1304 *Phyllonorycter scabiosella* (DOUGLAS, 1853)**

NW: Keldenich [27]

**1308 *Phyllonorycter sorbi* (FREY, 1855)**

HE: Wüstenachsen [110]

**1310a *Phyllonorycter cerasicorella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

NI: Bruxer Holz/RD [60]; NW: Sistig-Krekel [27]

**1311 *Phyllonorycter staintonella* (NICELLI, 1853)**

NW: Bad Müstereifel [27]

**1312 *Phyllonorycter stettinensis* (NICELLI, 1852)**

NI: Erlenseegebiet bei Nesseborg [73]; SL: Haustadt (NSG Wolfskopf) [121]

**1313 *Phyllonorycter strigulatella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

NI: Leer [73]; HE: NSG Stirnberg - Hohe Rhön; NSG Rotes Moor [110]

**1317 *Phyllonorycter tenerella* (JOANNIS, 1915)**

RP: Schuld [27]

**1319 *Phyllonorycter trifasciella* (HAWORTH, 1828)**

BY: Verschollen, alte Angabe bei OSTHEIDER (leg. LINACK) glaubhaft [59]

**1327 Phyllonorycter viminettorum (STAINTON, 1854)**  
NI: NSG Wolfmeer bei Veenhusen [73]; BB: Jänschwalde-Ost [79]; SN: Bautzen; Oehna/Spree; Umgebung Holscha (SCHÜTZE 1930), fehlt in der Deutschlandliste [79]

**1330 Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIC, 1986**  
NI: Uchte; Steinhuder Meer [89]; Zahlreiche weitere Funde [73]; NW: Zahlreiche Erstfunde (SCHULZ 2000) [89]; HE: Tredelburg [89]; Fulda-Eichenzell [110]; ST: Altmark [66]; TH: Bad Blankenburg; Schwarzwatal; Wachtelberg [108]

**1335 Phylloconistis labyrinthella (BJERKANDER, 1790)**  
SH: Meimersdorf [96]

**1336 Phylloconistis saligna (ZELLER, 1839)**  
MV: Aktuelle Funde [42]

**1337 Phylloconistis unipunctella (STEPHENS, 1834)**  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]; SL: Nohn [121]

**1339 Phylloconistis xenia M. HERING, 1936**  
SH: St. Peter-Ording [97]

**1347 Yponomeuta evonymella (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1348 Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1349 Yponomeuta malinella ZELLER, 1838**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1352 Yponomeuta orrella (HÜBNER, 1796)**  
SH: Hamburg (Bahrenfeld); Hamburg (Rissen); Sylt; Klanxbüll [96]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1355 Yponomeuta sedella TREITSCHKE, 1832**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1359 Zelleria hepariella STAINTON, 1849**  
SH: Kiel; Westensee, Bruchwald Mühlenbektal [96]; Bruxer Holz [60]; NW: Bad Müntereifel [27]

**1364 Euhyonomeutoides albithoracellus GAJ, 1954**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1365 Euhyonomeutoides ribesiella (JOANNIS, 1900)**  
Die Meldung für SH ist zu streichen, sie beruht auf einer Fehlbestimmung von *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849 [60]

**1398 Pseudoswammerdamia combinella (HÜBNER, 1786)**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1400 Swammerdamia caesiella (HÜBNER, 1796)**  
MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1402 Swammerdamia pyrella (VILLERS, 1789)**  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1402a Swammerdamia compunctella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**  
MV: Aktuelle Funde [39]

**1406 Paraswammerdamia conspersella (TENGSTRÖM, 1848)**  
BW: Die bei Wörz (1957) aus Markgröningen gemeldeten Falter konnten nicht aufgefunden und nachuntersucht werden. Der späte Flugzeitpunkt und die ökologischen Ansprüche der Art sprechen für eine Fehlbestimmung [61] Die Art war nicht in der Deutschlandliste aufgenommen worden.

**1408 Paraswammerdamia lutarea (HAWORTH, 1828)**  
MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1411 Cedestis gysselinella (ZELLER, 1839)**  
MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1416 Ocnerostoma pinariella ZELLER, 1847**

SH: Amrum; Büchen; Geesthacht [96]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1417 Ocnerostoma friesei SVENSSON, 1966**

NW: Nettersheim [27]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1419 Niphonympha albella (ZELLER, 1847)**  
BW: NSG Büchsenberg: Achkarren [22]

**1425 Prays ruficeps (HEINEMANN, 1870)**

BW: Schelingen, Degenmatt [78]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1433 Argyresthia laevigatella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

MV: Aktuelle Funde [39]

**1435 Argyresthia glabratella (ZELLER, 1847)**

SH: Hamburg; Westensee: Enkendorfer Holz und Wrohe [96]; MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1440 Argyresthia praecocella ZELLER, 1839**

SL: Wolfersweiler (Flachshübel) [121]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1442 Argyresthia trifasciata (STAUDINGER, 1871)**

SH: Handewitt [97]; BW: Laupheim und Umgebung; NSG Hauser Berg bei Allmendingen [61]; SN: Belgershain, und Ostrau [56]

**1445 Argyresthia thuiella PACKARD, 1871**

SN: Sächsische Schweiz: Kirnitzschtal, Ostrauer Mühle [56]; TH: Bad Frankenhausen [56]

**1447 Argyresthia dilectella ZELLER, 1847**

MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1449 Argyresthia abdominalis ZELLER, 1839**

HE: Eberschütz; Hörlé [90]; MV: Aktuelle Funde [39]; [40]; SN: Sprey bei Boxberg, FND Wacholderheide [57]

**1450 Argyresthia aurulentella STAINTON, 1849**

MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1452 Argyresthia ivella (HAWORTH, 1828)**

RP: Gerolstein [27]

**1454 Argyresthia goedartella (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktuelle Funde [39]; [40]

**1455 Argyresthia pygmaeella ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775)**

RP: Mützenich [27]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1456 Argyresthia sorbiella (TREITSCHKE, 1833)**

SH: Pinneberg; Westensee, Bruchwald Mühlenbektal [77]

**1460 Argyresthia fundella (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1835)**

SN: Ostrau [56]; MV: Aktuelle Funde [39]

**1461 Argyresthia glaucinella ZELLER, 1839**

SN: Mehrere aktuelle Funde [55]

**1462 Argyresthia spinosella STAINTON, 1849**

MV: Aktuelle Funde [39]

**1463 Argyresthia conjugella ZELLER, 1839**

RP: Mützenich [27]

**1464 Argyresthia pulchella LIENIG & ZELLER, 1846**

BY: Lkr. Landshut: Niederaichbach [86]

**1465 Argyresthia semifusca (HAWORTH, 1828)**

MV: Aktuelle Funde [39]; SN: Valtenberg bei Neustadt; Hintere Sächsische Schweiz, Kleiner Winterberg [57]

**1467 Argyresthia bonnetella (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktuelle Funde [39]

**1468 Argyresthia albistria (HAWORTH, 1828)**

MV: Aktuelle Funde [39]

**1469 Argyresthia semitestacea CURTIS, 1833**

MV: Aktuelle Funde [39]; SN: Hinterhermsdorf [56]

- 1480 *Ypsolopha mucronella* (SCOPOLI, 1763)**  
MV: Karnin [39]
- 1481 *Ypsolopha nemorella* (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1482 *Ypsolopha dentella* (FABRICIUS, 1775)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1483 *Ypsolopha falcella* (HÜBNER, 1796)**  
NW: Körbecke [90]; HE: Haueda; Hörl; Eberschütz [90]
- 1484 *Ypsolopha asperella* (LINNAEUS, 1761)**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste fehlend [18]; MV: Aktuelle Funde [39]
- 1488 *Ypsolopha horridella* (TREITSCHKE, 1835)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1490 *Ypsolopha persicella* (FABRICIUS, 1787)**  
NW: Hilden; Köln [18]
- 1491 *Ypsolopha alpella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste fehlend [18]
- 1492 *Ypsolopha sylvella* (LINNAEUS, 1767)**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Rhoden (UFFELN 1930); Lorch [18]; MV: Aktuelle Funde [39]
- 1494 *Ypsolopha ustella* (CLERCK, 1759)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1496 *Ypsolopha vittella* (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1519 *Ochsenheimeria glabratella* MÜLLER-RUTZ, 1914**  
BY: NSG Garchinger Heide bei Eching [83]
- 1520 *Ochsenheimeria taurella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Scheibeberg, nordwestlich von Zittau [58]
- 1527 *Plutella geniatella* ZELLER, 1839**  
BY: Lkr. Garmisch-Partenkirchen: NWR Wettersteinwand [86]
- 1528 *Plutella porrectella* (LINNAEUS, 1758)**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste fehlend [19]; MV: Aktuelle Funde [39]; SN: Mehrere aktuelle Funde [55]
- 1533 *Rhigognostis senilella* (ZETTERSTEDT, 1839)**  
MV: Aktuelle Funde [39]
- 1540 *Rhigognostis hufnagelii* (ZELLER, 1839)**  
NW: Wuppertal (Burgholz) [19]; BY: Lkr. München: Garchinger Heide; Lkr. Regensburg: Eilsbrunn [86]
- 1544 *Eidophasia messingiella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1840)**  
HE: Waldeck [19]; RP: Gerolstein und Ulmen, [27]; MV: Aktuelle Funde [39]
- 1556 *Digitalivalva pulicariae* (KLIMESCH, 1956)**  
BW: NSG Büchsenberg: Achkarren; NSG Rheinhalde: Burkheim [22]
- 1562 *Digitalivalva granitella* (TREITSCHKE, 1833)**  
BY: Lkr. Forchheim: Leutenbach, Wlaberla [86]
- 1572 *Acrolepia autumnitella* CURTIS, 1838**  
BY: Landshut-West; Lkr. Passau: Hainzing [85]; BB: Jänschwalde [49]
- 1580 *Glyphipterix thrasonella* (SCOPOLI, 1763)**  
RP: Ulmen [27]
- 1581 *Glyphipterix bergstraesserella* (FABRICIUS, 1781)**  
NW: Monschau [27]; BW: Mehrere aktuelle Funde [78]
- 1591 *Glyphipterix haworthiana* (STEPHENS, 1834)**  
SN: Schwarzkollm [49]
- 1592 *Glyphipterix forsterella* (FABRICIUS, 1781)**  
SN: Oberlausitz (SCHÜTZE 1902), in der Deutschlandliste fehlend; Zittauer Gebirge, Waltersdorf [57]
- 1594 *Glyphipterix simplicella* (STEPHENS, 1834)**  
BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]
- 1602 *Bedellia somnulentella* ZELLER, 1847**  
NW: Schon von GRABE (1955) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend; Mönchengladbach [107]
- 1608 *Leucoptera lustratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**  
BY: Regensburg (MEY, 1994) [86]; SN: Waltersdorf bei Zittau [58]
- 1616 *Leucoptera lathyrifoliella* (STAINTON, 1866)**  
BY: Lkr. Coburg: Oettinghausen [86]
- 1617 *Leucoptera genistae* (M. HERING, 1933)**  
D: SL: Hammelsberg bei Perl [121]
- 1618 *Leucoptera malifoliella* (O. COSTA, 1836)**  
SL: Tünsdorf [121]
- 1623 *Leucoptera sinuella* (REUTTI, 1853)**  
SH: Amrum [96]
- 1627 *Lyonetia clerkella* (LINNAEUS, 1758)**  
MV: Aktuelle Funde [40]
- 1629 *Lyonetia ledi* WOCKE, 1859**  
SL: Nunkirchen (Einschleppung an Ledum palustre) [121]
- 1643 *Ethmia dodecea* (HAWORTH, 1828)**  
BW: NSG Badberg: Schelingen [22]
- 1655 *Ethmia bipunctella* (FABRICIUS, 1775)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 1668 *Semioscopis avellanella* (HÜBNER, 1793)**  
ST: Altmark [66]
- 1669 *Semioscopis oculella* (THUNBERG, 1794)**  
NI: Dünsche; Munster-Süd [118]; SN: Kleinsaubernitz; Commerau bei Klix; NSG Dubringer Moor bei Hoyerswerda [57]
- 1676 *Levipalpus hepatariella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**  
TH: Schwarztal (Schieferbruch) [108]
- 1707 *Agonopterix assimilella* (TREITSCHKE, 1832)**  
SH: Sylt (Listland); Putlos [118]; SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 1712 *Agonopterix nanatella* (STAINTON, 1849)**  
NW: Bad Münstereifel [27]
- 1713 *Agonopterix putridella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
NI: Munster-Süd [118]
- 1714 *Agonopterix atomella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BY: Hanzing, Obernzell bei Passau [85]
- 1715 *Agonopterix scopariella* (HEINEMANN, 1870)**  
SN: Kreis Kamenz: Biehla; Bernbruch [49]
- 1717 *Agonopterix petasitis* (STANDFUSS, 1851)**  
SN: Mehrere aktuelle Funde [55]
- 1718 *Agonopterix ciliella* (STAINTON, 1849)**  
SH: Sylt-Nord [118]
- 1721 *Agonopterix propinquella* (TREITSCHKE, 1835)**  
SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 1724 *Agonopterix laterella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Kreis Kamenz: Zeißholz [49]

**1732 *Agonopterix purpurea* (HAWORTH, 1811)**

NI: Kapern [118]

**1735 *Agonopterix conterminella* (ZELLER, 1839)**

NI: Mehrere aktuelle Funde [118]

**1737 *Agonopterix capreolella* (ZELLER, 1839)**

SN: Lückendorf und Großschönau bei Zittau; Lausche bei Waltersdorf [49]

**1740 *Agonopterix angelicella* (HÜBNER, 1813)**

SN: Halbendorf/Spree [55]; TH: Gleiz (Muschelkalkberg bei Schwarza) [108]

**1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877)**

D: BB: Mildenberg bei Zehdenick/Havel [50]

**1743 *Agonopterix cnicella* (TREITSCHKE, 1832)**

SH: Krummsteert/Fehmarn; Listland/Sylt [118]

**1751 *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879)**

D: NW: Bad Münnstereifel; Gilsdorf [25]; HE: Lorch (Nöllig) [25]; RP: Lennig (bei Bornich) (JACKH 1942), in der Deutschlandliste fehlend [25]; BW: Schelingen, Blattenbuck [78]

**1756 *Agonopterix pallorella* (ZELLER, 1839)**

SN: Trebendorf bei Weißwasser [56]

**1757 *Agonopterix kaekeritziana* (LINNAEUS, 1767)**

SH: Putlos [118]; RP: Gerolstein und Ulmen [27]

**1764 *Agonopterix umbellana* (FABRICIUS, 1794)**

SH: Klappholttal auf Sylt [118]

**1766 *Agonopterix doronicella* (WOCKE, 1849)**

BY: Dreisesselberg, KLIMESCH in litt.; Lkr. Regen: Rinchnachmündt [86]

**1782 *Depressaria chaerophylli* ZELLER, 1839**

HE: Wüstensachsen [110]

**1783 *Depressaria ultimella* (STAINTON, 1854)**

NI: Höhbeck; Kapern [118]; SN: Uhyst/Spree [56]

**1786 *Depressaria pimpinellae* ZELLER, 1839**

TH: Wachtelberg bei Zeigerheim [108]

**1796 *Depressaria sordidatella* TENGSTRÖM, 1848**

NI: Kapern [118]

**1798 *Depressaria pulcherrimella* STAINTON, 1849**

NW: Zahlreiche Erstfunde [27]; SN: Lückendorf bei Zittau [49]

**1806 *Depressaria albipunctella* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775)**

SH: Putlos [118]; NI: Pevestorf [118]

**1828 *Cosmiotes consortella* (STAINTON, 1851)**

RP: Dörscheid; Cochem [26]; SL: Reinheim (an der Lohe) [121]; BB: Jänschwalde-Ost, Grießen/Neiße [49]; SN: Burg bei Hoyerswerda [58]

**1829 *Cosmiotes exactella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

SH: Bredstedt; Reher-Kratt; Westensee: Blotenberg und Tütebergmoor [96]; SL: Weiskirchen (Der hohe Fels) [121]

**1830 *Cosmiotes freyerella* (HÜBNER, 1825)**

HE: Wüstensachsen [110]

**1852 *Elachista adscitella* STAINTON, 1851**

SH: Zahlreiche Erstfunde [96]

**1862 *Elachista apicipunctella* STAINTON, 1849**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]

**1865 *Elachista atricomella* STAINTON, 1849**

HE: Wüstensachsen [110]

**1871 *Elachista bedelliella* (SIRCOM, 1848)**

SH: Büchen [96]

**1888 *Elachista chrysodesmella* ZELLER, 1850**

HE: Wüstensachsen [110]; BW: Schelingen, Degenmatt [78]; SL: Hilbringen (NSG Nackberg); Merchigen (NSG Gipsberg) [121]

**1890 *Elachista cingilella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]; BY: Lkr. Hof: Selbitz [86]; SL: Hilbringen (NSG Nackberg); Reinheim (Auf der Lohe) [121]

**1892 *Elachista lugdunensis* FREY, 1859 (= *coeneni* TRAUGOTT-OLSEN, 1985)**

Synonymie nach KAILA (1999) [86]

BW: NSG Rheinhald: Burkheim, Alt-Vogtsburg, Burkheim [22]; Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]

**1902 *Elachista differens* PARENTI, 1978**

BW: Mehrere Erstfunde [61]; SL: Mimbach (NSG Badstube); Siersburg (NSG Gauberg) [121]

**1906 *Elachista dispunctella* (DUPONCHEL, 1843)**

BW: Schelingen, Degenmatt; Alt-Vogtsburg, Badberg [78]; BY: Mehrere aktuelle Funde [86]

**1910 *Elachista eleochariella* (STAINTON, 1851)**

SH: Umgebung Hamburg: Finkenwerder [97]

**1921 *Elachista gangabella* ZELLER, 1850**

SH: Westensee, Bruxer Holz; Wrohe, Mühlenbektal [97]

**1925 *Elachista gleichenella* (FABRICIUS, 1781)**

SH: Friedeholz [96]

**1927 *Elachista grandella* TRAUGOTT-OLSEN, 1992**

SL: Perl (Hammelsberg) [121]

**1935 *Elachista herrichi* FREY, 1859**

SL: Merchigen (NSG Gipsberg) [121]

**1948 *Elachista juliensis* (FREY, 1870)**

SN: Hoyerswerda, Knappenrode [55]

**1951 *Elachista kilmunella* STAINTON, 1849**

SH: Moor bei Glasau/SE und Salemer Moor bei Ratzeburg [60]

**1973 *Elachista obliquella* STAINTON, 1854**= *megerella* auct., nec HÜBNER, 1810: Nomenklatorische Änderung, siehe Kozlov & KAILA (2001) [86]

BW: Schelingen, Degenmatt [78]

**1983 *Elachista nobilella* ZELLER, 1839**

MV: Aktuelle Funde [40]

**1986 *Elachista occidentalis* FREY, 1882**

Bisher ohne Bundeslandzuordnung genannt, jetzt: BY: Regensburg [74]

**1995 *Elachista poae* STAINTON, 1855**

BY: Landshut-West [86]

**2000 *Elachista pomerana* FREY, 1870**

SH: Bruxer Holz [60]

**2005 *Elachista regificella* SIRCOM, 1849**Nach KAILA et al., (2001) ein Artenkomplex aus *E. regificella* SIRCOM, 1849, *E. geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) und *E. tengstromi*, KAILA, BENGTSSON, SULCS & JUNNLAINEN, 2001. *E. regificella* ist bisher nur aus Großbritannien bekannt, sie ist aus der Deutschlandliste zu streichen. Die bisherigen Meldungen unter dem Namen *regificella* müssen alle überprüft werden.**2005a *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

(gesicherte Meldungen):

SH: Sylt: List [96]; NW: Drachenfels/Siebengebirge; Niedegegen [15]; RP: Boppard [15]; BW: Baden-Baden; Bad Wildbad/Schwarzwald; Heidelberg; Sindelfingen; Stuttgart-Rohr; Stuttgart-Vaihingen [15]; BY: Alte bayerische Funde in KAILA et al., (2001) [86]

- 2005b** *Elachista tengstromi*, KAILA, BENGSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001  
(gesicherte Meldungen:  
NI: Goslar [15]; NW: Kierberg/Ville [15]; BW: Schwarzwald; Freiburg [15]; BY: Erlangen [15]; Lkr. Donau-Ries, Naturwaldreservat Sulz [86]; BB: Berlin-Spandau; Bredow; Potsdam [15]; TH: Bad Blankenburg [15])
- 2008** *Elachista rudectella* (STAINTON, 1851)  
BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]
- 2012** *Elachista serricornis* (STAINTON, 1854)  
SH: Salemer Moor [96]
- 2021** *Elachista subnigrella* DOUGLAS, 1853  
SL: Merchigen (NSG Gipsberg) [121]
- 2023** *Elachista venssonii* TRAUGOTT-OLSEN, 1988  
D: BY: 1984 von Pröse erstmals gemeldet, bei der Zusammensetzung der Deutschlandliste übersehen, seitdem mehrere Nachweise (Pröse i. l.); Naturwaldreservate [59]
- 2027** *Elachista tetragonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)  
BY: Donauauen bei Günzburg [86]
- 2034** *Elachista unifasciella* (HAWORTH, 1828)  
SH: Alt-Dovenstedter Moor; Westensee [96]; SN: Belgershain [58]
- 2042** *Elachista zernyi* HARTIG, 1941  
BY: Berchtesgaden, Wimbachschorf [86]
- 2049** *Chrysoclista lathamella* T. FLETCHER, 1936  
SH: Rendsburg?, Hohe? [96]; BY: Selb; Hof, Fattigsmühle; Wörth/Isar [86]
- 2052:** *Heinemannia laspeyrella* (HÜBNER, 1796)  
BB: Ist zu streichen, es handelt sich um die nachfolgende Art [50]
- 2053** *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
BB: Oberberg und Lebus, fälschlich als *H. laspeyrella* (HÜBNER, 1796) gemeldet [50]
- 2057** *Blastodacna hellerella* (DUPONCHEL, 1838)  
BW: NSG Büchsenberg; Achkarren [22] SN: Belgershain [49]
- 2058** *Blastodacna vinolentella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1853)  
ST: Nordhausen (RIEDL, 1969), in der Deutschlandliste fehlend [57]
- 2060** *Spuleria flavicaput* (HAWORTH, 1828)  
HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]; SL: Siersburg (NSG Gauberg) [121]
- 2066** *Haplochrois ochraceella* (REBEL, 1903)  
D: BY: Regensburg, NSG Fellinger Berg [86]; Zahlreiche Erstfunde [74]
- 2077** *Scythris productella* (ZELLER, 1855)  
Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]
- 2090** *Scythris ericetella* (HEINEMANN & SNELLEN, 1872)  
NW: Bad Münster am Stein [10]
- 2110** *Scythris crassiuscula* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]
- 2104** *Scythris ericivorella* (RAGONOT, 1880)  
SH: Rendsburg (BENGSSON, 1984) (in der Deutschlandliste fehlend); Moor bei Nortorf [60]; MV: NSG „Grambower Moor“ [41]
- 2111** *Scythris potentillella* (ZELLER, 1847)  
SN: Mehrere Erstfunde [55]
- 2169** *Scythris limbella* (FABRICIUS, 1775)  
MV: Aktuelle Funde [41]
- 2174** *Scythris inspersella* (HÜBNER, 1817)  
MV: Aktuelle Funde [41]
- 2176** *Scythris empetrella* KARSHOLT & NIELSEN, 1978  
SH: Sylt [96]
- 2183** *Scythris cicadella* (ZELLER, 1839)  
MV: Aktuelle Funde [41]
- 2214** *Enolmis acanthella* (GODART, 1824)  
D: SL: Nennig [121]
- 2232** *Diurnea lipsiella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
TH: Aktuelle Funde [95]
- 2234** *Dasytroma salicella* (HÜBNER, 1796)  
TH: Aktuelle Funde [95]
- 2242** *Bisigna procerella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
MV: Aktuelle Funde [43]
- 2244** *Fabiola pokornyi* (NICKERL, 1865)  
Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]
- 2246** *Schiffermuelleria schaefferella* (LINNAEUS, 1758)  
MV: Aktuelle Funde [40]; TH: Aktuelle Funde [95]
- 2248** *Schiffermuellerina grandis* (DESVIGNES, 1842)  
HE: NSG Oberbernhardser Höhe [110]
- 2261** *Denisia albimaculea* (HAWORTH, 1828)  
SL: Saarbrücken (1914) [121]; SN: Belgershain [56]
- 2262** *Denisia similella* (HÜBNER, 1796)  
MV: Aktuelle Funde [43]
- 2264** *Denisia stipella* (LINNAEUS, 1761)  
HE: NSG Oberbernhardser Höhe [110]
- 2270** *Eratophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)  
SH: Fischbeker Heide [65]; Lübecker Stadtwald (Ritzerau); Hamburg (in Coll. EVERS) [97]; NI: Wedemark-Brelingen [75]; NW: Zahlreiche aktuelle Funde [67]; BW: Neckar-Odenwald-Kreis: Waldkatzbach [81]
- 2272** *Goidanichiana jourdheuillella* (RAGONOT, 1875)  
BW: NSG Badberg; Schelingen [22]; SL: Limbach (NSG Limbacher Düne) [121]
- 2274** *Decantha borkhausenii* (ZELLER, 1839)  
RP: Umgebung Speyer (DISQUE, 1901); BW: Schwetzingen (MEESS, 1907), diese Angaben für die beiden Bundesländer fehlten in der Deutschlandliste [61]; MV: Friedland (STANGE, 1899), im Verzeichnis nicht aufgeführt [43]
- 2278** *Metalamptra cinnamomea* (ZELLER, 1839)  
MV: Aktuelle Funde [43]
- 2287** *Borkhausenia fuscescens* (HAWORTH, 1828)  
SL: Nunkirchen; Differingen (NSG Eulenmühle) [121]
- 2293** *Herrichia excelsella* STAUDINGER, 1870  
SH: Hamburg, Wellingsbüttel [97]
- 2298** *Crassa tinctella* (HÜBNER, 1796)  
MV: Aktuelle Funde [43]; ST: Altmark [66]
- 2301** *Batia lambdella* (DONOVAN, 1793)  
NW: Bad Münterfeil (NSG Kuttenberg) [28]; BW: NSG Badberg; Schelingen [22]; MV: Aktuelle Funde [43]

**2303 *Batia lunaris* (HAWORTH, 1828)**

SH: Lübeck, Dummersdorfer Ufer [97]; BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) und LINACK (1955) (HAUSENBLAS, i. l.); Mehrere aktuelle Funde [22]; BY: Klosterforst bei Kitzingen [86]; MV: Die früher [40] gemachte Meldung erwies sich als Fehlbestimmung von *B. internella* JÄCKH, 1972 [43]

**2310 *Epicallima formosella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [95]

**2312 *Esperia sulphurella* (FABRICIUS, 1775)**

MV: bei BOLL (1850) gemeldet, fehlt im Verzeichnis [43]

**2314 *Esperia oliviella* (FABRICIUS, 1794)**

RP: Niederadenau [28]; BY: Scheuchenberg bei Sulzbach [83]

**2321 *Alabonia geoffrella* (LINNAEUS, 1767)**

BY: Lkr. Miltenberg Faulbach; Lkr. Main-Spessart: Karlburg [74]; TH: Aktuelle Funde [95]

**2328 *Carcina quercana* (FABRICIUS, 1775)**

TH: Aktuelle Funde [95]

**2360 *Pleurota aristella schlaegeriella* (ZELLER, 1887)**

BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) und LINACK (1955) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Rheinhalde: Burkheim; Oberberge [22]

**2380 *Holoscolia huebneri* KOÇAK, 1980**

BY: Aus der bayerischen Liste gestrichen [86]

**2384 *Aplota palpella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: Klotten(Moseltal) [23]

**2385 *Aplota kadeniella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

SN: Schon von SCHÜTZE (1902) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [49]

**2389 *Cephalispheira ferrugella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BW: NSG Badberg: Schelingen [22]; MV: Aktuelle Funde [43]; SN: Stromberg bei Weißenberg [56]

**2398 *Telechrysis tripuncta* (HAWORTH, 1828)**

BY: Lkr. Schwandorf: Burglenzenfeld [74]; MV: Aktuelle Funde [43]

**2403 *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761)**

TH: Aktuelle Funde [95]

**2428 *Batrachedra praeangusta* (HAWORTH, 1828)**

MV: Aktuelle Funde [43]

**2429 *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839)**

NW: Keldenich (NSG Tanzberg) [28]; MV: Aktuelle Funde [40]

**2436 *Augasma aeratella* (ZELLER, 1839)**

SN: Belgershain [56]

**2438 *Metriotes lutarea* (HAWORTH, 1828)**

TH: Kyffhäuser [56]

**2442 *Goniodoma limoniella* (STAINTON, 1884)**

D: SH: Westerhever; St. Peter-Ording; Hamburger Hallig [97]

**2452 *Coleophora spiraeella* (REBEL, 1916)**

BB: Berlin-Marienfelde [50]

**2455 *Coleophora ochripennella* ZELLER, 1849**

SN: Belgershain [56]

**2459 *Coleophora adjectella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861**

RP: Lorch (FUCHS, 1881); Schloßböckelheim [26]

**2462 *Coleophora badiipennella* (DUPONCHEL, 1843)**

SH: Westensee, Emkendorfer Holz; Westensee, Felder Holz [96]

**2463 *Coleophora limosipennella* (DUPONCHEL, 1843)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]; SN: Belgershain [56]

**2464 *Coleophora siccifolia* STAINTON, 1856**

RP: Dörscheid; Klotten [29]

**2465 *Coleophora uliginosella* GLITZ, 1872**

SH: Salemer Moor [96]

**2467 *Coleophora coracipennella* (HÜBNER, 1796)**

SH: Die Meldung bedarf der Bestätigung [96]

**2468 *Coleophora serratella* (LINNAEUS, 1761)**

HE: Wüstenachsen [110]; MV: Aktuelle Funde [40]

**2470 *Coleophora prunifoliae* DOETS, 1944**

SH: Kiel [96]

**2475 *Coleophora cornutella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861**

BY: Lkr. Erding: Mehrere Erstfunde [74]

**2476 *Coleophora fuscocuprella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

RP: Pfalz, coll. MöBIUS, Pfalz, Eppelsheim, coll. HEINITZ [56]

**2477 *Coleophora arctostaphyli* (MEDER, 1934)**

SN: Ist zu streichen, kann nicht bestätigt werden [56]

**2479 *Coleophora lusciniaeppennella* (TREITSCHKE, 1833)**

HE: NSG Stirnberg - Hohe Rhön [110]; RP: Klotten [29]; MV: Aktuelle Funde [42]

**2480 *Coleophora idaeella* HOFMANN, 1869**

NI: Wietzendorf und Rodehorst [71]; BY: Lkr. Traunstein: Pechschnait bei Abstreit [86]

**2481 *Coleophora vacciniella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861**

SH: Reher-Kratt [96]

**2484 *Coleophora vitisella* GREGSON, 1856**

NI: Schon bei HARTWIG (1958) und FÜGE et al., (1930) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend (HAUSENBLAS in l.); Müden/Örtze; Faßberg-Schmarbeck; Widderhausen; Neuhohe [71]

**2485 *Coleophora glitzella* O. HOFMANN, 1869**

NI: Neuhohe [71]; NW: Niedersfeld (NSG Neuer Hagen) [29]

**2487 *Coleophora violacea* (STRÖM, 1783)**

SH: Kiel [96]

**2492 *Coleophora juncicolella* STAINTON, 1851**

NW: Brüggen [29]

**2497 *Coleophora pulmonariella* RAGONOT, 1874**

ST: Kreis Merseburg, Ermritz, Elsteraue [57]

**2498 *Coleophora trifolii* (CURTIS, 1832)**

= *melliottella* SCOTT, 1860; = *frischella aurata* TOLL, 1960; = *trifolii aurata* TOLL, 1960: neue Synonymieliste [109]

**2499 *Coleophora frischella* (LINNAEUS, 1758)**

= *dannehli* TOLL, 1952; = *auronitiella* TOLL, 1962: neue Synonymieliste [109]

HE: Wüstenachsen [110]; BB: Cottbus; Berlin-Marienfelde [50]; TH: Langenfeld bei Bad Salzungen [109]

**2500 *Coleophora alcyonipennella* (KOLLAR, 1832)**

= *cuprifulgella* TOLL, 1962. Die bisher als Synonym geführte Art *cupriarilla* LIENIG & ZELLER, 1846 (nicht ZELLER, 1847) ist eine valide Art (Verbreitung Türkei, Griechenland) [109]

MV: Aktuelle Funde [42]

**2518 *Coleophora lineolea* (HAWORTH, 1828)**

MV: Aktuelle Funde [42]

**2524 *Coleophora hemerobiella* (SCOPOLI, 1763)**

ST: Altmark [66]

- 2546** *Coleophora lithargyrinella* ZELLER, 1849  
 HE: Wüstensachsen, Moorwiese [110]; SN: Belgershain [56];  
 TH: Küffhäuser [56]
- 2563** *Coleophora trifariella* ZELLER, 1849  
 BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]
- 2564** *Coleophora genistae* STANTON, 1857  
 SH: Mehrere aktuelle Funde auf Sylt [97]
- 2566** *Coleophora saturatella* STANTON, 1850  
 NW: Brüggen [29]; BW: Schelingen, Blattenbuck [78]
- 2567** *Coleophora niveicostella* ZELLER, 1839  
 BW: Schelingen, Degenmatt; Schelingen, Blattenbuck [78]
- 2568** *Coleophora albicostella* (DUPONCHEL, 1843)  
 BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]
- 2587** *Coleophora mayrella* (HÜBNER, 1813)  
 = *fabriciella* VILLERS, 1789; = *spissicornis* HAWORTH, 1828; = *trochilipennella* COSTA, 1836; = *coruscipennella* CLEMENS, 1860;  
 = *aeneusella* CHAMBERS, 1874; = *europarpurriella* CHAMBERS, 1874; = *moldaviella* NEMÉC, 2004: Neue Synonymieliste [109]
- 2589a** *Coleophora variicornis* TOLL, 1952  
 Bisher als Synonym von *C. hieronella* ZELLER, 1849 aufgefasst,  
 durch NUSS & STÜBNER (2003) als gültige Art wieder einge-  
 führt.
- D: BB: Jänschwalde-Ost; Jänschwalde; Potsdam-Wilhelms-  
 horst, Coll. ERNST [80]; Döberitzer Heide und Umgebung Zos-  
 sen; [109]; SN: Burg bei Hoyerswerda [109]
- 2591** *Coleophora ballotella* (FISCHER VON RÖSLER-  
 STAMM, 1843)  
 RP: NSG Nahegau bei Schloßböckelheim [7]
- 2593** *Coleophora albidella* ([DENIS & SCHIFFERMÜL-  
 LER], 1775)  
 MV: Aktuelle Funde [42]
- 2596** *Coleophora betulella* HEINEMANN & WOCHE,  
 1877  
 MV: Aktuelle Funde [40]
- 2597** *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854  
 BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; SN: Belgershain [56]
- 2598** *Coleophora currucipennella* ZELLER, 1839  
 SN: Ottendorf [56]
- 2602** *Coleophora brevipalpella* WOCHE, 1874  
 BY: Aus der bayerischen Liste gestrichen [86]
- 2606** *Coleophora virgatella* ZELLER, 1849  
 BW: NSG Badberg: Schelingen [22]; Schelingen, Blattenbuck;  
 Schelingen, Degenmatt [78]
- 2609** *Coleophora serpyletorum* E. HERRING, 1889  
 SH: Büchen [96]; Lübeck, Dummersdorfer Ufer [97]
- 2611** *Coleophora gallipennella* (HÜBNER, 1796)  
 SH: Sünderup Flensburg; Hofsee Ritzerau [97]
- 2618** *Coleophora flaviella* MANN, 1857  
 = *infibulatella* HOFMANN, 1874: Synonymie nach [63]  
 BW: Zusammenstellung der bisher bekannten Fundorte [63]
- 2619** *Coleophora vibicigerella* ZELLER, 1839  
 RP: Pfalz, Eppelsheim, Coll. STARKE [56]; BY: Zahlreiche ak-  
 tuelle Funde [86]
- 2621** *Coleophora partitella* ZELLER, 1839  
 SN: Belgershain [49]
- 2622** *Coleophora ditella* ZELLER, 1849  
 RP: Klotten [7]
- 2631** *Coleophora caelebipennella* ZELLER, 1839  
 SH: Büchendorf/RZ [60]

- 2639** *Coleophora vibicella* (HÜBNER, 1813)  
 BW: Schelingen, Blattenbuck [78]
- 2647** *Coleophora ochrea* (HAWORTH, 1828)  
 NW: mehrere aktuelle Funde [30]
- 2664a** *Coleophora infibulatella* HOFMANN, 1874  
 Ist zu streichen, da synonym zu Nr. 2618: *C. flaviella* MANN,  
 1857 [63]
- 2680** *Coleophora pennella* ([DENIS & SCHIFFERMÜL-  
 LER], 1775)  
 MV: Aktuelle Funde [40]
- 2686** *Coleophora adjunctella* HODGKINSON, 1882  
 BB: Rietzer See (Salzstelle) [51]; TH: Artern (Salzstelle); Au-  
 leben (Schloßberg-Solwiesen) [53]; die Meldung: Zeigerheim  
 (Truppenübungsplatz) [108] beruht auf einer Fehldetermination  
 [53]
- 2687** *Coleophora caespititiella* ZELLER, 1839  
 RP: Klotten [7]; Bornich; Cochem [29]
- 2688** *Coleophora tamensis* WATERS, 1929  
 NW: Kranenburg [29]; RP: Dörscheid [29]
- 2689** *Coleophora glaucicolella* WOOD, 1892  
 MV: Aktuelle Funde [42]
- 2692** *Coleophora alticolella* ZELLER, 1849  
 MV: Aktuelle Funde [42]
- 2693** *Coleophora taeniipennella* HERRICH-SCHÄFFER,  
 1855  
 MV: Aktuelle Funde [40]
- 2696** *Coleophora sylvaticella* WOOD, 1892  
 RP: Mehrere aktuelle Funde [29]; SN: Hinterhermsdorf, Ostrau  
 [56]
- 2701** *Coleophora maritimella* NEWMAN, 1863  
 D: SH: Fehmarn; Sylt: Puan Klen [97]
- 2707** *Coleophora obscenella* HERRICH-SCHÄFFER,  
 1855  
 NW: Keldenich [27]; MV: Aktuelle Funde [40]
- 2707a** *Coleophora virgaureae* STANTON, 1857  
 In der Deutschlandliste als Synonym von *obscenella* HERRICH-  
 SCHÄFFER, 1855 aufgeführt, nach BALDIZZONE & TABELL (2002)  
 eigenständige Art.  
 SH: Büchen; Kiel und Kiel-Stift [96]
- 2716** *Coleophora asteris* MÜHLIG, 1864  
 SH: Mehrere Erstfunde (STÜNING 1988); aktuelle Funde [96]
- 2721a** *Coleophora jaernaensis* BJÖRKLUND & PALM-  
 QVIST, 2002  
 D: SH: Hofsee in Ritzerau [97]
- 2725** *Coleophora squamosella* STANTON, 1856  
 BB: Glindower Alpen bei Potsdam, Coll. ERNST [58]
- 2729** *Coleophora versurella* ZELLER, 1849  
 BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; MV: Aktuelle Funde  
 [40]
- 2733** *Coleophora vestianella* (LINNAEUS, 1758)  
 MV: Aktuelle Funde [40]
- 2738** *Coleophora pappiferella* HOFMANN, 1869  
 RP: Bornich, leg. FUCHS (Coll. HEINITZ) [56]
- 2739** *Coleophora filaginella* FUCHS, 1881  
 SN: Burg bei Hoyerswerda [55]
- 2742** *Coleophora absinthii* HEINEMANN & WOCHE,  
 1877  
 SN: Aktueller Fund [55]

**2748 Coleophora artemisicoleta BRUAND, 1855**

NW: Erkelenz-Borschemich; Heinsberg-Prummern [7]; BY: Gößweinstein [86]; MV: Aktuelle Funde [40]

**2751 Coleophora deviella ZELLER, 1847**

In der Deutschlandliste existierte nur der Hinweis aus der Europaliste, ohne nähere Angabe.

SH: Mehrere Erstfunde [96]

**2764 Coleophora adelogrammella ZELLER, 1849**

D: BB: Wilhelmshorst bei Potsdam, Coll. ERNST [58]

**2766 Coleophora succursella HERRICH-SCHÄFFER, 1855**

SH: Amrum [96]

**2767 Coleophora gnaphalii ZELLER, 1839**

SH: Büchen [96]

**2772 Coleophora galbulipennella ZELLER, 1839**

RP: Pfalz, Coll. MÖBIUS [56]

**2775 Coleophora scabrida TOLL, 1959**

SH: Kiel; Büchen [96]; NW: Krefeld (Hülser Berg) [29]; BB: Berlin; Jänschwalde-Ost [54]

**2780 Coleophora millefolii ZELLER, 1849**

BY: Truppenübungsplatz Tennenlohe bei Erlangen [86]; SN: Baruth bei Weißenberg [49]

**2786 Coleophora peribenanderi TOLL, 1943**

SH: Kiel; Hamburg [96] NW: Gilsdorf [27]

**2805 Coleophora expressella KLEMENSIEWICZ, 1883**

BB: Jänschwalde-Ost [54]

**2808 Coleophora inulae WOCHE, 1876**

RP: Pfalz, Coll. MÖBIUS [56]

**2829 Coleophora follicularis (VALLOT, 1802)**

SN: Borna [55]

**2837 Coleophora adspersella BENANDER, 1939**

BY: Stadtwald Iphofen [74]

**2845 Coleophora nutantella MÜHLIG & FREY, 1857**

NW: Keldenich [27]

**2848 Coleophora saponariella HEEGER, 1848**

SH: Büchen [96]

**2850 Coleophora paripennella ZELLER, 1839**

TH: Jena [58]

**2854 Coleophora clupeiarella O. HOFMANN, 1871**

MV: Aktuelle Funde [40]

**2857 Coleophora squalorella ZELLER, 1849**

SH: Büchen [96]

**2858 Coleophora salicorniae HEINEMANN & WOCHE, 1877**

SH: Amrum; Sylt (Kampen); Westerhever [96]; ST: Sülldorf [52]

**2861 Coleophora unipunctella ZELLER, 1849**

HE: Frankfurt a. M., Coll. MÖBIUS [56]

**2876 Mompha langiella (HÜBNER, 1796)**

NW: Mönchengladbach; Dormagen [30]; SL: Dreisbach; Michelbach; Illingen [121]; MV: Aktuelle Funde [45]

**2878 Mompha terminella (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)**

SN: Weißiger Busche bei Bautzen (SCHÜTZE 1930); Ottendorf [56]

**2879 Mompha locupletella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Aktuelle Funde [45]

**2880 Mompha raschkiella (ZELLER, 1838)**

MV: Aktuelle Funde [45]

**2883 Mompha conturbatella (HÜBNER, 1819)**

MV: Aktuelle Funde [45]

**2885 Mompha lacteella (STEPHENS, 1834)**

MV: Aktuelle Funde [45]

**2886 Mompha propinqua (STAINTON, 1851)**

SL: Nohn [121]; MV: Buchholz; Dorf Mecklenburg [45]

**2887 Mompha divisella HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

MV: Aktuelle Funde [45]

**2890 Mompha sturnipennella (TREITSCHKE, 1833)**

MV: Mehrere Erstfunde [45]

**2892 Mompha epilobiella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Wüstensachsen [110]; BW: NSG Badberg; Schelingen; NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**2898 Blastobasis phycidella (ZELLER, 1839)**

BW: Fundangaben bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Büchsenberg: Achkarren [22]

**2899 Blastobasis huemeri SINEV, 1993**

D: BW: West-Dossenheim bei Heidelberg, leg. TRABOLD; „Unterer Dossenwald“ bei Friedrichsfeld (Mannheim), leg. HAUSENBLAS [64]

**2912 Hypatopa segnella (ZELLER, 1873)**

BY: (PRÖSE, 2001) [86]

**2937 Oegoconia caradjai POPESCU-GORJ & CAPUŞE, 1965**

(früher meist als *O. quadripuncta* (HAWORTH, 1828) gemeldet)

D: NW: Zahlreiche Erstfunde [14]; Prummern bei Heinsberg; Erkelenz-Borschemich und Mönchengladbach [112]; RP: Zahlreiche Erstfunde [14]; Neustadt/Pfalz; Speyer; Schloßböckelheim [112]; HE: Lorch [14]; BW: Rheinfelden; Heidelberg [112]; NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**2939 Oegoconia deauratella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

RP: Mehrere aktuelle Funde [14]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [112]; SN: Zahlreiche Erstfunde [56]; [112]; TH: Gotha; Jena; Bad Blankenburg [112]

**2939a Oegoconia uralskella (POPESCU-GORJ & CAPUŞE, 1965)**

RP: Mehrere Erstfunde [14]; BW: Markgröningen [112]; SN: Zahlreiche Erstfunde [56]; [112]; ST: Selketal/Harz [112]; TH: Zahlreiche Erstfunde (früher als *O. quadripuncta* (HAWORTH, 1828) fehlbestimmt) [108]; Jena [112]

**2939b Oegoconia novimundi (BUSCK, 1915)**

D: BW: Heidelberg-Kirchheim [112]

**2941 Oegoconia quadripuncta (HAWORTH, 1828)**

Die Meldungen für NW, HE, BY und SL sind ungesichert, die für SN und TH sind zu streichen [112]; RP: Neustadt/Pfalz, Elmstein und Dürkheim [112]; Kloten [24]; BW: Baden-Baden [112]; Alt-Vogtsburg, Badberg [78]; Die Meldungen für SN beruhen auf Verwechslungen mit den beiden vorherigen Arten [56]

**2976 Symmoca signatella HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

HE: Mörfelden [4]; BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); Griesheim (Rheinwald) [4]; Zahlreiche Erstfunde vom Kaiserstuhl [22]

**3054 Pseudatemelia latipennella (JÄCKH, 1959)**

BW: Umgebung Schelklingen: Nordwesthang des Achtals [61]; SN: Spitzkunnersdorf; Belgershain [55]

- 3056 *Pseudatemelia elsae* SVENSSON, 1982**  
BY: Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab: NWR Gscheibte Loh [74];  
SN: Mehrere Erstfunde [55]
- 3062 *Pseudatemelia subochreella* (DOUBLEDAY, 1859)**  
BB: Fläming: Reetzerhütten [50]
- 3069 *Pseudatemelia synchrozella* (JÄCKH, 1959)**  
NW: Wesertal bei Höxter [88]; BY: Lkr. Lorchheim: Gößweinstein [74]
- 3071 *Amphisbatis incongruella* (STAINTON, 1849)**  
SN: Sprey bei Boxberg; „Saxonia, Rachlau, leg. SCHÜTZE, 1905“ (PARENTI, 2000) [49]
- 3095 *Sorhagenia rhamniella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Mölln, Göttin [96]
- 3098 *Sorhagenia lophyrella* (DOUGLAS, 1846)**  
SN: Burg bei Hoyerswerda [56]
- 3104 *Pancalia leuwenhoeckella* (LINNEUS, 1761)**  
BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt; Schelingen, Blattenbuck [78]; BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]
- 3105 *Pancalia schwarziella* (FABRICIUS, 1798)**  
SH: Büchen [96]; BW: Mehrere aktuelle Funde [78]; BB: Die Meldung ist zu streichen, sie bezieht sich auf die nachfolgende Art [50]
- 3106 *Pancalia nodosella* (BRUAND, 1851)**  
D: BB: Neuenhagen/Oderberg (als *P. schwarziella* (FABRICIUS, 1798) gemeldet) [50]
- 3131 *Eteobalea anonymella* (RIEGL, 1965)**  
SN: Die in der Deutschlandliste gemachte Meldung beruhte auf einer Fehlbestimmung, es handelt sich um *E. gronoviella* (SCOPOLI, 1772) [56]; gesicherter Nachweis: Scheibeberg, 3 km nordwestlich von Zittau [58]
- 3132 *Eteobalea intermedia* (RIEGL, 1965)**  
BY: Die Art ist aus der Deutschlandliste zu streichen, die Meldungen von Frauendorf bei Staffelstein [83] sind eine Fehlbestimmung, es handelt sich um *E. anonymella* (RIEGL, 1965) [74]
- 3136 *Eteobalea gronoviella* (SCOPOLI, 1772)**  
SN: Mehrere Erstfunde (früher fälschlich als *E. anonymella* (RIEGL, 1965) gemeldet) [56]
- 3144 *Stagmatophora heydeniella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1833)**  
SL: Universität Saarbrücken [121]
- 3155 *Pyroderces* HERRICH-SCHÄFFER, 1853**
- 3156 *Pyroderces argyrogrammos* (ZELLER, 1847)**  
D: BW: Achkarren (Kaiserstuhl) [5]; NSG Badberg: Schelingen [22]; SL: Hammelsberg bei Perl [121]
- 3165 *Cosmopterix orichalcea* STAINTON, 1861**  
BY: Lkr. Traunstein: Pechschnait [86]
- 3166 *Cosmopterix scribaiella* (ZELLER, 1850)**  
SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]
- 3170 *Cosmopterix lienigiella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**  
BW: NSG zwischen Unteruhldingen und Seefelden am Überlinger See (AMSEL, 1961) [61]
- 3176 *Apatria kinkerella* (SNELLEN, 1876)**  
SH: Insel Sylt [120]
- 3205 *Megacraspedus lanceolellus* (ZELLER, 1850)**  
RP: Mainzer Sand [20]; Callstadt; Mainzer Sand (GROSS, 1964) [61]; BW: Kaiserstuhlgebiet (am Schlossberg bei Achkarren), (MEES, 1907) [61]
- 3210 *Megacraspedus binotella* (DUPONCHEL, 1842)**  
HE: Viernheim [61]; RP: Mainz-Gonsenheim [20]; Grünstadt, Pfalz; Mombach (Mainz) [61]; BW: Geisingen, LK Tuttlingen [61]
- 3227 *Aristotelia decurtella* (HÜBNER, 1813)**  
RP: Loreley (JÄCKH 1942) [20]
- 3228 *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879)**  
D: HE: Lorch (Nollig) [20]; RP: St. Goarshausen (FUCHS, 1899); Klotten/Moseltaal [2]
- 3230 *Aristotelia ericinella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Zahlreiche aktuelle Funde [120]
- 3231 *Aristotelia subdecurtella* STAINTON, 1851**  
BY: Lkr. Donauwörth: NSG Mertinger Höle [86]
- 3237 *Aristotelia brizella* (TREITSCHKE, 1833)**  
NI: Zahlreiche aktuelle Funde [120]
- 3242 *Chrysoesthia drurella* (FABRICIUS, 1775)**  
NW: Zahlreiche Erstfunde [20]; SL: Nohn [121]
- 3243a *Chrysoesthia verrucosa* TOKÁR, 1999**  
= *eppelsheimeri* auct., nec STAUDINGER, 1885: Synonymie begründet von TOKÁR (in ELSNER et al. 1999) [86]
- 3244 *Chrysoesthia sexguttella* (THUNBERG, 1794)**  
NW: Zahlreiche Erstfunde [20]
- 3250 *Xystophora pulveratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**  
BW: Durlach; Turmberg (Durlach), ex coll. REUTTI (REUTTI 1898) [61]
- 3261 *Isophrictis striatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BW: NSG Badberg: Schelingen [22]
- 3264 *Isophrictis anthemidella* (WOCKE, 1871)**  
NI: Pevestorf; Dreilingen [120]; HE: Lorch [20]; SL: Freisen und Wolfersweiler [121]; MV: Umgebung Dassow; Umgebung Pinnow [46]
- 3269 *Metzneria paucipunctella* (ZELLER, 1839)**  
NW: Gelsenkirchen und Warburg (UFFELN 1930) [20]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [20]
- 3271 *Metzneria neuropterella* (ZELLER, 1839)**  
HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Lorch [20]
- 3272 *Metzneria aestivella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Putlos [120]; NI: Neu Darchau; Unterlüß [120]; NW: Erkelenz-Borschemich [20]; RP: Loreley (JÄCKH 1942); Ahrweiler [20]
- 3273 *Metzneria lappella* (LINNAEUS, 1758)**  
HE: Rhoden (UFFELN 1930); Zwergen [20]
- 3280 *Metzneria metzneriella* (STAINTON, 1851)**  
SH: Fehmarn [96]; Putlos [120]; NI: Munster; Kapern [120]
- 3285 *Metzneria aprilella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**  
RP: Mehrere aktuelle Funde [20]
- 3288 *Metzneria santolinella* (AMSEL, 1936)**  
HE: Lorch [20]; RP: Dörscheid [20]
- 3292 *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843)**  
NW: Bad Müntereifel (Eschweiler Tal) [101]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Eberschütz [20]; SN: Baruth bei Weißenberg [56]
- 3295 *Ptocheuusa paupella* (ZELLER, 1847)**  
D: NW: Brühl und Kierberg/Ville [20]
- 3296 *Ptocheuusa inopella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Kiel; Lübeck-Eichholz; Büchen; Mölln [120]; NI: Gartow; Nemitz [120]

**3304 *Psamathocrita osseella* (STAINTON, 1860)**

SN: Ist zu streichen, es handelt sich um eine Fehldetermination von *Monochroa suffusella* (DOUGLAS, 1850) [56]

**3308 *Argolampytes micella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Wiesbaden [20]

***Monochroa parvulata* GOZMÁNY, 1957**

D: RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels) [21]

Die Art fehlt in der Europaliste von KARSHOLT & RAZOWSKI.

**3312 *Monochroa cytisella* (CURTIS, 1837)**

SH: Zahlreiche Erstfunde [96]

**3313 *Monochroa rumicetella* (O. HOFMANN, 1868)**

BY: Günzburg [86]

**3314 *Monochroa sepicolella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

RP: Bornich (FUCHS, 1886); Loreley; Bornich und Moseltal [2]

**3318 *Monochroa servella* (ZELLER, 1839)**

RP: Kastellaun [20]; BW: Alt-Vogtsburg, Badberg [78]; Schwäbische Alb: Schmiechen Halde bei Teuringshofen, Umgebung Schelklingen [61]

**3319 *Monochroa conspersella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

SH: Kiel; Kiel, Meimersdorf [96]; NI: Wietzendorf [120]; NW: Schermbeck [20]; HE: Wiesbaden [20] BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]; MV: Aktuelle Funde [42]

**3320 *Monochroa tetragonella* (STAUDINGER, 1885)**

SH: Insel Sylt bei Puan Klen [120]

**3321 *Monochroa elongella* (HEINEMANN, 1870)**

SH: Hamburg-Finkenwerder; Heiligenhafen [120]; BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**3323 *Monochroa lutulentella* (ZELLER, 1839)**

SH: Hamburg-Finkenwerder, Hamburg-Ohlsdorf; Insel Sylt [120]; NI: Pevestorf; Gummern; Drage [120]; NW: Mehrere Erstfunde [20]; HE: Mörfelden [20]; SL: Büschfeld; Niedaldorf; Nunkirchen [121]; SN: Mittelherwigsdorf, Scheibeberg [49]

**3324 *Monochroa lucidella* (STEPHENS, 1834)**

SH: Sylt: Puan Klen [120]; NW: Dortmund; Oerlinghausen [20]

**3325 *Monochroa divisella* (DOUGLAS, 1850)**

SH: Hamburg: Bahrenfeld Volkspark und Lindthorst [96]; HE: Mörfelden [12]

**3327 *Monochroa palustrella* (DOUGLAS, 1850)**

BY: Aus der bayerischen Fauna gestrichen [86]

**3328 *Monochroa simplicella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

BW: Buchtal südlich von Magolsheim [61]

**3330 *Monochroa arundinetella* (STAINTON, 1858)**

NI: Wietzendorf [120]

**3331 *Monochroa suffusella* (DOUGLAS, 1850)**

SH: Süderlügum; Fischbeker Heide (Hamburg) [120]; NI: Uchte (Moor) [20]; Zahlreiche aktuelle Funde [120]; SN: Mehrere Erstfunde (früher als *Psamathocrita osseella* (STAINTON, 1860) gemeldet) [56]

**3334 *Monochroa hornigi* (STAUDINGER, 1883)**

NI: Am Höhbeck; Forst Weckenstedt [120]; NW: Wahner Heide [21]; RP: Pommernbachtal bei Pommer (Mosel) [21]; BW: zahlreiche Erstfunde [61]

**3335 *Monochroa niphognatha* GOZMÁNY, 1953**

SH: Hofsee Ritzerau [97]; SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]

**3339 *Eulamprotes wilkella* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Mörfelden [20]; RP: Mainz; Bornich und Schloßböckelheim [20]; MV: Aktuelle Funde [40]

**3340 *Eulamprotes superbella* (ZELLER, 1839)**

SH: Büchen [96]

**3344 *Eulamprotes unicolorella* (DUPONCHEL, 1843)**

SL: Perl [20]

**3345 *Eulamprotes atrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Bottenhorn; Haueda [20]; RP: Elzbachtal; Kastellaun [20]; MV: Aktuelle Funde [42]

**3347 *Eulamprotes immaculatella* (DOUGLAS, 1850)**

= *phaeella* HECKFORD & LANGMAID, 1988

Die Synonymie bei HECKFORD et al. (1999) begründet [86]

**3348 *Eulamprotes plumbella* (HEINEMANN, 1870)**

BY: Tennenlohe bei Erlangen [83]

**3349 *Eulamprotes helotella* (STAUDINGER, 1859)**

D: NW: Essen [20]

**3367 *Gladiovalva ruminicivorella* (MILLIÈRE, 1881)**

RP: Bad Münster am Stein und Schloßböckelheim; Oberhausen/Nahe [2]

**3373 *Bryotropha terrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**3374 *Bryotropha desertella* (DOUGLAS, 1850)**

NI: Forst Göhrde; Munster; Leer-Loga [120]; RP: Mainz (Mainzer Sand) [20]

**3378 *Bryotropha boreella* (DOUGLAS, 1851)**

NI: Westharz (KARSHOLT, 1995); Oderbrück/Westharz (HARTWIEG, 1958), in der Deutschlandliste fehlend [120]; NW: Mehrere Erstfunde [20]

**3379 *Bryotropha galbanella* (ZELLER, 1839)**

SH: Umgebung Kiel [120]; HE: Martinsthal Rechtebachtal) [20]; MV: Friedrichsmoor bei Schwerin [46]

**3380 *Bryotropha plantariella* (TENGSTRÖM, 1848)**

SH: Mölln [96]; MV: Aktueller Fund [46]

**3383 *Bryotropha domestica* (HAWORTH, 1828)**

BY: Lkr. Passau: Obernzell/Hanzing, Untergriesbach [85]

**3384 *Bryotropha senectella* (ZELLER, 1839)**

HE: Hörlé [20]; SL: Siersburg (NSG Gauberg); Fechingen (NSG Birzberg) [121]; Freisen, Nohfelden und Nohn [20]

**3386 *Bryotropha similis* (STAINTON, 1854)**

RP: Mehrere Erstfunde [20]; SL: Nunkirchen [121]

**3387 *Bryotropha umbrosella* (ZELLER, 1839)**

SH: Insel Sylt [120]; NI: Zahlreiche aktuelle Funde [120]; BY: Ist zu streichen, alle bisher überprüften Meldungen für BY erwiesen sich als Fehlbestimmungen [86]

**3389 *Bryotropha affinis* (HAWORTH, 1828)**

HE: Wiesbaden [20]

**3390 *Bryotropha basaltinella* (ZELLER, 1839)**

SN: Insel Sylt: bei Morsum [120]; NI: Zahlreiche Erstfunde [120]; HE: Bottenhorst und Lorch [20]; RP: Mehrere Erstfunde [20]; MV: Mehrere Erstfunde [46]

**3399 *Recurvaria nanella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BW: NSG Badberg: Schelingen [22]

**3400 *Recurvaria leucatella* (CLERCK, 1759)**

HE: Eberschütz; Liebenau [6]

**3402 *Coleotechnites piceaella* (KEARFOTT, 1903)**

RP: Schloßböckelheim [26]

**3404 *Exoteleia dodecella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**3407b *Stenolechoides pseudogemmellus* ELSNER, 1995**

NI: Mehrere Erstfunde [120]; NW: Mehrere Erstfunde [6]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Mörfelden [6]; RP: Loreley (JÄCKH 1942); mehrere aktuelle Funde [6]; BW: Achkarren (Kaiserstuhl) [5]; SL: Siersburg (NSG Gauberg) [121]; SN: Großes Fürstenholz bei Borna [49]

**3410 *Parachronistis albiceps* (ZELLER, 1839)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [6]

**3414 *Teleiodes* SATTLER, 1860**

Nach HUEMER & KARSHOLT (1999) sind die folgenden Arten der Deutschlandliste aus der Gattung *Teleiodes* in zwei andere Gattungen zu stellen:

In *Carpatolechia* CAPUSE, 1964:

*decorella* (HAWORTH, 1812) [Nr. 3424]; *fugacella* (ZELLER, 1839) [Nr. 3426]; *fugitivella* (ZELLER, 1839) [Nr. 3427]; *alburnella* (ZELLER, 1839) [Nr. 3428]; *notatella* (HÜBNER, [1813]) [Nr. 3429]; *proximella* (HÜBNER, 1796) [Nr. 3430]; *aenigma* SATTLER, 1983 [Nr. 3433];

In *Pseudotelphusa* JANSE, 1958:*paripunctella* (THUNBERG, 1794) [Nr. 3432] [86]**3415 *Teleiodes vulgella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Langenthal [6]

**3419 *Teleiodes luculella* (HÜBNER, 1813)**

HE: Karlshafen [6]

**3420 *Teleiodes flavimaculella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

NI: Neuhoef [120]; BB: Jänschwalde-Ost [50]

**3431 *Teleiodes wagae* (NOWICKI, 1860)**

SN: Dubring; Ostrau [56]

**3434 *Teleiodes sequax* (HAWORTH, 1828)**

RP: Berndorf [27]

**3424 *Carpatolechia decorella* (HAWORTH, 1812)**

SH: Umgebung Hamburg (SORHAGEN, 1886, als *humeralis* ZELLER), in der Deutschlandliste fehlend [120] NW: Mehrere Erstfunde [6]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [6]

**3426 *Carpatolechia fugacella* (ZELLER, 1839)**

NW: Bonn; Büren; Essen-Altenessen [6]; RP: Dörscheid [26];

BW: Literaturangaben bei REUTLI (1898), LINACK (1955), SÜSSNER (1979) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Büchesenberg: Achkarren; NSG Rheinhalde: Burkheim [22] SN: Kreis Bautzen: Pließkowitz [57]

**3429 *Carpatolechia notatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: Klotten (Fahlberg) [10]

**3430 *Carpatolechia proximella* (HÜBNER, 1796)**

HE: NSG Stirnberg, Hohe Rhön; NSG Rotes Moor [110]

**3433 *Carpatolechia aenigma* (SATTLER, 1983)**

RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels) [21]

**3448 *Teleiopsis diffinis* (HAWORTH, 1828)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Lorch (Nollig) [6]; SL: Dreisbach; Limbach; Differden [121]

**3451 *Teleiopsis rosalabella* (FOLOGNE, 1862)**

BY: Lkr. Kelheim: Oberndorf bei Bad Abbach [86]

**3453 *Pseudotelphusa scalella* (SCOPOLI, 1763)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Rüsselsheim; Willmenrod [6]

**3432 *Pseudotelphusa paripunctella* (THUNBERG, 1794)**

RP: Serrig [6]

**3458 *Xenolechia aethiops* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)**

NI: Zahlreiche aktuelle Funde [120]

**3461 *Altenia scriptella* (HÜBNER, 1796)**

RP: Klotten (Fahlberg) [10]; SL: Saarhölzbach [121]; SN: Mehrere aktuelle Funde [56]

**3469 *Gelechia rhombella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Lorchhausen [13]

**3471 *Gelechia senticetella* (STAUDINGER, 1859)**

NI: Leer/Ostfriesland [13]; NW: Linnich; Velbert-Langenberg [13]; BB: Berlin-Marienfelde [50]; SN: Ostritz [55]

**3472 *Gelechia sabinella* ZELLER, 1839**

SL: Limbach (NSG Limbacher Düne) [121]

**3474 *Gelechia sororculella* (HÜBNER, 1817)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [13]

**3476 *Gelechia basipunctella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

NW: Olfen [13]

**3477 *Gelechia muscosella* ZELLER, 1839**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Bottendorf [13]; MV: Aktuelle Funde [42]

**3478 *Gelechia cuneatella* DOUGLAS, 1853**

NI: Gummern [120]

**3481 *Gelechia hippophaella* (SCHRANK, 1802)**

SH: Mehrere aktuelle Funde [120]

**3482 *Gelechia nigra* (HAWORTH, 1828)**

SH: Hamburg-Neugraben [120]; NI: Laase; Trauen; Wietzendorf [120]; NW: Lippoltshausen; Wahner Heide [13]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [13]

**3483 *Gelechia turpella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SH: Hamburg-Finkenwerder [120]; NI: Landkreis Leer: Mehrere aktuelle Funde [120]; NW: Zahlreiche Erstfunde; (UFFELN 1930) [13]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [13]; RP: Kaub (JÄCKH 1942) [13]; SL: Gdingen (1914), [121]

**3484 *Gelechia rhombelliformis* STAUDINGER, 1871**

SH: Hamburg; Bahrenfeld und Boberg [96]

**3486 *Gelechia sestertiella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

SH: Hamburg-Wellingbüttel; Hamburg-Rothenbaum [120]; RP: Bad Münster am Stein [26]; ST: Altmark [66]

**3490 *Psoricoptera speciosella* TEICH, 1893 nicht: TEICH, 1892 [86]****3491 *Psoricoptera gibbosella* (ZELLER, 1839)**

NW: Zahlreiche Erstfunde (UFFELN 1930) [13]

**3495 *Mirificarma maculatella* (HÜBNER, 1796)**

SL: Perl [121]; SN: Die Meldung ist zu streichen, sie beruhte auf einer Fehldetermination von *T. vulgella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [56]

**3498 *Mirificarma eburnella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NW: Zorn [13]; BY: Die Meldung ist zu streichen [86]; SL: Fechingen (Wintringer Hof) (1914) [121]

**3500 *Mirificarma lentiginosella* (ZELLER, 1839)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Tringenstein [13]

**3503 *Mirificarma interrupta* (CURTIS, 1827)**

SH: Hamburg; Hamburg (Rissen) [96]; Putlos; Büchen [120];

NI: Mehrere aktuelle Funde [120]; NW: Mehrere Erstfunde [13]; Gildorf [27]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Wiesbaden-Biebrich [13]

**3507 *Mirificarma mulinella* (ZELLER, 1839)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Lorch [13]; RP: Mehrere aktuelle Funde [13]

**3510 *Chionodes tragicella* (HEYDEN, 1865)**

RP: bei Bornich (Odinsnack) [21]

**3517 *Chionodes continua* (ZELLER, 1839)**

SH: Insel Sylt: Puan Klen und Listland [120]; NI: Inzmühlen; Munster [120]

**3520 *Chionodes distinctella* (ZELLER, 1839)**

NW: Zahlreiche Erstfunde [13]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [13]; SL: Fechingen (NSG Birzberg); Differnen (NSG Eulenmühle) [121]

**3524 *Chionodes electella* (ZELLER, 1839)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881); Tringenstein [13]

**3527 *Chionodes fumatella* (DOUGLAS, 1850)**

RP: Bornich [13]

**3528 *Chionodes ignorantella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854**

BW: Die Meldung von REUTTI (1898) für Karlsruhe wurde von MEES (1907) korrigiert, die Überprüfung der Falter konnte das bestätigen, es handelt sich um *Neofriseria peliella* (TREITSCHKE, 1835) [61]

**3537 *Filatima incomptella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]

**3545 *Neofriseria peliella* (TREITSCHKE, 1835)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**3546 *Neofriseria singula* (STAUDINGER, 1867)**

SH: Gudow; Büchen [96]; Hamburg; Insel Sylt: Listland; Güster; Putlos [120]; NI: Inzmühlen; Radbruch; Rodehorst; Kohlenbissen [120]

**3549 *Prolita sexpunctella* (FABRICIUS, 1794)**

SH: Insel Sylt; Hamburg-Neugraben [120]; NI: Mehrere aktuelle Funde [120]; NW: Dahlerbrück; Sinsen (UFFELN 1930) [13]; Hochsauerland: bei Niedersfeld [92]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [13]; SN: Neustadt/Spree, Neustädter Heide [58]

**3550 *Prolita solutella* (ZELLER, 1839)**

SH: Hamburg, mehrere Fundorte [120]; NW: Mehrere Erstfunde [13]

**3553 *Athrips pruinosa* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

SH: Insel Sylt; Lehmrade [120]; NI: Wietzendorf; Forst Lucie [120]; SN: Neustädter Heide und Klitten [58]

**3554 *Athrips rancidella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

RP: Mehrere Erstfunde [13]; BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; SL: Wolfersweiler (Flachshübel) [121]

**3559 *Athrips mouffetella* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Eberschütz [13]

**3565 *Gnorimoschema bodillum* KARSHOLT & NIELSEN, 1974**

SH: Insel Sylt: Listland [120]

**3566 *Gnorimoschema herbichii* (NOWICKI, 1864)**

SH: Hamburg (Finkenwerder) [96]

**3580 *Scrobipalpa acuminatella* (SIRCOM, 1850)**

NW: Düren und Marmagen [27]; MV: Aktuelle Funde [42]

**3584 *Scrobipalpa artemisiella* (TREITSCHKE, 1833)**

SH: Insel Sylt: Listland und Puan Klen [120]; NI: Gartow [120]; SL: Perl (NSG Hammelsberg) [121]

**3585 *Scrobipalpa atriplicella* (FISCHER VON RÖSSLER-STAMM, 1841)**

BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**3591 *Scrobipalpa clintoni* POVOLNÝ, 1968**

NI: Duhnen [120]

**3605 *Scrobipalpa halonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

BW: Bei STEUDEL & HOFMANN (1882) und bei WÖRZ (1954) werden Funde dieser Art (unter *Lita pauperella* bzw. *Lita halonella f. pauperella*) genannt. Die Überprüfung der Falter zeigte, dass es sich um drei verschiedene andere Arten handelt: *Bryotrophia terrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *B. senectella* (ZELLER, 1839), *Scrobipalpa acuminatella* (SIRCOM, 1850). Damit ist die Art aus der Deutschlandliste zu streichen [61]

**3609 *Scrobipalpa instabilella* (DOUGLAS, 1846)**

SH: Mehrere aktuelle Funde [120]

**3616 *Scrobipalpa nitentella* (FUCHS, 1902)**

NI: Stadt Emden [120]; BW: Bei der Meldung von WÖRZ (1954): Stuttgart/Feuerbach, leg. CALMBACH handelt es sich um *Scrobipalpa obsoletella* (FISCHER VON RÖSSLER-STAMM, 1841), die Art ist für BW zu streichen [61]; BB: Rietzer See (Salzstelle) [51]; TH: Artern (Salzstelle) [53]

**3619 *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD, 1859)**

RP: Klotten(Moseltal) [23]; SN: Großhennersdorf, Langer Berg [58]

**3620 *Scrobipalpa klimeschi* POVOLNÝ, 1967**

Nach ELSNER et al., (1999) ist der bisher als gültig angesehene Name *pauperella* ein nomen dubium und daher nicht verfügbar [86]

Herr KARSHOLT (i.l.) wies mich darauf hin, dass diese Feststellung korrigiert werden muss (HUEMER & KARSHOLT, im Druck).

**3623 *Scrobipalpa proclivella* (FUCHS, 1886)**

MV: Mehrere Erstfunde [46]

**3628 *Scrobipalpa salinella* (ZELLER, 1847)**

SH: Insel Helgoland; Insel Sylt: Puan Klen [120]; HE: Wüstsachsen [110]; TH: Artern (Salzstelle) [53]

**3629 *Scrobipalpa samadensis* (PFAFFENZELLER, 1870)**

SH: Insel Sylt: Puan Klen; Beltringharder Koog; Westerhever [120]; ST: Hecklingen [52]

**3632 *Scrobipalpa stangei* (E. HERING, 1889)**

SH: Insel Sylt: Puan Klen [120]

**3633 *Scrobipalpa suadella* (RICHARDSON, 1893)**

TH: Die Meldung Rögebiet bei Zeigerheim [108] beruht auf einer Fehldetermination [53]

**3644 *Scrobipalpa psilella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

MV: Umgebung Ventschow; Umgebung Pinnow [46]

**3646a *Scrobipalpula tussilaginis* (FREY, 1867)**

SN: Niederoderwitz, Zittauer Gebirge: Lückendorf, Görlitz: Lönsscher Grund [56]

**3648 *Phthorimea operculella* (ZELLER, 1873)**

NI: Leer-Loga [120]; NW: Velbert-Langenberg [8]; TH: Watzdorf [108]

**3660 *Ephysteris inustella* (ZELLER, 1847)**

RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels) [21]

**3669 *Cosmardia moritzella* (HÜBNER, 1814)**

SH: Büchen; Putlos [120]; NI: Hannover (FUGE et al., 1930), in der Deutschlandliste fehlend; Pevestorf, Höhbeck [120]

**3675 *Klimeschiopsis kiningerella* (DUPONCHEL, 1843)**

RP: Klotten; Bornhofen; Bornich [26]

**3679 *Caryocolum fischerella* (TREITSCHKE, 1833)**

SH: Kiel und Kiel, Stift; Büchen [96]; NI: Wietzendorf [120]; SL: Saarbrücken (Universität) [121]

**3681 *Caryocolum alsinella* (ZELLER, 1868)**

SH: Insel Sylt: Puan Klen und Listland [120]; NI: Wendisch-Evern; Wietzendorf; Schmarbeck [120]

**3689 *Caryocolum petryi* (O. HOFMANN, 1899)**

ST: Steigerthal, Alter Stolberg [58]; TH: Kyffhäuser, Rottleben [58]

**3699 *Caryocolum leucomelanella* (ZELLER, 1839)**

SN: Sprey bei Boxberg [57]

**3702 *Caryocolum marmorea* (HAWORTH, 1828)**

BY: Mülldeponie Nürnberg-Süd [74]; SN: Aktuelle Funde [55]

**3708 *Caryocolum fraternella* (DOUGLAS, 1851)**

RP: Büdesheim und Gerolstein [27]; SL: Nunkirchen; Fechingen (NSG Birzberg); Orscholz (Cloef) [121]

**3716 *Caryocolum blandulella* (TUTT, 1887)**

SH: Büchen [96]; Insel Sylt: Listland und Puan Klen [120]; NI: Pevestorf; Höhbeck [120]

**3718 *Caryocolum tricolorella* (HAWORTH, 1812)**

NW: Ergste (Elsebachtal); NSG Sistig-Krekeler Heide (Nord-eifel) [21]

**3721 *Caryocolum cassella* (WALKER, 1864)**

SH: Forst Schierensee/RD [60]; MV: Friedrichsmoor bei Schwerin [46]

**3724 *Caryocolum huebneri* (HAWORTH, 1828)**

SH: Ostholstein [120]

**3725 *Caryocolum kroesmanniella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

SH: Kiel; Mölln [96]; SL: Nunkirchen; Perl (Hammelsberg) [121]; SN: Belgershain; Schafberg bei Baruth; NSG Rotstein bei Bischofedorf [58]

**3754 *Sophronia ascalis* GOZMÁNY, 1951**

D: TH: „Kessel“ bei Großgörlitz [108]

**3756 *Sophronia chilonella* (TREITSCHKE, 1833)**

RP: Klotten [17]

**3757 *Sophronia humerella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NW: Marsberg [17]; RP: Mayschoß [17]; MV: Umgebung Ventschow [46]

**3771 *Stomopteryx remissella* (ZELLER, 1847)**

HE: Lorch [17]; BW: NSG Rheinhalde: Burkheim; NSG Badberg; Schelingen [22]; SL: Perl [121]

**3776 *Syncopacma patruella* (MANN, 1857)**

NW: Kall/Eifel: Sötenich [103]; HE: Zwergen [17]; RP: Schloßböckelheim [26]; SL: Nunkirchen [121]

**3777 *Syncopacma coronillella* (TREITSCHKE, 1833)**

SN: Königsbrück [56]

**3779 *Syncopacma sangiella* (STAINTON, 1863)**

RP: Bad Münster am Stein [21]; BW: Die Meldung bei Wörz (1955) bezieht sich auf *Eulamprotes atrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), die Angaben von REUTTI (1898) konnten nicht verifiziert werden. Bis zum Vorliegen gesicherter Nachweise ist die Art für BW zu streichen [61]; SN: Boxberg, Tagebaugelände [49]

**3780 *Syncopacma cinctella* (CLERCK, 1759)**

SH: Kiel; Mölln, Schmilau; Büchen [96]; BW: Nur einige der bei STEUDEL & HOFMANN (1882), WÖRZ (1955) und REUTTI (1898) genannten Funde beziehen sich auf diese Art. Aktuelle Nachweise: Federeé-Moor; Schwäbische Alb: Schmiechtal; Umgebung Hütten und Teuringshofen [61]; SN: Boxberg, Tagebaugelände [49]

**3781 *Syncopacma larseniella* GOZMÁNY, 1957**

BW: Bei WÖRZ (1955) unter *Anacampsis vorticella* oder *A. vorticella v. ligulella* (jetzt: *S. cinctella*): Murrhardt; Eriskirch; Degerloch (Stuttgart) [61]; MV: Aktuelle Funde [40]

**3782 *Syncopacma wormiella* (WOLF, 1958)**

HE: Trendelburg; Zwergen [17]; BW: Wental (Bartholomä); Schwäb. Alb: Weilheim/Teck [61]

**3784 *Syncopacma ochrofasciella* (TOLL, 1936)**

BW: Schelklingen; Eichelberg (Bruchsal), coll. REUTTI; Schwäbischer Jura, Bosler; Altsteußlingen; [61]; SN: Scheibeberg, 3 km nordwestlich von Zittau [58]

**3785 *Syncopacma taeniolella* (ZELLER, 1839)**

SN: Hainewalde bei Zittau [49]

**3787 *Syncopacma albifrontella* (HEINEMANN, 1870)**

BY: Allacher Wald, Stadtkreis München; in der f. *ignobilisella* HEINEMANN, 1870 Neufund für BY [85]

**3788 *Syncopacma cincticulella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

BW: Die bei WÖRZ (1955) genannten Falter gehören zu *S. albifrontella* (HEINEMANN, 1870). Zwei Falter in der Sammlung REUTTI, wahrscheinlich aus Lahr, gehören hierher. [61]; BY: Mehrere aktuelle Funde [86]

**3789 *Syncopacma vinella* (BANKES, 1898)**

BW: NSG Badberg: Schelingen [22]; Schelingen, Degenmatt [78]; Zahlreiche aktuelle Funde von der Schwäbischen Alb [61]

**3792 *Syncopacma albipalpella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)**

BW: Die bei WÖRZ (1955) genannten Falter erwiesen sich als zu *Aproaerema anthyllidella* (HÜBNER, 1813) gehörig, die Falter, die bei STEUDEL & HOFMANN (1882) und bei REUTTI (1898) genannt sind, sind nicht mehr auffindbar. Die Meldung für BW muss aus der Deutschlandliste gestrichen werden. [61]

**3793 *Syncopacma sueciella* (WOLFF, 1958)**

BW: Wertheim, coll. REUTTI. Bei REUTTI (1898) unter dem Namen *Anacampsis cincticulella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) aufgeführt. [61]

**3794 *Syncopacma captivella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

SH: Mölln [96]; BW: Grünwinkel (Karlsruhe), coll. REUTTI [61]

**3798 *Aproaerema anthyllidella* (HÜBNER, 1813)**

BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; Schelingen, Degenmatt [78]

**3800 *Iwaruna biguttella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

BW: Die in der Literatur (WÖRZ 1955; REUTTI 1898) genannten Falter erwiesen sich als *Aproaerema anthyllidella* (HÜBNER, 1813) bzw. *Syncopacma coronillella* (TREITSCHKE, 1833), die Angabe bei LINACK (1955) konnte bisher nicht überprüft werden.. Es wird auch hier von einer Fehlbestimmung ausgegangen, die Art ist aus der Deutschlandliste zu streichen. [61]

**3805 *Anacampsis blattariella* (HÜBNER, 1796)**

NW: Zahlreiche Erstfunde [17]; HE: Bottenborn; Mörfelden [17]; MV: Aktuelle Funde [40]; SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]

**3806 *Anacampsis timidella* (WOCKE, 1887)**

BW: NSG Büchsenberg: Achkarren [22]; SL: Perl [17]

**3807 *Anacampsis scintillella* (FISCHER VON RÖSSLER-STAMM, 1841)**

RP: Mainz (RÖSSLER 1881); Loreley; Bornhofen [17]; SL: Perl [17]

**3808 *Anacampsis temerella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

SH: Löwenstedter Heide; Lütjenholm; Schwansmoor [120]; NI: Höhbeck [120]

**3812 *Anacampsis obscurella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [17]; RP: Loreley (JÄCKH 1942) [17]; SL: Perl [121]

**3816 *Mesophleps silacella* (HÜBNER, 1796)**

HE: Lorch; Rhoden (UFFELN 1930) [17]

**3822 *Anarsia lineatella* (ZELLER, 1839)**

SH: Hamburg-Pölseldorf [120]; HE: Zwergen [17]; RP: Elzbachtal; Irrel [17]

**3823 *Anarsia spartiella* (SCHRANK, 1802)**

SH: Hamburg-Neugraben [120]; NI: Niederöhe; Unterlüß bei Dreilingen [120]; SN: Bernbruch; Biehla; Dauban [56]

**3827 *Hypatima rhomboidella* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Langenthal; Mörfelden und Wiesbaden [17]; RP: Eller/Mosel und Weiler/Binger Wald; Klotten [17]

**3829 *Nothris verbascella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SH: Lübeck-Dummersdorf; Büchen; Lilienthal bei Kiel [120]; NI: Mehrere aktuelle Funde [120]; RP: Mainz, Moselkern und Schloßböckelheim [17]; ST: Altmark [66]

**3831 *Nothris lemniscella* (ZELLER, 1839)**

SL: Perl [17]

**3833 *Neofaculta ericotella* (GEYER, 1832)**

HE: Mehrere Erstfunde (RÖSSLER 1881); (UFFELN 1930) [17]; MV: Aktuelle Funde [40]

**3834 *Neofaculta infernella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

NW: Horn, Schloß Holte und Senne [17]; HE: Wiesbaden [17]; RP: Weiler/Binger Wald; Morbach [17]; SN: Zittauer Gebirge; Lausche und Hochwald; Schleife bei Weißwasser [56]

**3848 *Dichomeris juniperella* (LINNAEUS, 1761)**

BY: Lkr. Bad Tölz-Wolfrathshausen: Ascholdinger Au [85]

**3849 *Dichomeris marginella* (FABRICIUS, 1781)**

HE: Eberschütz [17]

**3850 *Dichomeris ustalella* (FABRICIUS, 1794)**

NI: Forst Bennenstedt [120]; NW: Bonn (Kottenforst) [17]; SL: Saarhölzbach [17]; SN: Belgershain; Herrnhuth, NSG Hengstberg [49]

**3851 *Dichomeris derasella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Karlshafen [17]

**3852 *Dichomeris limosella* (SCHLÄGER, 1849)**

BY: Mehrere aktuelle Funde [86]

**3857 *Dichomeris alacella* (ZELLER, 1839)**

NI: Pevestorf [120]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [17]

**3858 *Acanthophila latipennella* (REBEL, 1937)**

SN: Ostritz [55]

**3862 *Brachmia dimidiella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NI: Mehrere aktuelle Funde [120]; MV: NSG Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf [82]

**3863 *Brachmia blandella* (FABRICIUS, 1798)**

SH: Mehrere aktuelle Funde [120]; NI: Mehrere aktuelle Funde [120]; HE: Mörfelden und Wiesbaden [17]

**3865 *Brachmia inornatella* (DOUGLAS, 1850)**

NW: Mehrere Erstfunde [17]; HE: Mörfelden [17]; BB: Jänschwalde-Ost [58]

**3867 *Helcystogramma lineolella* (ZELLER, 1839)**

NI: Dreilingen [120]; SN: Mehrere aktuelle Funde [56]

**3868 *Helcystogramma triannulella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

HE: Wiesbaden [17]; RP: St. Goarshausen (JÄCKH 1942); Lohrely [17]; BW: NSG Büchsenberg: Achkarren; NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; SN: Sprey bei Boxberg [49]

**3869 *Helcystogramma lutatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

HE: Lorch; Eberschütz; Bottenborn [17]; BW: Schelingen, Degennatt [78]; SL: Friesen; Perl; Merchingen [121]; MV: Aktuelle Funde [40]

**3870 *Helcystogramma rufescens* (HAWORTH, 1828)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**3874 *Acompsia cinarella* (CLERCK, 1759)**

HE: Wiesbaden; Zwergen [17]

**3883 *Telephila schmidtiellus* (HEYDEN, 1848)**

NW: Marsberg [17]

**3888 *Pexicopia malvella* (HÜBNER, 1805)**

SH: Putlos [120]; NW: Mehrere Erstfunde [17]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881) [17]; BW: NSG Rheinhalde: Burkheim; NSG Badberg: Schelingen [22]; SN: Weissenberg, NSG Gröditzer Skala [57]

**3890 *Platyedra subcinerea* (HAWORTH, 1828)**

NI: Boltensen; Mariensee bei Neustadt [120]; NW: Schwalmtal [17]; RP: Cochem; Klotten [17]; SL: Kesslingen [121]

**3893 *Sititroga cereella* (OLIVIER, 1789)**

SL: Perl [17]; SN: Mittelherwigsdorf bei Zittau [56]

**3896 *Thiotricha subocellea* (STEPHENS, 1834)**

HE: Hörl/Volkmarsen [17]

**4187 *Phtheochroa inopiana* (HAWORTH, 1811)**

BW: NSG Badberg: Schelingen [22]

**4191 *Phtheochroa pulvillana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Kapern [116]; MV: Umgebung Pinnow [46]

**4193 *Phtheochroa sodaliana* (HAWORTH, 1811)**

RP: Klotten (Fahlberg) [101]; MV: NSG Hellberge bei Hohenziertitz [38]; Ventschow [57]

**4221 *Cochylimorpha hilarana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

SH: Mölln (Laubg.); Büchen [96]

**4237 *Cochylimorpha woliniiana* (SCHLEICH, 1868)**

NW: Drachenfels bei Königswinter [92]; ST: Altmark [66]

**4247 *Cochylimorpha straminea* (HAWORTH, 1811)**

NW: Niederrheinische Bucht; Eifel [92]

**4251 *Cochylimorpha alternana* (STEPHENS, 1834)**

SH: Putlos [117]; SN: Schon von STARKE (1942) aus Bautzen gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend; Boxberg, Tagebau-Gelände [49]

**4253 *Phalonidia gilvicomana* (ZELLER, 1847)**

SH: Putlos/Ostseeküste [116]; NW: Umgebung Eitorf/Sieg [92]; RP: Klotten [31]

**4254 *Phalonidia curvistrigana* (STAINTON, 1859)**

RP: Pfalz, Coll. MÖBIUS [57]

**4255 *Phalonidia mannianna* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1839)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4256 *Phalonidia affinitana* (DOUGLAS, 1846)**

ST: Sülldorf; Teutschenthal [52]; TH: Artern [57]; Artern (Salzstelle) [53]

**4263 *Gynnidiomorpha vectisana* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)**BY: Ist für BY zu streichen, da die Art ausschließlich halobiont ist, und die wenigen Nachweise keine Salzstellen betreffen. Prüfungen von Material ergaben immer *G. alismana* (RAGONOT,

1888). [86]; BB: Rietzer See (Salzstelle) [32]; [51]; ST: Hecklingen [52]; TH: Auleben (RAPP, 1936); Artern (Salzstelle) [53]

**4265 Gynnidiomorpha permixtana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BB: Berlin und Havelland (SORHAGEN, 1886); Potsdam; Berlin (AMSEL, 1930) [32]; Potsdam, Großer Ravensberg [57]; SN: Bautzen, Coll. STARKE [57]

**4266 Gynnidiomorpha alismana (RAGONOT, 1883)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]; MV: Buchholz bei Rubow [38]

**4268 Agapeta hamana (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; Ventschow [57]

**4271 Agapeta zoegana (LINNAEUS, 1767)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4277 Fulvoclytis nerminae KOCAK, 1982**

SN: O-Erzgebirge, Bärenstein; Chemnitz [57]

**4280 Eugnosta hydrargyrana parreyssiana (DUPONCHEL, 1843)**

RP: Pfalz, Coll. STARKE; Coll. MÖBIUS [57]

**4286 Eupoecilia cebiana (HÜBNER, 1813)**

NI: Gorleben [117]; MV: Aktuelle Funde [46]

**4294 Aethes hartmanniana (CLERCK, 1759)**

SH: Putlos [117]

**4296 Aethes williana (BRAHM, 1791)**

BB: Die Meldung von SORHAGEN (1886) konnte bisher nicht bestätigt werden [32]; SN: Rötha [49]

**4303 Aethes margaritana (HAWORTH, 1811)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4306 Aethes triangulana (TREITSCHKE, 1835)**

BB: Havelniederung bei Ferchesar [32]; SN: Umgebung Schkeuditz, Aue von Weißer Elster und Luppe [69]

**4308 Aethes rutilana (HÜBNER, 1817)**

SN: Neudorf und Bautzen, Coll. STARKE [57]

**4310 Aethes tesserana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SN: Rötha, Stöhnaer Becken [58]

**4315 Aethes flagellana (DUPONCHEL, 1836)**

NI: Gartow [117]

**4317 Aethes beatricella (WALSINGHAM, 1898)**

SH: Amrum [96]; RP: Dörscheid [3]

**4321 Aethes francillana (FABRICIUS, 1894)**

MV: Trockenrasen bei Ventschow [38]

**4326 Aethes cnicana (WESTWOOD, 1854)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4327 Aethes rubigana (TREITSCHKE, 1830)**

BB: Berlin; Rathenow; Lebus; Oderberg [32]

**4331 Aethes kindermanniana (TREITSCHKE, 1830)**

NI: Vietze [117]

**4334 Cochylidia rupicola (CURTIS, 1834)**

MV: Umgebung Pinnow [46]; BB: Finkenkrug bei Berlin [57]; SN: Kreis Kamenz: Zeißholz [56]

**4347 Cochylis nana (HAWORTH, 1811)**

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4348 Cochylis roseana (HAWORTH, 1811)**

BB: Rüdersdorf (AMSEL, 1930) [32]

**4349 Cochylis flavigiliana (WESTWOOD, 1854)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4355 Cochylis atricapitana (STEPHENS, 1852)**

BW: Mehrere aktuelle Funde [78]; BB: Neuruppin [32]; MV: Umgebung Schwerin; Umgebung Pinnow [46]; SN: Schafberg bei Baruth; Hochhalde bei Boxberg; Königswartha; Uhyst/Spree [58]

**4368 Spatalistis bifasciana (HÜBNER, 1787)**

MV: Umgebung Cambis; Umgebung Ventschow [46]; SN: Mortka bei Hoyerswerda [56]

**4375 Acleris forskaleana (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4378 Acleris comariana (LIENIG & ZELLER, 1846)**

MV: Dalberg; Schwerin [38]

**4380 Acleris abietana (HÜBNER, 1822)**

MV: Ludwigsluster Heide [38]

**4382 Acleris macrina (TREITSCHKE, 1835)**

BB: Jänschwalde-Ost [49]

**4383 Acleris sparsana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4384 Acleris rhombana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Schwerin; Lübtheen [38]

**4385 Acleris emargana (FABRICIUS, 1775)**

= caudana FABRICIUS, 1775; = excavana HAWORTH, 1811 [70]

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4385a Acleris effractana (HÜBNER, 1799)**

= emargana blackmorei OBRAZTSOV, 1963 = stettinensis LERAUT, 2003 [70]

D: SH: Kiel, Meimersdorfer Moor [97]; NI: Braunschweig [70]; MV: Neustrelitz [70]; SN: Bautzen [70]; Alle bisher als emargana bestimmten Falter bedürfen einer erneuten Untersuchung [55]

**4386 Acleris schalleriana (LINNAEUS, 1761)**

MV: Schwerin; Schönberg [38]

**4387 Acleris lorquiniana (DUPONCHEL, 1835)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß Gusborn [116]; SN: Kreis Bautzen: Königswartha [49]

**4388 Acleris umbrana (HÜBNER, 1799)**

BW: NSG Büchsenberg: Achkarren [22]; BB: Umgebung Stadt Brandenburg [32]

**4389 Acleris cristana ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BW: NSG Büchsenberg: Achkarren [22]; SN: Ebersbach [56]

**4391 Acleris aspersana (HÜBNER, 1817)**

RP: Büdesheim und Gerolstein [27]; SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]

**4392 Acleris shepherdana (STEPHENS, 1852)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4394 Acleris hastiana (LINNAEUS, 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4395 Acleris hippophaeana (HEYDEN, 1865)**

RP: Raupenfunde bei Speyer (DISQUÈ, 1900; 1901) [61]; BW: Ragatz und Neuenburg am Rhein werden in der Urbeschreibung genannt; Rheinseln bei Breisach (REUTTI 1898) [61]

**4396 Acleris permutana (DUPONCHEL, 1836)**

NW: Paderborn [47]; Bad Münttereifel [27]; RP: Pfalz, Coll. STARKE [57]

**4397 Acleris hyemana (HAWORTH, 1811)**

SH: Zahlreiche aktuelle Funde [117]

**4398 Acleris scabrana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
BB: Jänschwalde-Ost [32]

**4402 Acleris ferrugana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4403 Acleris notana** (DONOVAN, 1806)  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4405 Acleris kochiella** (GOEZE, 1783)

BW: Zahlreiche Literaturangaben (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Büchsenberg; Achkarren [22]; BY: Lkr. Passau: Obernzell [86]; BB: Eberswalde; Skadow bei Cottbus [32]

**4407 Acleris logiana** (CLERCK, 1759)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4412 Acleris rufana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
In der Deutschlandliste fälschlich „*arufana*“ geschrieben.

**4413 Acleris fimbriana** (THUNBERG & BECKLIN, 1791)

RP: Speyer, Coll. STARKE; der Fundort wird auch bei RAZOWSKI (2001) genannt [57] BW: Altlußheim (südwestlich von Speyer)(DISQUÉ, 1900); Speyer; Grünstadt; Thalhaus (DISQUÉ, 1901); Kaiserstuhl (LINACK, 1955) [61]

**4418 Xerocnephelia rigana** (SODOFFSKY, 1829)

BW: Schelingen, Degenmatt [78]; BB: Offensichtlich verschollen [32]

**4420 Neosphaleroptera nubilana** (HÜBNER, 1799)

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4428 Doloploca punctulana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NI: Pevestorf [117]; NW: Eifel [92]; Bad Münstereifel [27]; RP: Pfalz, Coll. STARKE [57]; SN: Borna [49]; TH: Bad Salzungen [35]; schon bei RAPP (1936) gemeldet: Kyffhäusergebirge: Galgenberg und Erfurt, in der Deutschlandliste fehlend [37]; Jena, Löberschütz [55]

**4443 Eana osseana** (SCOPOLI, 1763)

SH: Krs. Lüchow-Dannenberg; Laase und Gartow [116]; BB: Die Meldung von AMSEL (1930): Potsdam, leg. HINNEBERG, beruht sicherlich auf einer Fehlbestimmung, ist zu streichen [32]

**4450 Eana incanana** (STEPHENSON, 1852)

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4460 Eana cyanescana** (RÉAL, 1953)

D: BY: Lkr. Main-Spessart: Umgebung Karlstadt [87]; TH: Schwarzauer zwischen Bad Blankenburg und Schwarza [108]

**4475 Cnephasia alticola** (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)  
MV: Aktuelle Funde [42]

**4479 Cnephasia pasiuana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

BW: Schelingen, Blattenbuck [78]

**4482 Cnephasia communana** (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Schelingen, Degenmatt [78]

**4493 Cnephasia longana** (HAWORTH, 1811)

SN: Königsbrück [56]

**4504 Cnephasia ecullyana** RÉAL, 1951

BW: Singen am Hohentwiel (SAUTER, 1981) [61]

**4525 Ditula angustiorana** (HAWORTH, 1811)

HE: Offenbach [122]

**4531 Epagoge grotiana** (FABRICIUS, 1781)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4539 Periclepsis cinctana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]

**4549 Philedonides lunana** (THUNBERG, 1784)

SH: Mehrere aktuelle Funde [117]; MV: Pinnow bei Schwerin [38]; SN: Bautzen [56]

**4550 Philedonides rhombicana** (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

D: SN: nördlich Boxberg, Hochhalde [58]

**4555 Archips oporana** (LINNAEUS, 1758)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4556 Archips betulana** (HÜBNER, 1787)

SH: Nordfriesland [115] NI: Bederkesa [115]; MV: Heideflächen bei Lübtheen [38]

**4558 Archips crataegana** (HÜBNER, 1799)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4564 Choristoneura hebenstreitella** (MÜLLER, 1764)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4566 Choristoneura lafauryana** (RAGONOT, 1875)

SH: Zahlreiche aktuelle Funde [116]

**4568 Argyrotaenia ljungiana** (THUNBERG, 1797)

SH: Sylt [117]

**4572 Ptycholomoides aeriferana** (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4574 Ptycholoma lecheana** (LINNAEUS, 1758)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4577 Pandemis cinnamomeana** (TREITSCHKE, 1830)

SN: Eibau; Niederoderwitz [56]

**4578 Pandemis corylana** (FABRICIUS, 1794)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4579 Pandemis cerasana** (HÜBNER, 1786)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4581 Pandemis dumetana** (TREITSCHKE, 1835)

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; SN: Trebendorf bei Schleife; NSG Niederspree [56]

**4590 Lozotaenia forsterana** (FABRICIUS, 1781)

MV: Pinnow bei Schwerin; Wacholderheide bei Karow und Jellen [38]

**4592 Cacoecimorpha pronubana** (HÜBNER, 1799)

SH: Klein Offenseh-Sparrieshoop [97]; NW: Mönchengladbach, verschiedene Stadtteile [106]; HE: Wiesbaden [1]; RP: Pfalz [31]; BW: Krs. Lörrach: Hausen im Wiesental [31]; BB: Berlin-Marienfelde [32]

**4597 Aphelia unitana** (HÜBNER, 1799)

NW: Zahlreiche Erstfunde [92]; [27]; HE: Wüstensachsen [110]

**4604 Aphelia viburnana** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

BW: Schelingen, Degenmatt [78]; BY: Lange Rhön: Großes Moor und Querenburg [86]

**4618 Clepsis rurinana** (LINNAEUS, 1758)

BB: Finkenkrug und Oderberg (AMSEL, 1930); Umgebung Eberswalde [32]; SN: Ottendorf, Großer Tschand [56]

**4623 Clepsis spectrana** (TREITSCHKE, 1830)

BW: Zahlreiche Fundmeldungen bei REUTTI (1898), LINACK (1955), KÖPPEL et al., (1994); Dossenheim bei Heidelberg [61]

**4624 *Clepsis pallidana* (FABRICIUS, 1776)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; SN: Die Meldung: Kreis Bautzen: Spreewiese [56] beruht auf einer Fehldetermination, die Art ist damit nicht für SN bekannt [58]

**4625 *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847)**

D: BW: Verschiedene Stadtteile von Stuttgart [62]

**4628 *Clepsis neglectana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

SH: Büchen [96]

**4629 *Clepsis consimilana* (HÜBNER, 1817)**

MV: Schwerin; Ventschow [38]

**4635 *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830)**

NW: Zahlreiche aktuelle Funde [123]; [67]; NSG Hannepützheide bei Zons am Rhein [77]

**4637 *Adoxophyes orana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4642 *Olindia schumacherana* (FABRICIUS, 1787)**

ST: Harz, Plessenburg [57]

**4644 *Isotrias hybridana* (HÜBNER, 1817)**

SN: Ostrau [57]

**4646 *Isotrias rectifasciana* (HAWORTH, 1811)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4655 *Bactra lancealana* (HÜBNER, 1799)**

HE: Wüstensachsen [110]

**4657 *Bactra lacteana* CARADJA, 1916**

NW: Umgebung Sythen, Umgebung Schermbeck [92]; MV: Umgebung Degtow [42]; Hakensee bei Dassow; Pinnow [46]; SN: Dresden: Dippeldorf und Lössnitz [57]

**4659 *Bactra robustana* (CHRISTOPH, 1872)**

BB: Rietzer See [32]; Rietzer See (Salzstelle) [51]; ST: Sülldorf; Teutschenthal; Hecklingen [52]

**4665 *Endothenia gentianaeana* (HÜBNER, 1799)**

MV: Schwerin [38]

**4666 *Endothenia oblongana* (HAWORTH, 1811)**

NW: Bad Münstereifel [27]; SN: Burg bei Hoyerswerda [57]

**4667 *Endothenia marginana* (HAWORTH, 1811)**

SH: Büchen [96]; BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]; MV: Mecklenburg, Coll. HEINITZ [57]; SN: Dresden: Plauenscher Grund, Pillnitz, Saubachtal, Lössnitz [57]

**4668 *Endothenia pullana* (HAWORTH, 1811)**

BY: Lkr. Günzburg: Leipheim. Die frühere Meldung für BY beruhte auf einer Fehlbestimmung von *Pristerognatha fuligana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) [85]; SN: Bautzen, Coll. STARKE [57]; Gröditz [49]

**4669 *Endothenia ustulana* (HAWORTH, 1811)**

BW: Zahlreiche Erstfunde (Wörz 1952) sowie aktuelle Funde zwischen 1996 - 2005 [61]; MV: Umgebung Bad Kleinen [46]

**4670 *Endothenia lapideana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

BY: NWR Hengstberg [59]; TH: Harz, Sophienhof [57]

**4679 *Eudemis porphyrana* (HÜBNER, 1799)**

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4680 *Eudemis profundana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Wanzeberg bei Malliß [38]

**4688 *Selenodes karelica* (TENGSTRÖM, 1875)**

SH: Krs. Schleswig-Flensburg: Großjörl [115]; HE: Diemeltal [92]

**4690 *Pseudosciaphila branderiana* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4692 *Apotomis semifasciana* (HAWORTH, 1811)**

SL: Braunhausen [121]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4695 *Apotomis infida* (HEINRICH, 1926)**

SH: Westensee: Mühlenbektal und Seeufer bei Ekhöft [96]; NW: Eifel [92]; BW: Oberschwaben (KÖPPEL et al., 1994); weitere Funde zwischen 1998 - 2005 [61]; MV: Küstenwald bei Boltenhagen [38]; SN: Neustadt/Spree, Neustädter Heide [49]

**4697 *Apotomis lineana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

ST: Altmark [66]

**4701 *Apotomis betuletana* (HAWORTH, 1811)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4703 *Apotomis capreana* (HÜBNER, 1817)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4706 *Apotomis sororculana* (ZETTERSTEDT, 1839)**

NW: Mehrere aktuelle Funde [92]; HE: NSG Rotes Moor [110]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4708 *Apotomis sauciana* (FRÖLICH, 1828)**

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4711 *Orthotaenia undulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4716 *Hedya dimidiata* (CLERCK, 1759)**

BB: Berlin und Potsdam (SORHAGEN, 1886); Byhlegurer See; Burg/Spreewald [32]

**4719 *Celypha atropunctana* (ZETTERSTEDT, 1839)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4721 *Celypha rufana* (SCOPOLI, 1763) (fälschlich als Nummer 4728 angegeben)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4722 *Celypha striana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4723 *Celypha rosaceana* (SCHLÄGER, 1847) (fälschlich als Nummer 4725 angegeben)**

MV: Die Meldung aus Ventschow (DEUTSCHMANN, 2002) beruht auf einer Fehlbestimmung und ist zu streichen [46]

**4724 *Celypha rurestrana* (DUPONCHEL, 1843) (fälschlich als Nummer 4727 angegeben)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Gartow [116]

**4728 *Celypha cespitana* (HÜBNER, 1817)**

NW: Mehrere aktuelle Funde [27]; RP: Bremm/Mosel [101]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4729 *Celypha woodiana* (BARRETT, 1882) (fälschlich als 4724 angegeben)**

BW: Sandhausen; Dossenheim bei Heidelberg; Rheinebene zwischen Stollhofen und Schiftung [61]

**4730 *Celypha tielemanniata* (ZELLER, 1845)**

MV: Warnowtal bei Karin [38]; SN: Zittauer Gebirge: Lauschegebiet und Jonsdorf [56]

**4732 *Celypha siderana* (TREITSCHKE, 1835)**

MV: Wanzeberg bei Malliß [38]; SN: Uhyst/Spree [56]

**4733 *Celypha rivulana* (SCOPOLI, 1763)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4734 *Celypha doubledayana* (BARRETT, 1872)**

NW: Die Meldung beruht auf einer Fehlbestimmung, sie ist zu streichen [47]

**4740 *Phiaris umbrosana* (FREYER, 1842)**

MV: Sternberg [38]

**4743 *Phiaris metallicana* (HÜBNER, 1799)**

SH: Süderlügum [117]; MV: Hochmoor bei Gadebusch [38]; SN: Sprey bei Boxberg [55]; ST: Harz: Schierke; Schierke Brocken [57]

**4744 *Phiaris schulziana* (FABRICIUS, 1776)**

RP: Daun-Strohn [101]; MV: Hochmoor bei Grambow [38]

**4746 *Phiaris turfosana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

BW: Literaturangabe bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); Brunnenholzried [22]

**4749 *Phiaris micana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NW: Kirchhundem-Heinsberg [101]; Mehrere aktuelle Funde [27]; RP: Gerolstein-Lissingen [27]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; ST: Harz: Schierke, Schierke - Brocken [57]

**4750 *Phiaris palustrana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

NW: Lemgo [92]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4752 *Argyroploce stibiana* (GUENÉE, 1845)**

BB: Havelland (SORHAGEN, 1886); Rangsdorf bei Berlin (AMSEL, 1930) [32]

**4755 *Phiaris bipunctana* (FABRICIUS, 1794)**

ST: Harz: Schierke, Schierke - Brocken [57]

**4760 *Pristerognatha penthinana* (GUENÉE, 1845)**

NW: Lage-Müssen (SCHULTZ, 1949), in der Deutschlandliste fehlend [47]; Keldenich [27]; HE: Sandberg bei Gersfeld [110]; MV: Aktueller Fund [46]; SN: Mehrere aktuelle Funde [56]

**4761 *Pristerognatha fuligana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SH: Felder Holz/RD [60]; MV: Umgebung Cambs [46]; SN: Zahlreiche Erstfunde, Coll. MÖBIUS; Coll. STARKE [57]; Kreis Kamenz: Bernbruch [49]

**4763 *Cymolomia hartigiana* (SAXESEN, 1840)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4765 *Argyroploce arbutella* (LINNAEUS, 1758)**

NI: Munster-Süd und Bergen [115]; NW: Hochsauerland: bei Niedersfeld [92]; SN: Burg bei Hoyerswerda [56]

**4768 *Argyroploce lediana* (LINNAEUS, 1758)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Gartow und Schlettau [115]; SN: Daubitz: Heidemoor [49]

**4769 *Argyroploce dalecarliana* (GUENÉE, 1845)**

SN: Knappenrode [58]

**4774 *Stictea mygindiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**

NW: Eifel: bei Mützenich [92]; BW: Literaturangaben bei REUTTI (1898) und WÖRZ (1952) (HAUSENBLAS, i. l.); Eintürnerberg (Rotmoos) [22]

**4791 *Lobesia botrana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BW: Mehrere aktuelle Funde [22]; Oberbergen; Schelingen, Degenmatt [78]; SN: Dresden-Lössnitz; Meißen [57]

**4794a *Lobesia virulenta* ssp. *mieana* FALCK & KARSHOLT, 1998**

D: BW: Auendorf (LK Ravensburg); Wental (Bartholomä); Württ. Oberland: Umgebung Bad Waldsee (LK Ravensburg), Steinacher Ried [61]; BY: Höllenthal, Oberfranken, [87]; Bodenwöhrl, NWR Postloher Forst; Niederlamitz [86] TH: Krs. Hildburghausen: Wiedersbach; Kyffhäuser: Rottleben [111]; Bad Blankenburg [108]

**4798 *Lobesia artemisiana* (ZELLER, 1847)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß Gusborn [116]

**4806 *Lobesia littoralis* (WESTWOOD & HUMPHREYS, 1845)**

MV: Schwerin [38]

**4810 *Eriopelta quadrana* (HÜBNER, 1813)**

MV: Pinnow [38]

**4826 *Rhopobota myrtillana* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)**

HE: NSG Rotes Moor [110]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; SN: Zittauer Gebirge: Hochwald; Großdubrau [56]

**4827 *Rhopobota stagnana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Pinnow [38]

**4831 *Spilonota ocellana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4836 *Gibbifera simplana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)**

MV: Umgebung Plate [46]; BB: Zossen; Jänschwalde-Ost [32]

**4838 *Epinotia sordidana* (HÜBNER, 1824)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4839 *Epinotia caprina* (FABRICIUS, 1798)**

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**4840 *Epinotia trigonella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4842 *Epinotia brunnichiana* (LINNAEUS, 1767)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4843 *Epinotia maculana* (FABRICIUS, 1775)**

MV: Schwerin [38]

**4845 *Epinotia abbreviana* (FABRICIUS, 1794)**

MV: Schwerin; Lütheen [38]

**4846 *Epinotia festivana* (HÜBNER, 1799)**

BW: Kaiserstuhl; Kaiserstuhl, Badberg (LINACK, 1955) [61]

**4848 *Epinotia granitana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

HE: Sandberg, Kaskadenschlucht [110]

**4849 *Epinotia signatana* (DOUGLAS, 1845)**

SH: Hofsee Ritzerau [97]; NW: Oberlauf der Ems [92]; BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**4850 *Epinotia cruciana* (LINNAEUS, 1761)**

MV: Boltenhagen [38]; ST: Altmark [66]

**4853 *Epinotia immundana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)**

HE: NSG Stirnberg - Hohe Rhön [110]

**4856 *Epinotia kochiana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

BW: Literaturangaben bei LINACK (1955) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; Schelingen, Degenmatt [78]

**4858 *Epinotia nanana* (TREITSCHKE, 1835)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4864 *Epinotia tetraquetana* (HAWORTH, 1811)**

HE: NSG Stirnberg - Hohe Rhön; Wüstensachsen, Goldbrunner [110]

**4866 *Epinotia pygmaeana* (HÜBNER, 1799)**

MV: Umgebung Ventschow [46]

**4867 *Epinotia subsequana* (HAWORTH, 1811)**

BY: Lkr. Günzburg: Leipheim [85]

**4870 *Epinotia ramella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**4871 *Epinotia nigricana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

ST: Altmark [66]

- 4872 *Epinotia rubiginosana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4878 *Epinotia nisella* (CLERCK, 1759)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]  
Britische Autoren halten die bisher als Synonym hierzu gestellte *cinereana* HAWORTH, 1811 für eine eigene Art.
- 4883 *Zeiraphera rufimitrana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**  
BY: Lkr. Hof: Höllental [86]
- 4884 *Zeiraphera ratzeburgiana* (SAXESEN, 1840)**  
NW: Sauerland [92]
- 4887 *Crocidosema plebejana* ZELLER, 1847**  
D: BY: Lkr. Landshut: Adlkofen Dorf [74]
- 4889 *Phaneta pauperana* (DUPONCHEL, 1842)**  
HE: Umgebung Trendelburg [92]; SN: Umgebung Bautzen (ehemaliges Militärgelände) [56]
- 4891 *Pelochrista decolorana* (FREYER, 1842)**  
NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Pevestorf [115]; BB: Neuruppin [32]
- 4896 *Pelochrista caecimaculana* (HÜBNER, 1799)**  
SN: Kreis Kamenz: Bernbruch und Osling [56]
- 4900 *Pelochrista infidana* (HÜBNER, 1824)**  
SH: Mehrere aktuelle Funde [117]; NI: Mehrere aktuelle Funde [117]
- 4912 *Pelochrista hepatariana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**  
BY: Regensburg, NSG Fellinger Berg [86]
- 4926 *Eucosma obumbratana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**  
SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 4935 *Eucosma hohenwarthiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BW: Schelingen, Degenmatt; Alt-Vogtsburg, Badberg [78];  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4938 *Eucosma flavispeculana* KUZNETSOV, 1964**  
D: BB: Berlin-Marienfelde [50]
- 4939a *Eucosma parvulana* (WILKINSON, 1859)**  
D: BY: Lkr. Bad Tölz-Wolfrathshausen: Ascholdinger Au; Lkr. Erding: Zengermoos. Die in der Deutschlandliste unter 4939: *E. scutana* (CONSTANT, 1893) aufgeführten Angaben beziehen sich auf diese Art. (AGASSIZ & LANGMAID, 2004) [85]
- 4943 *Eucosma campoliliana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4945 *Eucosma aemulana* (SCHLÄGER, 1849)**  
NW: Lage-Müsssen (SCHULTZ, 1949), in der Deutschlandliste fehlend [47]
- 4947 *Eucosma rubescana* (CONSTANT, 1895)**  
Nach LERAUT (1997) ist *catoptrana* REBEL, 1903 synonym zu *rubescana*.  
SH: Halbinsel Eiderstedt; Westerhever; St. Peter-Ording [65]; Für ST streichen, die Meldung beruht auf einer Fehlbestimmung von *Sesamia tripolitana* (BARRETT, 1880) [52]
- 4948 *Eucosma tripolitana* (BARRETT, 1880)**  
TH: Ist zu streichen, die Meldung (RAPP, 1936) beruht auf einer Fehldetermination [53]
- 4949 *Eucosma lacteana* (TREITSCHKE, 1835)**  
SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 4958 *Eucosma metzneriana* (TREITSCHKE, 1830)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4961 *Eucosma wimmerana* (TREITSCHKE, 1835)**  
NI: Krs. Lüchow-Dannenberg, Pevestorf [116]
- 4963 *Eucosma conterminana* (GUENÉE, 1845)**  
NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Pevestorf [115]; MV: Jasnitz; Ventschow [38]
- 4968 *Eucosma pupillana* (CLERCK, 1759)**  
MV: Ventschow; Grambow [38]; TH: Jena [57]
- 4983 *Gypsonoma minutana* (HÜBNER, 1799)**  
Die bisher hierher als Synonym gestellte *imparana* MÜLLER-RUTZ, 1914 ist eine eigene Art.  
SH: Büchen [116]; NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Schletau und Laase [116]
- 4987 *Gypsonoma sociana* (HAWORTH, 1811)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4988 *Gypsonoma nitidulana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**  
MV: Heidegebiet bei Lübtheen [38]; BB: Brandenburg-Drewitz, Umgebung Kleinsee [58]
- 4989 *Gypsonoma aceriana* (DUPONCHEL, 1843)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 4993 *Epiblema sticticana* (FABRICIUS, 1794)**  
MV: Schwerin; Grambow [38]
- 4994 *Epiblema scutulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
BB: Rathenow [32]; Potsdam, Krampnitz und Erkner bei Berlin [57]; SN: Belgershain [56]
- 4995 *Epiblema cirsiana* (ZELLER, 1843)**  
SH: Schwentinetal bei Raisdorf [60]; MV: Grevesmühlen; Brüel [38]; SN: Belgershain [56]; TH: Zahlreiche Erstfunde: Muschelkalk- und Buntsandsteingebiet [108]
- 4999 *Epiblema costipunctana* (HAWORTH, 1811)**  
BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]; Oberpfalz: Weiden [84]; SN: Halbdorf/Spree; NSG Rotstein bei Bischofshof [56]
- 4999a *Epiblema confusana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]
- 5000 *Epiblema junctana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)**  
NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Pevestorfer Wiesen [115]; BB: Frankfurt/Oder (SORHAGEN, 1886); keine aktuellen Funde bekannt [32]
- 5001 *Epiblema hepaticana* (TREITSCHKE, 1835)**  
NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Pevestorf [116]; HE: Wüsten-sachsen [110]
- 5002 *Epiblema turbidana* (TREITSCHKE, 1835)**  
SL: Überherrn (Bistau) [121]
- 5003 *Epiblema grandaevana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**  
MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]
- 5005 *Epiblema graphana* (TREITSCHKE, 1835)**  
SH: Büchen [96]; NW: Eifel [92]; BW: Oberbergen, Ortslage [78]; MV: Ventschow [38]
- 5006 *Epiblema fuchsiana* (RÖSSLER, 1877)**  
BB: Rüdersdorf (AMSEL, 1930) [32]
- 5009 *Epiblema similana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
NW: Marmagen [92]; HE: NSG Oberbernhardser Höhe [110]
- 5011 *Epiblema obscurana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**  
TH: Küffhäuser: Kattenburg; Kyffhäuser [57]

**5014 *Epiblema berolinensis* AMSEL, 1932**

Status der Art unsicher, da der Typus nicht auffindbar ist [32]

**5019 *Notocelia cynosbatella* (LINNAEUS, 1758)**

BW: Zahlreiche aktuelle Funde [78]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5021 *Notocelia uddmanniana* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5022 *Notocelia roborana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Buchholz bei Rubow; Fährdorf (Insel Poel) [38]

**5026 *Notocelia trimaculana* (HAWORTH, 1811)**

NI: Zahlreiche aktuelle Funde [115]

**5028 *Blastesthia posticana* (ZETTERSTEDT, 1839)**

NW: Schermbeck; Venloer Heide; Dalheim [92]

**5029 *Blastesthia turionella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5031 *Blastesthia tessulatana* (STAUDINGER, 1871)**

D: NW: Dalheim [92]

**5033 *Retinia resinella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Pinnow; Lübtheen [38]

**5034 *Retinia perangustana* (SNELLEN, 1883)**

D: SN: Krs. Löbau-Zittau: NSG Hengstberg bei Herrnhut [114]

**5036 *Barbara herrichiana* OBRAZTSOV, 1960**

BY: Lkr. Landshut: Unterlenghart [85]

**5038 *Gravitarmata margarotana* (HEINEMANN, 1863)**

NI: Zahlreiche aktuelle Funde [115]; NW: Wesertal bei Wasserstraße [92]; MV: Dömitz [115]; Ludwigsluster Heide [38]

**5045 *Rhyacionia pinicolana* (DOUBLEDAY, 1849)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5048 *Rhyacionia pinivorana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5057 *Ancylis unguicella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5058 *Ancylis uncella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5059 *Ancylis laetana* (FABRICIUS, 1775)**

BW: Zahlreiche aktuelle Funde [78]

**5061 *Ancylis obtusana* (HAWORTH, 1811)**

SH: Hamburg (Horst) [96]; NI: Pevestorf [115]; NW: Mehrere Erstfunde [92]; SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]

**5063 *Ancylis upupana* (TREITSCHKE, 1835)**

SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]

**5065 *Ancylis subacurana* (DOUGLAS, 1847)**

SH: Krs. Nordfriesland: Lütjenholm [115]; NI: Munster-Süd, Krs. Lüchow-Dannenberg: Prezelle [115]

**5066 *Ancylis diminutana* (HAWORTH, 1811)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5067 *Ancylis selenana* (GUENÉE, 1845)**

BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]

**5069 *Ancylis myrtillana* (TREITSCHKE, 1830)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5071 *Ancylis paludana* (BARRETT, 1871)**

SN: NSG Lausche bei Walterdorf; Kreis Kamenz: Mortha [49]

**5073 *Ancylis badiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

HE: Hessische Rhön: Zahlreiche aktuelle Funde [110]

**5076 *Ancylis mitterbachiana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5077 *Ancylis tineana* (HÜBNER, 1799)**

MV: Grambow; Lübtheen [38]

**5084 *Cydia compositella* (FABRICIUS, 1775)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5087 *Cydia pallifrontana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

MV: Warnotal bei Karnin; Dutzow (Schaalsee) [38]

**5088 *Cydia difficilana* (WALSINGHAM, 1900)**

Bisher ohne Bundeslandzuordnung, hier die ersten Nachweise: NW: Keldenich (NSG Tanzberg) [92]; HE: Lorch (Nollig) [23]; RP: Bornhofen und Dörscheid [23]

**5089 *Cydia coronellana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

SN: Königsbrück [56]

**5093 *Cydia caecana* (SCHLÄGER, 1847)**

NW: Dahlem [92]; BW: Schelingen, Degenmatt [78]

**5094 *Cydia discretana* (WOCKE, 1861)**

SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]

**5095 *Cydia gemmiferana* (TREITSCHKE, 1835)**

NW: Mehrere Erstfunde [92]; SN: Borna [55]

**5097 *Cydia nebritana* (TREITSCHKE, 1830)**

Aus der Liste für BY streichen [86]

**5098 *Cydia jungiella* (LINNAEUS, 1761)**

MV: Mehrere aktuelle Funde [38]

**5099 *Cydia lathyrana* (HÜBNER, 1822)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5100 *Cydia lunulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Krakow [38]

**5101 *Cydia orobana* (TREITSCHKE, 1830)**BW: Bestätigung der Bestimmung: Karlsruhe, coll. LOUDET (REUTI 1898); Meldung glaubhaft: Burgstall/Murr (SÜSSNER 1972); die Angabe bei WÖRZ (1953): Zuffenhausen, leg. CALMBACH, bezieht sich auf *C. indivisa* (DANILEVSKI, 1963) [61]; BY: Mehrere Funde [86]; MV: Hochmoor bei Grambow [38]**5102 *Cydia funebrana* (TREITSCHKE, 1835)**

HE: Wüstenachsen, Ritterhof [110]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5103 *Cydia tenebrosana* (DUPONCHEL, 1843)**

NW: Leverkusen-Bergisch Neukirchen; Wewelsburg [92]

**5106 *Cydia lobarewskii* (NOWICKI, 1860)**

BY: Lkr. Landshut: Adlkofen Dorf [74]

**5107 *Cydia molesta* (BUSCK, 1916)**

BY: Lkr. Neustadt/WN: Pressath [85]

**5113 *Cydia oxytropidis* (MARTINI, 1912)**

BY: Lkr. Rhön-Grabfeld: Irmelshausen [74]

**5116 *Cydia succedana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NI: Truppenübungsplatz Munster-Süd [116]

**5125 *Cydia medicaginis* (KUZNETSOV, 1962)**

BB: Jänschwalde-Ost [32]; SN: NSG Niederspree bei Rietischen; Kreis Bautzen: Baruth [56]

**5128 *Cydia microgrammana* (GUENÉE, 1845)**

SH: Büchen [96]; HE: Diemeltal bei Langenthal [92]

**5131 *Cydia duplicana* (ZETTERSTEDT, 1839)**

NW: Niederrheinisches Tiefland [92]; BB: Nach SORHAGEN (1886) von HINNEBERG bei Potsdam beobachtet, keine Belege vorhanden [32]; BY: NWR Heilige Hallen [59]

**5132 *Cydia cognatana* (BARRETT, 1874)**

**BW:** Steinacher Ried bei Bad Waldsee [61]; **BY:** Zahlreiche aktuelle Funde [85] **SN:** Herrnhuth bei Löbau, NSG Hengstberg [57]

**5133 *Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

**NW:** Schermbeck; Hochheide bei Niedersfeld [92]; **MV:** Umgebung Cambs [46]; **BB:** Drewitz bei Jänschwalde-Ost, Umgebung Kleinsee [49]; **SN:** Großschönau bei Zittau und Weberg bei Waltersdorf [58]

**5134 *Cydia conicolana* (HEYLAERTS, 1874)**

**NI:** Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß Gusborn [116]; **NW:** Schermbeck Senne (Truppenübungsplatz); Wesertal bei Waserstraße [92]

**5135 *Cydia corollana* (HÜBNER, 1823)**

**NI:** Krs. Lüchow-Dannenberg: Lasse [115]; **BY:** Erlangen-West [86]; **ST:** Altmark [66]

**5136 *Cydia coniferana* (SAXESEN, 1840)**

**MV:** Mehrere aktuelle Funde [38]

**5137 *Cydia indivisa* (DANILEVSKI, 1963)**

**BW:** Bei WÖRZ (1953) als *C. duplicana* (ZETTERSTEDT, 1839) aufgeführt; zahlreiche weitere aktuelle Funde [61]; **BB:** Jänschwalde-Ost [32]

**5138 *Cydia cosmophorana* (TREITSCHKE, 1835)**

**NI:** Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß-Gusborn [115]; **MV:** Mehrere aktuelle Funde [38]

**5139 *Cydia strobilella* (LINNAEUS, 1758)**

**BW:** Mehrere aktuelle Funde [78]; **SL:** Differenzen (NSG Eulenmühle); Orscholz (Leukbachtal) [121]; **MV:** Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5140a *Cydia pinetana* (SCHLÄGER, 1847)**

**BB:** Umgebung Rathenow [32]; **SN:** Dubring bei Hoyerswerda [56]

**5141 *Cydia grunertiana* (RATZEBURG, 1868)**

**BB:** Drewitz bei Jänschwalde-Ost, Umgebung Kleinsee [49]; **SN:** Niederoderwitz [56]; **TH:** Schiefergebirge [108]

**5142 *Cydia millenniana* (ADAMCZEWSKI, 1967)**

**NW:** Weserbergland, Mehrere Erstfunde [91]; **HE:** Mehrere Erstfunde [74]; **BY:** Girnitztal bei Duggendorf [86]; **BB:** Drewitz bei Jänschwalde-Ost, Umgebung Kleinsee [49]; **SN:** Niederoderwitz-Königsholz [56]

**5143 *Cydia zebeana* (RATZEBURG, 1840)**

**NW:** Weserbergland (UFFELN 1930); in der Deutschlandliste fehlend; Bonn-Kottenforst [92]; **BB:** Drewitz, Umgebung Calpenzmoor [49]

**5144 *Cydia pomonella* (LINNAEUS, 1758)**

**MV:** Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5149 *Cydia leguminana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

**RP:** Geislingen und Maxau (REUTTI 1898) [61]; **BW:** Degerloch (Stuttgart) (bei WÖRZ 1953 als *C. lathyrana* (HÜBNER, 1813) aufgefasst) [61]; **SN:** Zittauer Gebirge, Lausche [58]

**5154 *Cydia amplana* (HÜBNER, 1799)**

**SH:** Lauenburg, Göttin [97]; **NW:** Niederrheinische Bucht (STOLLWERK, 1863); in der Deutschlandliste fehlend; Wahner Heide [92]; **SL:** Limbach (NSG Limbacher Düne) [121]

**MV:** Mehrere Erstfunde [46]

**5155 *Cydia inquinatana* (HÜBNER, 1799)**

**NW:** Mönchengladbach; Bliesheim [92]; **BW:** Meldungen von REUTTI (1898) (bei Freiburg; bei Karlsruhe) und WÖRZ (1953) (Ellwangen, leg. FRÖLICH; Wasseralffingen, leg. HAHNE) konnten nicht überprüft werden; überprüfter Fund: Linsenbüchl bei Honau, leg. A. WÖRZ (bei WÖRZ (1953) als *C. dorsana* bestimmt). Weitere Funde: Schwäbische Alb und Oberschwaben

(Schmiechen Halde bei Teuringshofen und Mettenberg (Biberach)) [61]; **SL:** Siersburg (Gauberger) [121]

**5167 *Pammene aurana* (FABRICIUS, 1775)**

**SH:** Putlos [117]; **NI:** Adendorf; Radburch [117]

**5168 *Pammene gallicana* (GUENÉE, 1845)**

**NW:** Lichtenau, Eselsbett [92]; **MV:** Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5173a *Pammene herrichiana* (HEINEMANN, 1854)**

**BY:** Zahlreiche Erstfunde [86]

**5175 *Pammene splendidulana* (GUENÉE, 1845)**

**NI:** Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß Gusborn [116]

**5178 *Pammene insulana* (GUENÉE, 1845)**

**NI:** Gartow [115]; **BY:** Naturwaldreservat Wasserberg bei Gößweinstein [85]; **SN:** Aktueller Fund [55]

**5179 *Pammene ignotana* KUZNETZOV, 1968**

**SH:** Bruxer Holz/RD und Felder Holz/RD [60]; Lübecker Stadtwald [97]; **NW:** Bad Münstereifel [92]; **HE:** Wüstensachsen, Tannenhof [110]; **BW:** Kräher Wald bei Stuttgart; Umgebung Bad Urach; Biberach/RiB, Mettenbach [61]

**5180 *Pammene gallicolana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

**NW:** Dortmund; Krefeld; Uerdingen (alte Funde, genannt bei GRABE (1955), in der Deutschlandliste fehlend [47]; **HE:** Die mital bei Trendelburg [92]; **SN:** Dresden-Pillnitz und Dresden-Lössnitz; Bautzen; zu dieser Art gehören auch die Funde aus Bautzen, leg. GRAF, die als *P. albiginana* (GUENÉE, 1845) (Nr. 5184) früher [56] gemeldet wurden [57]

**5181 *Pammene giganteana* (PEYERIMHOFF, 1863)**

= *inquilina* T. FLETCHER, 1938

**MV:** Sternberg [38]

**5183 *Pammene suspectana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

**SN:** NSG Rotstein bei Bischofrod; Großhennersdorf bei Zittau und Baruth bei Weißenberg [56]

**5184 *Pammene albuginana* (GUENÉE, 1845)**

**BW:** Schelingen, Degenmatt [78]; Kräherwald; Dürnachtal [61]; **MV:** Hochmoor bei Grambow [38]; **SN:** Die Falter von Bautzen, leg. GRAF [56] erwiesen sich als *P. gallicolana* (LIENIG & ZELLER, 1846) (Nr. 5180) [57]

**5186 *Pammene obscurana* (STEPHENS, 1834)**

**MV:** Mehrere aktuelle Funde [38]

**5187 *Pammene agnotana* REBEL, 1914**

**SN:** Kreis Bautzen, zwischen Malschwitz und Gleina [49]

**5189 *Pammene luedersiana* (SORHAGEN, 1885)**

**SH:** Salemer Moor [96]

**5190 *Pammene rhediella* (CLERCK, 1759)**

**BY:** Zahlreiche aktuelle Funde [86]; **MV:** Schwerin [38]

**5192 *Pammene populana* (FABRICIUS, 1787)**

**MV:** Warnowtal bei Karnin [46]; **SN:** Kreis Kamenz: Bernbruch [56]

**5193 *Pammene spiniana* (DUPONCHEL, 1843)**

**NW:** Biesterberg bei Lemgo [47]; **BY:** Erlangen-West [86]

**5194 *Pammene trauniana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

**SH:** Kasseedorf [117]; Dummersdorfer Ufer bei Lübeck [60]; **SN:** Bautzen, Stausee [58]

**5196 *Pammene regiana* (ZELLER, 1849)**

**SH:** Kasseedorf [117]; **NI:** Gartow; Dannenberg; Munster-Süd [117]

**5197 *Pammene aurita* RAZOWSKI, 1991**

**MV:** Schwerin [38]; **SN:** NSG Rotstein [56]

**5198 *Pammene juniperana* (MILLIÈRE, 1858)**

HE: Diemeltal bei Eberschütz [92]; BY: Lkr. Main-Spessart: Aschfeld [74]

**5200 *Pammene ochsenheimeriana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

MV: Schwerin [38]; BB: Berlin-Dahlem (AMSEL, 1930); Berlin-Marienfelde [32]

**5205 *Pammene germanica* (HÜBNER, 1799)**

NI: Krs. Lüchow-Dannenberg: Groß-Gusborn [115]; NW: Dalheim [92]; BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]; BB: Drewitz, Umgebung Kleinsee [49]; SN: Kreis Bautzen: Großdubrau-Crosta [49]

**5207 *Strophedra weirana* (DOUGLAS, 1850)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**5208 *Strophedra nitidana* (FABRICIUS, 1794)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**5213 *Dichrorampha alpigenana* HEINEMANN, 1863**

Die Meldung für NW bei [92] und [27] beruht auf einer Verwechslung, sie ist zu streichen [28]

**5218 *Dichrorampha aeratana* (PIERCE & METCALFE, 1915)**

HE: Wüstensachsen; NSG Oberbernhardser Höhe [110]; MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5220 *Dichrorampha cacaleana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

SN: Lausche bei Waltersdorf [49]

**5232 *Dichrorampha acuminatana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

BW: Alt-Vogtsburg, Badberg; Schelingen, Degenmatt [78]; MV: Schwerin [38]

**5240 *Dichrorampha sequana* (HÜBNER, 1799)**

SN: Burg bei Hoyerswerda [56]

**5242 *Dichrorampha heegerana* (DUPONCHEL, 1843)**

BY: Lkr. Würzburg: Kleinochsenfurt [86]

**5245 *Dichrorampha incognitana* (KREMKY & MASLOWSKI, 1933)**

NI: Gartow [115]; BB: Potsdam, Bornstedter Feld und Rüdersdorf bei Berlin [57]; ST: Stendal [32]

**5246 *Dichrorampha gueneeana* OBRAZTSOV, 1953**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5247 *Dichrorampha flavidorsana* KNAGGS, 1867**

BW: Alt-Vogtsburg, Badberg [78]

**5248 *Dichrorampha alpinana* (TREITSCHKE, 1830)**

SN: Die Meldung für SN ist zu streichen, die Angaben in der Literatur (SCHÜTZE 1901; MÖBIUS 1936) beruhen mit Sicherheit auf Fehldeterminationen von *D. flavidorsana* KNAGGS, 1867 und *D. gueneeana* OBRAZTSOV, 1953 [57]

**5249 *Dichrorampha petiverella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5251 *Dichrorampha plumbagana* (TREITSCHKE, 1830)**

MV: Ventschow [38]

**5257 *Dichrorampha agilana* (TENGSTRÖM, 1848)**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde [38]

**5268 *Anthophila abhasica* DANILEVSKY, 1969**

D: BY: Alpen (KURZ & HUENER, 2000) [86]

**5272 *Prochoreutis sehestadiana* (FABRICIUS, 1776)**

SH: Zahlreiche Erstfunde [96]; HE: Naurod (Theißtal) [11]; RP: Lykershausen; Schuld [11]; BW: Zahlreiche Erstfunde [61]

**5278 *Tebenna bjerkanrella* (THUNBERG, 1784)**

NW: Bonn (GRABE, 1955), in der Deutschlandliste fehlend [92]; BB: Nymphensee bei Brieselang [50]

**5283 *Choreutis nemorana* (HÜBNER, 1799)**

D: BW: Neuershausen [34]

**5287 *Wockia asperipunctella* (BRUAND, 1851)**

SN: Weißwasser, NSG Altes Schleifer Teichgebiet, Schleife/Trebendorf [57]

**5291 *Schreckensteinia festaliella* (HÜBNER, 1819)**

HE: NSG Rotes Moor [110]

**5296 *Phaulernis fulviguttella* (ZELLER, 1839)**

RP: Speyer (REUTTI 1898), in der Deutschlandliste fehlend; SN: Kreis Bautzen: Wuischke und Großsaubernitz [57]

**5298 *Phaulernis dentella* (ZELLER, 1839)**

SH: Westensee/RD [65]; SN: Viereichen bei Rietschen [58]; Die Meldung von Funden für NI; NW und RP bei GAEDIKE (1972) wurden bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen [65]

**5303 *Epermenia chaerophyllella* (GOEZE, 1783)**

NW: Gilsdorf [27]; SL: Siersburg (NSG Gauberg); Nunkirchen [121]; SN: Hermsdorf bei Königswartha; Großhennersdorf [56]; TH: Schwarztal (Schieferbruch); Wachtelberg bei Zeigerheim [108]

**5304 *Epermenia illigerella* (HÜBNER, 1813)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**5305 *Epermenia falciformis* (HAWORTH, 1828)**

SN: Großschönau bei Zittau [58]

**5323 *Alucita hexadactyla* (LINNÆUS, 1758)**

BY: Zahlreiche aktuelle Funde [86]

**5325 *Alucita huebneri* (WALLENGREN, 1859)**

BW: Mehrere aktuelle Funde [78]

**5329 *Alucita desmodactyla* ZELLER, 1847**

RP: Kobern; Schloßböckelheim [26]; BY: Lkr. Bad Kissingen: Karsbach; Lkr. Würzburg: Kleinochsenfurt [86]; SL: Perl (Hammelsberg) [121]

**5337 *Pterotopteryx dodecadactyla* (HÜBNER, 1813)**

NW: Eberschütz [90]; HE: Körbecke [90]

**5342 *Agdistis adactyla* (HÜBNER, 1819)**

BW: Freiburg im Breisgau (ARENBERGER 1995); Belege zu den Funden bei REUTTI (1853) und FUNK (1923) konnten nicht gefunden werden [61]

**5348 *Agdistis bennetti* (CURTIS, 1833)**

SH: Westerhever (Eiderstedt) [65]

**5364 *Agdistis tamaricis* (ZELLER, 1847)**

BW: Badisches Rheintal: „von Kleinkems bis Greffern, auf Rheinseln und in Rheinwaldungen“ (REUTTI 1898) [61]

**5381 *Amblyptilia acanthadactyla* (HÜBNER, 1813)**

SN: Rotstein [49]; TH: Bohlen bei Saalfeld; Wachtelberg bei Zeigerheim [108]

**5382 *Amblyptilia punctidactyla* (HAWORTH, 1811)**

TH: Wachtelberg bei Zeigerheim; Volkstdt [108]

**5393 *Stenoptilia stigmatodactylus* (ZELLER, 1852)**

NW: Sistig-Krekel [27]

**5402 *Stenoptilia annadactyla* SUTTER, 1988**

NW: Körbecke [90]; HE: Mehrere Erstfunde [90]; BW: NSG Badberg: Schelingen, Altvogtsburg [22]; SL: Perl (Hammelsberg); Fechingen (NSG Birzberg); Reinheim (Auf der Lohe) [121]

**5414 *Stenoptilia pelidnodactyla* (STEIN, 1837)**

BY: Lkr. Wunsiedel: Röslau [86]; SN: Kreis Zittau: Scheibeberg bei Mittelherwigsdorf [56]

- 5419 *Stenoptilia alpinalis* BURMANN, 1954**  
BY: NWR Reiteralpe [59]
- 5428 *Stenoptilia pneumomanthes* (BÜTTNER, 1880)**  
BY: Lkr. Donauwörth: NSG Mertinger Hölle [86]
- 5434 *Cnaemidophorus rhododactylus* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SH: Kiel (Stift) [96]
- 5442 *Oxyptilus ericetorum* (STAINTON, 1951)**  
SN: Scheibeberg, 3 km nordwestlich von Zittau [58]
- 5445 *Oxyptilus distans* (ZELLER, 1847)**  
BY: Lkr. Hof: Selbitz [86]; SN: Mehrere aktuelle Funde [56]; TH: Kyffhäuser, Rottleben [49]
- 5451 *Oxyptilus tristis* (ZELLER, 1841)**  
SN: Halbendorf/Spree und Uhyst/Spree [56]
- 5457 *Geina didactyla* (LINNAEUS, 1758)**  
NW: Keldenich; Sistig-Krekel und Nettersheim [27]; RP: Gerolstein-Lissingen und Büdesheim [27]
- 5468 *Capperia fusca* (O. HOFMANN, 1898)**  
SL: Perl (Hammelsberg) [121]
- 5500 *Merrifieldia tridactyla* (LINNAEUS, 1758)**  
SH: Amrum [96]; SN: Hoyerswerda, Burg [55]
- 5521 *Pselnophorus heterodactyla* (MÜLLER, 1764)**  
BY: Lkr. Wunsiedel: Schirnding [85]
- 5528 *Oidematophorus lithodactylus* (TREITSCHKE, 1833)**  
SL: Haustadt (NSG Wolferskopf) [121]; SN: Kreis Bautzen, Baruth, Schafberg [57]
- 5574 *Melissoblaptes zelleri* (JOANNIS, 1932)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5620 *Synaphe punctalis* (FABRICIUS, 1775)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5627 *Pyralis farinalis* (LINNAEUS, 1758)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5632 *Aglossa caprealis* (Hübner, 1809)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BY: Landshut-West [86]
- 5633 *Aglossa pinguisinalis* (LINNAEUS, 1758)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; MV: Aktuelle Funde [40]
- 5652 *Hypsopygia costalis* (FABRICIUS, 1775)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5668 *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5669 *Cryptoblabes loxiella* RAGONOT, 1887**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5673 *Trachonitis cristella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Meißen, Knorre [58]
- 5676 *Salebriopsis albicilla* (HERRICH-SCHÄFFER, 1849)**  
SH: Lübecker Stadtwald (Ritzerau) [97]
- 5679 *Elegia similella* (ZINCKEN, 1818)**  
BW: Schelingen, Degenmatt [78]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 5682 *Ortholepis vacciniella* (LIENIG & ZELLER, 1847)**  
SN: Es konnten keine Belege für die Meldung in der Deutschlandliste gefunden werden [58]
- 5684 *Matilella fusca* (HAWORTH, 1811)**  
Nach LERAUT (2001) gehört die Art in die Gattung *Matilella*  
LERAUT, 2001 [86]
- 5686 *Pempeliella ornatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SH: Ellenbogen (Sylt); Lkr. Ostholstein: Putlos [119]
- 5690 *Pempeliella dilutella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SH: Lkr. Ostholstein: Putlos [119]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 5700 *Catastia marginea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SN: Sächsische Schweiz (SPULER, 1906), in der Deutschlandliste fehlend [58]
- 5724 *Scotia rhenella* (ZINCKEN, 1818)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Mehrere aktuelle Funde [56]
- 5725 *Scotia hostilis* (STEPHENSON, 1834)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5727 *Scotia adelphella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)**  
SH: Lkr. Itzehoe: Lägerdorf [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5732 *Selagia argyrella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5742 *Etiella zinckenella* (TREITSCHKE, 1832)**  
NI: Lkr. Lüchow-Dannenberg: Nemitz [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5751 *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763)**  
MV: Aktueller Fund [46]
- 5753 *Oncocera faecella* (ZELLER, 1839)**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Güster; Langenlebsten [119]; ST: Elbhavelland; Altmark [66]
- 5766 *Pempelia formosa* (HAWORTH, 1811)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Zahlreiche aktuelle Funde [56]
- 5767 *Pempelia palumbella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5770 *Pempelia obductella* (ZELLER, 1839)**  
SN: Scheibeberg bei Zittau [58]
- 5781 *Dioryctria sylvestrella* (RATZEBURG, 1840)**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Langenlebsten [119]
- 5784 *Dioryctria abietella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5805 *Hypocalcia decorella* (HÜBNER, 1810)**  
D: SN: „Sachsen“ (SORHAGEN, 1886), bisher kein aktueller Beleg [58]
- 5808 *Hypocalcia ghilianii* STAUDINGER, 1870**  
BY: Ist nach LERAUT (2002) synonym zu *H. ahenella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Nr. 5811), deshalb aus der Deutschlandliste zu streichen [86]
- 5810 *Hypocalcia lignella* (HÜBNER, 1796)**  
SN: Bisher wurden keine Belege für die Angaben in der Literatur gefunden [58]
- 5811 *Hypocalcia ahenella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
Neues Synonym (nach LERAUT, 2002): *H. ghilianii* STAUDINGER, 1870 [86]
- 5827 *Epischnia prodromella* (HÜBNER, 1799)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5848 *Nephopterix angustella* (HÜBNER, 1796)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: Mehrere aktuelle Funde [78]

- 5853 *Conobathra tumidana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
MV: Aktuelle Funde [42]
- 5854 *Conobathra repandana* (FABRICIUS, 1798)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5857 *Trachycera suavella* (ZINCKEN, 1818)**  
SH: Lkr. Ostholstein: Putlos [119]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 5860 *Trachycera marmorea* (HAWORTH, 1811)**  
MV: Aktuelle Funde [42]
- 5868 *Acrobasis sodalella* ZELLER, 1848**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Büchen; Güster; Lkr. Schleswig-Flensburg: Groß Jörl [119] RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Borna [49]
- 5869 *Acrobasis consociella* (HÜBNER, 1813)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 5870 *Acrobasis glauccella* STAUDINGER, 1859**  
RP: HEUSER et al., 1971 (als *A. fallouella* RAGONOT, 1871) [61]
- 5871 *Acrobasis obtusella* (HÜBNER, 1796)**  
NI: Lkr. Lüchow-Dannenberg: Pevestorf; Görde; Lkr. Herzogtum Lauenburg: Göttin [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; Lorch; Loreley; Mainzer Strand [26]
- 5873 *Apomyelois bistriatella subcognata* RAGONOT, 1887**  
= *bistriatella neophanes* DURRANT, 1915: Nomenklatorische Änderung [83]  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Langenlehsten; Grönauer Heide bei Lübeck [119]; Lübeck, Grönauer Heide [97]; BY: Erlangen-West [83]; MV: Friedrichsmoor bei Schwerin [46]
- 5875 *Apomyelois ceratoniae* (ZELLER, 1839)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 5878 *Glyptoteles leucocrinella* ZELLER, 1848**  
NI: Lkr. Lüchow-Dannenberg: Pevestorf [119]; BW: Literaturangabe bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Rheinhalde: Burkheim [22]
- 5880 *Episcythrastis tetricella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Langenlehsten [119]; BY: Bodenwöhre, Postloher Forst, NWR Dürrenberg [86]
- 5888 *Eurhodope rosella* (SCOPOLI, 1763)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: Kaiserstuhl, NSG Badberg [49]; NSG Badberg: Schelingen [22]
- 5891 *Eurhodope cirrigerella* (ZINCKEN, 1818)**  
SH: Büchen [96]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: Literaturangabe bei REUTTI (1898) (HAUSENBLAS, i. l.); NSG Badberg: Schelingen [22]
- 5935 *Eucarphia vinetella* (FABRICIUS, 1787)**  
SN: „Sachsen“ (SORHAGEN, 1886), bisher keine aktuelle Belege [58]
- 5963 *Gymnancyla canella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
Die Meldung für ST ist zu streichen, sie beruht offensichtlich auf einer Fehlbestimmung von *G. hornigii* (LEDERER, 1852) [52]
- 5964 *Gymnancyla hornigii* (LEDERER, 1852)**  
NI: Wedemark-Brelingen, Coll. KRÜGER [119]; HE: Tredelburg/Diemeltal [102]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 5973 *Zophodia grossulariella* (HÜBNER, 1809)**  
RP: HEUSER et al., 1971 (als *Z. convolutella* HÜBNER, 1796) [61]; SN: Aktuelle Funde [55]
- 5980 *Eccopisa effractella* (ZELLER, 1848)**  
SH: Lübecker Stadtwald (Ritzerau) [97]; BW: Kaiserstuhl [22]; SN: Burg bei Hoyerswerda [56]
- 5986 *Assara terebrella* (ZINCKEN, 1818)**  
SH: Stadtgebiet Hamburg; Lkr. Herzogtum Lauenburg [119]
- 5997 *Euzophera cinerosella* (ZELLER, 1839)**  
NI: Lkr. Lüchow-Dannenberg: Gartow, Sallahn, Pevestorf [119]; NW: Königswinter [99]; SN: Burg bei Hoyerswerda; Nochten bei Boxberg [56]
- 6009 *Euzophera fuliginosella* (HEINEMANN, 1865)**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Büchen; Güster [119]
- 6015 *Nyctegretis lineana* (SCOPOLI, 1786)**  
TH: Aktuelle Funde [94]
- 6027 *Ancylosis cinnamomella* (DUPONCHEL, 1836)**  
NI: Poitzen bei Munster; Winkel nahe Gifhorn (HARTWIEG, 1958) [119]; NW: Königswinter [99]
- 6057 *Ancylosis oblitella* (ZELLER, 1843)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 6072 *Homoeosoma sinuella* (FABRICIUS, 1793)**  
SH: Insel Sylt: Puan Klent [119]
- 6079 *Homoeosoma nebulella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 6082 *Homoeosoma nimbelia* (DUPONCHEL, 1836)**  
SH: Insel Sylt: Puan Klent [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 6086 *Phycitodes maritima* (TENGSTRÖM, 1848)**  
BW: ROESLER (1973); Häfnerhaslach [61]; SN: Die Meldung bezieht sich auf ein 1973 gefangenes Exemplar, deshalb kein aktueller (nach 1980) Fund [58]; aktuelle Funde [55]
- 6087 *Phycitodes binaevella* (HÜBNER, 1813)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; Schloßböckelheim; Bad Münster am Stein [26]
- 6088 *Phycitodes lacteella* (ROTHSCHILD, 1915)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 6089 *Phycitodes inquinatella* (RAGONOT, 1887)**  
BW: ROESLER (1973) [61]
- 6090 *Phycitodes saxicola* (VAUGHAN, 1870)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: ROESLER (1973) [61]; SN: Mehrere Erstfunde, damit konnte die bisher nicht belegte Meldung [58] bestätigt werden [55]
- 6091 *Phycitodes albatella pseudonimbella* BENTINCK, 1936**  
BW: ROESLER (1973); Schützingen [61]; MV: Aktuelle Funde [40]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 6093 *Vitula edmandsii* (PACKARD, 1864)**  
MV: Insel Poel/Fährdorf [46]
- 6094 *Vitula biviella* (ZELLER, 1848)**  
SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Güster; Langenlehsten [119]; NI: Wendland: verschiedene Fundorte [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: Weinheim an der Bergstraße (ROESLER, 1982) [61]; SN: Für die Meldung in der Deutschlandliste konnte kein Beleg gefunden werden [58]; TH: Muschelkalkgebiet bei Thälendorf; Greifenstein; Zeigerheim [108]
- 6102 *Plodia interpunctella* (HÜBNER, 1813)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]
- 6105 *Epehrinia kuehniella* (ZELLER, 1879)**  
RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Aktuelle Funde [94]
- 6112 *Epehrinia elutella* (HÜBNER, 1796)**  
MV: Aktuelle Funde [46]

**6113 *Epeorus parasitella* STAUDINGER, 1859**

BY: Kommt nach LERAUT (2002) nicht in Deutschland vor, deshalb aus der Liste zu streichen [86]

**6113a *Epeorus unicolorella* STAUDINGER, 1881, ssp. *woodiella* RICHARDS & THOMPSON, 1932**

Nach LERAUT (2002) valide Art, kein Synonym von *E. parasitella* STAUDINGER, 1859

Wird von ROESLER glaubhaft für HE, BW, BY und BB angegeben [86]; BW: NSG Büchsenberg: Achkarren; NSG Rheinhalle: Burkheim (unter *E. parasitella* STAUDINGER, 1859) [22]

**6118 *Cadra figulilella* (WALKER, 1863)**

SN: Dresden (MÖBIUS 1936), bisher kein Beleg gefunden [58]

**6119 *Cadra cautella* (WALKER, 1863)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Niederoderwitz [56]

**6120 *Cadra calidella* (GUENÉE, 1845)**

NW: Düsseldorf-Friedrichstadt [101]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6123 *Anerastia lotella* (HÜBNER, 1813)**

BW: Daxlanden/Karlsruhe (REUTTI 1898); Mannheim-Sandhofen; Dossenheim bei Heidelberg [61]

**6162 *Cholius luteolaris* (SCOPOLI, 1772)**

(durch NUSS, 1999 aus der Gattung *Scoparia* in die Gattung *Cholius* Guenée, 1845 gestellt)

Die Meldung für BW konnte bisher nicht bestätigt werden [56]

**6169 *Scoparia ancipitella* (LA HARPE, 1855)**

SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Güster [119]; NW: Winterberg (Kahler Asten) [102]

**6170 *Scoparia conicella* (LA HARPE, 1863)**

BW: Heidelberg; Schwäbische Alb, Schwäbisch Gmünd; Kaiserstuhl [56]; TH: Jena, Löberschütz [58]

**6174 *Scoparia ingratella* (ZELLER, 1846)**

NW: NSG „Kallmuther Berg mit Westschacht“ bei Mecherich-Kalenberg [98]; Burbach-Oberdresseindorf [101]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Radebeul, Spitzgrund [58]

**6176 *Gesneria centuriella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: Rheinpfalz, Ludwigswinkel (HEUSER et al., 1971) [56]; HEUSER et al., 1971 [61]; BW: Kaiserstuhl, Vogtsburg (LINACK, 1955) [56]

**6180 *Eudonia lacustrata* (PANZER, 1804)**

Gehört nach NUSS (1999) in die Gattung *Eudonia* BILLBERG, 1820 [86]

**6182 *Eudonia murana* (CURTIS, 1827)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6188 *Eudonia laetella* (ZELLER, 1846)**

SH: Die Meldung ist zu streichen [119]; SN: Für die Literaturmeldungen (SCHÜTZE 1899) konnten bisher keine Belege gefunden werden [58]

**6189 *Eudonia delunella* (STAINTON, 1849)**

NW: Die Meldung ist zu streichen [49]; HE: Frankfurt/M. [49]

RP: HEUSER et al., 1971 (als *W. resinella*) [61]; Pfälz: Speyer [49]; BW: Baden, Manau [49]; BY: Ist zu streichen [86]; SL: Perl (Hammelsberg) [121]; SN: Die Meldung von MÖBIUS (1936) ist nicht überprüfbar, wahrscheinlich Fehlbestimmung [49]; keine Belege gefunden [58]

**6199 *Witlesia pallida* (CURTIS, 1827)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6201 *Heliothela wulfeniana* (SCOPOLI, 1863)**

SH: Neuhohe: Südeide [119]; RP: HEUSER et al., 1971 (als *H. atralis*) [61]

**6222 *Chilo phragmitella* (HÜBNER, 1805)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6229 *Friedlanderia cicatricella* (HÜBNER, 1824)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BY: Stadt Ingolstadt, Friedrichshofen [86]

**6235 *Calamotropha paludella* (HÜBNER, 1824)**

TH: Erstfunde [94]

**6236 *Calamotropha aureliella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1841)**

SN: In die Deutschlandliste bisher nur aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) ohne genaue Zuordnung übernommen, jetzt aktueller Nachweis: Sprey [55]

**6244 *Crambus silvellus* (HÜBNER, 1813)**

SH: Zahlreiche aktuelle Funde [119]

**6245 *Crambus uliginosellus* (ZELLER, 1850)**

SH: Zahlreiche aktuelle Funde [119]; MV: Aktuelle Funde [42]; SN: Aktuelle Funde [55]

**6248 *Crambus heringiellus* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)**

SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Bröthen [119]

**6264 *Agriphila latistria* (HAWORTH, 1811)**

SN: Belgershain [58]

**6267 *Agriphila straminella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6270 *Agriphila poliella* (TREITSCHKE, 1832)**

SN: Mehrere Erstfunde [55], damit konnten die Literaturangaben bestätigt werden [58]

**6282 *Catoptria myella* (HÜBNER, 1796)**

SN: Die Meldungen aus der Literatur (SCHÜTZE 1899, MÖBIUS 1936) können wegen der Verwechslung mit *C. permutterella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848) und *C. osthelderi* (DE LATTIN, 1950) ohne Prüfung der Belege nicht übernommen werden [58]

**6283 *Catoptria osthelderi* (DE LATTIN, 1950)**

SN: Mehrere aktuelle Funde [56]; MV: Aktuelle Funde [42]

**6294 *Catoptria radiella* (HÜBNER, 1813)**

BY: NWR Wettersteinwand [59]

**6299 *Catoptria mytilella* (HÜBNER, 1805)**

NW: Königswinter [99]; SN: Wird von SCHÜTZE (1899) gemeldet, keine Belege vorhanden [58]

**6301 *Catoptria pinella* (LINNAEUS, 1758)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6314 *Catoptria falsella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

MV: Aktuelle Funde [40]

**6318 *Catoptria verella* (ZINCKEN, 1817)**

SH: Zahlreiche aktuelle Funde [119]; NW: Wahner Heide [103]; MV: Aktuelle Funde [40]; [46]; SN: Mehrere Erstfunde [55]

**6340 *Xanthocrambus saxonellus* (ZINCKEN, 1821)**

SN: Wurde aus der „Gegend um Leipzig“ beschrieben, fehlt in der Deutschlandliste [58]

**6348 *Chrysocrambus craterellus* (SCOPOLI, 1763)**

BY: Ist zu streichen [86]

**6354 *Pediasia pedriolellus* (DUPONCHEL, 1836)**

D: BY: Bayerische Alpen: Naturwaldreservate [59]

**6355 *Pediasia luteella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NI: Mehrere aktuelle Funde [119]; RP: Schloßböckelheim [26]; BW: NSG Badberg: Schelingen [22]

**6376 *Platytes cerussella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6380 *Ancylolomia tentaculella* (HÜBNER, 1796)**

D: BY: Oberpfalz: Weiden [84]

**6386 *Talis querella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

Aus der bayerischen Liste und damit auch aus D gestrichen [86]

**6390 *Schoenobius gigantella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6393 *Donacula forcicella* (THUNBERG, 1794)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6394 *Donacula mucronella* (SCOPOLI, 1763)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6421 *Acentria ephemera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**RP: HEUSER et al., 1971 (als *A. niveus*) [61]**6423 *Cataclysta lemnata* (LINNEAUS, 1758)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6425 *Parapoynx stratiotata* (LINNAEUS, 1758)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6427 *Parapoynx nivalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SH: Ist zu streichen [119]

**6431 *Nymphula stagnata* (DONOVAN, 1806)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; MV: Aktuelle Funde [42]

**6441 *Asalebria floralis* (MANN, 1862)**

RP: Albersweiler (Jöst, 1950); Loreley (JÄCKH 1951); STAMM, 1955 [61]

**6468 *Atrala albofascialis* (TREITSCHKE, 1829)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Vogtland (SCHWEITZER, 1931), bisher kein Beleg gefunden [58]

**6488 *Evergestis frumentalis* (LINNAEUS, 1761)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BY: Hammelburg [86]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6499 *Evergestis extimalis* (SCOPOLI, 1763)**

SH: Lkr. Plön: Sellin; Lkr. Herzogtum Lauenburg: Schwarzenbek [119]; MV: Aktueller Fund [46]

**6501 *Evergestis pallidata* (HUFNAGEL, 1767)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; MV: Aktuelle Funde [42]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6507 *Evergestis aenealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NI: Wedemark [76]; Gummern; Wedemark; Forst Weckenstedt [119]; BY: Erlangen-West [86]; MV: Harkensee bei Dassow [46]; ST: Elbhavelland [66]

**6521 *Hellula undalis* (FABRICIUS, 1781)**

RP: HEUSER et al., 1971; zahlreiche aktuelle Funde zwischen 1900 - 1980 [61]

**6531 *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6533 *Udea fulvalis* (HÜBNER, 1809)**

SN: Meißen, Knorrie; Meißen, Zadel, Steinbruch [58]

**6537 *Udea institialis* (HÜBNER, 1819)**

NW: Mechernich-Berg [27]; RP: Schloßböckelheim/Nahe [101]

**6541 *Udea prunalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6553 *Udea nebulalis* (HÜBNER, 1796)**

SN: Bautzen [58]

**6556 *Udea decrepitalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)**

NW: Hochsauerland: bei Niedersfeld [93]

**6559 *Udea hamalis* (THUNBERG, 1788)**

RP: Gerolstein [27]

**6561 *Paracorsia repandalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NW: Kruft; Klotten/Mosel [100]

**6566 *Loxostege turbidalis* (TREITSCHKE, 1829)**

SH: Lkr. Herzogtum Lauenburg: Büchen [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; Mehrere Erstfunde [78]

**6577 *Loxostege sticticalis* (LINNEAUS, 1761)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6588 *Ecpyrrhorhoe rubiginalis* (HÜBNER, 1796)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Erstfund [94]

**6596 *Pyrausta rectefascialis* TOLL, 1936**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Aktuelle Funde [55]

**6599 *Pyrausta sanguinalis* (LINNAEUS, 1767)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6603 *Pyrausta porphyralis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; MV: Aktuelle Funde [46]

**6607 *Pyrausta falcatalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SN: Königshainer Berge (SCHÜTZE 1899); Quoos (SCHÜTZE 1930); Radebeul (MÖBIUS 1936), fehlt in der Deutschlandliste, bisher kein Beleg gefunden [58]

**6613 *Pyrausta nigrata* (SCOPOLI, 1763)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6616 *Pyrausta aerealis* (HÜBNER, 1793)**

NI: Mehrere aktuelle Funde [119]

**6619 *Uresiphita gilvata* (FABRICIUS, 1794)**RP: HEUSER et al., 1971 (als *U. limbalis*) [61]; SN: Dresden: Saubachtal und Zschoner Grund [58]**6621 *Nascia ciliatilis* (HÜBNER, 1796)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BW: NSG Rheinhalde: Burkheim [22]; SN: In der Deutschlandliste gemeldet, bisher kein Beleg gefunden [58]

**6623 *Sitochroa palealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

SH: Mehrere aktuelle Funde [119]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6629 *Perinephela lancealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6631 *Phlyctaenia coronata* (HUFNAGEL, 1767)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6632 *Phlyctaenia stachydalis* (GERMAR, 1821)**

SH: Umgebung Kiel [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6633 *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1809)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6638 *Algedonia terrealis* (TREITSCHKE, 1829)**

NI: Hannover-Ricklingen [119]

**6641 *Sclerocona acutellus* (EVERSMANN, 1842)**

NI: Osterwiesen bei Winsen a.d. Luhe [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; BB: Berlin-Marienfelde [50]

**6643 *Psammotis pulveralis* (HÜBNER, 1796)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]; SN: Trebendorf bei Weißwasser [56]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6649 *Ostrinia nubilalis* (HÜBNER, 1796)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6655 *Anania verbascalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

BW: Alt-Vogtsburg, Badberg [78]; SN: Rietschen [56]; MV: Aktuelle Funde [42]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6658 *Eurrhypara hortulata* (LINNAEUS, 1758)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**6660 *Paratalanta pandalis* (HÜBNER, 1825)**

SN: Königsbrücker Heide [58]

**6661 *Paratalanta hyalinalis* (HÜBNER, 1796)**

SH: Putlos [119]; RP: HEUSER et al., 1971 [61]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6672 *Mecyna flavalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

RP: HEUSER et al., 1971 [61]

**6673 *Mecyna lutealis* (DUPONCHEL, 1833)**

SN: Dresden-Kreischa, fehlt in der Deutschlandliste [58]

**6676 *Mecyna auralis* (PEYERIMHOFF, 1772)**

NW: Königswinter, Schloßböckelheim [99]

**6680 *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI, 1763)**

SN: Seußlitz, Seußlitzgrund [49]; TH: Aktuelle Funde [94]

**6682 *Diasemia reticularis* (LINNAEUS, 1761)**RP: HEUSER et al., 1971 (als *D. litterata*) [61]; SN: Elbsandsteingebirge: Königstein, Elbe [58]**6686 *Duponchelia fovealis* ZELLER, 1847**

D: NI: Hallig Gröde; Lkr. Lüneburg: Radbruch und Adendorf [119]; NW: Mönchengladbach; Doveren [124]; BY: Gauting-Buchdorf, München, Laim: eingeschleppte Art [86]; SN: Dresden, Großer Garten [58]

**6690 *Palpita vitrealis* (Rossi, 1794)**Nach LERAUT (1997) gültiger Name für *Palpita unionalis* (HÜBNER, 1796) [86]

RP: ROESLER (1961), HEUSER et al., 1971) [61]; BW: Karlsruhe: Bahnhof (REUTTI 1898); Kirchentellinsfurt bei Tübingen (GIERLING 1984) [61]

**6700 *Dolicharthria punctalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

NW: Gilsdorf [27]

**6719 *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

TH: Aktuelle Funde [94]

**Zusammenfassung der Ergebnisse**

In der 1999 veröffentlichten Liste wurden 2233 Arten gemeldet, darunter waren 63 Arten, von denen nur ein Vernerk in der Europaliste (KARSHOLT & RAZOWSKI 1996) ohne näheren Hinweis existierte. Bei Berücksichtigung der 47 Neufunde sowie der 13 Streichungen beträgt der Gesamtbestand gegenwärtig 2267 Arten.

Der Artenbestand der einzelnen Bundesländer hat sich wie folgt geändert:

Bundesland	bisherige Artenzahl	Streichungen	Neufunde	Gesamt-bestand
SH	1179	3	122	1298
NI	1187		58	1245
NW	1189	3	127	1313
HE	766		879	
RP	920		159	1079
BW	1538	5	84	1617
BY	1872	13	43	1902
SL	987		78	1065
MV	1120		44	1164
BB	1422	2	47	1467
SN	1335	14	145	1466
ST	1190	1	27	1216
TH	1477	1	28	1504

**Zitate zur Faunistik**

- [1] BATHON, H. (2001): Der Mittelmeernelkenwickler *Cacoecimorpha pronubana* auch in Hessen (Insecta, Lepidoptera, Tortricidae). - Hessische Faunistische Briefe 20(4): 66-68.
- [2] BIESENBAUM, W. (2000): Erwähnenswerte Gelechiiden-Funde aus Rheinland-Pfalz mit dem Erstnachweis von *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae). Melanargia 12(1): 1-3, Taf. I, Fig. 1-3.
- [3] BIESENBAUM, W. (2000a): *Aethes beatricella* (WALSINGHAM, 1898) als Neufund und *Phalonidia gilvicomana* (ZELLER, 1847) als Wiederfund für das Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). - Melanargia 12(3/4): 62-63.
- [4] BIESENBAUM, W. (2000b): Über das Vorkommen von *Symmoca signatella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae). Melanargia 12(3/4): 75-76.
- [5] BIESENBAUM, W. (2000c): Bemerkenswerte Nachweise von zwei Kleinschmetterlingsarten in Baden-Württemberg (Lep., Cosmopterigidae et Gelechiidae). - Melanargia 12(3/4): 81-83.
- [6] BIESENBAUM, W. (2000d): Familie Gelechiidae STAINTON, 1854, Unterfamilie Gelechiinae STAINTON, 1854, Tribus Teleiodini PISKUNOV, 1973 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 8: 1-109, 26 Farabbildungen.
- [7] BIESENBAUM, W. (2001): *Coleophora ballotella* (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1839) - ein Neufund für die rheinisch-westfälische Lepidopterenfauna und weitere Nachträge zu den Coleophoriden (Lep., Coleophoridae). - Melanargia 13(1): 1-3.
- [8] BIESENBAUM, W. (2001a): Nachweis von *Phthorimaea operculella* (ZELLER, 1873) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae). - Melanargia 13(1): 18.
- [9] BIESENBAUM, W. (2001b): Nachweise von *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979 in Deutschland (Lep., Gracillariidae). - Melanargia 13(2): 44-47.
- [10] BIESENBAUM, W. (2001c): Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 2. Nachtrag zu Band 5, Familie: Scythrididae Spuler, 1915 und 1. Nachtrag zu Band 8, Familie: Gelechiidae STANTON, 1854 Unterfamilie Gelechiinae STANTON, 1854 - Tribus Teleiodini PISKUNOV, 1979. - Melanargia 13(2): 48-49.

- [11] BIESENBAUM, W. (2001d): Über das Vorkommen der beiden Arten *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776) und *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Choreutidae). - *Melanargia* 13(3/4): 78-82.
- [12] BIESENBAUM, W. (2001e): Erstnachweis vom *Monochroa divisella* (DOUGLAS, 1850) für Hessen (Lep., Gelechiidae). - *Melanargia* 13(3/4): 133-134.
- [13] BIESENBAUM, W. (2001f): Familie Gelechiidae STANTON, 1854, Unterfamilie Gelechiinae STANTON, 1854, Tribus Gelechiini STANTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 9: 1-103, 28 Farabbildungen.
- [14] BIESENBAUM, W. (2002): Revision der bisher in unserem Arbeitsgebiet festgestellten *Oegoconia*-Arten (Lep., Autostichidae). - *Melanargia* 14(1): 4-9.
- [15] BIESENBAUM, W. (2002a): Ein Beitrag zum Vorkommen der Arten *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) und *Elachista tengstromi* KAILA, BENGTSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001 in Deutschland (Lep., Elachistidae). - *Melanargia* 14(3): 70-75.
- [16] BIESENBAUM, W. (2002b): Ein Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Douglasiidae im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Douglasiidae). - *Melanargia* 14(4): 116-122.
- [17] BIESENBAUM, W. (2002c): Familie Gelechiidae STANTON, 1854, Unterfamilie Gelechiinae STANTON, 1854, Tribus Anacampsini BRUAND, [1851], Tribus Chelariini LE MARCHAND, 1947, Unterfamilie Dichomeridinae HAMPSION, 1918, Unterfamilie Pexicopiinae HODGES, 1986 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabildungen). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 10: 1-161, 48 Farabbildungen.
- [18] BIESENBAUM, W. (2003): Beitrag zum Vorkommen von Arten aus der Gattung *Ypsolopha* im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ypsolophidae). - *Melanargia* 15(2): 41-66.
- [19] BIESENBAUM, W. (2003a): Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Plutellidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Plutellidae). - *Melanargia* 15(4): 164-174.
- [20] BIESENBAUM, W. (2003b): Familie Gelechiidae STANTON, 1854, Unterfamilie Gelechiinae STANTON, 1854, Tribus Apatetrini LE MARCHAND, 1947 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabildungen). - Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 11: 1-151, 46 Farabbildungen.
- [21] BIESENBAUM, W. (2004): Erstnachweis von *Monochroa parvulata* GOZMÁNY, 1957 für die Bundesrepublik Deutschland und weitere bemerkenswerte Gelechiiden-Funde aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Gelechiidae). - *Melanargia* 16(1): 9-11.
- [22] BIESENBAUM, W. (2004a): Nachweise von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) aus Baden-Württemberg. - *Melanargia* 16(2): 69-77. [Anmerkung: Mehrere hier als Neufunde genannte Arten wurden schon früher in der für Baden-Württemberg relevanten Literatur genannt, allerdings fehlte ein entsprechender Hinweis in der Deutschlandliste. Diese Meldungen werden deshalb als aktuelle Funde angeführt].
- [23] BIESENBAUM, W. (2005): Bemerkenswerte Nachweise von Kleinschmetterlingen in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). - *Melanargia* 17(1): 15-18.
- [24] BIESENBAUM, W. (2005a): Nachweis von *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae). - *Melanargia* 17(2/3): 84-85.
- [25] BIESENBAUM, W. (2005b): Über das Vorkommen von *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Depressariidae) mit einer vorläufigen Liste der im Arbeitsgebiet nachgewiesenen Arten der Gattungen *Agonopterix* und *Depressaria*. - *Melanargia* 17(2/3): 90-93.
- [26] BIESENBAUM, W. (2006): Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde aus Rheinland-Pfalz (Lep., Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Alucitidae et Pyralidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 2, 4, 7, 8, 9 und 10. - *Melanargia* 18(1): 1-4.
- [27] BIESENBAUM, W. (2006a): Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. - *Melanargia* 18(2): 45-103.
- [28] BIESENBAUM, W. (2006b): Berichtigungen und Ergänzungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. - *Melanargia* 18(4): 214-215.
- [29] BIESENBAUM, W., LEIDERITZ, P. & SELIGER, R. (2005): 3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7 (Lep., Coleophoridae). - *Melanargia* 17(2/3): 56-60.
- [30] BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (2003): Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 3 und Band 7 (Lep., Momphidae et Coleophoridae). - *Melanargia* 15(1): 14-16.
- [31] BILLEN, W. (1999): Ist der Mittelmeernelkenwickler (*Caecocimorpha pronubana* HÜBNER) (Lepidoptera: Tortricidae) im Begriff, in Süddeutschland heimisch zu werden?. - *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutdzienstes* 51: 127-128.
- [32] BLACKSTEIN, H. (2002): Die Tortricidae-Fauna der Länder Brandenburg und Berlin (Insecta: Lepidoptera). - Deutsches Entomologisches Institut (DEI): 1-67, 12 Farbfotos.
- [33] BORKOWSKI, A. (1970): Studien an Stigmelliden (Lepidoptera). Teil II. *Fedalmia thymi* sp. n.: eine neue Art aus Mitteleuropa. - *Polskie Pismo Entomologiczne* 40: 69-78.
- [34] BRYNER, R. (2007): *Choreutis nemorana* (Hübner) in Deutschland wieder gefunden (Lepidoptera, Choreutidae). - *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel* 57: 16-21.
- [35] BÜCHNER, U. (2001): *Doloploca punctulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lepidoptera, Tortricidae) neu für Thüringen. - *Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V.* 8(2): 75.
- [36] BÜCHNER, U. (2005): Nachweis der Feuerdornmotte *Phyllonycter leucographella* (ZELLER, 1850) in Thüringen (Lepidoptera, Gracillariidae). - *Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V.* 12(1): 2-3, 2 Fig.
- [37] BÜCHNER, U. (2006): Berichtigung zu den Arten *Doloploca punctulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Tortricidae) und *Phyllonycter leucographella* (ZELLER, 1850) (Gracillariidae) in den Beiträgen von Büchner (2001, 2005). - *Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V.* 13(1): 6-7.
- [38] DEUTSCHMANN, U. (2002): Die „Kleinschmetterlinge“ Mecklenburg-Vorpommerns Teil 3 (Tortricidae, Wickler). Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 6(1): 5-20, 8 Fig.
- [39] DEUTSCHMANN, U. (2004): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 4 (Yponomeutidae, Geospinstmotten), (Ypsolophidae), (Plutellidae). Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 7(1): 6-11.
- [40] DEUTSCHMANN, U. (2004a): Beitrag zur Schmetterlingsfauna im NSG „Dünenkieferwald am Langhagensee“. -

- Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg-Vorpommern Virgo 7(1): 24-32.
- [41] DEUTSCHMANN, U. (2004b): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 5 (Scythrididae). - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg-Vorpommern Virgo 7(1): 72-73.
- [42] DEUTSCHMANN, U. (2005): Untersuchungen der Kleinschmetterlingsfauna in einem Kalkflachmoor bei Degtow im Landkreis Nordwestmecklenburg. - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 8(1): 30-33.
- [43] DEUTSCHMANN, U. (2005a): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 6 Oecophoridae (Faulholzmotten). - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 8(1): 38-40.
- [44] DEUTSCHMANN, U. (2006): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 7 Bucculatrigidae (Zwergwickler). - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 9(1): 33-34.
- [45] DEUTSCHMANN, U. (2006a): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 8 Mommidae (Fransenmotten). - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 9(1): 35-36.
- [46] DEUTSCHMANN, U. (2007): Nachträge zu den „Kleinschmetterlingen“ Mecklenburg-Vorpommerns (Lepidoptera: Pyralidae, Tortricidae, Gelechiidae). - Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 10(1): 29-32.
- [47] DUDLER, H. & RETZLAFF, H. (2003): Erstnachweise und bisher unberücksichtigte Literaturangaben über Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae). - Melanaria 15(1): 1-4.
- [48] GÄDIKE, R. (2007): New and poorly known Lepidoptera from the West Palaearctic (Tineidae, Acrolepiidae, Douglassiidae, Epermeniidae). Nota lepidopterologica 29(3/4)(2006): 159-176.
- [49] GÄDIKE, R., F. GRAF, C. KAISER, I. LANDECK, H. LEUTSCH, M. NUSS, A. STÜBNER & S. WAUER (2003): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) IV. Entomologische Nachrichten und Berichte 47(2): 77-80.
- [50] GERSTBERGER, M. (2002): Weitere Ergänzungen zur Kleinschmetterlingsfauna der Länder Berlin und Brandenburg (Lepidoptera)(II). - Märkische Entomologische Nachrichten 4(2): 57-62.
- [51] GERSTBERGER, M. (2002a): Biotoptypische Schmetterlingsarten (Lepidoptera) der Salzstelle am Rietzer See in Brandenburg. - Märkische Entomologische Nachrichten 4(2): 63-67.
- [52] GERSTBERGER, M. (2003): Biotoptypische Schmetterlingsarten (Lepidoptera) des NSG „Salzstellen bei Sülldorf“ nebst Anmerkungen zu den halotopobionten Schmetterlingsfauna in Sachsen-Anhalt. - halophilus (Staßfurt) 46: 4-6.
- [53] GERSTBERGER, M. (2003a): Halotopobionte Schmetterlingsarten (Insecta: Lepidoptera) der Naturschutzgebiete „Arerner Solgraben“ und „Schloßberg-Solwiesen“ bei Auleben in Thüringen. Rudolstädter naturhistorische Schriften 11: 135-140.
- [54] GERSTBERGER, M. & STÜBNER, A. (2000): Beitrag zur Kenntnis märkischer Miniersackträger (Lepidoptera: Coleophoridae). Märkische Entomologische Nachrichten 2(2): 1-8.
- [55] GRAF, F.; JACOBASCH, J.; KAISER, C.; LEUTSCH, H.; NUSS, M.; STÖCKEL, D.; STÜBNER, A. & WAUER, S. (2007): Aktuelle Daten zu den Microlepidopteren Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera) VI. - Entomologische Nachrichten und Berichte 51(2): 107-109.
- [56] GRAF, F., H. LEUTSCH, M. NUSS, A. STÜBNER, R. SUTTER & S. WAUER (2001): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern. - Entomologische Nachrichten und Berichte 45(2): 89-96.
- [57] GRAF, F., H. LEUTSCH, M. NUSS, A. STÜBNER & S. WAUER (2002): Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) III. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Dresden 46(2): 99-104.
- [58] GRAF, F., C. KAISER, H. LEUTSCH, M. NUSS, H.-P. REIKE, A. STÜBNER & S. WAUER (2004): Aktuelle Daten zu den Microlepidoptera Sachsens mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lep.) V. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Dresden 48(3/4): 207-212.
- [59] HACKER, H. & MÜLLER, J. (2006): Die Schmetterlinge der bayerischen Naturwaldreservate. Eine Charakterisierung der süddeutschen Waldlebensraumtypen anhand der Lepidoptera (Insecta). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik, Supplementband 1: 1-272.
- [60] HAUSENBLAS, D. (2005): (Lep. div) Ergänzende Neufunde von Lepidopteren für die Fauna Schleswig-Holsteins sowie Bemerkungen zu einigen weiteren Arten. BOMBUS 3(66/67): 261-266.
- [61] HAUSENBLAS, D. (2006): Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopteronaufauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete. - Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 41(1/2): 3-27, 1 Taf.
- [62] HAUSENBLAS, D. (2007): *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847), ein neuer Wickler für die Fauna Deutschlands (Lepidoptera: Tortricidae). - Entomologische Zeitschrift 117(2): 67-70.
- [63] HAUSENBLAS, D. (2007a): Zum taxonomischen Status von *Bucculatrix albipedella* HOFMANN, 1874 und *Coleophora infibulatella* HOFMANN, 1874 (Lepidoptera: Bucculatrigidae, Coleophoridae). - Entomologische Zeitschrift 117(4): 147-150.
- [64] HAUSENBLAS, D. (2007b): Zum Vorkommen von *Blastobasis huemeri* SINEV, 1993 in Deutschland (Lepidoptera, Blastobasidae). - Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 42: 93-95, 1 Fig.
- [65] HAUSENBLAS, D. & ROWEK, H. (2003): 161. (Lep. div.) - Neue Lepidopterarfunde für die Fauna Schleswig-Holsteins und Hamburgs. - BOMBUS 3(58/60): 234-236.
- [66] HEINZE, B.; STROBL, P.; KÖNECKE, F.-W.; SCHULZ, F. & HEINEMANN, M. (2006): Insekten der Altmark und des Elbhavellandes. 1. Teil. Leidoptera - Schmetterlinge. Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Sonderheft 2006: 3-66.
- [67] HEMMERSBACH, A. (2001): Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) und *Eratophyes* [sic!] *amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) am Niederrhein (Lep., Tortricidae et Oecophoridae). Melanaria 13(3/4): 88-90.
- [68] HORNEMANN, A. (2006): Hessenfauna 16. Wiederfunde von *Euplocamus anthracinalis* (SCOPOLI, 1763) im südlichen Hessen (Lepidoptera: Tineidae, Eupocaminae). - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N. F. 27(4): 214, 1 Fig.
- [69] KARISCH, T. (2000): *Aethes triangulana* (TREITSCHKE, 1835), ein neuer Wickler für Sachsen. - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 19: 145-147.
- [70] KARSHOLT, O., AARVIK, L., AGASSIZ, D., HUEMER, P. & TUCK, K. (2005): *Acleris effractana* (HÜBNER, 1799) - a Holarctic Tortricid. Nota lepidopterologica 28(2): 93-102.
- [71] KAYSER, C. (2001): 139. (Lep. Coleophoridae) - Über einige interessante Coleophora-Arten aus unserem Faunengebiet. BOMBUS 3(51/52): 202-203.
- [72] KAYSER, C. (2002): 149. (Lep. Gracillariidae). - Eine seltene und eine für unser Faunengebiet neue Gracillariide. - BOMBUS 3(53/54): 215-216.

- [73] KAYSER, C. & VAN LOH, H.-J. (2004): Aktualisierungen und Neufunde von Blatttütenmotten aus Niedersachsen (Lep., Gracillariidae). - *Melanargia* 16(2): 89-92.
- [74] KOLBECK, H., LICHTMANNECKER, P. & PRÖSE, H. (2005): neu und bemerkenswerte Funde von Kleinschmetterlingen aus Bayern (Insecta: Lepidoptera). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 7: 151-158.
- [75] KRÜGER, E. O. (2001): 140 (Lep. Oecophoridae) - Neu für die Fauna Niedersachsens: *Eratophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855). *BOMBUS* 3(51/52): 203.
- [76] KRÜGER, E. O. (2004): 168 (Lep. Pyralidae) - Neu für die Fauna Niedersachsens: *Evergestis aenealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775). - *BOMBUS* 3(64/65): 259.
- [77] LEIDERITZ, P. (2001): Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) (Lep., Tortricidae). - *Melanargia* 13(2): 50.
- [78] NUSS, M., SEGERER, A., STÜBNER, A. & WERNO, A. (2004): Microlepidoptera vom Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. - *carolinaea* 62: 105-111, 1 Fig., 2 Farbtaf.
- [79] NUSS, M. & A. STÜBNER (2001): Aktuelle Daten zur Fauna der Lithocelletinae in Sachsen. - (Lep., Gracillariidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 44(4) (2000): 225-228.
- [80] NUSS, M. & A. STÜBNER (2003): *Coleophora variicornis* TOLL, 1952 stat. rev. is a distinct species occurring in Central Europe (Coleophoridae). - Nota lepidopterologica 26(1/2): 27-34.
- [81] PETSCHENKA, G. (2003): Erstfund von *Eratophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) in Baden-Württemberg (Lep., Oecophoridae). *Melanargia* 15(4): 159-162, 1 Foto.
- [82] PLOTZ, A. (2005): Ein bemerkenswerter Neufund für Mecklenburg/Vorpommern *Brachmia dimidiella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) Lepidoptera Gelechiidae Dichomeridinae. - Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo 8(1): 4, 1 Fig.
- [83] PRÖSE, H. (2001): Neue Ergebnisse zur Faunistik der „Microlepidoptera“ in Bayern. Vierter Beitrag. (Insecta: Lepidoptera). Dem Gedenken an ALFONS SPECKMEIER gewidmet. - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 50(1/2): 51-65.
- [84] PRÖSE, H. (2005): 523 Schmetterlingsarten (Lepidoptera) in einem Oberpfälzer Garten. Ein Beitrag zur Entomofaunistik der nördlichen Oberpfalz. Dem Gedenken an ANNEMARIE PFISTER (1910-1999) gewidmet. *galathea* 21(1): 3-46.
- [85] PRÖSE, H. (2006): Neue Ergebnisse zur Faunistik der „Microlepidoptera“ in Bayern - 5. Beitrag. (Insecta: Lepidoptera). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 8: 99-105.
- [86] PRÖSE, H.; KOLBECK, H. & SEGERER, A. H. (2003): Addenda et Corrigenda zur Liste der bayerischen „Kleinschmetterlinge“ 1999 und zu den bayerischen Angaben in der Deutschlandliste (Entomofauna Germanica). Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 5: 33-45.
- [87] PRÖSE, H. & NOWAK, G. (2001): *Nola subchlamydula* STAUDINGER, 1871, *Eana cyanescana* (RÉAL, 1953) und *Lobesia virulenta* BAE & KOMAL, 1991 - drei für Bayern neue Schmetterlingsarten (Lepidoptera: Nolidae, Tortricidae). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 4: 29-31.
- [88] RETZLAFF, H. (2002): Drei für Nordrhein-Westfalen neue Schmetterlingsarten *Antispila treitschkiella* (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1843), *Eudarcia pagstencherella* (HÜBNER, 1825) und *Pseudodatemelia synchrozella* (JACKH, 1959) (Lep., Heliozelidae, Tineidae et Amphisbatidae). - *Melanargia* 14(3): 57-59, Taf. IV: Fig. 1-3.
- [89] RETZLAFF, H. & DUDLER, H. (2002): Zur Ausbreitung einiger Miniermotten im östlichen Westfalen, im mittleren Niedersachsen und in Nordhessen (Lep., Gracillariidae). - *Melanargia* 14(2): 51-53.
- [90] RETZLAFF, H. & KINKLER, H. (2004): Die Verbreitung von *Erebia aethiops* (ESPER, 1777) in Nordrhein-Westfalen und ihre lokalen Vorkommen in den lichten und thermophilien Kiefernbeständen der Kalklandschaften (Lep., Nymphalidae). - Verbreitung, Ökologie, Gefährdung, Habitatpflege und Entwicklung, Artenschutz, zu berücksichtigende Leit- und Begleitarten. - *Melanargia* 16(2): 45-68.
- [91] RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2002): Der Lärchengallen-Wickler *Cydia millenniana* (ADAMCZEWSKI, 1967) - eine in Deutschland seltene oder nur übersehene Art? (Lep., Tortricidae). - *Melanargia* 14(4): 123-125.
- [92] RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2005): Rote Liste und Artenverzeichnis der Wickler (Lep., Tortricidae et Choraeutidae) in Nordrhein-Westfalen. - *Melanargia* 17(4): 101-147.
- [93] RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2007): Die Hochheiden, Felsheiden, Bergwiesen, Moore und Wälder im Hochsauerland und in der Hocheifel als bedeutsame Refugien für montane Schmetterlingsarten in Nordrhein-Westfalen. - *Melanargia* 19(1): 1-62, 10 Farbtaf.
- [94] ROMMEL, R.-P. (2003): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Lepidoptera). I. Beitrag: Familien Ethmiidae und Pyralidae (Unterfamilien Galleriinae, Pyralinae, Phycitinae, Odontiinae, Evergestinae, Pyraustinae). Thüringer Faunistische Abhandlungen 9: 187-222.
- [95] ROMMEL, R.-P. & PLATT, H. (2006): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Insecta: Lepidoptera). 3. Beitrag: Chimabachidae, Oecophoridae (Faulholzmotten) und Amphisbatidae. Thüringer Faunistische Abhandlungen 11: 129-144.
- [96] ROWECK, H. & SAVENKOV, N. (2002): Ergänzungen zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Schleswig-Holstein und Hamburg. - Faunistisch-ökologische Mitteilungen 8: 201-218, 3 Taf.
- [97] ROWECK, H. & SAVENKOV, N. (2007): Weitere Ergänzungen zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Schleswig-Holstein und Hamburg. - Faunistisch-ökologische Mitteilungen 8: 471-482, 2 Taf. [Eine Reihe von Meldungen wird als „Neufunde“ deklariert, obwohl diese Arten schon früher für das Gebiet gemeldet wurden]
- [98] SCHMITZ, W. (2001): Die Schmetterlingsfauna des NSG „Kallmuther-Berg mit Westschacht“ bei Mechernich-Kallenberg (Nordeifel/NRW) (Macrolepidoptera et Pyralidae). - *Melanargia* 13(3/4): 117-130.
- [99] SCHUMACHER, H. (2003): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 15. Zusammenstellung. - *Melanargia* 15(2): 70-80.
- [100] SCHUMACHER, H. (2004): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 16. Zusammenstellung. - *Melanargia* 16(1): 17-28.
- [101] SCHUMACHER, H. (2005): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 17. Zusammenstellung. - *Melanargia* 17(1): 30-45.
- [102] SCHUMACHER, H. (2006): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 18. Zusammenstellung. - *Melanargia* 18(1): 22-34.
- [103] SCHUMACHER, H. (2007): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. *Melanargia* 19(1): 63-74.
- [104] SEGERER, A. (2001): Zum Vorkommen einiger bemerkenswerter blattminierender „Kleinschmetterlinge“ in bayrischen Moorbiotopen (Insecta: Lepidoptera: Nepticulidae, Tischeriidae, Gracillariidae). - Beiträge zur bayrischen Entomofaunistik 4: 33-40.

- [105] SEGERER, A., PROSE, H., KOLBECK, H. & LICHTMANNECKER, P. (2003): *Nematopogon magna* (ZELLER, 1878) ein kaum bekannter Langhornfalter in Bayern (Lepidoptera: Adelidae: Nematopogoninae). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 5: 25-31.
- [106] SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002): Funde von *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Tortricidae). Melanargia 14(2): 47-49.
- [107] SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002a): Zur Lebensweise und Verbreitung von *Bedellia somnulentella* (ZELLER, 1847) (Lep., Bedelliidae). Melanargia 14(2): 54-55.
- [108] STEUER, H. (2002): 2. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen)(Lep.) Entomologische Nachrichten und Berichte 46(3): 167-172, 12 Fig.
- [109] STÜBNER, A. (2007): Taxonomische Revision der *Coleophora frischella*-Artengruppe (Coleophoridae). Nota lepidopterologica 30(1): 121-172, 63 Fig.
- [110] STÜBNER, S. & STÜBNER, A. (2003): Kleinschmetterlinge aus der Hessischen Rhön (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47(3/4): 183-186. [Anmerkung: Eine Reihe der hier als Neufunde für Hessen gemeldeten Arten sind schon früher für Hessen gemeldet worden (z. B. bei RÖSSLER, A. 1866, 1881), allerdings wurden sie bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste nicht ausgewertet. Die Meldungen werden hier als Erstfunde geführt, da sie bisher in der Deutschlandliste für HE fehlten.]
- [111] SUTTER, R. (2000): *Lobesia virulenta* BAE & KOMEI, 1991 (Lep., Tortricidae) neu für Deutschland. Entomologische Nachrichten und Berichte 44(3): 201-202.
- [112] SUTTER, R. (2003): Die Arten der Gattung *Oegoconia* STANTON, 1854 in Deutschland und ihre Verbreitung in Ostdeutschland (Lepidoptera: Autostichidae). - Beiträge zur Entomologie 53(2): 437-447, 40 Fig.
- [113] TEN HOLT, H. (2005): 174. (Lep. Heliozelidae) - *Antispila treitschkiella* (FISCHLER [sic!] VON RÖSLERSTAMM, 1843) - Neu für Niedersachsen. - BOMBUS 3(66/67): 266-267. [Nicht neu, da schon früher für die Umgebung von Hannover - siehe FÜGE et al., 1930 - gemeldet]
- [114] WAUER, S. (2003): *Retinia perangustana* (SNELLEN, 1883) - eine neue Art für Deutschland (Lep., Tortricidae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 47(1): 43-44, 1 Photo.
- [115] WEGNER, H. (2001): 134. (Lep. Tortricidae) - Neue und bemerkenswerte Tortricidae im Faunengebiet. I. - BOMBUS 3(49/50): 194-197.
- [116] WEGNER, H. (2001a): 141. (Lep. Tortricidae) - Neue und bemerkenswerte Tortricidae im Faunengebiet. II. (Teil I: siehe BOMBUS 3: 194 - 197). - BOMBUS 3(51/52): 204-205.
- [117] WEGNER, H. (2003): 152. (Lep. Tortricidae) - Neue und bemerkenswerte Tortricidae im Faunengebiet. III. (Teil I und II: siehe BOMBUS 3: 194-197, 204-305). - BOMBUS 3(55/57): 218-223.
- [118] WEGNER, H. (2003a): 153. (Lep. Depressariidae) Ein Beitrag zur Depressariiden-Fauna in Nordwest-Deutschland. - BOMBUS 3(55/57): 223-224.
- [119] WEGNER, H. & KAYSER, C. (2006): Neubearbeitung der zünslerartigen Schmetterlinge von Hamburg, Schleswig-Holstein, dem nördlichen Niedersachsen und Bremen (Lepidoptera: Pyralidae). - Faunistisch-Ökologische Mitteilungen, Supplement 33: 3-54, 4 Farbtaf.
- [120] WEGNER, H.; KAYSER, C. & VAN LOH, H.-J. (2007): Die Palpenmotten Nordwest-Deutschlands - eine Dokumentation der Beobachtungen in den Jahren 1981 - 2006 (Lepidoptera: Gelechiidae). - Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 8: 417-438, 42 Farbabb.
- [121] WERNO, A. (2001): Neue Arten von Kleinschmetterlingen für die saarländische Lepidopterenfauna mit 3 Erstnachweisen für die Bundesrepublik Deutschland. - Abhandlungen der Delattinia 27: 229-244, 3 Farbabb.
- [122] WEYH, R. E. (2007): Hessenfauna 17. *Ditula angustiorana* (HAWORTH, 1811) in Hessen gefunden (Lepidoptera: Tortricidae, Tortricinae, Archipini). - Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N. F. 28(1/2): 13-14, 1 Fig.
- [123] WITTLAND, W. (2001): Zur Verbreitung von *Lozotaenides formosana* (GEYER, 1830) in Deutschland (Lep., Tortricidae). - Melanargia 13(1): 14-16.
- [124] WITTLAND, W. (2001a): Zum Status von *Duponchelia fovealis* (ZELLER, 1847) in Deutschland (Lep., Pyralidae). - Melanargia 13(2): 41-43.
- [125] ZELLER-LUKASHORT, H. C.; KURZ, M. E.; LEES, D. C. & KURZ, M. A. (2007): A review of *Micropterix* HÜBNER, 1825 from northern and central Europe (Micropterigidae). - Nota lepidopterologica 30(2): 235-298, 125 figs.

## Literatur

- AGASSIZ, D. J. L. & LONGMAID, J. R. (2004): The *Eucosma hohenwarthiana*-group of species (Tortricidae). - Nota lepidopterologica 27(1): 41-49.
- AMSEL, H. G. (1930): Die Microlepidopterenfauna der Mark Brandenburg nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse. - Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“ Dresden 44(2): 83-96; 44(3): 97-132.
- AMSEL, H. G. (1961): Über einige bemerkenswerte Kleinschmetterlinge des Naturschutzgebietes von Unteruhldingen am Bodensee. Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwest-Deutschland 20: 93-98.
- ARENBERGER, E. (1995): Pterophoridae. - In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. & REISER, H. (Hrsg.): Microlepidoptera Palearctica 9. - G. BRAUN, Karlsruhe, XXV+258 S., 153 Taf.
- BALDIZZONE, G. & TABELL, J. (2002): *Coleophora obscenella* HERICH-SCHÄFFER, 1855, *C. virgaureae* STANTON, 1857 and *C. cinea* TOLL, 1953, three distinct species (Lepidoptera: Coleophoridae). - Shilap, Revista lepidopterologica 30(117): 15-26.
- BENGTSSON, B. Å. (1984): The Scythrididae (Lepidoptera) of Northern Europe. - Fauna Entomologica Scandinavica 13: 1-137.
- BOLL, E. F. A. (1850): Uebersicht der Mecklenburgischen Lepidopteren. - Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs 4: 12-50.
- DAVIS, D. & DESCHKA, G. (2001): Biology and systematics of the North American *Phyllonorycter* leafminers in Salicaceae, with a synoptic catalog of the palearctic species. - Smithsonian Contributions to Zoology 614: 1-89.
- DEUTSCHMANN, U. (2002): Die „Kleinschmetterlinge“ Mecklenburg-Vorpommerns Teil 3 (Tortricidae, Wickler). - Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 6(1): 5-20, 8 Fig.
- DISQUÉ, H. (1900): Zur Mikrolepidopteren-Fauna von Speier nebst Nachträgen und Berichtigungen zu „REUTTI, Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden“. - Mitteilungen des badischen zoologischen Vereins 7: 126-135.
- DISQUÉ, H. (1901): Verzeichniss der in der Umgegend von Speyer vorkommenden Kleinschmetterlinge. - Deutsche entomologische Zeitschrift Iris 14: 149-176, 197-228.
- ELSNER, G., HUEMER, P. & TOKÁR, Z. (1999): Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen. - Bratislava, 208 S.
- FUCHS, A. (1881): Microlepidopteren des Rheingaus. - Stettiner entomologische Zeitung 42: 451-470.
- FUCHS, A. (1886): Microlepidopteren des unteren Rheingau's nebst einer allgemeinen topographisch-lepidopterologischen Einleitung, Dritter Artikel. - Stettiner entomologische Zeitung 47: 39-83.
- FUCHS, A. (1899): Über die neuesten lepidopterologischen Forschungen in der Loreley-Gegend. - Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 52: 161-173.
- FÜGE, B.; PFENNIGSMUTH, W.; PIETZSCH, W. & TRÖDER, J. (1930): Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. - Naturhistorische Gesellschaft Hannover, 140 S.
- FUNK, A. (1923): XIII. Schmetterlinge (Lepidoptera). - In: Das Naturschutzgebiet am Federsee in Württemberg. - Beiträge zur Naturdenkmalfpflege 8: 374-395.
- GAEDIKE, R. (1972): Beitrag zur Kenntnis der Epermeniidae- und Acrolepiidae fauna der BRD (Lepidoptera). - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N. F.) 19(I/II): 31-44.

- GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomoifauna Germanica 3). - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 5: 1 - 216.
- GIERLING, R. (1984): Microlepidoptera. - *Atalanta* 15: 68-72.
- GRABE, A. (1955): Kleinschmetterlinge des Ruhrgebietes. - Mitteilungen aus dem Ruhrland- und Heimatmuseum der Stadt Essen 117(2): XV+1-159.
- GROSS, F. (1964): Beitrag zur Lepidopterenfauna der weiteren Umgebung von Wiesbaden. - Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde 97: 50-80.
- HARTWIEG, F. (1958): Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings. - Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig, 148 S.
- HECKFORD, R. J., SATTLER, K. & YORK, P. V. (1999): The taxonomic status of *Eulamprotes immaculatella* (DOUGLAS, 1850) (Lepidoptera: Gelechiidae). - *Entomologist's Gazette* 50: 145-150.
- HEUSER, R.; JÖST, H. & ROESLER, R. (1971): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. V. Die Zünsler. - Mitteilungen der Pollichia 18: 11-85.
- HUEMER, P. & KARSHOLT, O. (1999): Gelechiidae I (Gelechiinae: Telioidini, Gelechiini). - In: HUEMER, P., KARSHOLT, O. & LYNEBORG, L. (Hrsg.), *Microlepidoptera of Europe*, Apollo Books, Stenstrup 3: 356 p.
- JÄCKH, H. (1942): Die Microlepidopteren-Fauna des rechtsrheinischen Mittelrheintales nebst Beschreibung von *Borkhausenia magnatella* spec. nov. (Lep., Gelechiidae). - Zeitschrift des Wiener entomologischen Vereins 27: 195-200, 216-218.
- JÄCKH, H. (1951): *Pristiphora florella* (MANN, 1862) - (Pyralidae, Phycitinae) am Mittelrhein. - Zeitschrift für Lepidopterologie 1(1950-1951): 105.
- JÖST, H. (1950): *Pristiphora florella* MANN in der Pfalz (Lep., Pyralidae). - Zeitschrift für Lepidopterologie 1: 45-48.
- KAILA, L. (1999): Phylogeny and classification of the Elachistidae s. s. (Lepidoptera: Gelechioidea). - *Systematic Entomology* 24: 139-169.
- KAILA, L.; BENGTSSON, B. A.; ŠULCS, I. & JUNNILAINEN, J. (2001): A revision of the *Elachista regificella* SIRCOM complex (Lepidoptera: Elachistidae). - *Entomologica Fennica* 12: 153-168.
- KARSHOLT, O. (1995): Kommentiertes Verzeichnis der Symmocidae, Blastobasidae und Gelechiidae Ostdeutschlands (Lepidoptera). - Beiträge zur Entomologie 45(1): 137-154.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. [Hrsg.] (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. - Stenstrup: Apollo Books 1-380.
- KÖPPEL, C.; SPELDA, J. & RAHMANN, H. (1994): Die Schmetterlinge (Lepidoptera) von vier Kiesgruben unterschiedlicher Sukzessionsstufen in Oberschwaben. - Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Würtemberg 150: 237-279.
- KOZLOV, M. V. (2004): Annotated checklist of the European species of *Nemophora* (Adelidae). - *Nota lepidopterologica* 26(3/4)(2003): 115-126.
- KOZLOV, M. V. & KAILA, L. (2001): The identity of *Tinea megerella* HÜBNER, [1810] - a long-lasting confusion between *Elachista* (Elachistidae) and *Adela* (Adelidae). - *Nota lepidopterologica* 24(4): 3-10.
- KURZ, M. & HUEMER, P. (2000): Erstnachweis von *Anthophila abhasica* DANILEVSKY, 1969, in den Alpen (Lepidoptera, Choreutidae). - Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 49(3/4): 87-91.
- LERAUT, P. (1997): Liste systematique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). - Alexander Supplément 1997: 1-526.
- LERAUT, P. (2001): Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). - Revue française d'Entomologie, N. S. 23(2): 129-141.
- LERAUT, P. (2002): Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). - Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 19(2): 115-250.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwest-Deutschland 14: 70-77.
- MEESS, A. (1907): Nachtrag zu REUTTI's Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden. - Mitteilungen des badischen zoologischen Vereins 18: 121-130.
- MEY, W. (1994): Taxonomische Bearbeitung der westpaläarktischen Arten der Gattung *Leucoptera* HÜBNER, [1825], s. l. (Lepidoptera, Lyonetiidae). - Deutsche entomologische Zeitschrift, N. F. 41(1): 173-234.
- MÖBIUS, E. (1936-1937): Verzeichnis der Kleinschmetterlinge von Dresden und Umgebung. - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 50(3)(19.X.1936): 101-134; 50(4)(30.I.1937): 167-196.
- NUSS, M. (1999): Revision der Gattungen der Scopariinae (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae). - Nova Supplementa Entomologica 13: 3-151.
- NUSS, M. & A. STUBNER (2003): *Coleophora variicornis* TOLL, 1952 stat. rev. is a distinct species occurring in Central Europe (Coleophoridae). - *Nota lepidopterologica* 26(1-2): 27-34.
- PARENTI, U. (2000): A Guide to the Microlepidoptera of Europe. - Museo regionale di Scienze Naturali Torino, 426 S., 156 Taf.
- RAPP, O. (1936): Beitrag zur Fauna Thüringens, Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). - Erfurt, 240 p.
- RAZOWSKI, J. (2001): Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen. - Bratislava, 319 S.
- REUTTI, C. (1853): Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden. - Beiträge zur Rheinischen Naturgeschichte 3: 1-216.
- REUTTI, C. (1898): Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden und der anstoßenden Länder. 2. Ausg. Herausgegeben von MEESS, A. & SPULER, A. - Berlin, BORNTRÄGER, 361 S.
- RIEDL, T. (1969): Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques (Lepidoptera). Partie IX. Revue des Momphidae européennes, y compris quelques espèces d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. - Polskie Pismo Entomologiczne 39(4): 635-919.
- ROESLER, R.-U. (1973): Phycitinae. - In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. & REISSER, H. (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica* 4. - G. FROMME & Co., Wien, XVI+752+137 S., 170 Taf.
- ROESLER, R.-U. (1982): Der Zünsler *Vitula biviella* (ZELLER, 1848) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae) neu für die Fauna Baden-Württembergs. - carolina 40: 105-106.
- ROßSLER, A. (1881): Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte. - Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde 33-34(1880-1881): 1-393.
- SAUTER, W. (1981): Interessante Neufunde von Microlepidopteren aus der Schweiz und Süddeutschland. - *Nota lepidopterologica* 4: 103-106.
- SCHÜTZE, K. T. (1899): Die Kleinschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. I. Theil (Pyralidina, Pterophorina, Alucitina). - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 12: 269-287.
- SCHÜTZE, K. T. (1902): Die Kleinschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. II. Theil (Tortricina). - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 14: 116-138.
- SCHÜTZE, K. T. (1902): Die Kleinschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. III. Theil (Tineina, Micropterygina). - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 15: 1-49.
- SCHÜTZE, K. T. (1930): Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. III. Theil (Tineina, Micropterygina). - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 44(1): 1-41.
- SCHULTZ, V. (1949): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 9. 15 Kleinschmetterlingsarten des lippsischen Faunengebietes, die im benachbarten Westfalen bislang nicht registriert wurden. - Natur und Heimat 13(3): 1-13.
- SCHULZ, W. (2000): Die Roßkastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 Hinweise und Aufruf zur Mitarbeit (Lep., Lithocolletinae). - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 16: 71-73.
- SCHWEITZER, K. (1931): Die Groß- und Kleinschmetterlinge des Vogtländes. - Mitteilungen der Vogtländischen Gesellschaft für Naturforschung, Plauen 1(7): 1-84.
- SORHAGEN, L. (1886): Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg und einiger angrenzender Landschaften. - Berlin, R. FRIEDLÄNDER & SOHN, I-X, 1-367.
- SPULER, A. (1903-1910): Die Schmetterlinge Europas. Stuttgart, E. SCHWEITZERBART'sche Verlagsbuchhandlung. 2: 1-526, Taf. 81-91.
- STAMM, K. (1955): Bericht über die Exkursion 1950 in die Umgebung der Loreley und die Exkursion 1951 nach Moselkern. - Zeitschrift für Lepidopterologie 3: 73-80.
- STANGE, G. (1899): Die Tineen der Umgegend von Friedland i. Meckl. [I. Teil]. - Wissenschaftliche Beilage, Programm des Gymnasiums Friedland in Mecklenburg: 1-50.
- STARKE, H. (1942): Zweiter Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. - Deutsche entomologische Zeitschrift Iris 55(1941): 127-133.

- STEUDEL, W. & HOFMANN, E. (1882): Verzeichniss württembergischer Kleinschmetterlinge. - Jahresheft des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **38**: 143-262.
- STEUER, H. (1998): Neue Daten zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) der Umgebung von Bad Blankenburg (Thüringen). - Rudolstädter naturhistorische Schriften **9**: 29-34.
- STOLLWERK, F. (1863): Die Lepidopteren-Fauna der Preussischen Rheinlande. - Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens **20**: 43-348.
- STÜNING, D. (1988): Biologisch-ökologische Untersuchungen an Lepidopteren des Supralitorals der Nordseeküste. - Faunistisch-Ökologische Mitteilungen, Supplement **7**: 1-116.
- SÜSSNER, L. (1972): Bemerkenswerte Funde von Microlepidopteren in Württemberg. Ergänzung I. - Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart **7**: 77-84.
- SÜSSNER, L. (1983): *Scardia tessulatella* (ZELLER) (Tineidae) (Kleine Mitteilungen 48). - Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart **18**: 31.
- UFFELN, K. (1930): Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidoptera) Westfalens. - Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzialmuseum für Naturkunde **1**: 69-70.
- WÖRZ, A. (1952): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (3. Fortsetzung). - Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **107**(1951): 191-211.
- WÖRZ, A. (1954): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (5. Fortsetzung). - Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **109**: 83-130.
- WÖRZ, A. (1955): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (6. Fortsetzung). - Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **110**: 229-260.
- WÖRZ, A. (1957): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (8. Fortsetzung). - Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **112**: 282-313.
- WÖRZ, A. (1958): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (9. Fortsetzung und Schluß). - Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg **113**: 253-312.

Manuskripteingang: 31.1.2008

Anschrift des Verfassers:

Dr. REINHARD GAEDIKE  
Florusstraße 5  
D-53225 Bonn  
email: tinagma@msn.com.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard

Artikel/Article: [Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge  
Deutschlands \(Microlepidoptera\). 9-49](#)