© Entomologische Nachrichten und Berichte; down

BRITZ, L. (1968): Gesundheitsschädlinge des Menschen und seiner Nutztiere. – In FRITZSCHE, R., GEILER, H. & SEDLAG, U.: Angewandte Entomologie: 595-638. Jena.
VATER, G. (1969): Zur Lage in der Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen. – Verhandlungen Jahreskongress Gesellschaft für Seuchenschutz, Leipzig: 518-539.
VATER, G. (1973): Virusübertragung durch mitteleuropäische Stechmücken. – Biologische Rundschau **11**: 234-238.
BRITZ, L. (1976): Gesundheitsschädlinge im Krankenhaus, ihre Bedeutung und Bekämpfung. – Das stationäre und ambulante Gesundheitswesen **25**: 5-8.
BRITZ, L. (1976): Arthropoden als Überträger von Infektionserregern. – In WILDFÜHR, G. & W. WILDFÜHR: Medizin. Mikrobiologie, Immunologie und Epidemiologie, 2. Aufl. Bd. I: 477-502, Leipzig.
MÜLLER, P., COCH, F., KRETZMAR, K., BRITZ, L., OCKERT, G., DIX, V., SEMLOW, A., STEINBRINK, H. & DITTMANN, I. (1976): Gesundheitsschädlinge und ihre Bekämpfung in stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens. – Das stationäre und ambulante Gesundheitswesen **29**: 93 -120.
BRITZ, L. (1971): Arten und Bedeutung der im Krankenhaus vorkommenden Insekten. – Medizin aktuell **3** (12): 565.
VATER, G. (1979): Hausschaben (*Blattella germanica*) im Kühlschrank. – Angewandte Parasitologie **20**: 147-154.
VATER, G. (1980): Einfluß von DDT/Lindan auf den Goldafterparasiten *Eupteromalus peregrinus* (Pteromalidae). – Angewandte Parasitologie **21**: 159-163.
BRITZ, L. (1981): Besondere arachno-entomologische Geschehen in den Bezirken und Notizen über die Verbreitung der Pharao-Ameisen in der DDR – Angewandte Parasitologie **22**: 111.
BRITZ, L. (1981): Notizen zur Gattung *Solenopotes* (Anoplura Linognathidae). – Angewandte Parasitologie **22**: 4.
VATER, G. (1981): Die Erntemilbe *Neotrombicula autumnalis* im Gebiet von Leipzig. – Angewandte Parasitologie **22**: 32-38.
VATER, G. (1981): Nissen-Differenzierung und Behandlung von Läuseeiern. – Heilberufe **33**: 468-470.
VATER, G. (1982): Zur geographischen Verbreitung der Erntemilbe *Neotrombicula autumnalis* (Acari, Trombiculidae). Zoologische Jahrbücher Systematik **109**: 329-356.
BRITZ, L. (1983): Über einheimische Stechmücken des Subgenus *Aedes* (Dipt., Culicidae). – Angewandte Parasitologie **24** (3): 152-156.
BRITZ, L. (1983): Informationen über *Culex torrentium* und *C. territans* (Dipt. Culicidae). – Angewandte Parasitologie **24** (4): 216-223.
VATER, G. (1983): Medizinische Arachno-Entomologie als Bestandteil des Gesundheitsschutzes in der DDR. – Medizin-Report **12**: 291-351.
BAUCH, R., ZIESENHEMM, K. & GROSKOPF, C., (1984): *Lucilia sericata*-Myiasis (Diptera, Calliphoridae) an einer Vorfuß-Gangrän!. – Angewandte Parasitologie **25**: 167-169.
BRITZ, L. (1984): Ein weiterer Beitrag zum Kriebelmücken-Vorkommen (Dipt. Simuliidae) in der DDR. – Angewandte Parasitologie **25** (1): 36-43.
BRITZ, L. (1984): Gedanken über die mögliche Bedeutung von Arthropoden für die Zirkulation und Verbreitung der Plasmide. – Angewandte Parasitologie **25** (3): 141-147.
VATER, A. & VATER, G. (1984): Flöhe (Siphonaptera) beim Menschen. Befundanalyse 1981-1983 im Bezirk Leipzig Teil 1: Arten, Befallsquellen und Ausbreitung. – Angewandte Parasitologie **25**: 148-156.
BRITZ, L. (1985): Zur Klassifikation der Brutplätze von Stechmücken (Dipt., Culicidae). Angewandte Parasitologie **26** (3): 157-164.
VATER, A. & VATER, G. (1985): Flöhe (Siphonaptera) beim Menschen. Befundanalyse 1981-1983 im Bezirk Leipzig Teil 2: Räumliche und zeitliche Verbreitung. – Angewandte Parasitologie **26**: 27-38.
BRITZ, L. & BAUCH, R. (1986): Zur Kenntnis der Stechmückenfauna (Dipt. Culicidae) des DDR-Bezirkes Leipzig. – Angewandte Parasitologie **27** (2): 91-122.
BRITZ, L. & VATER, G. (1986): 25 Jahre Abteilung Medizinisch Parasitologie und 10 Jahre Referenzlaboratorium für Medizinische Arachno-Entomologie der DDR an Bezirks-Hygieneinspektion und -Institut Leipzig. – Angewandte Parasitologie **27** (1): 3-9.
BAUCH, R. & DANNER, G. (1988): Funde von *Ixodes Dermacentor reticulatus* (Ixodida, Ixodidae) in den DDR Bezirken Leipzig und Halle. – Angewandte Parasitologie **29**: 250-254.
BAUCH, R. (1990): *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis concinna* und *Dermacentor reticulatus* (Ixodida, Ixodidae) im DDR-Bezirk Leipzig. – Angewandte Parasitologie **31**: 57-64.
VATER, G. (1991): Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen im Bezirk Leipzig 1980-1990. – Der praktische Schädlingsbekämpfer **43**: 256-272.
VATER, G., VATER, A. & SORGER, O. (1992): Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen im Bezirk Leipzig 1980-1990, Teile 2, 3 und 4. – Der praktische Schädlingsbekämpfer **44**: 128-139, 152-161, 208-246.
VATER, ANTJE (1993): Gliederfüßer in Leipziger Wohnungen. – Zeitschrift für angewandte Zoologie **79**: 65-115.
BAUCH, R. (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchungen über *Ixodes ricinus* im Stadtgebiet von Leipzig. – Angewandte Parasitologie **34**: 57-64.
VATER, ANTJE (1996): Parasitische Arthropoden in Leipzig. – In: BREUSTE, J.: Stadtökologie und Stadtentwicklung, Bd. 4, Analytica: 273-292, Berlin.
VATER, G. (2007): Das Referenzlaboratorium für Medizinische Arachno-Entomologie und sein ökofaunistischer Nachlass. – Entomologische Nachrichten und Berichte **51**: 161-166.
BRITZ, L. (Manuskript, Stand 1995): Gesundheitsschädliche Arthropoden. Einführung in die Medizinische Arthropodologie. 823 Seiten, 382 Abb., 9 Phylogramme, 42 Schlüssel zur Identifikation, 39 Karten. – Hinterlegt im Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg.

Manuskripteingang: 6.6.2008

Anschrift des Verfassers:
Dr. Lothar Britz
Wertheimer Straße 25
D-04207 Leipzig

ERLESENES

Gedanken über Sauriermist

Dinosaurier sind seit der Trias bekannt, Scarabaeiden tauchen erst in der Fossilüberlieferung des Oberjura auf. Triassische Spuren von Coprophagie in Vertebraten-Coprolithen (nicht nur von Dinosauriern) werden Dipterenlarven zugeschrieben. Älteste eindeutig von einem sehr häufigen südamerikanischen Dungkäfer stammende Spurenfossilien sind aus der Oberkreide bekannt; man fand auch eine Puppenkammer. Dinosaurierkot dürfte ebenso wie Vogelkot (Guanoablagerungen!) durch Beigabe von Harnverbindungen für Käfer wenig attraktiv gewesen sein. Jedenfalls ist ihre Coprophagie, die wahrscheinlich ab der unteren Kreide in Gondwanaland begann, von Anfang an mit Säugetieren assoziiert gewesen. Im Mesozoikum war der Energiefluss im Ökosystem wahrscheinlich langsamer als in der Erdneuzeit. Der Dinosaurierkot sammelte sich wohl an und wurde hart. Eine Regeneration des Bodens dürfte aber wegen geringer Populationsdichte möglich gewesen sein. Erinnert sei an die Problematik der unter Rindermist erstickenden Böden Australiens, ehe sich eingeführte afrikanische Mistkäfer ihrer annahmen. Im tropischen Regenwald spielt Kotansammlung keine Rolle. (Journal of Natural History 1405-1408 2008).

U. SEDLAG

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: 54

Autor(en)/Author(s): Sedlag Ulrich

Artikel/Article: Erlesenes. 77