

R. GAEDIKE, Bonn

## Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera)

Mit Beiträgen von H. BLACKSTEIN, U. BÜCHNER, D. HAUSENBLAS, L. LINDNER, D. NOWAK, M. NUSS, B. PIEPGRAS, W. SCHMITZ & S. WAUER

**Zusammenfassung** Der vorliegende Nachtrag umfasst den Zeitraum von Dezember 2008 bis Februar 2010. Es wurden 19 in diesem Zeitraum publizierte Arbeiten ausgewertet sowie eine Reihe bisher unveröffentlichter Meldungen zusammengestellt. Die folgenden sechs Arten sind Neufunde für Deutschland: 2279 *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977; 5407a *Stenoptilia mariaeluisae* BIGOT & PICARD, 2002; 5901 *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855); 5973a *Zophodia graciella* (HULST, 1887); *Diploseustis perieresalis* (WALKER, 1859), *Neoglyphodes perspectalis* (WALKER, 1859). Die nachfolgenden vier Arten sind aus der Deutschlandliste zu streichen: 1130 *Caloptilia semifascia* (HÜBNER, 1828); 1185 *Parornix eppelsheimi* (FUCHS, 1901); 5669 *Cryptoblabes loxiella* RAGONOT, 1887; 6596 *Pyrausta rectefascialis* TOLL, 1936. Es wird auf zahlreiche nomenklatorisch erforderliche Änderungen, vor allen Dingen bei den Pyraloidea, hingewiesen.

**Summary Additions 2009 to the: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).** – The present supplement covers the period from December 2008 to February 2010. Nineteen published papers were checked and numerous previously unpublished records were listed. The following six species are new for the country: 2279 *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977; 5407a *Stenoptilia mariaeluisae* BIGOT & PICARD, 2002; 5901 *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855); 5973a *Zophodia graciella* (HULST, 1887); *Diploseustis perieresalis* (WALKER, 1859), *Neoglyphodes perspectalis* (WALKER, 1859). The following four species have to be deleted from the German list: 1130 *Caloptilia semifascia* (HÜBNER, 1828); 1185 *Parornix eppelsheimi* (FUCHS, 1901); 5669 *Cryptoblabes loxiella* RAGONOT, 1887; 6596 *Pyrausta rectefascialis* TOLL, 1936. Attention is drawn to numerous necessary nomenclatural changes, mainly among Pyraloidea.

### Einleitung

Im abgelaufenen Zeitraum seit Erscheinen des letzten Nachtrages (GAEDIKE 2009) konnten durch die Auswertung der Literatur wieder zahlreiche Meldungen für Deutschland ermittelt werden, die entweder Neufunde oder aktuelle (nach 1980 gefunden) Funde für einzelne Bundesländer beinhalteten. Auch dieses Mal gelangen außerdem wieder einige Neufunde für Deutschland. Einige Kollegen teilten mir Funde mit, die hier erstmals veröffentlicht werden.

Auf zwei Arbeiten möchte ich hier besonders hinweisen, da sie für die faunistische Erforschung einzelner Regionen besonders wichtig sind.

1. Bei der Arbeit von KLEINEKÜHLE & NIEDRINGHAUS (2008) handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der bisher in der Literatur das Gebiet der Ostfriesischen Inseln gemeldeten Arten. Leider konnte sie für den Nachtrag nicht ausgewertet werden, da Hinweise auf den Zeitpunkt der Meldungen fehlen.

2. Die Arbeit von HAUSENBLAS (2009) ([8]) listet nicht nur eine Reihe von neuen und aktuellen Funden für Baden-Württemberg auf. Besonders erwähnenswert ist, dass mit großer Gründlichkeit das historische Material aus den Aufsammlungen von C. REUTTI erfasst und ausgewertet wurde. Dadurch konnten zahlreiche Arten für BW nachgewiesen werden, was unterstreicht, wie wichtig die kritische Auswertung älterer faunistischer Angaben für die Ermittlung und Beurteilung des rezenten Artenbestandes ist. Die im Anhang der Arbeit aufge-

föhrten Listen mit der Erläuterung des Farbcode-Systems der Sammlung ist eine wertvolle Hilfe für alle weiteren Studien in dieser für die Region so wichtigen Sammlung, die im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart aufbewahrt wird.

Herr UWE BÜCHNER hat mich freundlicherweise auf ein Versäumnis hingewiesen, was hiermit korrigiert wird: es wurde bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste versäumt, die Fundmeldungen aus der Arbeit von PETERSEN & GAEDIKE (1987) mit zu berücksichtigen.

Neue Erkenntnisse in der Systematik machten es erforderlich, auf eine Reihe von nomenklatorisch erforderlichen Änderungen hinzuweisen, die die heimische Fauna betreffen. Die Ergebnisse sind im Abschnitt „Nomenklatorische Änderungen“ zusammengestellt.

Den Sammlerfreunden HANS BLACKSTEIN, UWE BÜCHNER, DIETGER HAUSENBLAS, LOTHAR LINDNER, DAGMAR NOWAK, MATTHIAS NUSS, BIRGITT PIEPGRAS, WILLIBALD SCHMITZ und SVEN WAUER sei hiermit recht herzlich dafür gedankt, dass ihre Funde hier erstmals veröffentlicht werden können.

Dem Buchsbaumzünsler widmet sich ein Beitrag von M. NUSS, der es sinnvoll erscheinen lässt, ihn nicht in das sonst für diese Nachträge übliche Schema einzufügen. Er findet sich, zusammen mit der darin zitierten Literatur, am Schluss der Zusammenstellung. Ich bedanke mich auf diesem Wege herzlich für die Möglichkeit der Veröffentlichung in diesem Rahmen.

**Neufunde für Deutschland****2279 *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977**

**BW:** 1 ♀, Stuttgart-Mühlhausen, 21.06.2006, leg. I. KEHR, det. HAUSENBLAS. Nachsuchen 2007 und 2008 waren nicht erfolgreich. Zur Biologie schreibt BURMANN (1988), dass die Art in Südtirol bei Zuchten von Coleopteren aus Holzproben von *Ostrya carpinifolia* sowie von *Quercus pubescens* und *Q. robur* mit eingetragenen und gezüchtet wurde [8]

**5407a *Stenoptilia mariaeluisae* BIGOT & PICARD, 2002**

Es wird hier der Auffassung von ARENBERGER (2005) gefolgt, dass es sich hierbei nicht um ein Synonym von *S. arida* (ZELLER, 1847), sondern um eine valide Art handelt.

**BW:** 1 ♀, Markgröningen, 13.-16.08.1950, leg. WÖRZ, det. ARENBERGER [8]

**5901 *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

**BY:** 1 ♀, Sperrbachtal südlich Oberstdorf, ca. 1400 m, 03.08.2008, leg. W. WOLF. Wahrscheinlich bedingt durch die Wetterlage (Kaltlufteinbruch), wurde die ansonsten in größeren Höhen nachgewiesene Art hier gefunden. [19]

**5973a *Zophodia graciella* (HULST, 1887)**

**BW:** Stuttgart, mit Kakteen eingeschleppt (ROESLER, 1976), neuere Nachweise bisher nicht bekannt [HAUSENBLAS]

***Diploseustis perieresalis* (WALKER, 1859)**

[= *minima* BUTLER, 1881; = *nana* WARREN, 1896]

**BB:** 1 Falter im Jahre 2006 an importierten Palmen in einem Gewächshaus in Berlin, det. M. GERSTBERGER, der Falter befindet sich in den Sammlungen des Museums Berlin (bisher unveröffentlichte Meldung in GLOBIZ);

**NW:** 1 Falter, Duisburg-Wanheim, 10.09.2008, Foto W. WIEWEL, det. E. RENNWALD.

Die Freilandaufnahme wurde im Lepiforum am 13. September 2008 veröffentlicht. [16]

Bei vorliegender Art handelt es sich um einen exotischen Vertreter der Crambidae (Spilomeninae), die in der orientalischen und australischen Region sowie in der Ostpaläarktis weit verbreitet ist. Seit dem Jahre 2000 ist die Art auch aus Europa nachgewiesen (Kanaren, Insel Scilly, Portugal, Spanien, Balearen, Schweiz, Niederlande). Die Futterpflanzen scheinen Arten der Gattung *Carex* zu sein. Eine Zusammenstellung des bisherigen Kenntnisstandes über diese Art geben SPEIDEL et al. (2007).

***Neoglyphodes* STRELTZOV, 2008*****Neoglyphodes perspectalis* (Walker, 1859)**

**NI; NW; HE; BW; BB; SN.** Erstnachweis für Deutschland im Jahre 2006. Einzelheiten hierzu siehe am Schluss der Zusammenstellung [Nuss]

**Aus der Deutschlandliste zu streichende Arten****1130 *Caloptilia semifascia* (HÜBNER, 1828)**

Ist zu streichen, da synonym zu 1130a [3]

**1185 *Parornix eppelsheimi* (FUCHS, 1901)**

Ist zu streichen, da synonym zu 1182 [3]

**5669 *Cryptoblates loxiella* RAGONOT, 1887**

Ist zu streichen, da synonym zu 5668 [Nuss]

**6596 *Pyrausta rectefascialis* TOLL, 1936**

Ist zu streichen, da synonym zu 6595 [Nuss]

**Nomenklatorische Änderungen****1130a *Caloptilia onustella* (HÜBNER, 1813)**

= *semifascia* HÜBNER, 1828

Synonymie nach DE PRINS & DE PRINS (2005) [3]

**1182 *Parornix carpinella* (FREY, 1861)**

= *eppelsheimi* FUCHS, 1901

Synonymie nach DE PRINS & DE PRINS (2005) [3]

**1616a *Leucoptera orobi* (STANTON, 1870)**

Bisher als Synonym von 1616 (*Leucoptera lathyriifoliella* (STANTON, 1866)) angesehen, durch KAILA & WIKSTRÖM (2004) als eigenständige Art festgestellt. Sicher nur durch Genitaluntersuchung zu trennen [8]

In den letzten Jahren wurden durch neuere Untersuchungen zahlreiche nomenklatorische Änderungen bei den Pyraloidea erforderlich. Herr Dr. M. Nuss hat die für die Deutschlandfauna relevanten Änderungen zusammengestellt sowie gleichzeitig einige Korrekturen an den in der Liste aufgeführten Namen vorgenommen.

**5658 *Hypsopygia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758)**

Gattungskombination nach LERAUT (2003), nicht: *Orthopygia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758) [Nuss]

**5690 *Delplanqueia dilutella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Gattungskombination nach LERAUT (2001), nicht: *Pempeliella dilutella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) [Nuss]

**5753 *Laodamia faecella* (ZELLER, 1839)**

Gattungskombination nach BALINSKY (1994), nicht: *Oncocera faecella* (ZELLER, 1839) [Nuss]

**5766 *Rhodophaea formosa* (HAWORTH, 1811)**

Gattungskombination nach LERAUT (2001), nicht: *Pempelia formosa* (HAWORTH, 1811) [Nuss]

**5770 *Moitrelia obductella* ZELLER, 1839**

Gattungskombination nach LERAUT (2001), nicht: *Pempelia obductella* ZELLER, 1839 [Nuss]

**6654 *Anania* HÜBNER, 1825**

Nach LERAUT (2005) (siehe auch TRÄNKNER et al. (2009)) sind die folgenden Gattungen synonym hierzu:

**6652 *Opsibotys* WARREN, 1880; 6628 *Perinephela* HÜBNER, 1825; 6630 *Phlyctaenia* HÜBNER, 1825; 6634 *Algedonia* LEDERER, 1863; 6651 *Ebulea* DOUBLEDAY, 1849; 6657 *Eurrhypara* HÜBNER, 1825.**

Damit gehören alle unter diesen Gattungen aufgeführten Arten zur Gattung *Anania*. Es sind das:

**6653 fuscalis** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775); **6629 lancealis** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775); **6631 coronata** (HUFNAGEL, 1767); **6632 stachydalis** (GERMAR, 1821); **6633 perlucidalis** (HÜBNER, 1809); **6638 terrealis** (TREITSCHKE, 1829); **6652 crocealis** (HÜBNER, 1796); **6658 hortulata** (LINNAEUS, 1758). [NUSS]

Durch diese neue Anordnung wird die Reihenfolge der bisher verwendeten Nummern nach KARSHOLT & RAZOWSKI durcheinander gebracht. Es ist sicherlich sinnvoll, bei einer späteren Neuauflage der Deutschlandliste ganz auf diese Nummerierung als Ordnungsprinzip zu verzichten.

#### Nachträge und Korrekturen

**48 Eriocrania subpurpurella** (HAWORTH, 1828)

HE: Diemeltal bei Trendelburg [14]

**51 Eriocrania sparmannella** (BOSC, 1791)

NI: Uchte-Nord, Uchter Moor [14]

**90 Stigmella confusella** (WOOD & WALSINGHAM, 1894)

ST: Ballenstedt [15]

**92 Stigmella freyella** (HEYDEN, 1858)

ST: Umgebung Rumpin [10]

**96 Stigmella betulicola** (STAINTON, 1856)

MV: Grambower Moor [14]

**102 Stigmella microtheriella** (STAINTON, 1854)

ST: Ballenstedt [15]

**103 Stigmella prunetorum** (STAINTON, 1855)

ST: Umgebung Rumpin [10]

**104 Stigmella aceris** (FREY, 1857)

ST: Ballenstedt [15]

**105 Stigmella malella** (STAINTON, 1854)

ST: Umgebung Rumpin [10]

**110 Stigmella anomalella** (GOEZE, 1783)

ST: Ballenstedt [15]

**113 Stigmella ulmivora** (FOLOGNE, 1860)

ST: Ballenstedt [15]

**126 Stigmella crataegella** (KLIMESCH, 1936)

ST: Ballenstedt [15]

**130 Stigmella oxyacanthella** (STAINTON, 1854)

ST: Ballenstedt [15]

**131 Stigmella pyri** (GLITZ, 1865)

ST: Ballenstedt [15]

**138 Stigmella tityrella** (STAINTON, 1854)

RP: Moseltal Klotten, Fahlberg [14]

**139 Stigmella salicis** (STAINTON, 1854)

ST: Ballenstedt [15]

**144 Stigmella obliquella** (HEINEMANN, 1862)

ST: Ballenstedt [15]

**146 Stigmella trimaculella** (HAWORTH, 1829)

NW: Brügggen, NSG Brachter Wald [14]

**149 Stigmella plagicolella** (STAINTON, 1854)

ST: Umgebung Rumpin [10]

**150 Stigmella lemniscella** (ZELLER, 1839)

ST: Ballenstedt [15]

**152 Stigmella aurella** (FABRICIUS, 1775)

ST: Ballenstedt [15]

**166 Stigmella perpygmaeella** (DOUBLEDAY, 1859)

ST: Ballenstedt [15]

**178 Stigmella dorsiguttella** (JOHANSSON, 1971)

ST: Ballenstedt [15]

**180 Stigmella atricapitella** (HAWORTH, 1828)

ST: Ballenstedt [15]

**240 Bohemannia quadrimaculella** (BOHEMAN, 1851)

RP: Von DISQUE „in dem Rheinwald oberhalb Speyer“ gefangen, von MEES als *Bucculatrix antispilella* beschrieben. In der Deutschlandliste bisher übersehen. [8]; ST: Ballenstedt [15]

**244 Ectoedemia sericopeza** (ZELLER, 1839)

NW: Aktueller Fund [14]

**254 Ectoedemia septembrella** (STAINTON, 1849)

SH: Aktueller Fund: Sparrieshoop, Garten in Ortsrandlage, Minen an *Hypericum ericetum*, 3. 11.2005, ex l. 20.2.2006, leg. B. PIEPGRAS, det. P. BUCHNER. Danach jedes Jahr zahlreiche Minen. Siehe auch: [http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki\\_vgl.pl?Ectoedemia\\_Septembrella](http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki_vgl.pl?Ectoedemia_Septembrella) [PIEPGRAS]; ST: Ballenstedt [15]

**261 Ectoedemia liebwerdella** (ZIMMERMANN, 1940)

ST: Ballenstedt [15]

**268 Ectoedemia intimella** (ZELLER, 1848)

ST: Ballenstedt [15]

**269 Ectoedemia hannoverella** (GLITZ, 1872)

NW: Sinsen [1]; Hückelhoven-Brachelen [14]

**293 Ectoedemia heringi** (TOLL, 1934)

RP: Moseltal Klotten, Fahlberg [14]

**301 Ectoedemia angulifasciella** (STAINTON, 1849)

ST: Ballenstedt [15]

**318 Pseudopostega auritella** (HÜBNER, 1813)

NW: Wassenberg, Myhl [14]

**319 Pseudopostega crepusculella** (ZELLER, 1839)

NI: Aktueller Fund [14]

**324 Antispilina ludwigi** M. HERING, 1941

BW: Vermutlich fälschlich gemeldet, es existieren keine Sammlungsbelege oder Literaturangaben [HAUSENBLAS]

**326 Antispila metallella** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

NW: Lage-Nord [14]

**397 Lampronia capitella** (CLERCK, 1759)

NW: Aktueller Fund [14]

**400 *Lampronia morosa* ZELLER, 1852**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**407 *Lampronia fuscata* (TENGLSTRÖM, 1848)**

NW: Troisdorf Wahner Heide, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]; Schwalmtal; Dalheim [14]

**409 *Lampronia pubicornis* (HAWORTH, 1828)**

NW: Köln, NSG Thielenbruch, leg. W. SCHMITZ, D. FEIER-ABEND, J. VIEHMANN [SCHMITZ]

**423 *Incurvaria pectinea* HAWORTH, 1828**

HE: Trendelburg-Langenthal [14]

**441 *Tischeria dodonaea* STANTON, 1858**

NI: Aktuelle Funde [14]; NW: Aktuelle Funde [14]; ST: Bal-lenstedt [15]

**449 *Emmetia angusticollella* (DUPONCHEL, 1843)**

HE: Trendelburg-Langenthal [14]

**471 *Ateliotum hungaricellum* ZELLER, 1839**

BW: Vermutlich fälschlich gemeldet, es existieren keine Sammlungsbelege oder Literaturangaben [HAUSENBLAS]

**476 *Haplotinea insectella* (FABRICIUS, 1794)**

NW: Aktueller Fund [14]

**545 *Infurcitinea ignicomella* (ZELLER, 1852)**

HE: Aktueller Fund [14]

**605 *Montescardia tessulatella* (ZELLER, 1846)**

NW: Aktueller Fund [2]; TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Langensalzaer Stadtwald, Baumkronenpfad, 11.06.2006, leg. S. ERLA-CHER [GAEDIKE]

**609 *Morophaga choragella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

HE: Aktueller Fund: Obertshausen, NAOM-Wiese beim Hengster/Rembrücken, 02.08.1997, leg. W. NÄSSIG et al. [GAEDIKE]

**621 *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1787)**

BB: Aktueller Fund (Biesenthal), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**630 *Nemapogon rucicolella* (STANTON, 1859)**

BW: Region Mittel-Baden, 1883, ex coll. REUTTI, det. PETERSEN, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]

**631 *Nemapogon variatella* (CLEMENS, 1859)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**635 *Nemapogon glirella* (HEYDEN, 1865)**

BW: Schon bei REUTTI (1898) aus Karlsruhe und Durlach gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen. Mehrere aktuelle Funde durch Zuchten aus *Stereum hirsutum*, zwischen 1993-2006 (D. BARTSCH, D. HAUSENBLAS) [8]

**642 *Nemapogon fungivorella* (BENANDER, 1939)**

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Gespringwiese Schmalkalden. 18.06.2009, leg. U. BÜCHNER [GAEDIKE]

**644 *Nemapogon nigralbella* (ZELLER, 1839)**

MV: Umgebung Sternberg [7]

**648 *Nemapogon falstriella* (HAAS, 1881)**

MV: Jasnitz bei Ludwigslust [7]

**661 *Trichophaga tapetzella* (LINNAEUS, 1758)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**669 *Tineola bisselliella* (HUMMEL, 1823)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**671 *Tinea pellationella* LINNAEUS, 1758**

TH: Aktueller Fund (NSG „Vesserthal“), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**675 *Tinea dubiella* STANTON, 1859**

ST: Athenstedt, schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**680 *Tinea pallescentella* STANTON, 1851**

NW: Aktueller Fund [14]

**681 *Tinea steueri* PETERSEN, 1966**

MV: Zahlreiche aktuelle Funde zwischen 1982 und 1985, schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**686 *Tinea semifulvella* HAWORTH, 1828**

ST: Aktueller Fund [10]

**689 *Niditinea fuscella* (LINNAEUS, 1758)**

ST: Aktueller Fund [10]

**690 *Niditinea striolella* (MATSUMURA, 1931)**

MV: Aktueller Fund (Schwerin), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**708 *Monopis monachella* (HÜBNER, 1796)**

ST: Aktuelle Funde [10]

**711 *Monopis fenestratella* (HEYDEN, 1863)**

MV: Umgebung Bad Kleinen [7] ST: Aktueller Fund [10]

**1030 *Roeslerstammia erxlebella* (FABRICIUS, 1787)**

NW: Gemünd (Kermeter)/Nationalpark Eifel [2]; TH: Aktuelle Funde [3]

**1031 *Roeslerstammia pronubella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

TH: Aktuelle Funde [4]

**1037 *Tinagma ocnerosomellum* (STANTON, 1850)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1039 *Tinagma anchusellum* (BENANDER, 1936)**

MV: Aktueller Fund (Umgebung Usadel), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**1040 *Tinagma balteolellum* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1841)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1052 *Bucculatrix abedinella* ZELLER, 1839**

TH: Schon bei RAPP (1936) werden Funde von PETRY von 1900 und 1903 genannt, in der Deutschlandliste übersehen [3].

**1057 *Bucculatrix argentisignella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1065 *Bucculatrix cidarella* ZELLER, 1839**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1066 *Bucculatrix cristatella* ZELLER, 1839**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1071 *Bucculatrix gnaphaliella* (TREITSCHKE, 1833)**

TH: „Alte Warth“ bei Gumpelstadt [3]

**1084 *Bucculatrix noltei* PETRY, 1912**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1094 *Bucculatrix ulmella* ZELLER, 1848**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1095 *Bucculatrix ulmifoliae* M. HERING, 1931**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1100 *Parectopa ononidis* (ZELLER, 1839)**

ST: Aktueller Fund [10]

**1101 *Parectopa robiniella* CLEMENS, 1863**

BW: Zahlreiche Neufunde seit 2007 durch Zucht an Robinie [8]

**1104 *Micrurapteryx kollariella* (ZELLER, 1839)**

NW: Sötenich [2]; TH: Aktuelle Funde [3]

**1111 *Caloptilia azaleella* (BRANTS, 1913)**

NW: Rösraht Kleineichen, leg. K. HANISCH [SCHMITZ]

**1112 *Caloptilia betulicola* (M. HERING, 1928)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1115 *Caloptilia cuculipennella* (HÜBNER, 1796)**

ST: Umgebung Rumpin [10]; TH: Aktuelle Funde [3]

**1117 *Caloptilia falconipennella* (HÜBNER, 1813)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1120 *Caloptilia fribergensis* (FRITZSCHE, 1871)**

TH: Die bisher vorliegenden Meldungen stammen alle von vor 1900, die Kennzeichnung in der Deutschlandliste (+) muss deshalb in „o“ geändert werden [3].

**1125 *Caloptilia populetorum* (ZELLER, 1839)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]; TH: Aktuelle Funde [3]

**1127 *Caloptilia robustella* JÄCKH, 1972**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1128 *Caloptilia roscipennella* (HÜBNER, 1796)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *juglandella*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]**1132 *Caloptilia suberinella* (TENINGSTRÖM, 1848)**

ST: Ballenstedt [15]

**1147 *Calybites phasianipennella* (HÜBNER, 1813)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1148 *Calybites quadrisignella* (ZELLER, 1839)**

TH: Flachstal südlich Kaisershagen [3]

**1167 *Leucospilapteryx omisella* (STANTON, 1848)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1169 *Ornixola caudulentella* (ZELLER, 1839)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1172 *Callisto denticulella* (THUNBERG, 1794)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1181 *Parornix betulae* (STANTON, 1854)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1213 *Phyllonorycter anderidae* (W. FLETCHER, 1885)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1214 *Phyllonorycter apparella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1223 *Phyllonorycter cavella* (ZELLER, 1846)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1232 *Phyllonorycter comparella* (DUPONCHEL, 1843)**

TH: Schon bei RAPP (1936) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen, jetzt aktuelle Funde [3]

**1236 *Phyllonorycter cydoniella* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)**

ST: Aktueller Fund [10]

**1242 *Phyllonorycter emberizaepenella* (BOUCHÉ, 1834)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1244 *Phyllonorycter esperella* (GOEZE, 1783)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1246 *Phyllonorycter fraxinella* (ZELLER, 1846)**

TH: Schon bei RAPP (1936) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [3]

**1247 *Phyllonorycter froelichiella* (ZELLER, 1839)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1253 *Phyllonorycter harrisella* (LINNAEUS, 1761)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1254 *Phyllonorycter heegeriella* (ZELLER, 1846)**

NW: Sinsen [1]

**1261 *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963)**

BW: Zahlreiche Neufunde seit 2006 durch Zucht aus Minen an Winterlinde [8]; TH: Hützscheroda (2005); Weimar/Waldstadt (2007) [3]

**1265 *Phyllonorycter kleemannella* (FABRICIUS, 1781)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1267 *Phyllonorycter lantanella* (SCHRANK, 1802)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1268 *Phyllonorycter lautella* (ZELLER, 1846)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1272 *Phyllonorycter medicaginella* (GERASIMOV, 1930)**BW: Erstfunde 2006 in Untergrombach und Markgröningen, an *Melilotus alba* [8]**1273 *Phyllonorycter mespillella* (HÜBNER, 1805)**

TH: Aktuelle Funde [3]

**1274 *Phyllonorycter messaniella* (ZELLER, 1846)**

TH: Leimbach/Nordhausen (RAPP, 1936), in der Deutschlandliste übersehen [3]

**1282 *Phyllonorycter oxyacanthae* (FREY, 1855)**

TH: Aktuelle Funde [3]

- 1287 *Phyllonorycter platani* (STAUDINGER, 1870)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1288 *Phyllonorycter platanoidella* (JOANNIS, 1920)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1289 *Phyllonorycter populifoliella* (TREITSCHKE, 1833)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1292 *Phyllonorycter quercifoliella* (ZELLER, 1839)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1294 *Phyllonorycter rajella* (LINNAEUS, 1758)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1297 *Phyllonorycter roboris* (ZELLER, 1839)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1301 *Phyllonorycter salictella* (ZELLER, 1846)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1302 *Phyllonorycter saportella* (DUPONCHEL, 1840)**  
TH: Schon bei RAPP (1936) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [3]
- 1307 *Phyllonorycter scopariella* (ZELLER, 1846)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1310a *Phyllonorycter cerasicolella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**  
ST: Umgebung Rumpin [10]
- 1312 *Phyllonorycter stettinensis* (NICELLI, 1852)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1322 *Phyllonorycter tristrigella* (HAWORTH, 1828)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1326 *Phyllonorycter ulmifoliella* (HÜBNER, 1817)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1327 *Phyllonorycter viminetorum* (STAINTON, 1854)**  
TH: Schon bei RAPP (1936) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [3]
- 1336 *Phyllocnistis saligna* (ZELLER, 1839)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1337 *Phyllocnistis unipunctella* (STEPHENS, 1834)**  
TH: Aktuelle Funde [3]
- 1339 *Phyllocnistis xenia* M. HERING, 1936**  
BW: Schon von WÖRZ (1956) und LINACK (1955) von zahlreichen Fundorten gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen. Aktuelle Funde zwischen 2006 und 2008 aus Stuttgart und Nordbaden (NSG „Hirschacker“) [8].
- 1344 *Scythropia crataegella* (LINNAEUS, 1767)**  
ST: Umgebung Rumpin [10]
- 1348 *Yponomeuta padella* (LINNAEUS, 1758)**  
ST: Aktuelle Funde [10]
- 1349 *Yponomeuta malinella* ZELLER, 1838**  
HE: Diemeltal, Langenthal [14]
- 1350 *Yponomeuta cagnatella* (HÜBNER, 1813)**  
HE: Diemeltal, Eberschütz [14]
- 1359 *Zelleria hepariella* STAINTON, 1849**  
ST: Ballenstedt [15]
- 1402 *Swammerdamia pyrella* (VILLERS, 1789)**  
HE: Diemeltal, Sielen, Zwergen, Hörle [14]
- 1412 *Cedestis subfasciella* (STEPHENS, 1834)**  
RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *farinatella*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]; HE: Diemeltal, Zwergen [14]
- 1424 *Prays fraxinella* (BJERKANDER, 1784)**  
HE: Zahlreiche Erstfunde [14]
- 1425 *Prays ruficeps* (HEINEMANN, 1870)**  
HE: Langenthal, NSG Hölleberg [14]
- 1435 *Argyresthia glabratella* (ZELLER, 1847)**  
NW: Lemgo, NSG Biesterberg [14]; ST: Ballenstedt [15]
- 1442 *Argyresthia trifasciata* (STAUDINGER, 1871)**  
ST: Umgebung Rumpin [10]; Ballenstedt [15]
- 1445 *Argyresthia thuiella* PACKARD, 1871**  
NW: Mönchengladbach, Leppershütte [14]
- 1455 *Argyresthia pygmaeella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**  
HE: Diemeltal, Liebenau-Haueda [14]
- 1456 *Argyresthia sorbiella* (TREITSCHKE, 1833)**  
HE: Diemeltal, Zwergen [14]
- 1459 *Argyresthia retinella* ZELLER, 1839**  
RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]; HE: Aktueller Fund [14]
- 1462 *Argyresthia spinosella* STAINTON, 1849**  
ST: Aktueller Fund [10]
- 1464 *Argyresthia pulchella* ZELLER, 1846**  
HE: Trendelburg-Langenthal [14]
- 1466 *Argyresthia pruniella* (CLERCK, 1759)**  
ST: Aktuelle Funde [10]
- 1467 *Argyresthia bonnetella* (LINNAEUS, 1758)**  
HE: Zahlreiche Erstfunde [14]
- 1469 *Argyresthia semitestacella* (CURTIS, 1833)**  
NW: Aktueller Fund [2]; [14]
- 1483 *Ypsolopha falcella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**  
ST: Umgebung Rumpin [10]; Ballenstedt [15]
- 1551 *Digitalvalva arnicella* (HEYDEN, 1863)**  
NW: Aktueller Fund [14]
- 1556 *Digitalvalva pulicariae* (KLIMESCH, 1956)**  
ST: Aktueller Fund (Harz/Ballenstedt), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.
- 1572 *Acrolepia autumnitella* CURTIS, 1838**  
NW: Aktuelle Funde [14]; MV: Aktueller Fund (Schwerin), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.
- 1587 *Glyphipterix equitella* (STEPHENS, 1834)**  
MV: Ventschow [5]
- 1591 *Glyphipterix haworthana* (SCOPOLI, 1763)**  
MV: Grambow Moor [5]

**1592 *Glyphipterix forsterella* (FABRICIUS, 1782)**

MV: Aktuelle Funde [5]; ST: Ballenstedt [15]

**1598 *Heliodines roesella* (LINNAEUS, 1758)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**1602 *Bedellia somnulentella* (ZELLER, 1847)**

NI: Leese; Loccum [14]; RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]; HE: Bad Karlshafen; Hörle [14]; MV: Greifswald-Wieck [14]

**1610 *Leucoptera laburnella* (STAINTON, 1858)**

NW: Lage Nord [14]

**1616 *Leucoptera lathyriifoliella* (STAINTON, 1866)**

BW: Bisher ein sicherer Nachweis: Stuttgart, 01.05.1876, schon bei STEUDEL &amp; HOFMANN (1882) und WÖRZ (1957) gemeldet [8]

**1616a *Leucoptera orobi* (STAINTON, 1870)**Bisher als Synonym von 1616 (*Leucoptera lathyriifoliella* (STAINTON, 1866)) angesehen, durch KAILA & WIKSTRÖM (2004) als eigenständige Art festgestellt. Sicher nur durch Genitaluntersuchung zu trennen [8]**1630 *Lyonetia prunifoliella* (HÜBNER, 1796)**

NW: Rösrath Kleineichen, leg. K. HANISCH [SCHMITZ]; Niederkrüchten, NSG Raderveekes Bruch [14]

**1715 *Agonopterix scopariella* (HEINEMANN, 1870)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**1718 *Agonopterix ciliella* (STAINTON, 1849)**

NW: Aktuelle Funde: Rösrath Kleineichen, leg. K. HANISCH; Köln, NSG Thielenbruch, leg. W. SCHMITZ, D. FEIERABEND, J. VIEHMANN [SCHMITZ]; [14]

**1722 *Agonopterix subpropinquella* (STAINTON, 1849)**

NW: Aktueller Fund [14]

**1729 *Agonopterix yeatiana* (FABRICIUS, 1781)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**1745 *Agonopterix senecionis* (NICKERL, 1864)**

NW: Teutoburger Wald, Truppenübungsplatz Senne, Ruine Lophom [14]

**1754 *Agonopterix furvella* (TREITSCHKE, 1832)**

RP: Aktueller Fund [14]

**1781 *Depressaria depressana* (FABRICIUS, 1775)**

HE: Zahlreiche Erstfunde [14]

**1798 *Depressaria pulcherrimella* STAINTON, 1849**

HE: Langenthal, NSG Hölleberg [14]

**1837 *Perittia herrichiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

ST: Ballenstedt [15]

**1874 *Elachista biatomella* (STAINTON, 1848)**

ST: Ballenstedt [15]

**2057 *Blastodacna hellerella* (DUPONCHEL, 1838)**

HE: Langenthal, NSG Hölleberg [14]

**2060 *Spuleria flavicaput* (HAWORTH, 1828)**

NW: Aktueller Fund [14]

**2112 *Scythris bifissella* (HOFMANN, 1889)**

BW: 10 Falter der Typenserie stammen von Friedrichsfeld, 7-8 km südöstlich von Mannheim, in der Deutschlandliste bisher übersehen. Aktuelle Funde von 1997 aus Sandhausen [8]

**2278 *Metalampra cinnamomea* (ZELLER, 1839)**

ST: Ballenstedt [15]

**2279 *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977**

D: BW: 1 ♂, Stuttgart-Mühlhausen, 21. 6. 2006, leg. I. KEHR, det. HAUSENBLAS [8]

**2380 *Holoscolia huebneri* KOCAK, 1980**

ST: Umgebung Rumpin [10]: es handelt sich um den ersten aktuellen Fund für Deutschland.

**2398 *Telechrysis tripuncta* (HAWORTH, 1828)**

BW: Bei REUTTI (1898) aus Ebersteinburg bei Baden-Baden gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]

**2403 *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2511 *Coleophora calycotomella* STAINTON, 1869**BW: NSG „Hirschacker“ Die Meldungen unter dem Namen *C. sarothamni* bei REUTTI (1898) konnten wegen fehlenden Belegmaterials nicht überprüft werden [8]**2561 *Coleophora colutella* (FABRICIUS, 1794)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *serenella*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]**2585 *Coleophora deauratella* LIENIG & ZELLER, 1846**

ST: Aktueller Fund [10]

**2586 *Coleophora fuscicornis* ZELLER, 1847**BW: Bei dem Fund von Lahr (REUTTI, 1898) handelt es sich um *C. trifolii* (CURTIS, 1832) (det. HAUSENBLAS), die Art ist damit aus D noch nicht nachgewiesen [8]**2601 *Coleophora pyrrehulipennella* ZELLER, 1839**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2602 *Coleophora brevialpella* WOCKE, 1874**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2603 *Coleophora serratulella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855**

BW: Friedrichsfeld, Larvensäcke und Imagines, schon bei REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen. Durch weitgehende Zerstörung des ursprünglichen Biotops waren Nachsuchen erfolglos [8]

**2611 *Coleophora gallipennella* (HÜBNER, 1796)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2617 *Coleophora coronillae* ZELLER, 1849**

ST: Aktueller Fund [10]

**2622 *Coleophora ditella* ZELLER, 1849**

BB: Döberitzer Heide, Juni 2008, leg. O. SCHMITZ [SCHMITZ]

**2629 *Coleophora astragalella* ZELLER, 1849**BW: Bei dem Fund von Karlsruhe (leg. LOUDET) (REUTTI, 1898) handelt es sich um *C. hartigi* TOLL, 1944 (det. HAUSENBLAS), die Art ist damit aus D noch nicht nachgewiesen [8]

**2631 *Coleophora caelebipennella* ZELLER, 1839**

BW: Bei REUTTI (1898) von Karlsruhe gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]

**2693 *Coleophora taenipennella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855**

BW: Die Meldung von REUTTI (1898) „Rheindamm bei Maxau“ kann bisher nicht verifiziert werden, ein Falter ist nicht bestimmbar (ohne Abdomen), die anderen beiden sind *C. striatipennella* NYLANDER, 1848 [8]

**2761 *Coleophora odorariella* MÜHLIG, 1857**

BW: Friedrichsfeld; Sandhausen. Gegenwärtig die einzigen aktuellen Nachweise für Deutschland [8]

**2764 *Coleophora adelogrammella* ZELLER, 1849**

BW: Jöhlingen, 1887, ex coll. REUTTI (als *C. succursella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 determiniert), det. HAUSENBLAS. Bisher nur aus BB nachgewiesen [8]

**2766 *Coleophora succursella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855**

BW: Die bisher unter diesem Namen gemeldeten (REUTTI, 1898) Falter erwiesen sich als *C. adelogrammella* ZELLER, 1849, *C. dianthi* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 und *C. obscenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855, die Art ist bisher noch nicht für BW nachgewiesen [8]

**2809 *Coleophora striatipennella* NYLANDER, 1848**

BW: Unter dem Namen *C. taenipennella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 bei REUTTI (1898) vom Rheindamm bei Maxau (bei Karlsruhe) gemeldet [8]

**2850 *Coleophora paripennella* ZELLER, 1839**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2854 *Coleophora clupeiferella* O. HOFMANN, 1871**

BW: Schon bei REUTTI (1898) von Mühlburg gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen; jetzt aktuelle Funde [8]

**2857 *Coleophora squalorella* ZELLER, 1849**

BW: Schon bei REUTTI (1898) von Mühlburg und Friedrichsfeld gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen; jetzt aktueller Fund [8]

**2878 *Mompha terminella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**2898 *Blastobasis phycidella* (ZELLER, 1839)**

NW: 5 Falter, Rösrath Kleineichen, 21.05.2007, 01.06.2008, leg. K. HANISCH; Troisdorf Wähler Heide, 23.06.2006, 03.05.2007, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]; Krefeld-Hüls; Kempen-Klixdorf; Hückelhoven-Millich [14]

**3062 *Pseudatemelia subochreella* (DOUBLEDAY, 1859)**

ST: Ballenstedt [15]

**3071 *Amphisbatis incongruella* (STANTON, 1849)**

NW: Aktuelle Funde [14]

**3097 *Sorhagenia janiszewskae* RIEDL, 1962**

HE: Diemeltal, Zwergen, NSG Warmberg [14]; ST: Ballenstedt [15]

**3098 *Sorhagenia lophyrella* (DOUGLAS, 1846)**

NW: Köln, NSG Thielenbruch, 31.07.2004, leg. W. SCHMITZ, D. FEIERABEND, J. VIEHMANN, det. A. WERNO [SCHMITZ]; RP: Nahetal, Schloßböckelheim, NSG Felsenberg [14]

**3163 *Cosmopterix zieglerella* (HÜBNER, 1810)**

NW: Zahlreiche Erstfunde [14]; ST: Ballenstedt [15]

**3170 *Cosmopterix lienigiella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

NW: Kranenburg, NSG Kranenburger Bruch [14]

**3237 *Aristotelia brizella* (TREITSCHKE, 1833)**

BW: Bisher nur alte Belege vor 1900 von Wertheim, ex coll. REUTTI; coll. MEESS, det. HAUSENBLAS [8]

**3292 *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843)**

Die Frage der Synonymisierung von *martinii* zu *bifractella* bedarf weiterer Untersuchungen (KARSHOLT i. l.) [HAUSENBLAS]

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**3296 *Ptocheuusa inopella* (ZELLER, 1839)**

BW: Nur eine kleine Serie von 1885: Friedrichsfeld, ex coll. REUTTI, det. HAUSENBLAS [8]

**3312 *Monochroa cytisella* (CURTIS, 1837)**

BW: Bisher nur alte Belege vor 1900 von Zell-Wiesental, Schweigmatt, Frauenalb, ex coll. REUTTI; coll. MEESS [8]

**3390 *Bryotropha basaltinella* (ZELLER, 1839)**

ST: Gatersleben [15]

**3402 *Coleotechnites piceaella* (KEARFOTT, 1903)**

BW: Stuttgart-Stammheim, an *Picea pungens* [8]

**3421 *Teleiodes saltuum* (ZELLER, 1878)**

ST: Ballenstedt [15]

**3461 *Altenia scriptella* (HÜBNER, 1796)**

ST: Bad Suderode, NSG Schäfereiche [15]

**3482 *Gelechia nigra* (HAWORTH, 1828)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**3510 *Chionodes tragicella* (HEYDEN, 1865)**

ST: Ballenstedt [15]

**3524 *Chionodes electella* (ZELLER, 1839)**

ST: Umgebung Rumpin [10]

**3660 *Ephysteris inustella* (ZELLER, 1847)**

NW: Rösrath Kleineichen, leg. K. HANISCH [SCHMITZ]

**3679 *Caryocolum fischerella* (TREITSCHKE, 1833)**

NW: Aktueller Fund [14]

**3699 *Caryocolum leucomelanella* (ZELLER, 1839)**

ST: Umgebung Rumpin [10]

**3708 *Caryocolum fraternella* (DOUGLAS, 1851)**

ST: Ballenstedt [15]

**3715 *Caryocolum proxima* (HAWORTH, 1828)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *maculiferella*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**3785 *Syncopacma taeniolella* (ZELLER, 1839)**

ST: Aktueller Fund [10]

**3857 *Dichomeris atacella* (ZELLER, 1839)**

NW: Gemünd (Kerneter)/Nationalpark Eifel [2]

**3858 *Dichomeris latipennella* (REBEL, 1937)**

ST: Ballenstedt [15]

**3865 *Brachmia inornatella* (DOUGLAS, 1850)**

ST: Ballenstedt [15]

**4288 *Eupoecilia ambiguella* (HÜBNER, 1796)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4379 *Acleris laterana* (FABRICIUS, 1794)**

In der Deutschlandliste fälschlich unter 4377 aufgeführt [GAEDIKE]

**4402 *Acleris ferrugana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *lithargyran*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]; HE: Umgebung Mühlheim/Main [12]**4405 *Acleris kochiana* (GOEZE, 1783)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *boscana* und *parisiana*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]**4407 *Acleris logiana* (CLERCK, 1759)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *niveana*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]**4479 *Cnephasia pasiuana* (HÜBNER, 1799)**

HE: Geilenberg [12]

**4504 *Cnephasia ecullyiana* RÉAL, 1951**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4517 *Sparganothis pilleriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

HE: Umgebung Geilenberg [12]

**4525 *Ditula angustiorana* (HAWORTH, 1811)**

BW: Weinheim; Sandhausen; Friedrichsfeld [8]; ST: Ballenstedt [15]

**4531 *Epagoge grotiana* (FABRICIUS, 1781)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4533 *Paramesia gnomana* (CLERCK, 1759)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4558 *Archips crataegana* (HÜBNER, 1799)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4559 *Archips xylosteana* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4562 *Choristoneura diversana* (HÜBNER, 1817)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**4625 *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847)**

SH: Lübeck [18]; NI: Adendorf; Lüneburg [18]; BY: Stadtgebiet von München [17]

**4637 *Adoxophyes orana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)**

HE: Aktuelle Funde [12]

**4657 *Bactra lacteana* (CARADJA, 1916)**

NW: Sythen [1]

**4670 *Endothenia lapideana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**4698 *Apotomis inundana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

NW: Köln, NSG Thielenbruch, 18.06.2003, leg. W. SCHMITZ, D. FEIERABEND, J. VIEHMANN [SCHMITZ]

**4740 *Phiaris umbrosana* (FREYER, 1842)**

ST: Aktueller Fund [10]

**4743 *Phiaris metallicana* (HÜBNER, 1799)**

BB: Aktueller Fund: 1 Falter, Umgebung Rathenow, 25.06.2008, leg. EICHSTÄDT [BLACKSTEIN]: bisher waren aus BB nur Nachweise vor 1900 bekannt.

**4750 *Phiaris palustrana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**4763 *Cymolomia hartigiana* (SAXESEN, 1840)**

ST: Ballenstedt [15]

**4836 *Gibbifera simplana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)**

NW: Aktuelle Funde: Troisdorf Wahner Heide, leg. W. SCHMITZ; Köln, NSG Thielenbruch, leg. W. SCHMITZ, D. FEIERABEND, J. VIEHMANN [SCHMITZ]

**4848 *Epinotia granitana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

ST: Aktueller Fund [10]

**4887 *Crociosema plebejana* ZELLER, 1847**

RP: Meldung von EPPELSHEIM (1881) [HAUSENBLAS]

**4926 *Eucosma obumbratana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**BW: Neuester Nachweis: Dossenheim bei Heidelberg, 1975. Früher unter dem Namen *expallidana* schon bei REUTTI (1898), LINACK (1955), STEUDEL & HOFMANN (1882), WÖRZ (1953) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]**4939 *Eucosma scutana* (CONSTANT, 1893)**BW: Bei dem Falter vom Kaiserstuhl (LINACK 1955) handelt es sich um *Lathronympha strigana* (FABRICIUS, 1775) (det. HAUSENBLAS) [8]**4945 *Eucosma aemulana* (SCHLÄGER, 1849)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**4988 *Gypsonoma nitidulana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet (als *erictana*), in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]**4989 *Gypsonoma aceriana* (DUPONCHEL, 1843)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5028 *Blastesthia posticana* (ZETTERSTEDT, 1839)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5049 *Rhyacionia duplana* (HÜBNER, 1813)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5058 *Ancylis uncella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

NW: Aktuelle Funde: Troisdorf Wahner Heide, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]

**5061 *Ancylis obtusana* (HÜBNER, 811)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5065 *Ancylis subacurana* (DOUGLAS, 1847)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5093 *Cydia caecana* (SCHLÄGER, 1847)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5095 *Cydia gemmiferana* (TREITSCHKE, 1835)**

ST: Umgebung Rumpin [10]

**5101 *Cydia oborana* (TREITSCHKE, 1830)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5104 *Cydia janthinana* (DUPONCHEL, 1835)**

HE: Aktuelle Funde [13]

**5106 *Cydia lobarzewskii* (NOWICKI, 1860)**

BW: Bodenseegebiet (bei BENDER, 1954 als *Grapholitha janthinana* (DUPONCHEL, 1835) gemeldet); Stuttgart-Stammheim; Federseemoor [8]

**5125 *Cydia medicaginis* (KUZNETZOV, 1962)**

ST: Ballenstedt [15]

**5133 *Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

ST: Ballenstedt [15]

**5142 *Cydia milleniana* (ADAMCZEWSKI, 1967)**

ST: Ballenstedt [15]

**5146 *Cydia servillana* (DUPONCHEL, 1836)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5178 *Pammene insulana* (GUENÉE, 1845)**

ST: Ballenstedt [15]

**5183 *Pammene suspectana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

BW: Markgröningen [8]

**5193 *Pammene spiniana* (DUPONCHEL, 1843)**

RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5194 *Pammene trauniana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

ST: Ballenstedt [15]

**5196 *Pammene regiana* (ZELLER, 1849)**

NW: Aktuelle Funde [2]; RP: Von DISQUÉ (1900) gemeldet, in der Deutschlandliste übersehen [HAUSENBLAS]

**5200 *Pammene oxsenheimeriana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

ST: Ballenstedt [15]

**5217 *Dichrorampha eidmanni* OBRAZTSOV, 1953**

NI: Volkmarshausen (LK Göttingen), der Typenfundort, in der Deutschlandliste bisher ohne Zuordnung unter „K“ gemeldet [HAUSENBLAS]

**5218 *Dichrorampha aeratana* (PIERCE & METCALFE, 1915)**

ST: Umgebung Rumpin [10]; Ballenstedt [15]

**5242 *Dichrorampha heegerana* (DUPONCHEL, 1843)**

BW: Funde veröffentlicht im Lepiforum [HAUSENBLAS]

**5269 *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767)**

MV: Aktuelle Funde [6]

**5272 *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776)**

MV: Aktuelle Funde [6]

**5282 *Choreutis pariana* (CLERCK, 1759)**

MV: Buchholz bei Rubow [6]

**5393 *Stenoptilia stigmatodactyla* (ZELLER, 1852)**

ST: Umgebung Rumpin [10]

**5407a *Stenoptilia mariaeluisae* BIGOT & PICARD, 2002**

Es wird hier der Auffassung von ARENBERGER (2005) gefolgt, dass es sich hierbei nicht um ein Synonym von *S. arida* (ZELLER, 1847), sondern um eine valide Art handelt.

D: BW: 1 ♀, Markgröningen, 13.-16.8.1950, leg. WÖRZ, det. ARENBERGER [8]

**5494 *Calyciphora albodactyla* (FABRICIUS, 1794)**

BW: Mittelbaden (roter Farbcode in coll. REUTTI), 1857, det. HAUSENBLAS, in der REUTTI-Sammlung als *Leioptilus distinctus* bestimmt [8]

**5536 *Euleioptilus distinctus* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

BW: Schon bei REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen: 1 ♂, Mittelbaden (roter Farbcode in coll. REUTTI), 1857, det. HAUSENBLAS [8]

**5574 *Aphomia zelleri* (JOANNIS, 1932)**

HE: Wiesbaden (ROESSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher fehlend [11]

**5589 *Galleria mellonella* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Aktuelle Funde [11]

**5627 *Pyralis farinalis* LINNAEUS, 1758**

RP: Aktuelle Funde [11]

**5632 *Aglossa caprealis* (HÜBNER, 1809)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher fehlend; LORCH (1948) [11]

**5633 *Aglossa pingualis* (LINNAEUS, 1758)**

HE: Aktueller Fund [11]

**5658 *Orthopygia glaucinalis* (LINNAEUS, 1758)**

RP: Aktuelle Funde [11]

**5668 *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811)**

= *loxiella* RAGONOT, 1887 [NUSS]

**5669 *Cryptoblabes loxiella* RAGONOT, 1887**

Ist zu streichen, da nach LERAUT (2003) ein Synonym von 5668 *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811) [NUSS]

**5682 *Ortholepis vacciniella* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

Nicht: 1847 [NUSS]

**5705 *Khorassania***

Nicht: *Khorassaniana* [NUSS]

**5782 *Dioryctia schuetzeella* FUCHS, 1899**

RP: Aktueller Fund: Schloßböckelheim/Nahe-Domäne, 04.06.1998, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]

**5901 *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

D: BY: 1 ♀, Sperrbachtal südlich Oberstdorf, ca. 1400 m, 03.08.2008, leg. W. WOLF. [19]

**5973a *Zophodia graciella* (HULST, 1887)**

D: BW: Stuttgart, mit Kakteen eingeschleppt (ROESLER, 1976), neuere Nachweise bisher nicht bekannt [HAUSENBLAS]

**5980 *Eccopisa effractella* ZELLER, 1848**

NW: Troisdorf Wähler Heide, 02.08.2004, leg. W. SCHMITZ; zahlreiche Falter, Köln, NSG Thielenbruch, zwischen 03.06.2000 und 31.07.2004, leg. W. SCHMITZ, D. FEIERABEND, J. VIEHMANN; Königswinter/Drachenfels, 01.07., 08.09.2009, leg. H. SCHUMACHER; Eschweiler Tal bei Bad Münstereifel, 09.08. 2004, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]; Niederrhein und Eifel [14]

**5994 *Euzophera bigella* (ZELLER, 1848)**

BW: Zahlreiche aktuelle Funde, nachdem schon LINACK (1955) und ROESLER (1973) die Art gemeldet hatten, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]

**6009 *Euzophera fuliginosella* (HEINEMANN, 1865)**

HE: Bei ROESLER (1973) ohne nähere Fundangaben gemeldet, jetzt ein Beleg: Südhessen, Lorscher Wald [8]; BW: Bei ROESLER (1973) und bei ROESLER & SPEIDEL (1979) ohne nähere Fundangaben gemeldet, jetzt ein Beleg: Baden Airport bei Stollhofen [8]

**6089 *Phycitodes inquinatella* (RAGONOT, 1887)**

RP: Aktueller Fund: Bremm/Mosel, 28.07.2002, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]

**6112 *Ephestia elutella* (HÜBNER, 1796)**

RP: Aktueller Fund: Daun/Eifel, zahlreiche Falter zwischen 1985 und 2002, leg. U. FLESCHE [SCHMITZ]

**6113a *Ephestia unicolorella woodiella* RICHARDS & THOMPSON, 1932**

NW: Köln/NSG Thielbruch, 28.05., 10.08.2003, leg. W. SCHMITZ; Rösrath-Kleineichen, 01.-12.05.2007, 12.-28.05.2008, leg. K. HANISCH; Wähler Heide-Hühnerbruch, 03.05.2007, leg. W. SCHMITZ; Aachen-Wahlheim, 17.06.2009, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]; RP: Klotten/Mosel, 17.05.2002, leg. W. SCHMITZ; Bremm/Mosel, 28.07.2002, leg. W. SCHMITZ [SCHMITZ]

**6118 *Cadra figulilella* (GREGSON, 1871)**

Nicht: WALKER, 1863 [NUSS]

**6185 *Eudonia vallesialis* (DUPONCHEL, 1832)**

Nicht: *vallesialis parella* ZELLER, 1839 [NUSS]

**6189 *Eudonia delunella* (STAINTON, 1849)**

BW: Bei REUTTI (1898) als *Scoparia resinella* von zahlreichen Fundorten gemeldet, darunter auch von Maxau (nicht: Manau, wie bei GAEDIKE (2008) geschrieben) [8]

**6229 *Friedlanderia cicatricella* (HÜBNER, 1824)**

MV: Aktueller Fund (Schwerin), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**6236 *Calamotropha aureliella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1841)**

BW: Bei REUTTI (1898) werden Funde von 1850 bis 1852 aufgeführt, danach keine Nachweise mehr, offensichtlich in BW ausgestorben [8]

**6280 *Catoptria permutatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)**

BB: Aktueller Fund: Döberitzer Heide, Juni 2008, leg. O. SCHMITZ [SCHMITZ]

**6283 *Catoptria osthelderi* (DE LATTIN, 1950)**

TH: Aktueller Fund (NSG „Vesserthal“), schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**6352 *Pediasia fascelinella* (HÜBNER, 1813)**

BW: Schon bei REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen, aktuelle Funde von 1983 aus der Viernheimer Heide [8]

**6364 *Pediasia contaminella* (HÜBNER, 1796)**

BW: Zahlreiche Funde zwischen 1974 und 1979, schon bei REUTTI (1898) und LINACK (1955) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]; TH: NSG „Vessertal“ bei Breitenbach, schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen [BÜCHNER].

**6390 *Schoenobius gigantella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Nicht: *gigantellus* [NUSS]

**6394 *Donacaula mucronella* (SCOPOLI, 1763)**

HE: Mörfelden, NSG Dachnau (1962), leg. GROSS [11]

**6417 *Elophila rivulalis* (DUPONCHEL, 1833)**

Nicht: *rivularis* (DUPONCHEL, 1834) [NUSS]

**6441 *Apodores floralis* (HÜBNER, 1809)**

RP: Schloßböckelheim (1975), leg. BROSKZKUS [11]

**6478 *Eurrhypis pollinalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher fehlend; Lorch (Lorchhausen, Retzbachtal (1942), Werkerbachtal (1980), Wispental (1928)) [11]

**6488 *Evergestis frumentalis* (LINNAEUS, 1761)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher fehlend [11]

**6499 *Evergestis extimalis* (SCOPOLI, 1763)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher fehlend; Lorch (Mandelberg (1967), Nollig (1942) [11]; RP: Aktuelle Funde [11]

**6503 *Evergestis pollitalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

NW: Die bei STOLLWERCK (1863) genannten Funde (Aachen, Brühl, Krefeld, Uerdingen) sind nicht überprüfbar, es handelt sich wahrscheinlich um eine Fehlbestimmung [11]

**6507 *Evergestis aenealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

NW: Die bei STOLLWERCK (1863) genannten Funde (Aachen, Brühl, Krefeld, Uerdingen) sind nicht überprüfbar, es handelt sich wahrscheinlich um eine Fehlbestimmung [11]

**6537 *Udea initialis* (HÜBNER, 1819)**

BW: Letzte Nachweise von 1963, früher schon bei REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen [8]

**6545 *Udea inquinatalis* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

Nicht: (ZELLER, 1846) [NUSS]

**6553 Udea nebulalis (HÜBNER, 1796)**

**BW:** Von REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen, gegenwärtig nur zwei alte Meldungen von 1881 und 1882 bekannt [8]

**6556 Udea decrepitalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)**

**BW:** Von REUTTI (1898) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen, letzte Meldungen von 1901 [8]

**6595 Pyrausta cingulata (LINNAEUS, 1758)**

= *rectefascialis* TOLL, 1935

**6596 Pyrausta rectefascialis TOLL, 1936**

Aus der Deutschlandliste zu streichen, da nach LERAUT (2008) ein Synonym von **6595 Pyrausta cingulata** (LINNAEUS, 1758) [Nuss]

**6603 Pyrausta porphyralis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

**BW:** Von REUTTI (1898) zahlreich gemeldet, in der Deutschlandliste bisher übersehen, keine neueren Meldungen bekannt [8]

**6619 Uresiphita gilvata (FABRICIUS, 1794)**

Nicht: FABRICIUS, 1794 [Nuss]

**6633 Anania perlucidalis (HÜBNER, 1809)**

**MV:** Aktuelle Funde, schon bei PETERSEN & GAEDIKE (1987) gemeldet, bei der Zusammenstellung der Deutschlandliste übersehen.

**6641 Sclerocona acutellus (EVERSMANN, 1842)**

**NW:** Leverkusen-Steinbüchel [9]; **HE:** Von GROSS 1969 in Dachnau nachgewiesen, in der Deutschlandliste bisher übersehen [9]; **BW:** Von EBERT (1978) und BIEBINGER & SPEIDEL (1982) gemeldet, aktuelle Funde veröffentlicht im Lepiforum [HAUSENBLAS]

**6655 Anania verbascalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

**BB:** Aktueller Fund: Döberitzer Heide, Juni 2008, leg. O. SCHMITZ [SCHMITZ]

**Dilopseustis WALKER, 1859****Dilopseustis perieresalis (WALKER, 1859)**

[= *minima* BUTLER, 1881; = *nana* WARREN, 1896]

**D:** **BB:** 1 Falter im Jahre 2006 an importierten Palmen in einem Gewächshaus in Berlin, det. M. GERSTBERGER, der Falter befindet sich in den Sammlungen des Museums Berlin (bisher unveröffentlichte Meldung in GLOBIZ);

**NW:** 1 Falter, Duisburg-Wanheim, 10.09. 008, Foto W. WIEWEL, det. E. RENNWALD.

Die Freilandaufnahme wurde im Lepiforum am 13.09.2008 veröffentlicht. [16]

**Neoglyphodes STRELTZOV, 2008****Neoglyphodes perspectalis (Walker, 1859)**

Der in Ostasien heimische Buchsbaumzünsler (*Neoglyphodes perspectalis*) wurde in der Vergangenheit in den Gattungen *Diaphania* HÜBNER, 1818, *Glyphodes* GUENÉE, 1854 und *Palpita* HÜBNER, 1808 (= *Phakellura* GUILDING, 1830) geführt. STRELTZOV (2008) beschrieb die neue, monotypische Gattung *Neoglyphodes* für *perspectalis*. Eine verwandtschaftliche Zuordnung steht

aber nach wie vor aus und wird gegenwärtig durch MALLY & NUSS untersucht, womit auch die Gattungszugehörigkeit geklärt werden soll.

Der Buchsbaumzünsler wurde erst vor kurzem nach Europa verschleppt. Der Erstnachweis stammt aus Südwestdeutschland aus dem Jahr 2006 (KRÜGER 2008). 2007 folgten erste Nachweise aus der Schweiz (KÄPPELI 2008, SIGG 2009) und den Niederlanden (MUUS et al. 2009), 2008 aus Großbritannien (MITCHELL 2009), Frankreich (FELDTRAUER et al. 2009) und Österreich (RODELAND 2009). Ein Überblick über die Ausbreitung der Art ist bei RODELAND (2009) zu finden.

Es ist anzunehmen, dass der Buchsbaumzünsler mit Buxus-Pflanzen nach Europa und innerhalb Europas verschleppt wurde und wird (KRÜGER 2008, KÄPPELI 2008, MUUS et al. 2009, SIGG 2009). Es gibt aber auch Hinweise, dass die Art selbständig in Europa überwintert und sich ausbreitet (KRÜGER 2008, FELDTRAUER et al. 2009, MUUS et al. 2009, SIGG 2009). In Mitteleuropa werden die Larven oft in großer Anzahl an Buchsbaum gefunden, wo sie insbesondere im letzten Larvenstadium die Büsche kahl fressen, so dass diese absterben (KRÜGER 2008; KÄPPELI 2008; SIGG 2009). Damit könnte sich der Buchsbaumzünsler zu einer wirklichen Gefahr der westpaläarktischen Buchsbaumbestände (*Buxus sempervirens* L.) entwickeln.

Neben den bei RODELAND (2009) aufgezeigten Nachweisen des Buchsbaumzünslers in **NI**, **NW**, **HE** und **BW** liegen nun auch Erstnachweise aus **BB** durch SVEN WAUER und aus **SN** durch DAGMAR NOWAK & LOTHAR LINDNER vor:

**BB:** Burg/Spreewald: 2 Falter am 26.09.2009, abends am Licht; 9 Falter am 27.09.2009 auf dem Friedhof, leg. D. NOWAK & L. LINDNER. Dort waren einige Büsche kahl gefressen. Larven wurden nicht mehr gefunden, aber ein Puppe.

**SN:** südöstlich Leipzig, Beucha, 07.09.2008, abends am Licht, leg. S. WAUER.

Der Artenbestand in den Bundesländern hat sich gegenüber 2008 wie folgt geändert:

Bundesland	Artenzahl 2007	Neufunde (abz. Streichungen)	Artenzahl 2008
SH	1302	1	1303
NI	1268	5	1273
NW	1330	27	1357
HE	894	30	924
RP	1092	42	1134
BW	1641	34	1675
BY	1903	2	1905
SL	1291	-	1291
MV	1179	8	1187
BB	1496	3	1499
SN	1469	1	1470
ST	1222	62	1284
TH	1513	10	1523

## Literatur

- FELDTRAUER, J.-F., FELDTRAUER, J.-J. & BRUA, C. (2009): Premiers signalements en France de la Pyrale du Buis *Diaphania perspectalis* (WALKER, 1859), espèce exotique envahissante s'attaquant aux Buis (Lepidoptera, Crambidae). – Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse 65: 55-58.
- KAPPEL, F. (2008): Der Buchsbaumzünsler – Im Eiltempo durch Basler Gärten. – g'plus – die Gärtner-Fachzeitschrift (Zürich) 2008 (20): 33.
- KRÜGER, E. O. (2008): *Glyphodes perspectalis* (WALKER, 1859) – neu für die Fauna Europas (Lepidoptera: Crambidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 118: 81-83.
- MITCHELL, A. (2009): Boxworm moth *Diaphania perspectalis* (WALK.) – a new pyralid moth to Britain and Ireland. – Atropos 36: 17-18.
- MUUS, T. S. T., VAN HAAFTEN, E.-J. & VAN DEVENTER, L. J. (2009): De buxusmot *Palpita perspectalis* (Walker) in Nederland (Lepidoptera: Crambidae). – Entomologische Berichten 69: 66-67.
- RODELAND, J. (ed.) 2009. Lepiforum. URL: www.lepiforum.de
- SIGG, C.-R. 2009: Auch das noch: Ein neuer Buchs-Schädling schlägt zu. Massive Schäden durch den Buchsbaumzünsler. – Der Gartenbau (Solothurn) 2009 (4): 2-4.
- STRELTZOV, A. N. 2008: A new genus for *Glyphodes perspectalis* (WALKER, 1859) (Pyraloidea, Crambidae, Pyraustinae). – Euroasian Entomological Journal 7: 369-372.
- Zitate zur Faunistik**
- [1] BIESENBAUM, W. (2009): Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des westlichen Münsterlandes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). – Melanargia 21(1): 1-34.
- [2] BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2008): Beiträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 3. Nachtrag. – Melanargia 20(4): 103-108.
- [3] BÜCHNER, U. (2008): Kommentierte Checkliste der Gracillarioida Thüringens: Roesslerstammiidae, Douglasiidae, Bucculatricidae, Gracillariidae (Lepidoptera). – Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 16: 5-14.
- [4] BÜCHNER, U. (2009): Ein weiterer Nachweis von *Roesslerstammia pronubella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) für Thüringen (Lepidoptera: Roesslerstammiidae). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e. V. 16(1): 14-15, 1 Fig.
- [5] DEUTSCHMANN, U. (2009): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns, Teil 10, Glyphipterigidae (Rundstirmotten, Wippmotten). – Virgo, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 12(1): 35.
- [6] DEUTSCHMANN, U. (2009a): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns, Teil 11, Choreutidae (Spreizflügelfalter). – Virgo, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 12(1): 36.
- [7] DEUTSCHMANN, U. (2009b): Bemerkenswerte Tineidenfunde aus Mecklenburg-Vorpommern (Lepidoptera, Tineidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 53(3/4): 254.
- [8] HAUSENBLAS, D. (2009): Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete – 2. Beitrag. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 44: 81-106, 9 Fig.
- [9] KINKLER, H. (2009): *Sclerocona acutellus* (EVERSMANN, 1842) neu für Nordrhein-Westfalen (Lep., Pyralidae). – Melanargia 21(3): 133-134.
- [10] MEY, W. (2008): Hohlwege und Streuobsthänge als Überlebensräume für Kleinschmetterlinge (Lepidoptera) im Naturpark „Unteres Saaletal“, Sachsen Anhalt. – Insecta, Heft 11: 95-102, 9 Fig.
- [11] MÖRTER, R. & KINKLER, H. (2008): Familie: Pyralidae LATREILLE, 1809, Unterfamilie: Galleriinae ZELLER, 1848, Unterfamilie: Pyralinae LATREILLE, 1809; Familie: Crambidae LATREILLE, 1810, Unterfamilie Schoenobiinae DUPONCHEL, 1846; Unterfamilie: Acentropinae STEPHENS, [1836], Unterfamilie: Odontiinae GUENÉE, 1854, Unterfamilie: Evergestiinae MARIÓN, 1952. – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens 14: 155 S. 4 Farbtaf.
- [12] NÄSSIG, W. A. (2008): Künstliche Sexuallockstoffe in der Faunistik: Ergebnisse einer Studie an Wicklern in Hessen (Lepidoptera: Tortricidae) 2. Systematischer Teil: Tortricidae, Tortricinae. – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N. F. 29(3): 127-148.
- [13] NÄSSIG, W. A. & THOMAS, W. (1991): Pheromonbiologische und faunistische Beobachtungen an vier *Grapholitha*-Arten in Hessen (Lepidoptera, Tortricidae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo N. F. 12(1): 69-83.
- [14] RETZLAFF, H.; SELIGER, R.; WITTLAND, W. & FINKE, CH. (2009): Erstmeldungen und aktuelle Funde zur Schmetterlingsfauna (Microlepidoptera) von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen. – Melanargia 21(2): 88-96.
- [15] RUTTEN, T. & KARISCH, T. (2009): Ergänzungen zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen-Anhalt (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 53(3/4): 161-164.
- [16] SCHUMACHER, H. (2009): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 21. Zusammenstellung. – Melanargia 21(1): 35-38.
- [17] SEGERER, A. (2009): Über zwei bemerkenswerte Schmetterlingsarten für Bayern (Lepidoptera: Gracillariidae, Tortricidae). – Nachrichtenblatt bayerischer Entomologen 58(3/4): 105-109.
- [18] WEGNER, H. (2009): *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847) nun auch in Nordwestdeutschland gefunden (Lep., Tortricidae). – Melanargia 21(3): 129-130.
- [19] WOLF, W. (2009): *Cremnophila flaviciliella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) in den Allgäuer Hochalpen – Erstnachweis für Deutschland. (Insecta: Lepidoptera: Pyralidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 9: 61-64, 2 Fig.
- Literatur**
- ARENBERGER, E. (2005): Pterophoridae III. Platyptiliinae: Platyptiliini: *Stenoptilia*. – In: GAEDIKE, R. (Hrsg.): Microlepidoptera Palaearctica 12: 191 S., GOECKE & EVERS, Keltum.
- BALINSKY, B. I. (1994): A study of African Phycitinae in the Transvaal Museum. – B. I. BALINSKY, Johannesburg, 1-208, errata.
- BENDER, E. (1954): Vergleichende Untersuchungen über Auftreten, Entwicklung und Schaden durch *Laspeyresia janthinana* Dup. und *Carpocapsa pomonella* L. – Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie 12: 160-164.
- BIEBINGER, A. D. & SPEIDEL, W. (1982): Revision der Gattung *Sclerocona* MEYRICK, 1890 in der Westpalaearkt (Lepidoptera: Crambidae). – Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 32: 6-9.
- BURMANN, K. (1988): Beiträge zur Microlepidopterenfauna Tirols. XII. Oecophoridae (Insecta: Lepidoptera: Oecophoridae). – Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 75: 227-239.
- DE PRINS, W. & DE PRINS, J. (2005): Gracillariidae (Lepidoptera). – World Catalogue of Insects 6: 1-502.
- DISQUÉ, H. (1900): Zur Mikrolepidopteren-Fauna von Speier nebst Nachträgen und Berichtigungen zu „REUTTI, Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden“. Mitteilungen des Badischen zoologischen Vereins 7: 126-135.
- EBERT, G. (1978): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Naturschutzgebietes Rußheimer Altrhein. – In: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbaische Auenlandschaft. – Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 10: 525-552.
- EPPELSHEIM, F. (1881): Über die Synonymie der *Crociodosema plebejana* Z. – Entomologische Zeitung (Stettin) 42: 379-380.
- GAEDIKE, R. (2008): Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 52(1): 9-49.
- GAEDIKE, R. (2009): Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 53(2): 75-100, 7 Fig.
- GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 5: 1-216.
- KAILA, L. & WIKSTRÖM, B. (2004): *Leucoptera lathyrfoliella* (STANTON, 1866) and *L. orobi* (STANTON, 1870): two distinct species (Lyonetiidae). – Nota lepidopterologica 27(2/3): 187-192.
- KLEINEKÜHLE, J. & NIEDRINGHAUS, R. (2008): Die Kleinschmetterlinge der Ostfriesischen Inseln (Microlepidoptera). – Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 11: 331-340.
- LERAUT, P. J. A. (2001): Contribution à l'étude des Phycites Paléarctiques (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae). – Revue française d'Entomologie 23(2): 129-141.
- LERAUT, P. J. A. (2003): Nouvelle contribution à l'étude des Pyrales Paléarctiques (Lepidoptera, Pyraloidea). – Revue française d'Entomologie (N.S.) 25(2): 67-79.

- LERAUT, P. J. A. (2005): Contribution à l'étude de quelques genres et espèces de Pyraustinae (Lepidoptera: Crambidae). – Nouvelle Revue d'Entomologie 22(2): 123-139.
- LERAUT, P. J. A. (2008): Ebauche d'une liste des pyrales de France [Lepidoptera, Pyraloidea]. Revue française d'Entomologie (N.S.) 29(2007)(4): 149-166.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwest-Deutschland 14: 70-77.
- PETERSEN, G. & GAEDIKE, R. (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera Nachträge VI (Tineidae, Acrolepiidae, Crambidae, Galleriidae, Pyralidae s. str., Douglasiidae, Pyraustinae, Scopariinae, Phycitinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 31(1): 29-36.
- RAPP, O. (1936): Beiträge zur Fauna Thüringens. 2: Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). Beobachtungen von Professor Dr. ARTHUR PETRY in Nordhausen, CURT BEER in Erfurt, ERNST HOKEMEYER in Großenbehringen. – Erfurt, II + 240 S.
- REUTTI, C. (1898): Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthum's Baden und der anstossenden Länder. 2. Ausg. Herausgegeben von MEISS, A. & SPULER, A. – Berlin, BORNTRAEGER, 361 S.
- ROESLER, R. U. (1973): Phycitinae. – In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. & REISSER, H. (Hrsg.): Microlepidoptera Palaearctica 4: XVI+172+137 S., 170 Taf.; G. FROMME & Co. Wien.
- ROESLER, R. U. (1976): Phycitinen-Studien XIV (Lepidoptera: Pyralidae). *Zophodia graciella* (HULTS, 1887), neu für Deutschland. – Entomologische Zeitschrift 86: 77-82.
- ROESLER, R. U. & SPIEDEL, W. (1979): Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Zünslerfalter (Pyraloidea) (Lepidoptera – Schmetterlinge). – Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 49/50: 371-395.
- RÖSSLER, A. (1881): Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte. – Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde 33-34(1880-1881): 1-393.
- SPEIDEL, W., NIEUKERKEN, E. J. VAN, E. J., HONEY, M. R. & KOSTER, S. (J. C.) (2007): The exotic pyraloid moth *Diplostepis perieresisalis* (WALKER) expanding in the West Palaearctic Region (Crambidae: Spilomelinae). – Nota lepidopterologica 29(2006)(3/4): 185-192.
- STUEDEL, W. & HOFMANN, E. (1882): Verzeichniss württembergischer Kleinschmetterlinge. – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 38: 143-262.
- STOLLWERCK, F. (1863): Die Lepidopteren-Fauna der preussischen Rheinlande. – Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande 20(N.F. 10): 43-248.
- TRÁNKNER, A., H. LI & M. NUSS (2009): On the systematics of *Anania hübnerei*, 1823 (Pyraloidea: Crambidae: Pyraustinae). – Nota lepidopterologica 32(1): 63-80.
- WÖRZ, A. (1953): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (4. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 108: 90-118.
- WÖRZ, A. (1956): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (7. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 111: 223-254.
- WÖRZ, A. (1957): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (8. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 112: 282-313.

## TAGUNGSBERICHTE

(Fortsetzung von S. 102)

- 19.05.-21.05.1989 (4.): Wüstenhain, Kreis Calau (DD), Organisation: JOACHIM RUSCH, MANFRED UHLIG;
- 08.06.-10.06.1990 (5.): Gosen bei Berlin (DD), Humboldt-Universität (Museum für Naturkunde), Organisation: RAY MASCH, MANFRED UHLIG;
- 16.05.-19.05.1991 (6.): Eberswalde (DE), Deutsches Entomologisches Institut, Organisation: LOTHAR ZERCHE, MANFRED UHLIG;
- 23.04.-26.04.1992 (7.): Zwillbrock, Kreis Borken (DE), Biologische Station Zwillbrock, Organisation: HEINRICH TERLUTTER, LOTHAR ZERCHE, MANFRED UHLIG;
- 23.04.-25.04.1993 (8.): Vitte/Hiddensee (DE), Organisation: LOTHAR ZERCHE, MANFRED UHLIG;
- 22.04.-24.04.1994 (9.): Quolsdorf, Kreis Niesky (DE), Organisation: JÜRGEN VOGEL, LOTHAR ZERCHE, MANFRED UHLIG;
- 25.05.-28.05.1995 (10.): Stanzach/Tirol (AT), Organisation: MANFRED KAHLER, LOTHAR ZERCHE, MANFRED UHLIG;
- 16.05.-19.05.1996 (11.): Prag (CZ), Výzkumný ústav rostlinné výroby, Organisation: MATUŠ KOCIAN;
- 08.05.-11.05.1997 (12.): Silbertal/Vorarlberg (AT), Organisation: ANDREAS KAPP, CLEMENS M. BRANDSTETTER;
- 21.05.-24.05.1998 (13.): Mühlleithen/Vogtland (DE), Organisation: VOLKER GOLLKOWSKI;
- 13.05.-16.05.1999 (14.): Hörbranz/Bodensee (AT), Organisation: ANDREAS KAPP, CLEMENS M. BRANDSTETTER;
- 01.06.-04.06.2000 (15.): Freiburg i. Br. (DE), Albert-Ludwigs-Universität, Organisation: CHRISTIAN MAUS, KLAUS PESCHKE;
- 24.05.-27.05.2001 (16.): Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (DE), Organisation: JOACHIM WILLERS;
- 09.05.-12.05.2002 (17.): Wien (AT), Naturhistorisches Museum, Organisation: HARALD SCHILLHAMMER;
- 29.05.-01.06.2003 (18.): Verona (IT), Museo Civico di Storia Naturale, Organisation: ADRIANO ZANETTI;
- 20.05.-23.05.2004 (19.): Genf (CH), Muséum d'histoire naturelle, Organisation: GIULIO CUCCODORO;
- 05.05.-08.05.2005 (20.): Berlin (DE), Museum für Naturkunde, Organisation: JOHANNES FRISCH, LOTHAR ZERCHE;
- 25.05.-28.05.2006 (21.): České Budějovice (CZ), University of South Bohemia, Organisation: JAROSLAV BOHÁČ;
- 17.05.-20.05.2007 (22.): Stuttgart (DE), Staatliches Museum für Naturkunde, Organisation: KARIN WOLF-SCHWENNINGER, WOLFGANG SCHAWALLER;
- 01.05.-04.05.2008 (23.): Wien (AT), Naturhistorisches Museum, Organisation: HARALD SCHILLHAMMER;
- 21.05.-24.05.2009 (24.): Müncheberg (DE), Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Organisation: LOTHAR ZERCHE.

ALEXEY SOLODOVNIKOV, VOLKER GOLLKOWSKI

Manuskripteingang: 14.4.2010

Anschriff des Verfassers:  
 Dr. Reinhard Gaedike  
 Florusstraße 5  
 D-53225 Bonn  
 E-Mail: tinagma@msn.com

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard

Artikel/Article: [Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands \(Microlepidoptera\). 109-122](#)