

F. KÖHLER, Bornheim

2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera) Teil 1

Familie CARABIDAE

Cicindela sylvicola DEJ., 1822: **Pf+**(/ [PERSOHN & LUDEWIG 2002, PERSOHN et al. 2006].

Cicindina arenaria FUESSL., 1775: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Cylindera germanica L., 1758: **Br+**(-) [STUCK 2011].

Calosoma sycophanta (L., 1758): **Wf**(-) [HANNIG 2005a].

Calosoma investigator (ILL., 1798): **Sn-** [GÜNTHER & PESCHEL 2001]. **WE?** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].

Calosoma maderae (F., 1775): **By+** [GERSTMAYER 2000]. **No+** [HANNIG 2008b].

Calosoma reticulatum (F., 1787): **WE**(+) [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+**: Halle i. W., K. H. MEYER, 8.VII.1954 [SCHULZE 2009].

Carabus violaceus L., 1758: **Wf+** [BORCHERDING 1994].

Carabus purpurascens F., 1787: **WE+** [coll. WAGNER, BELLMANN i.l. 2000].

Carabus nitens L., 1758: **No+**(-) [HAMERS & KÖHLER 2005, BAUMANN 2007, SCHÜLE 2007].

Carabus nodulosus CREUTZ., 1799: **No**(-): Bonn-Rüngsdorf, J. KLEIN, 1913/14 (t. HANNIG, Museum Koenig Bonn) [HANNIG i.l.].

Carabus ullrichii GERM., 1824: **No** [HANNIG 2008b]. **Rh+**(-) [coll. Mus. Bonn]. **WE** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf** [HANNIG 2005a].

Carabus linnei PANZ., 1810: **Hn?**(-) [SPRICK et al. 2007].

Leistus spinibarbis (F., 1775): **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].

Leistus montanus STEPH., 1827: **Ba?**(?) [FRITZE & HANNIG 2010]. **By+** [FRITZE & HANNIG 2010]. **Rh+**(/) [FRITZE & HANNIG 2010]. **Wt+** [SZALLIES & AUSMEIER 2001b].

Leistus fulvibarbis DEJ., 1826: **Ba+** [HANNIG 2010a]. **Hs+** [HANNIG 2010a]. **MV** [MICKÉ 1915 nach HORION 1941, HANNIG 2010a falsch]. **Pf+** [HANNIG 2010a]. **WE+** [NORDMANN & HIELSCHER 1994, HANNIG 2010a]. **Wf+** [HANNIG & SCHWERK 2000, HANNIG 2010a].

Nebria picicornis (F., 1801): **Wf?**(.) [HANNIG & KAISER 2006].

Nebria rufescens (STRÖM, 1768): **No**: bei dem von ROHWEDDER (2006) mit über 20 Jahren Verzug gemeldeten Stück handelt es sich sicher um eine Fundortverwechslung / Fälschekettierung [KÖHLER i.l.].

Nebria salina FAIRM.LAB., 1854: **Br+**(-) [KIELHORN 2011].

Nebria picea (DEJ., 1826): **By+** [HUBER et al. 2005].

Nebria cordicollis CHAUD., 1837: **Ba**: als *N. praegensis* beschrieben [HUBER & MOLENDRA 2004], jetzt ssp. von *N. cordicollis*.

Oreonebria boschi WINKLERHORION, 1949: **Ba+** [MÜLLER-MOTZFELD 2004]. **Wt+** [MÜLLER-MOTZFELD 2004].

Notiophilus substriatus WTH., 1833: **Sd+** [LILLIG 2006].

Notiophilus quadripunctatus DEJ., 1826: **Ba+** [PERSOHN et al. 2006, HEMANN & TRAUTNER 2002].

Elaphrus aureus MÜLL., 1821: **Br+**(-) [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004]. **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000].

Elaphrus ullrichii REDT., 1842: **Hn+**(.) [SCHMIDT et al. 2000]. **Sn+**(.) [PERSOHN et al. 2006]. **Wf**(+): Der dem Eintrag zugrunde liegende Fundort Eimen bei Herford liegt in Niedersachsen, letzter Nachweis: Steinhagen 1936 (BARNER 1949) [HANNIG & SCHWERK 2001].

Dyschirius thoracicus F., 1801: **Pf+** [ARK Bienenwald].

Dyschirius obscurus (GYLL., 1827): **Wf**(+) [HANNIG 2004].

Dyschirius nitidus (DEJ., 1825): **Br+**(-) [KIELHORN 2006].

Dyschirius agnatus MOTSCH., 1844: **Br** [KIELHORN et al. 2005]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].

Dyschirius calceus ER., 1837: **No?**(-) [HANNIG 2006b]. **WE**(+) [coll. BOCHE].

Dyschirius salinus SCHAUUM, 1843: **Wf?**(.) [HANNIG 2001].

Dyschirius laevisculus PUTZEYS, 1846: **Br+**(-) [KIELHORN et al. 2005].

Dyschirius angustatus (AHR., 1830): **Rh**(.) [SCHWARZWÄLDER 1999].

Dyschirius lafertei PUTZEYS, 1846: **Th+** [PESCHEL 1997].

Perileptus areolatus (CREUTZ., 1799): **Br+**(-) [EICHLER et al. 2002, BARNDT 2004, KIELHORN et al. 2005]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **No**(-) [HANNIG & BUCHHOLZ 2010]. **No** [HANNIG & BUCHHOLZ 2010]. **Pf** [ARK Bienenwald].

Thalassophilus longicornis (STURM, 1825): **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000].

Epaphius rivularis (GYLL., 1810): **Hn**(+): bei dem im ersten Nachtrag (KÖHLER 2000) genannten Tier handelt es sich um *Trechus rubens* (WINKELMANN det.) [SPRICK i.l. 2000].

Trechus cuculorum MEQ., 1921: **Hs+**: Grube Messel [HOFMANN i.l. 2010].

Trechus splendens GEMM.HAR., 1868: **Br+** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002].

Trechus austriacus DEJ., 1831: **MV+** [PERSOHN et al. 2006, STEGEMANN 2005].

Trechus cardioides PUTZEYS, 1870: **WE?** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].

Tachys scutellaris STEPH., 1828: **Wf?**(.) [HANNIG & KAISER 2006].

Paratychus bistriatus (DUFT., 1812): **MV+**(?) [KÖHLER Rüte]. **Ne+** [BURGARTH 2003].

Paratychus micros (FISCH.-W., 1828): **Br+**(-) [KIELHORN et al. 2005].

Paratychus fulvicollis (DEJ., 1831): **Hs+**: Grube Messel [HOFMANN i.l. 2010]. **No+**: Meckenheim, Krautfabrik, JUNKER, 25.V.2007, 1 Ex. (t. KÖHLER) in einer Lichtfalle [JUNKER & KÖHLER 2010]. **Pf** [ARK Bienenwald].

Paratychus exiguus (R.F.SAHLB.): **Ba**: bei der gemeldeten Art (SZALLIES im Dr.) handelt es sich um eine andere für Mitteleuropa neue Spezies [SCHÜLE mdl. 2001].

Elaphropus haemorrhoidalis (PONZA, 1805): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Elaphropus diabrachys (KOL., 1845): **Ba?**(+): die Meldung im 1. Nachtrag (Buggingen, Kalihalde, MAUS leg.) sollte geprüft werden [HANNIG & SIEBER 1999, HANNIG 2000a]. **Br+** [KIELHORN et al. 2005, KIELHORN et al. 2007, BARNDT 2008]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Pf** [ARK Bienenwald, RENNER 2011]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [HANNIG & SIEBER 1999, SIEBER 1999b, PESCHEL i.l. 2007, KIELHORN et al. 2007]. **St** [KIELHORN et al. 2005, KIELHORN et al. 2007]. **Th+** [HANNIG & SIEBER 1999, KOPETZ & WEIGEL 2000, KIELHORN et al. 2007].

Elaphropus quadrisignatus (DUFT., 1812): **Ne**: eine Meldung bei ZIEGLER (2006c) bezieht sich auf *Elaphropus diabrachys* [GÜRLICH et al. i.V.]. **Pf** [ARK Bienenwald]. **SH** [GÜRLICH et al. i.V.].

Elaphropus sexstriatus (DUFT., 1812): **Pf**(/) [ARK Bienenwald].

Elaphropus walterianus (SHIP., 1913): **Ba+** [PERSOHN et al. 2006]. **By+**: Chiengauer Alpen, Inzeller Moor, unbekannter Finder, 1 Ex. in coll. AUSMEIER - als *E. paulinae* publiziert [SZALLIES & AUSMEIER 2001a, NEUMANN mdl., PERSOHN et al. 2007]. **Wt**: Bad Waldsee, Oberes Ried, SZALLIES u.a., 1997-99, mehrfach - Bad Buchau, Wildes Ried, ULBRICH, 13.VI.1987, 1 Ex. - als *Elaphropus paulinae* beschrieben - NEUMANN weist auf die Übereinstimmung mit der *walterianus*-Diagnose bei HÜRKA (2000) hin [SZALLIES & AUSMEIER 2001a, NEUMANN mdl.].

Porotachys bisulcatus (NICOL., 1822): **St**(-) [CIUPA & GRUSCHWITZ 1998, JUNG 2007].

Tachyta nana (GYLL., 1810): **SH**(+) [ZIEGLER 2004].

Bembidion striatum (F., 1792): **Br**(-) [KIELHORN et al. 2005]. **Rh**(-) [GEISSEN 2000].

Bembidion velox (L., 1761): **Wf**(-) [HANNIG 2001].

Bembidion pygmaeum (F., 1792): **Wf?**(+) [HANNIG & KAISER 2006].

Bembidion bipunctatum (L., 1761): **Ba**(+): der der Meldung zugrundeliegende Beleg der coll. GLADITSCH ist fehlbestimmt [KONZELMANN i.l. 2001].

Bembidion ruficollis (PANZ., 1797): **Hn**(-) [SCHMIDT et al. 2005]. **No**(/) [coll. KÖHLER]. **WE**(?) [BELLMANN & MAUS 2007].

Bembidion prasinum (DUFT., 1812): **Hn**- [SPRICK et al. 2007]. **No**(-) [HANNIG 2006a].

Bembidion fasciolatum (DUFT., 1812): **Hn**- [SPRICK et al. 2007]. **Wf**(?) [HANNIG 2006a].

- Bembidion pseudascendens* MANDERBACH & MÜLLER-MOTZFELD, 2004: **By+** [MANDERBACH & MÜLLER-MOTZFELD 2004].
- Bembidion lunatum* (DUFF., 1812): **Wf?**(?) [HANNIG & KAISER 2006].
- Bembidion cruciatum* DEJEAN, 1831: **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Wf+**(/) [PERSOHN et al. 2007, HANNIG 2008b].
- Bembidion testaceum* (DUFF., 1812): **WE?**(?) [BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Bembidion fluviale* DEJ., 1831: **SH?**(?) [SOKOLOWSKI 1952]. **WE?**(?) [BELLMANN et al. 2003].
- Bembidion millerianum* HEYDEN, 1883: **St+**(-) [JUNG 2001].
- Bembidion schuppelii* DEJ., 1831: **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **SH+**(/) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Bembidion fumigatum* (DUFF., 1812): **Wf+** [HANNIG & KAISER 2006].
- Bembidion clarki* (Daws., 1849): **St+** [JUNG 2007].
- Bembidion tenellum* Er., 1837: **Ba+**(/) [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Bembidion azurens* (D.T., 1877): **No?**(-) [HANNIG 2006b]. **Sd+** [coll. KÖHLER].
- Bembidion quadripustulatum* SERV., 1821: **Wf+**(-) [HANNIG 2001].
- Bembidion neresheimeri* J.MÜLLER, 1929: **SH?** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Asaphidion caraboides* (SCHRCK., 1781): **Hs+**: Hofheim a. T., KRECKEL, 1906 [coll. HÖHNER].
- Asaphidion stierlini* (HEYD., 1870): **Ne?**: der bei MÜLLER-MOTZFELD (2004) angegebene Fund in Hamburg ist zweifelhaft, da es sich um ein unvollständig etikettiertes Kaufexemplar handelt [SCHÜLE i.l. 2005]. **No+** [SCHÜLE 2002, PERSOHN et al. 2006]. **Rh+** [SCHÜLE i.l. 2005, PERSOHN et al. 2007].
- Asaphidion austriacum* SCHWEG., 1975: **No**(-) [HANNIG 2006b]. **Pf**(+) Fehlbestimmung [Hannig i.l.]. **Wt+** [KOSTENBADER 2009].
- Anillus caecus* DUVAL, 1851: **Wt+** [MALZACHER & KONZELMANN 2001].
- Anisodactylus signatus* (PANZ., 1797): **Hn+**(+) [SCHMIDT et al. 2005]. **Sn+** [ESSER 2005c]. **Wf+**(-) [HANNIG 2005a].
- Diachromus germanus* (L., 1758): **Hn+**(+): Gut Marienstein nördl. Göttingen, TEICHERT, VII-VIII.1999, 1 Ex. auf einer Agrarfläche [BÜCHE i.l., SCHMIDT et al. 2000]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1878, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+**(-) [DREES 2003].
- Parophonus maculicornis* (DUFF., 1812): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf?**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Harpalus signaticornis* (DUFF., 1812): **Wf+**(+): Diemeltal, mehrere Fundorte, HOLSTE (t. KAISER) [KAISER i.l. 2000].
- Harpalus flavescens* (PILL.MITT., 1783): **Wf+**(-) [HANNIG 1999].
- Harpalus hirtipes* (PANZ., 1797): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **No?**(-) [HANNIG 2006b]. **Wf?**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Harpalus dimidiatus* (ROSSI, 1790): **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Harpalus caspius* (STEVEN, 1806): **Br+** [BRUNK 2008].
- Harpalus tenebrosus* DEJ., 1829: **Ba+** [SZALLIES 2001].
- Harpalus xanthopus* GEMM. & HAROLD, 1868: **Ba+** [PERSOHN et al. 2007, KNAPP & RHEINHEIMER 2010].
- Harpalus luteicornis* (DUFF., 1812): **No+**(-) [HANNIG & WENZEL 2003]. **Wf+**(/) [DÖRING & KAISER 2000].
- Harpalus marginellus* DEJ., 1829: **Th-** [PESCHEL 1997]. **Wf?**(-) [HANNIG & KAISER 2006].
- Harpalus picipalpis* STURM, 1818: **Br?**: Bindow, 5.VIII.1961 (Mus. Berlin) mögl. Fundortverwechselung [WRASE et al. 2003].
- Harpalus fuscicornis* Ménétr., 1832: **Ba+** [WRASE et al. 2003]. **By+** [PERSOHN et al. 2007, HANNIG 2006c].
- Harpalus picipennis* (DUFF., 1812): **Wf?**(/) [HANNIG 2005a].
- Harpalus pumilus* STURM, 1818: **Wf-**: Saerbeck, Emsaue, PEETZ, 21.IV.1936, 5 Ex. (KAISER det.) in Hochwassergebiet [KAISER i.l. 2000].
- Harpalus servus* (DUFF., 1812): **Wf?**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Harpalus albanicus* Rtt., 1900: **Pf+** [PERSOHN et al. 2006].
- Harpalus politus* DEJ., 1829: **Hs-**: Frankfurt Schwanheim, C. STOCK, etwa 1910 - Hanau, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER]. **Rh+**(/) [WENZEL & HANNIG 2002].
- Harpalus subcylindricus* DEJ., 1829: **Sn+** [WEIGEL 2005]. **Wt+** [WOLF-SCHWENNINGER 2003].
- Ophonus sabulicola* (PANZ., 1796): **Rh+**(?) [BÖHME & HÖHNER 2001].
- Ophonus stictus* STEPH., 1828: **Hs+**(+): Roßdorf, Roßberg, HANSEN, 30.VIII.52, 6 Ex. und BÖHME, 18.IX.55, 6 Ex. (t. PERSOHN) [coll. BÖHME, BRENNER 2000]. **St+** [CIUFA 2004]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, PESCHEL 1997]. **Wf**(+): Porta Westfalica, Barkhausen, JANKOWSKI, 4.VII.1949, 1 Ex. (t. WRASE, Museum Bielefeld) [KAISER i.l. 2001].
- Ophonus diffinis* DEJ., 1829: **Sn+** [WEIGEL 2005]. **Wf**: die aus dem Diemeltal publizierte Art (HOLSTE 1997) erwies sich als *Ophonus ardosiacus* (KAISER det.) [KAISER i.l. 2000].
- Ophonus ardosiacus* LUTSHNIK, 1922: **Wf+** [HANNIG & SCHWERK 2001].
- Ophonus brevicollis* (SERV., 1821): **Hs+** [PERSOHN et al. 2006]. **Pf+** [PERSOHN et al. 2006, PERSOHN & KITZ 2002].
- Ophonus schaubergerianus* PUEL, 1937: **Br**/ [KIELHORN et al. 2005].
- Ophonus cordatus* (DUFF., 1812): **Nov**(-) [HANNIG 2006b]. **Wf+**(-): Diemeltal, mehrere Fundorte, HOLSTE (t. KAISER) [KAISER i.l. 2000].
- Ophonus parallelus* DEJ., 1829: **No**/ [HANNIG 2006b]. **Wf**/ [HANNIG 2004].
- Ophonus puncticollis* (PAYK., 1798): **No+**(-) [HANNIG & KAISER 2006].
- Ophonus melletii* HEER, 1837: **No+** [HANNIG 2006b, KÖHLER 2006a].
- Pseudoophonus calceatus* (DUFF., 1812): **No+**(-) [KOCH 1990, JUNKER & KÖHLER 2010, coll. KÖHLER]. **Rh+**(-) [KÖHLER & KÖHLER 2009a]. **Sd+**(-) [KLOMANN et al. 1978, KOCH 1990].
- Dicheirotichus muscivorus* (DEJ., 1829): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Acupalpus elegans* (DEJ., 1829): **WE**(/) [BELLMANN i.l. 2000]. **Wf?**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Acupalpus brunneipes* (STURM, 1825): **Ba**(+): der der Meldung zugrundeliegende Beleg der coll. KNAPP ist fehlbestimmt [KONZELMANN i.l. 2001].
- Acupalpus suturalis* (DEJ., 1829): **WE**/ [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Acupalpus luteatus* (DUFF., 1812): **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **Pf+**(?) [ARK Bienenwald]. **SH+**(/) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Acupalpus interstitialis* Rtt., 1884: **No**/ [HANNIG 2006b]. **Rh+**(-) [WENZEL & HANNIG 2002].
- Amblystomus niger* (HEER, 1841): **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Poecilus punctulatus* (SCHALL., 1783): **Th+**(-) [JESSAT 2001].
- Poecilus kugelanni* (PANZ., 1797): **Br+**(-) [BARNDT et al. 2002].
- Poecilus koryi* GERM., 1824: **Ba**/ [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich].
- Poecilus sericeus* FISCH.-W., 1823: **Ba**/ [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich].
- Pterostichus longicollis* (DUFF., 1812): **Wf?**(/) [HANNIG & KAISER 2006].
- Pterostichus pumilio* (DEJ., 1828): **Nov** [REISSMANN 2006a].
- Pterostichus negligens* (STURM, 1824): **Rh+** [MOLENDEN 2000]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, MOLENDEN 2000].
- Pterostichus leonisi* APFELB., 1904: **Wt+** [PERSOHN et al. 2006, MARGGI & MESSUTAT 2002].
- Pterostichus gracilis* (DEJ., 1828): **Rh+**(-) [GRUSCHWITZ 1989].
- Pterostichus aterrimus* (Hbst., 1784): **Ba+** [KNAPP 2003]. **No+**(-) [KÖHLER & SCHARF 2010].
- Pterostichus aethiops* (PANZ., 1797): **Br+**(?) [BARNDT i.l., BARNDT 2008].
- Pterostichus melas* (CREUTZ., 1799): **No+**(v) [HANNIG & KAISER 2006].
- Pterostichus panzeri* (PANZ., 1850): **Wt+** [SZALLIES & AUSMEIER 2001b].
- Molops elatus* (F., 1801): **WE?** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Abax carinatus* (DUFF., 1812): **No+** [HANNIG 2006b, PERSOHN et al. 2007]. **Wf?**(/) [HANNIG 2006b].
- Calathus mollis* (MARSH., 1802): **Wf**/ [HANNIG 2005a].
- Calathus cinctus* (MOTSCH., 1850): **WE+** [HANNIG 2000b].
- Calathus rotundicollis* DEJ., 1828: **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Rh+** [coll. KÖHLER].
- Dolichus halensis* (SCHALL., 1783): **WE?** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Sphodrus leucophthalmus* (L., 1758): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Agonum impressum* (PANZ., 1797): **Hn**/ [SPRICK et al. 2007]. **WE?**(?) [WIEPKEN 1886, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf**(+): bei dem Beleg in der coll. JANKOWSKI handelt es sich um *Agonum sexpunctatum* (KAISER det. 2000), die Art ist weiter verschollen (vgl. KOCH 1968) [KAISER i.l. 2000].
- Agonum viridicupreum* (GOEZE, 1777): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **MV+**(?) [HAMPEL 2008]. **SH+**(/) [SCHULZ 2002].
- Agonum dolens* (SAHLB., 1827): **No+**(-) [HANNIG & WENZEL 2003, PERSOHN et al. 2006]. **Sd+** [TRAUTNER 2005b].
- Agonum monachum* (DUFF., 1812): **By**(+): der zugehörige Beleg aus Schwabach erwies sich als Weibchen von *Agonum afrium* (t. HANNIG & SCHWERK) [Hannig 2000a]. **St**(-): ein alter Nach-

- weis aus Halle wurde schon früher angezweifelt, Belege fehlen, so dass die Art zu streichen ist [HANNIG 2000a]. **Th**(-): zu einer alten Meldung existiert kein Beleg, die Art ist daher zu streichen [HANNIG 2000a]. **WE**(+): Bremer Funde (HOLLMANN 1884) sind unbelegt, daher zu streichen [HANNIG 2000a]. **Wf**(+): der aus Hagen publizierte Fund gehört zu *Agonum nigrum* (t. HANNIG & SCHWERK 1999) [HANNIG 2000a].
- Agonum nigrum* DEJ., 1828: **Ba**? [HANNIG 2008a]. **Hs**+/ [HANNIG i.l. 2010]. **Pf**+ [HANNIG 2008a]. **St**? [HANNIG 2008a]. **WE**- [HORION 1941, BELLMANN i.l. 2000, HANNIG 2008a].
- Agonum lugens* (DUF., 1812): **No**(-) [HANNIG 2006b]. **Wf**?(+) [HANNIG 2006b].
- Agonum scitulum* DEJ., 1828: **By**+/ [SCHMIDT & BENEDIKT 2010]. **No**+/ [HANNIG 2006a]. **Wf**?(?) [HANNIG & GRUNWALD 2000, HANNIG 2006a].
- Agonum munsteri* (HELLEN, 1935): **Wf**?(+) [HANNIG & KAISER 2006].
- Limodromus krynickii* (SPERK, 1835): **Ne**?(i) [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**?(i) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Zabrus tenebrioides* (GOEZE, 1777): **Ne**+/ [GÜRLICH et al. i.V.].
- Amara tricuspidata* DEJ., 1831: **Hn*** [SPRICK et al. 2007]. **MV**+/ [PERSOHN et al. 2007, HAMPFEL 2008]. **Rh**+/ [WENZEL & HANNIG 2002]. **WE**/ [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Amara strandi* LUTSHNIK, 1933: **Br**+ [MÜLLER-MOTZFELD 2004]. **St**+ [MÜLLER-MOTZFELD 2004]. **Th**+ [MÜLLER-MOTZFELD 2004, SPARNBERG 2008].
- Amara strenua* ZIMM., 1832: **No**+/ [HANNIG et al. 2002]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wf**?(i) [HANNIG & KAISER 2006]. **Wt**+(?) [SZALLIES 2001].
- Amara kulzi* FASS., 1947: **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [SCHÄFER 2004, PERSOHN et al. 2007].
- Amara fulvipes* (SERV., 1821): **Pf**+: von HORION 1941 mit **Pf** angegeben, wohl aber **kult**i [PERSOHN in Vorber., PERSOHN et al. 2007].
- Amara montivaga* STURM, 1825: **Br**+ [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
- Amara nitida* STURM, 1825: **MV**+ [SCHMIDT 2004].
- Amara pulpani* KULT, 1949: **MV**+ [SCHMIDT 2004]. **Wf**+ [SCHÄFER 2005, HANNIG 2006b, PERSOHN et al. 2007].
- Amara littorea* THOMS., 1857: **No**?(-) [HANNIG 2006b]. **Wf**+/ [HANNIG & GRUNWALD 2001].
- Amara proxima* PUTZEYS, 1866: **By**+/ [PERSOHN et al. 2006].
- Amara erratica* (DUF., 1812): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000]. **Wf**?(i) [HANNIG & KAISER 2006].
- Amara ingenua* (DUF., 1812): **No**+/ [HANNIG 2006b]. **Wt**?(?) [HIEKE 2001].
- Amara fusca* DEJ., 1828: **Wf**?(i) [HANNIG & KAISER 2006].
- Amara messae* BALIANI, 1924: **By**- [HIEKE 2001].
- Amara municipalis* (DUF., 1812): **No**?(-) [HANNIG 2006b]. **Wf**?(+) [HANNIG 2001, HANNIG 2006b].
- Amara praetermissa* (SAHLB., 1827): **MV**+/ [BEIER & BRÜGGEMANN 2001].
- Amara sabulosa* (SERV., 1821): **Wf**?(+) [HANNIG & KAISER 2006].
- Amara majuscula* CHAUD., 1850: **No**+ [HADULLA 2002, coll. KÖHLER]. **Rh**+ [KÖHLER & KÖHLER 2009b].
- Amara crenata* DEJ., 1828: **Pf**+ [KÖHLER & KÖHLER 2009b]. **Rh**+: Zeltingen-Rechtig, ESSER, 22.VII.2008, 1 Ex. auf einer Weinbergsbrache [coll. ESSER].
- Amara gebleri* GREDL., 1868: **Br**+ [BARNDT i.l.]. **St**+ [SCHNITTER 2007]. **WE**+(?) [SCHÄFER 2002]. **Wf**+ [HANNIG 2002].
- Amara convexuscula* (MARSH., 1802): **Pf**+ [LUDEWIG 1998, KÖHLER & KÖHLER 2009b].
- Chlaenius spoliatus* (ROSSI, 1790): **St**+ [SCHNITTER & TROST 2003].
- Chlaenius nitidulus* (SCHIRK., 1781): **Rh**+/ [GRUSCHWITZ 1989, WAGNER 2002a].
- Chlaenius variegatus* (GEOFFR., 1785): **Nov**(i) [HANNIG 2006b].
- Chlaenius sulcicollis* (PAYK., 1798): **Wf**?(i) [HANNIG & KAISER 2006].
- Chlaenius quadrisulcatus* (PAYK., 1790): **Wf**?(i) [HANNIG & KAISER 2006].
- Callistus lunatus* (F., 1775): **WE*** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Oodes gracilis* VILLA, 1833: **Hs**+: Eschwege, Werraue, KIRCH, 1963 [coll. HÖHNER]. **Sn**+(?) [LORENZ 2001b].
- Licinus hoffmannseggii* (PANZ., 1797): **No**+ [FRIEDRICH 1993].
- Licinus punctatulus* (F., 1792): **Wf**?(i) [HANNIG 2004].
- Licinus depressus* (PAYK., 1790): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **WE**+ [FALKE & ASSMANN 2001, BELLMANN & ESSER 2010].
- Badister meridionalis* PUEL, 1925: **Hn**+/ [SCHMIDT et al. 2000].
- Badister peltatus* (PANZ., 1797): **Wf**+/ [HANNIG & KAISER 2006].
- Masoreus wetterhallii* (GYLL., 1813): **Rh**+/ [WENZEL & HANNIG 2002].
- Lebia cyanocephala* (L., 1758): **Br**+/ [BEIER & HEILMANN 2003, KIELHORN et al. 2005]. **Hn**?(?) [SPRICK et al. 2007]. **WE**?(i) [BELLMANN i.l. 2000]. **Wf**+/ [HANNIG 2006b].
- Cymindis axillaris* (F., 1794): **No**?(i) [HANNIG 2006b].
- Cymindis macularis* MANNH., 1824: **WE**+/ [SCHMIDT & MELBER 2004].
- Cymindis vaporariorum* (L., 1758): **Pf**+ [PERSOHN et al. 2006, WINTERHAGEN 2002].
- Dromius meridionalis* DEJ., 1825: **Br**+ [KIELHORN et al. 2005].
- Dromius schneideri* CROCH., 1871: **WE*** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Dromius kuntzei* POLENTZ, 1939: **Th**+ [FRENZEL 2006, PERSOHN et al. 2007].
- Calodromius bifasciatus* DEJ., 1825: **No**+ [HANNIG & REISSMANN 2004, PERSOHN et al. 2006].
- Philorhizus quadrisignatus* DEJ., 1825: **SH**+ [HANNIG & KERKERING 2004]. **St**+ [BASE 2007].
- Philorhizus crucifer* (LUCAS, 1846): **SH**+ [HANNIG & KERKERING 2004, PERSOHN et al. 2006].
- Paradromius longiceps* (DEJ., 1826): **Wf**?(i) [HANNIG 2004].
- Syntomus obscuroguttatus* (DUF., 1812): **Ba**+ [KNAPP & RHEINHEIMER 2010]. **Hn*** [SPRICK et al. 2007]. **Rh**+ [PERSOHN et al. 2006]. **Sd**+ [EISINGER 2006a, PERSOHN et al. 2007]. **Wf**?(i) [HANNIG 2004].
- Syntomus pallipes* (DEJ., 1825): **Br**+(?) [ESSER et al. 2006, BARNDT 2008]. **Hn*** [SPRICK et al. 2007]. **Hs**+: Hanau Umgebung, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER]. **St**+ [KNOBBE 2008].
- Apristus europaeus* MATEU, 1980: **Ba**+ [PERSOHN et al. 2007].
- Polistichus connexus* (GEOFFR., 1785): **Br**+ [BRUNK et al. 2010]. **Rh**+ [coll. FRIEDRICH]. **Sn**+ [LORENZ 2007b].
- Brachinus explosivus* DUF., 1812: **Br**+/ [BARNDT i.l.]. **No**+/ [JUNKER & KÖHLER 2005].
- Perigona congoana* BURGEON, 1935: **Hsi** [PERSOHN et al. 2007].
- Ophonus longicollis* RAMBUR, 1838: **Noi** [HANNIG 2008b].
- ### Familie HYGROBIIDAE
- Hygrobia hermanni* (F., 1775): **By**+/ [HECKES et al. 2006]. **Pf**+ [ARK Bienenwald]. **Th*** [HORION 1938].
- ### Familie HALIPLIDAE
- Brychius elevatus* (PANZ., 1794): **MV**+ [WOLF 1999].
- Haliplus varius* NICOL., 1822: **No**+/ [REISSMANN 2006a].
- Haliplus fulvicollis* ER., 1837: **By**?(i) [HECKES et al. 2006].
- Haliplus furcatus* SEIDL., 1887: **MV**+/ [BANNEMIN, SONDERMANN, 24.VIII.1999, in einem Waldtümpel [WOLF 1999, coll. SONDERMANN].
- Haliplus variegatus* STURM, 1834: **Th**+/ [APFEL 2003].
- ### Familie DYTISCIDAE
- Hydroglyphus hamulatus* (GYLL., 1813): **Br**+/ [HENDRICH & BRAUNS 2004]. **MV**+/ [Neuglobsow, Stechlinseegebiet, 3. VI.2000 [BÜCHE & ESSER 1999, HENDRICH & BRAUNS 2004]. **No**+ [coll. KÖHLER].
- Bidessus minutissimus* (GERM., 1824): **Hs**+: Groß-Rohrheim, KBC-Kiessee, SONDERMANN, 2.X.2002, 22 Ex. im Uferkies [SONDERMANN i.l.].
- Bidessus delicatulus* (SCHAU., 1844): **Wt**+: Berkach bei Echingen/Donau, SONDERMANN, 2.VI.1988, im Uferschotter eines Baggersees [coll. SONDERMANN].
- Bidessus unistriatus* (SCHRK., 1781): **Th**+/ [HENDRICH & BALKE in Vorber.].
- Bidessus grossepunctatus* VORBR., 1907: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs**+: Hanau Umgebung, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER]. **Pf**+ [SONDERMANN & ERDNUSS 2002]. **Th**- [SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818): **Hs**+: Mainau 1,5 km N Seligenstadt, Sandabgrabungsgewässer, SONDERMANN, 30.VII.1996 [coll. SONDERMANN]. **No**+ [REISSMANN 2006a]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th*** [HORION 1938]. **WE**+ [coll. HAESLOOP, BELLMANN i.l. 2006].
- Coelambus parallelogrammus* (AHR., 1812): **Br**+(?) [BRAASCH et al. 2000].
- Coelambus novemlineatus* (STEPH., 1828): **MV**+/ [SCHEMSCHAT 1980].

- Coelambus nigrolineatus* (STEVEN, 1808): **Hs+**: Kornsand bei Oppenheim, SONDERMANN, 8.VII.1999, auf einem flach überstauten Weizenacker [coll. SONDERMANN].
- Hydroporus scalesianus* (STEPH., 1828): **No+**(-) [KERKERING & REISSMANN 2006].
- Hydroporus morio* AUBÉ, 1836: **Br+**: Klein-Kölzig, SONDERMANN, 8.V.1999, in einem Waldtümpel [EICHLER et al. 1999, coll. SONDERMANN].
- Hydroporus obscurus* STURM, 1835: **Th+**(-) [CUPPEN et al. 1998].
- Hydroporus elongatus* STURM, 1835: **MV+**(-) [FRASE 2009].
- Hydroporus pubescens* (GYLL., 1808): **Br+**(-) [EICHLER et al. 2002]. **Th+**(-) [SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Hydroporus nigrita* (F., 1792): **Th+**(-): Hütscheroda bei Eisenach, SONDERMANN & BELLSTEDT, 10.V.2000, in Helokrenen [coll. SONDERMANN].
- Hydroporus ferrugineus* STEPH., 1828: **Th+**(-) [SKALE 1995].
- Hydroporus melanarius* STURM, 1835: **Th+**(-) [CUPPEN et al. 1998].
- Hydroporus longicornis* SHP., 1871: **Br+** [BRASCH et al. 2000].
- Hydroporus longulus* MULS., 1860: **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004].
- Hydroporus kraatzii* SCHAUM, 1868: **Wt+** [KOSTENBADER 2008].
- Graptodytes bilineatus* (STURM, 1835): **Hs+**(-): Heuchelheim bei Gießen, SONDERMANN, 10.IV.1997, in einem semipermanent überstauten Weidensumpf [coll. SONDERMANN]. **Pf+**(-): Dexheim, Steinbruch, SKALE, 7.V.2002 [SONDERMANN & ERDNUSS 2002, SKALE i.l. 2002]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Deronectes aubei* (MULS., 1843): **By+** [HECKES et al. 2006].
- Deronectes latus* (STEPH., 1829): **Hs+**(-): Viernünden, SONDERMANN, 20.V.2000, in einem schwach fließendem Wiesenbach [CUPPEN 2000, coll. SONDERMANN]. **St+**(-) [ORENDT 1996, ORENDT 1998].
- Stictotarsus duodecimpustulatus* (F., 1792): **MV+** [WOLF 1999].
- Nebiroporus canaliculatus* (LACORD., 1835): **Sd+** [LILLIG 2010, coll. KÖHLER].
- Nebiroporus depressus* (F., 1775): **By**(+): Art wird in der Roten Liste nicht mehr erwähnt [HEBAUER et al. 2003]. **MV+**(-) [ZIEGLER 2006a, HENDRICH mdl. 2011]. **No**(+), **Pf**(+), **Rh**(+) und **Sd**(+) [KÖHLER in Vorber.]. Die Art wird auch für andere Regionen im Süden und Westen zu streichen sein.
- Nebiroporus elegans* (PANZ., 1794): **By+** [HEBAUER et al. 2003]. **MV+** [HENDRICH mdl. 2011]. **No+** [coll. KÖHLER]. **Pf+**: Nachweise von *P. depressus* sind sicher auf diese Art zu beziehen [KÖHLER in Vorber.]. **Rh+** [coll. KÖHLER]. **Sd+**: Nachweise von *P. depressus* sind sicher auf diese Art zu beziehen [KÖHLER in Vorber.].
- Laccophilus ponticus* SHARP, 1882: **MV+**(-) [FRASE 2009]. **St+**(-) [BASE 2007, SCHÖPKE 1999].
- Copelatus haemorrhoidalis* (F., 1787): **Th+**(-) [NAUMANN 1989, SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Agabus subtilis* ER., 1837: **WE+**(-) [HAESLOOP 2001].
- Agabus erichsoni* GEMM. HAR., 1868: **Br+**(-) [BRAASCH et al. 2000]. **No+**: Wesel-Flüren, Altrhein, KERKERING, 28.VII.2001, 1 Ex. aus einer Hochwasserlache in Rheinfurde [HANNIG & KERKERING 2001b]. **Wf+**(-): Münster, NWZ Teppes Viertel 1991 [coll. KÖHLER, HANNIG & KERKERING 2001a].
- Agabus montanus* (STEPH., 1828): **Ba+** [SCHAEFFLEIN 1983]. **By** [HECKES et al. 2006].
- Agabus neglectus* ER., 1837: **Th+** [SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Agabus nitidus* (F., 1801): **MV+** [WOLF 1999].
- Agabus melanarius* AUBÉ, 1836: **Br+**(-) [EICHLER et al. 2002, BARNDT et al. 2002, BRASCH et al. 2000]. **Th+**(-) [SKALE & WEIGEL 1997].
- Agabus solieri* AUBÉ, 1836: **Ba**(+): die Meldung beruhte auf einem Stück vom Feldberg aus dem Jahre 1950 aus der HORION-Sammlung, bei dem es sich allerdings um *Agabus bipustulatus* (KLESS det.) handelt [KLESS i.l. 2001].
- Agabus striolatus* (GYLL., 1808): **St+** [JUNG 2001]. **Th+**(-) [NAUMANN 1989].
- Agabus wasastjernae* (SAHLB., 1824): **Ba+**: Radolfzell, KLESS, 21.V.1996 und 4.VI.1996 in einem Hochmoor in einem Wurzeltrichter einer umgestürzten Kiefer [KLESS i.l. 2001, DETTNER 1976, FRANK & KONZELMANN 2002].
- Agabus affinis* (PAYK., 1798): **Th+**(-) [BELLSTEDT & FICHTNER 1985, FICHTNER 1983a, HERTZEL 1969, SKALE & WEIGEL 1997].
- Agabus unguicularis* THOMS., 1867: **Ba+** [BRAUN & KUNZ 1991].
- Agabus clypealis* THOMS., 1867: **MV+** [WOLF 1999].
- Ilybius quadriguttatus* (LACORD., 1835): **Th+**(-) [HARTMANN 1989a].
- Ilybius similis* THOMS., 1854: **MV+**(-) [FRASE 2009].
- Ilybius aenescens* THOMS., 1870: **Th+** [SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Rhantus notaticollis* (AUBE, 1836): **SH**(?) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Rhantus exsoletus* (FORST., 1771): **Sd+** [LILLIG 2006].
- Rhantus latitans* SHP., 1882: **St+**(-) [DIETZE 2005, JUNG 2007].
- Colymbetes striatus* (L., 1758): **St+** [JUNG 2001].
- Hydaticus transversalis* (PONT., 1763): **Hs+**(-): Mörfelden, Mönchsbruch, BÖHME 22.IX.56 und 27.IV.57, je 1 Ex. (t. KÖHLER) - im hessischen Ried überall häufig, SONDERMANN, 1996-2000 [coll. BÖHME, coll. SONDERMANN].
- Hydaticus aruspex* CLARK, 1865: **MV+** [WOLF 1999].
- Graphoderus bilineatus* (DEGEER, 1774): **WE+**(-) [HAESLOOP 2001].
- Acilius canaliculatus* (NICOL., 1822): **Th+**(-) [NAUMANN 1993].
- Dytiscus latissimus* L., 1758: **Hs+**(-) [HOFMANN 1997]. **WE+** [ALFES & BILKE 1977].
- Dytiscus lapponicus* GYLL., 1808: **By** [HECKES et al. 2006]. **No+**(-) [REISSMANN 2006a].
- Cybister lateralmarginalis* (DEGEER, 1774): **Hn+**(-) [SPRICK et al. 2007]. **SH**(-) [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE+**(-) [HAESLOOP 2001].
- ### Familie GYRINIDAE
- Gyrinus colymbus* ER., 1837: **By**(-) [HECKES et al. 2006].
- Gyrinus distinctus* AUBÉ, 1836: **No+**(-) [JUNKER 2001].
- Gyrinus natator* (L., 1758): **Br+**(-) [BRAASCH et al. 2000]. **WE+**(-) [BELLMANN i.l. 2000]. **Wf** [SCHMIDT 1913, RENNER 2008b].
- Gyrinus suffriani* SCRIBA, 1855: **MV+**(-) [SCHIEFERDECKER 1967]. **St+** [DIETZE 2005].
- Gyrinus caspius* MENETR., 1832: **Ba?** [KONZELMANN i.l. 2006: fraglich].
- Gyrinus paykulli* OCHS, 1927: **WE+**(-) [NIEDRINGHAUS & ZANDER 1998].
- ### Familie MICROSPORIDAE
- Microsporid acaroides* WALT., 1838: **Br+** [RENNER 2008b, BEIER & KÖRGE 2001]. **Hs+** [BRENNER 2006].
- ### Familie HYDRAENIDAE
- Hydraena assimilis* REY, 1885: **Hs+**: Hochweisel bei Butzbach, SONDERMANN & ERDNUSS, 11.V.2002, in einem Wald-Quellsumpf [coll. SONDERMANN].
- Hydraena reyi* KUW., 1888: **Hs+**: Viernünden, SONDERMANN, 20.V.2000, in einem schwach fließendem Wiesenbach [CUPPEN 2000, coll. SONDERMANN].
- Hydraena nigrita* GERM., 1824: **MV+**(-) [ZIEGLER 2006a].
- Hydraena subimpressa* REY, 1884: **Ba**(+): nicht bei HORION (1951) erwähnt, neue Meldungen zurückgezogen [KONZELMANN i.l. 2001]. **By**(+) [HECKES et al. 2006]. **Wt**(+): nicht bei HORION (1951) erwähnt, keine sicheren Belege [KONZELMANN i.l. 2001].
- Hydraena angulosa* MULS., 1844: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Hs+** [CUPPEN 2000]. **Wf** [REHAGE & TERLUTTER 2006, coll. SONDERMANN].
- Hydraena rufipes* CURT., 1830: **No+** [coll. KÖHLER].
- Hydraena testacea* CURT., 1830: **Br+** [LESZINSKI & DIECKMANN 2005]. **MV+**: Rögelliner Holz, ZIEGLER, 1.VII.2009 im Autokeiser [ZIEGLER i.l. 2011]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+**(-) [LORENZ 2001b]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Hydraena gracilis* GERM., 1824: **MV+**(-) [WOLF 1999]. **Pf+** [SONDERMANN & ERDNUSS 2002].
- Hydraena excisa* KIESW., 1849: **Pf+** [SONDERMANN & ERDNUSS 2002].
- Hydraena belgica* D'ORCH., 1930: **No**(+): bei der Revision von Sammlungsmaterial wurde nur *Hydraena gracilis* gefunden [GEREND i.l. 2000]. **Rh**(+): bei der Revision von Sammlungsmaterial wurde nur ein Männchen aus Daun/Eifel (vgl. KOCH 1968) gefunden [GEREND i.l. 2000].
- Hydraena truncata* REY, 1885: **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Hydraena dentipes* GERM., 1844: **Wf**(-) [REHAGE & TERLUTTER 2006].
- Hydraena minutissima* STEPH., 1829: **Hs+**(-) [BRENNER 2005, CUPPEN 2000].
- Ochthebius gibbosus* GERM., 1824: **No+**(-) [KÖHLER 1996h]. **Sn+**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Ochthebius auriculatus* REY, 1885: **Th+**(-) [SKALE & BELLSTEDT 2001].
- Ochthebius bicolon* GERM., 1824: **Br+**(-) [EICHLER & PÖTZ 2000]. **Sn+**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Ochthebius foveolatus* GERM., 1824: **No**(-) [KÖHLER 2006a]. **Rh**(-) [KÖHLER 2006a].
- Ochthebius pedicularis* KUW., 1887: **By**- [HECKES et al. 2006].
- Ochthebius nobilis* VILLA, 1835: **By+**(-) [HOFMANN & KÖHLER 2010, HERING 1995, HECKES i.l. 2002].

Ochthebius pusillus STEPH., 1835: **Pf+(-)** [ARK Bienenwald]. **St+** [BÄSE i.l. 2011].
Ochthebius marinus (PAYK., 1798): **Wf?** [SCHMIDT 1913, RENNER 2008b].
Limnebius papposus MULS., 1844: **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a].
Limnebius parvulus (HBST., 1797): **Ba-(+)**: die Art muß zurückgestuft werden, da die neueren Meldungen falsch oder fraglich sind [HORION 1951, KONZELMANN i.l. 2001]. **By(-)** [HECKES et al. 2006]. **Pf+** [ARK Bienenwald].
Limnebius crinitus REY, 1885: **Rh+** [BÜCHER et al. 1996].
Limnebius trifidus (MARSH., 1802): **St+(-)** [SCHOLZ 2007]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Limnebius aluta BEDEL, 1881: **Wf+(-)** [REHAGE & TERLUTTER 2003].
Limnebius atomus (DUFT., 1805): **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Familie HYDROCHIDAE

Hydrochus ignicollis MOTSCH., 1860: **By+** [BUSSLER 1995, HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [ZIEGLER 2006a].
Hydrochus megaphallus BERGE, 1988: **MV+** [WEIGEL & WOLF 2001]. **No+** [KÖHLER J 2010].
Hydrochus nitidicollis MULS., 1844: **By+** [HECKES et al. 2006, HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Pf+(-)** [SONDERMANN & ERDNUSS 2002].

Familie GEORISSIDAE

Georissus crenulatus (ROSSI, 1794): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005].
Georissus laevis GERM., 1831: **Pf+** [ARK Bienenwald].

Familie HYDROPHILIDAE

Helophorus rufipes (BOSC., 1791): **Ba?** [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich]. **St+** [JUNG 2007b].
Helophorus tuberculatus GYLL., 1808: **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999].
Helophorus aequalis THOMS., 1868: **MV+** [WOLF 1999]. **Sn+** [WEIGEL 2005]. **St+** [BÄSE 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Helophorus arvernensis MULS., 1846: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002].
Helophorus montenegrinus KUW., 1885: **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Helophorus nanus STURM, 1836: **Pf+(-)** [ARK Bienenwald]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+(-)** [DREES 2002b].
Helophorus pumilio ER., 1837: **Hn+** [SPRICK et al. 2007].
Helophorus redtenbacheri KUW., 1885: **Rh+** [KÖHLER 2006a]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Helophorus strigifrons THOMS., 1868: **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
Helophorus asperatus REY, 1885: **Sn+(-)** [SIEBER et al. 2011]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Helophorus dorsalis (MARSH., 1802): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **WE/ (+)** [GRÄF 1987, NIEDRINGHAUS 2008].
Helophorus paramimitus ANGUS, 1986: **MV+** [WOLF 1999]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Helophorus griseus HBST., 1793: **Sn+** [LORENZ 2005].
Helophorus longitarsis WOLL., 1864: **Rh/ (+)** [KÖHLER 2006a].
Dactylosternum abdominale (F., 1792): **No+** [JUNKER & KÖHLER 2005, WENZEL 2003, KÖHLER NWZ9]. **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2007b]. **Wf+** [RENNER 2011].
Sphaeridium marginatum F., 1787: **Ba+**: Weinheim/Bergstraße, SCHRADER, 11.V.69, 1 Ex. (BÖHME det.). Wutachgebiet, KLESS IX.1956, X.1956 und V.1957 - Radolfzell, KLESS, VI.1998 [coll. BÖHME, KLESS i.l. 2001]. **MV+** [ESSER 2001a]. **St+** [JUNG 2001]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Cercyon littoralis (GYLL., 1808): **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Cercyon obsoletus (GYLL., 1808): **Br+?** [EICHLER et al. 1999, ESSER 2002a]. **MV+** [ZIEGLER 2004, ZIEGLER 2006a]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001b, HORNIG 2000a, PESCHIEL i.l. 2007]. Alle Meldungen für *C. obsoletus* sollten auf die folgende Art geprüft werden.
Cercyon castaneipennis VORST., 2009: **Br+** [coll. ESSER]. **By+**: Steinbach am Wald, KREMER, 6.VIII.1985, 2 Ex. (KATTSCHAK det.) [coll. KATTSCHAK]. **MV+** [coll. ESSER]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **No+** [KÖHLER in Vorber.]. **Rh+** [KÖHLER in Vorber.]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+** [RENNER 2011].
Cercyon alpinus VOGT, 1969: **Sn+** [GOLLOWSKI 2008a].
Cercyon melanocephalus (L., 1758): **Br+** [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 2002].
Cercyon terminatus (MARSH., 1802): **Br+** [EICHLER et al. 1999].
Cercyon pygmaeus (ILL., 1801): **Br+** [DREGER et al. 2009, EICHLER et al. 1999].

Cercyon granarius ER., 1837: **Br+** [BARNDT 2008]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
Cercyon renneri HEBAUER, 1997: **Sn+** [HEBAUER det., RENNER i.l. 2005].
Cercyon hungaricus E.-Y., 1967: **St+** [BÄSE 2010c].
Cercyon sternalis SHP., 1918: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Paracymus aeneus (GERM., 1824): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **WE+** [HANNIG 2005b]. **Wf?**: einzige Wf-Meldung von SCHMIDT 1913, aber ohne Beleg [RENNER 2008b].
Laccobius atrocephalus RTT., 1872: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Laccobius bipunctatus (F., 1775): **Br+** [EICHLER et al. 1999].
Laccobius albus KUW., 1890: **By/ (-)** [HECKES et al. 2006]. **WE?** [HORION 1949, BELLMANN i.l. 2000].
Helochares lividus (FORST., 1771): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Helochares obscurus (MÜLL., 1776): **No+** [KÖHLER J 2010].
Helochares punctatus SHP., 1869: **By+** [HECKES et al. 2006]. **MV+** [GÜRLICH 2005a].
Enochrus fuscipennis THOMS., 1884: **By+** [HECKES et al. 2006]. **MV+** [ESSER 2002b]. **No+** [HADULLA in Vorber., KÖHLER 2009]. **Sn+** [KLAUSNITZER 1996, KLAUSNITZER et al. 2009, PESCHIEL i.l. 2007]. **St+** [DIETZE 2004]. **WE+** [NIEDRINGHAUS & ZANDER 1998]. **Wf+** [SCHMIDT 1913, RENNER 2008b].
Enochrus halophilus (BEDEL, 1878): **MV+** [WOLF 1998].
Enochrus bicolor (F., 1792): **Wf-** [SCHMIDT 1913, RENNER 2008b]. **Wf+** [KONZELMANN 2010].
Enochrus nigrinus (SHP., 1872): **Pf+** [SONDERMANN & ERDNUSS 2002].
Chaetarthria similis WOLL., 1864: **Ba+**: Grissheim, Rheinaue, RENNER, VI.2000, mehrfach im Autokescher [RENNER 2000a, FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2006b]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **No+** [coll. KÖHLER]. **Wf+** [RENNER 1999c, RENNER 2003a].
Chaetarthria similis VORST & CUPPEN, 2003: **Br-** [VORST & CUPPEN 2003]. **By+** [VORST & CUPPEN 2003, HECKES et al. 2006]. **Hn+** [VORST & CUPPEN 2003]. **No+** [VORST & CUPPEN 2003]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Th+** [VORST & CUPPEN 2003]. **WE+** [VORST & CUPPEN 2003].
Hydrophilus piceus (L., 1758): **Ne+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
Berosus signaticollis (CHARP., 1825): **Wf+** [SCHÖDL 1993].
Berosus geminus REICH.SAULCY, 1856: **St+** [BELLSTEDT & SKALE 1998, HESS et al. 1999].
Berosus spinosus (STEV., 1808): **Br+** [EICHLER et al. 1999, BRASCH et al. 2000]. **St+(-)** [SCHÖPE 1999]. **WE/** [BELLMANN i.l. 2011].
Berosus frontifoveatus KUWERT, 1888: **Hs+** [BRENNER 2003]. **MV+** [STÖCKEL et al. 1993]. **St+** [DIETZE 2004]. **Th+** [SKALE & BELLSTEDT 2001].

Familie HISTERIDAE

Teretrius fabricii MAZUR, 1972: **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010].
Plegaderus saucius ER., 1834: **MV+?** [RINGEL & HAMPEL 2003]. **SH+** [ZIEGLER 2004].
Plegaderus caesus (HBST., 1792): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH 2000, GÜRLICH User].
Plegaderus dissectus ER., 1839: **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [APPEL 2003, RENNER i.l. 2007].
Plegaderus discisus ER., 1839: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Hs+** [SCHAFFRATH 2001].
Chetabraeus globulus (CREUTZ., 1799): **No+** [JUNKER 2001]. **St-** [PESCHIEL 2004].
Abraeus granulum ER., 1839: **Sn+(-)** [LORENZ 2001b, GOLLOWSKI 2008b]. **St+** [JUNG 2001].
Abraeus parvulus AUBÉ, 1842: **Sn+(-)** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St+(-)** [JUNG 2007b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2006].
Aceritis minutus (HBST., 1792): **Rh+** [KÖHLER Eisc]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009]. **St+(-)** [JUNG 2010].
Aceritis komai LEWIS, 1879: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Rh+** [RENNER 1999a, WENZEL & HANNIG 2002]. **Th-** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Aeletes atomarius (AUBE, 1842): **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **St+** [JUNG 2007, ZIEGLER 2006b]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2006]. **Wf+** [RENNER 1999c]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Myrmecops paykullii KANAAR, 1979: **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
Gnathocnus rotundatus (KUG., 1792): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn].
Gnathocnus namnetensis (MARSH., 1862): **Sn+?** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Gnathoncus communis (MARS., 1862): **Sn**?(?) [GOLLKOWSKI 2008b, KLAUSNITZER et al. 2009].

Gnathoncus byssoni AUZAT, 1917: **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005, LORENZ 2001b, GOLLKOWSKI 2008b].

Gnathoncus nidorum STOCKM., 1957: **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn**+ [LORENZ 2001b].

Saprinus semipunctatus (F., 1792): **St**?(?) un belegt, Massenverwechslung [PESCHEL 2004, PESCHEL i.l. 2007].

Saprinus planusculus MÖTSCH., 1849: **Hs**+: Erlensee, HÖHNER, 1987 und 1994 - Groß-Gerau Mönchbruch, HÖHNER, 1978 [coll. HÖHNER].

Saprinus semistriatus (SCRIBA, 1790): **Hs**+: Beiseförth, Darmstadt-Kranichstein, Dieburg, Wallenstein, Messel, BÖHME, zwischen 1955 und 1989, mehrfach [coll. BÖHME, FLECHTNER 2004b].

Saprinus subnitescens BICKH., 1909: **Pf**+(?) [ARK Bienwald]. **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005, WEIGEL 2005]. **St**+ [PESCHEL 2004].

Saprinus tenuistrius MARS., 1855: **Br**+ [ESSER 2005a]. **St**+ [BÄSE 2007, PESCHEL 2004].

Saprinus laetus ER., 1839: **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999]. **SH**+ [ZIEGLER 2004]. **Sn**+ [LORENZ 2001b].

Saprinus politus (BRAHM, 1790): **St**- [PESCHEL 2004].

Saprinus immundus (GYLL., 1827): **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].

Chalcionellus decemstriatus (ROSSI, 1792): **Br**+(?) [EICHLER et al. 2002]. **St**- [PESCHEL 2004].

Hypocaccus metallicus (Hbst., 1792): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999]. **St**+(?): Stendal, SPRICK, 25.IV.1994, 6 Ex. (ERBELING det.) südlich der Stadt an einer Bahnstrecke an offenen Sandstellen [SPRICK i.l. 2000].

Hypocaccus rugiceps (DUFT., 1805): **Sn**- [KLAUSNITZER et al. 2009].

Onthophilus striatus (FORST., 1771): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999]. **St**+ [SCHÜLKE 2001a, KNOBBE 2008, PESCHEL 2004].

Onthophilus punctatus (MÜLLER, 1776): **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005].

Epiurus comptus ER., 1834: **Ba**+: Rastatt, Plittersdorfer Aue, NEUMANN, 22.V.2011, 1 Ex. unter Pappelerinde [coll. NEUMANN].

Platysoma deplanatum (GYLL., 1808): **St**? [PESCHEL 2004].

Platysoma elongatum (THUNB., 1787): **Hn**+(?) [SPRICK et al. 2007]. **Wt**+ [REIBNITZ 2009].

Platysoma lineare (ER., 1834): **Hs**+: Hanau Umgebung, DEHNERT, 1955 - Viernheimer Heide, KÜRSCHNER, 2009 [coll. HÖHNER, coll. KÜRSCHNER]. **SH**+ [ZIEGLER 2004]. **Sn**+(?) Mühlrose, BÖHME, 12.VI.97, 1 Ex. [coll. BÖHME].

Platysoma angustatum (THUNB., 1794): **St**+(?) [BÄSE 2007]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].

Margarinotus bipustulatus (SCHRK., 1781): **Sn**+(?) [coll. Mus. Chemnitz, PESCHEL i.l. 2005, KLAUSNITZER et al. 2009].

Margarinotus neglectus (GERM., 1813): **Br**+(?) [EICHLER et al. 2003]. **Sn**+(?) [coll. PESCHEL, LORENZ 2001a]. **Th**+(?) [coll. PESCHEL].

Margarinotus ventralis (MARS., 1854): **Th**+(?) [coll. PESCHEL].

Margarinotus punctiventer (MARS., 1854): **MV**+: Gotthmann bei Boizenburg, ZIEGLER, 20.I.2011 [ZIEGLER i.l. 2011]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **Rh**+(?) [WENZEL & HANNIG 2002, STAUBUS & WAGNER 2007]. **St**+ [SPRICK 2002].

Margarinotus ignobilis (MARS., 1854): **St**? [PESCHEL 2004].

Margarinotus terricola (GERM., 1824): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999]. **MV**+(?) [BÜCHE & ESSER 1999].

Margarinotus merdarius (HOFFM., 1803): **Hs**+(?): Darmstadt, HANSEN, 29.V.50, 1 Ex. (BÖHME det.) [BRENNER i.Vdr., coll. BÖHME, SCHAFFRATH 1999, FLECHTNER 2004b, FL. & KÖHLER 2007].

Margarinotus marginatus (ER., 1834): **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005]. **St**- [PESCHEL 2004].

Margarinotus ruficornis (GRIMM, 1852): **Br**+(?) [BEIER & KÖRGE 2001]. **St**+(?) [JUNG 2007].

Hister quadrimaculatus SCRIBA, 1790: **Br**+(?) [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **Hs**+: Darmstadt, Rotbühl, BÖHME, 11.VI.83, 1 Ex. Traisa-Trautheim, HANSEN, 1.V.52, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME]. **Sn**+(?) [DIETZE & WOLSCHE 2005].

Hister helluo TRUQUI, 1852: **WE**+ [www.insektenfotos.de].

Hister funestus ER., 1834: **Br**+ [BARNDT 2004].

Atholus bimaculatus (L., 1758): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999]. **Sn**+ [LORENZ 2001b].

Atholus duodecimstriatus (SCHRK., 1781): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999].

Atholus praetermissus (PEYRON, 1856): **Br**+(?) [BARNDT et al. 2002].

Atholus corvinus (GERM., 1817): **Br**+(?) [BARNDT 2007].

Hetaerius ferrugineus (OL., 1789): **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **WE**+(?) [BELLMANN et al. 2003].

Familie SILPHIDAE

Thanatophilus dispar (Hbst., 1793): **St**+(?) [JUNG 2007b]. **Wt**?(+): die Art ist nach alter unbelegter Meldung fraglich, Beleg in der coll. ULBRICH ist fehlbestimmt [HORION 1949: fragl., KONZELMANN i.l.2001].

Blitophaga undata (MÜLL., 1776): **MV**+(?) Stuer, BÖHME, 26.VI.54, 1 Ex. [coll. BÖHME]. **St**+(?) [BÄSE 2007].

Familie AGYRTIDAE

Pteroloma forstrossii (GYLL., 1810): **By**+ [SCHMIDL et al. 2005]. **St**+(?) [JUNG 2001].

Familie LEPTINIDAE

Leptinus testaceus MÜLL., 1817: **Br**+ [ESSER & SCHNEIDER 2002].

Platysyllus castoris RITS., 1869: **Ba**+: Radolfzeller Aach-Ried, 23.VIII.2000, 4 Imagines und 3 Larven (coll. PANKOW, BAUM, Ch. NEUMANN) an totem Biber, abgelesen im Tierhygienischen Institut Freiburg [PANKOW i.l. 2001, FRANK & KONZELMANN 2002]. **St**+(?) [NEUMANN et al. 2000].

Familie CHOLEVIDAE

Ptomaphagus subvillosus (GOEZE, 1777): **Br**+(?) [ESSER 2005a, BARNDT 2008].

Anemadus strigosus (Kr., 1852): **Br**+ [ESSER 2005a, BARNDT 2008]. **MV**+(+): bei der neueren Meldung handelt es sich um *Nemadus colonoides* (WEIGEL i.l.) [HOFMANN 2001]. **Th**?(+): bei der neueren Meldung handelt es sich um *Nemadus colonoides*, alte Funde sind nicht belegt und daher fraglich (WEIGEL i.l.) [HOFMANN 2001].

Nargus badius (STURM, 1839): **Ba**/ [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich].

Nargus brunneus (STURM, 1839): **No**+: Rosbach, Rosbachtal, KATSCHAK, 17.IV.1999, 3 Ex. an einem Waldrand aus Laub gesiebt [KATSCHAK mdl. 1999]. **Wf**+ [BORCHERING 1994].

Nargus anisotomoides (SPENCE, 1815): **Br**+(?) [ESSER 2010].

Choleva paskoviensis Rtt., 1913: **By**+(?) [WEICHSELBAUMER 2003a].

Choleva nivalis (Kr., 1856): **St**+(?) [JUNG 2001]. **Wt**+ [SZALLIES & AUSMEIER 2001b].

Choleva reitteri PETRI, 1915: **Hn**+(?) [SCHMIDT et al. 2005].

Choleva cisteloides (Frölich, 1799): **Sd**+ [EISINGER 2006a].

Choleva sturmi BRIS., 1863: **Ba**/ [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich]. **St**+(?) [JUNG 2007].

Drepscopia umbrina (ER., 1837): **Hn**+(?) [SPRICK et al. 2001]. **MV**+(?) [MÖLLER 2003]. **Pf**+(?) [ARK Bienwald]. **Sn**+(?) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].

Catops nitidicollis Kr., 1856: **Rh**+(?) [WENZEL & HANNIG 2002].

Catops grandicollis ER., 1837: **MV**+ [KÖHLER Rüte].

Catops kirbyi (SPENCE, 1815): **Br**+(?) [EICHLER et al. 1999].

Catops nigricantoides Rtt., 1901: **By**+(?) [GOSSNER et al. 2008, GOSSNER 2004]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].

Familie COLONIDAE

Colon rufescens Kr., 1850: **Ba**+ [RENNER 2005b, SZALLIES 2001]. **No**+ [JUNKER & KÖHLER 2010]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **St**+(?) [JUNG 2010].

Colon affine STURM, 1839: **Ba**+(?) [RENNER 2005b]. **St**+(?) [JUNG 2001]. **Wf**+ [BORCHERING 1994].

Colon angulare ER., 1837: **MV**+(?) [ZIEGLER 2006a].

Colon dentipes (SAHLB., 1822): **Hn**+: Platendorf, BÖHME, 5.VI.80, 1 Ex. (HÖHNER det.) [coll. BÖHME, SCHMIDT et al. 2000]. **Sn**+(?) [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].

Colon barnevillei Kr., 1858: **Wt**+ [BRITZ et al. 2001].

Colon calcaratum ER., 1837: **St**+(?) [JUNG 2001].

Colon serripes (SAHLB., 1822): **Hs**+: Messel, HANSEN, 28.VIII.62, 1 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, BRENNER 2005]. **Sn**+ [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].

Colon viennense Hbst., 1797: **MV**+(?) [KÖHLER 2003a].

Familie LEIODIDAE

Triarthron maerkelii MÄRK., 1840: **Hs**+(?): Messel, HANSEN, 15. IX.63, 2 Ex. - Traisa-Trautheim, HANSEN, 1966, 8 Ex. [coll. BÖHME]. **Sn**+(?) [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St**+(?) [JUNG 2007b].

Hydnobius spinipes (GYLL., 1813): **St**+ [JUNG 2001].

Hydnobius punctatus (STURM, 1807): **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+(?) [LORENZ 2005]. **WE**+ [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].

Hydnobius multistriatus (GYLL., 1813): **Hs**+: Mühlthal Traisa-Trautheim, Autokescher, HANSEN, 1963 [coll. HÖHNER]. **Sn**+(?)

- [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Wf+** [BORCHERDING 1994]. **Wt+** [GUTKNECHT 2009].
- Trichohydrobius suturalis* (ZETT., 1828): **Th/(-)**: nicht bei HORION 1949 [TERLUTTER et al. 2009]. **Wf+** [TERLUTTER et al. 2009].
- Leiodes ciliaris* (SCHM., 1841): **Wf+**: BURGARTH det. [TERLUTTER et al. 2009].
- Leiodes furva* (ER., 1845): **SH+** [GÜRLICH 2006c].
- Leiodes pallens* (STURM, 1807): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **Hs+** [BRENNER 2005]. **St+** [SCHOLZE 2007]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Leiodes rubiginosa* (SCHM., 1841): **Wf+(-)** [TERLUTTER et al. 2009].
- Leiodes triepkei* (SCHM., 1841): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Wt(+)**: die Art ist zu streichen, da in der coll. ULBRICH kein Beleg auffindbar ist, schon HORION (1949) bezeichnet eine alte Meldung als sehr fraglich [HORION 1949: fragl., KONZELMANN i.l.2001].
- Leiodes rufipes* (GEBLER, 1833): **Th/**: der Beleg zu KOPETZ et al. (2008) hatte ein verwechseltes Bestimmungsetikett [BURGARTH 2010].
- Leiodes rugosa* STEPH., 1829: **MV+(-)** [RINGEL & MÜLLER-MOTZFELD 2002].
- Leiodes hybrida* (ER., 1845): **St+** [JUNG 2007].
- Leiodes cinnamomea* (PANZ., 1793): **St+(-)** [JUNG 2001].
- Leiodes oblonga* (ER., 1845): **No+(-)** [WENZEL 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Leiodes silesiaca* (K.R., 1852): **Sn+(-)** [SIEBER et al. 2011].
- Leiodes lucens* (FAIRM., 1855): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Leiodes austriaca* DAFNER, 1983: **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
- Leiodes longipes* (SCHM., 1841): **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Leiodes flavimiri* FLEISCH., 1906: **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
- Leiodes vladesiens* (SCHM., 1841): **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Leiodes macropus* (RYE, 1873): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Wt+** [GUTKNECHT i.l. 2007].
- Leiodes polita* (MARSH., 1802): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, RINGEL & MÜLLER-MOTZFELD 2002, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte].
- Leiodes lunicollis* RYE, 1872: **Br+?** [EICHLER et al. 1999]. **Th+?** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wf+** [BORCHERDING 1994].
- Leiodes picea* (PANZ., 1797): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Leiodes dubia* (KUG., 1794): **Ne(+)** [MEYBOHM 2001].
- Leiodes obesa* (SCHM., 1841): **Hs+(-)** [BRENNER 2005]. **Wf+(-)** [KÖHLER Sieg].
- Leiodes rufipennis* (PAYK., 1798): **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Leiodes bicolor* (SCHM., 1841): **Br+** [EICHLER et al. 1999, BARNDT 2005]. **MV+** [ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **No+** [coll. KÖHLER]. **St+** [BASE i.l. 2011]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+** [coll. BELLMANN]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Leiodes ruficollis* SAHLB., 1898: **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Leiodes litura* STEPH., 1832: **Ba+(-)** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Leiodes ferruginea* (F., 1787): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **MV+(-)** [RINGEL i.l. 2011]. **Sn+** [HORNIG i.l. 2002, SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Leiodes gallica* RTT., 1884: **Wf+** [RENNER 2008a].
- Leiodes nigrita* (SCHM., 1841): **Ne+** [MEYBOHM 1999b]. **WE-** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Leiodes badia* (STURM, 1807): **Br+(-)** [BARNDT 2007]. **Hs+(-)**: Gernsheim, HANSEN, 2.II.55, 1 Ex. (KÖHLER det.) [coll. BÖHME, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald].
- Leiodes gyllenhalii* STEPH., 1829: **MV+(-)** [KÖHLER 2003a]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+(-)** [JUNG 2007]. **Wf+** [KÖHLER Sieg]. **Wt?/+)**: das Vorkommen muss wegen taxonomischer Änderungen als fraglich gelten, neue Belege (KONZELMANN leg.) wurden im Rahmen eines Werkvertrages abgegeben und sind nicht mehr prüfbar [KONZELMANN i.l. 2001].
- Leiodes strigipenne* DAFNER, 1983: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2008]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001].
- Leiodes flavicornis* (BRIS., 1883): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Pf+?** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
- Agaricophagus cephalotes* SCHM., 1841: **Hs+(-)** [SCHAFFRATH 1999, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a].
- Cyrtusa subtestacea* (GYLL., 1813): **Br+(-)** [ESSER 2008a]. **Ne+**: Dünsche/Dannenberg 26.6.83, Forst Lucie/Dannenberg 11.6.00, beide MEYBOHM, Forst Landwehr/Dannenberg 18.6.00 TOLASCH, je 1 Ex im AK [TOLASCH i.l.2001]. **St+(-)** [JUNG i.l. XII.2006].
- Liocyrtusa minuta* (AHR., 1812): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Liocyrtusa vittata* (CURT., 1840): **Hs+(-)**: Messel, HANSEN, 28. VIII.62, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. BÖHME]. **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Anisotoma glabra* (KUG., 1794): **St+(-)** [JUNG 2007]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Liopropia serricornis* (GYLL., 1813): **Br+(-)** [SCHÖLKE 2008c, ESSER 2011]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **Ne+** [BURGARTH 2003]. **SH+** [BURGARTH 2003]. **St+** [JUNG i.l. XII.2006]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
- Amphicyllis globiformis* (SAHLB., 1833): **MV+(-)** [MÖLLER 2003].
- Cyrtoplastus seriepunctatus* (BRIS., 1867): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
- Agathidium haemorrhoum* ER., 1845: **WE?** [SCHILSKY 1909, BELLMANN i.l. 2000].
- Agathidium convexum* SHP., 1866: **Br+(-)** [EICHLER et al. 2002, BARNDT et al. 2002, DREGER et al. 2002, BARNDT 2008]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Agathidium mandibulare* STURM, 1807: **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Agathidium nudum* HAMPE, 1870: **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Agathidium nigrinum* STURM, 1807: **Pf+(-)** [KÖHLER 2004a].
- Agathidium bohemicum* RTT., 1884: **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
- Agathidium pisanum* BRISOUT, 1872: **Sn+** [GOLKOWSKI 2008b].
- ### Familie SCYDMAENIDAE
- Euthiconus conicicollis* (FAIRM., 1855): **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Euthia plicata* (GYLL., 1813): **MV+(-)** [RINGEL & HAMPEL 2003]. **Pf+(-)** [KÖHLER 2000d]. **Rh+(-)** [KOCH 1968]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001].
- Euthia schauini* KIESW., 1858: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Euthia linearis* MULS., 1861: **Ba+(-)** [SCHUNGER 2001]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Wf+(-)** [BORCHERDING 1994, RENNER 2003a].
- Euthia scydmaenoides* STEPH., 1830: **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [SKALE & WEIGEL 2001].
- Cephennium thoracicum* MÜLL.KUNZE, 1822: **Sn+(-)** [PESCHEL i.l. 2007].
- Cephennium majus* RTT., 1881: **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004].
- Cephennium gallicum* GANGLB., 1899: **Br+** [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Cephennium carnicum* RTT., 1881: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Neuraphes carinatus* (MULS., 1861): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
- Neuraphes imitator* BLATTNY, 1919: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Neuraphes rubicundus* (SCHAUUM, 1841): **Th+(-)** [RENNER i.l. 2007].
- Neuraphes ruthenus* MACH., 1925: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2005b]. **Hs+** [KÖHLER Gold, KÖHLER Loch]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, KLEEBERG & BUSCH 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+** [JUNG 2001]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+**: Enigen, LANGE, 18.III.1993, 1 Ex. [BRITZ et al. 2001, LANGE i.l. 2003]. **Sn+** [LORENZ 2006].
- Neuraphes talparum* LOKAY, 1920: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [RENNER 2002].
- Neuraphes plicicollis* RTT., 1879: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER et al. in Vorber.]. **MV+** [KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004]. **Wt+** [MALZACHER 2005, BENSE 2006a].
- Neuraphes coronatus* SAHLB., 1881: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+(-)** [JUNG 2001]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+**: Bad Urach, LANGE, 15.III.2003, 1 Männchen [LANGE i.l. 2003].
- Neuraphes praeteritus* RYE, 1872: **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001, KONZELMANN 2006a, KONZELMANN 2010].
- Scydmorephes sparschalli* (DENNY, 1825): **Wf+(-)** [BORCHERDING 1994, KÖHLER Länd].
- Scydmorephes helvolus* (SCHAUUM, 1844): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+** [BÜCHE & ESSER

- 1999, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Scydnorhaphes minutus* (CHAUD., 1845): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
- Stenichnus pusillus* (MÜLL.KUNZE, 1822): **St+(-)** [JUNG 2007].
- Stenichnus godarti* (LATR., 1806): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007]. **St+(-)**: NSG Rogätzer Hang bei Rogätz, BAYER 2.X.1998, 1 Ex gesiebt, coll BÜCHE [BÜCHE i.l., JUNG 2007, BÄSE 2007].
- Stenichnus foveola* REY, 1888: **Ba+**: Hardtwald bei Karlsruhe, BÜCHE, 14.V.1983, 1 Ex. (MEYBOHM det.) in einem Gesiebe aus einer Wurzelhöhle einer alten Eiche, zusammen mit *Lasius brunneus* und der myrmecophilen Staphylinide *Homoeusa acuminata* [BÜCHE i.l., FRANK & KONZELMANN 2002]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Stenichnus bicolor* (DENNY, 1825): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+** [JUNG 2010]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001, SZALLIES 2001].
- Stenichnus poweri* (FOWLER, 1884): **Hs(+)**: bei dem ex coll. HÖHNER gemeldeten Beleg handelt es sich um ein Weibchen von *Stenichnus scutellaris* [HÖHNER i.l. 2006]. **Ne+** [GÜRLICH 2006a]. **SH+** [GÜRLICH 2006a].
- Microsydymus nanus* (SCHAUM, 1844): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Microsydymus minimus* (CHAUD., 1845): **St+** [JUNG 2007]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
- Euconus pubicollis* (MÜLL.KUNZE, 1822): **Br+** [EICHLER et al. 2002, BARNDT et al. 2002]. **St+(-)** [JUNG 2001].
- Euconus claviger* (MÜLL.KUNZE, 1822): **MV+(-)** [GÜRLICH User, KLEEGER & BUSCH 2010]. **Pf+(-)** [KÖHLER Bien]. **Sn+(-)** [WEIGEL 2005, GOLLKOWSKI 2010]. **St+(-)** [JUNG 2007]. **Wt+(-)**: die Art muß zurückgestuft werden, da der der Meldung zugrunde liegende Beleg aus der coll. SZALLIES fehlbestimmt ist [HORION 1951, KONZELMANN i.l. 2001].
- Euconus pragensis* (MACH., 1923): **Sn+**: Moritzburg, JANTKE, 15.X.95, 2 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, WEIGEL 2005]. **St+(-)** [JUNG 2010]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Euconus unicus* FRANZ, 1957: **Hs+** [BRENNER 2005]. **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **SH+()** [ZIEGLER 2004]. **WE+** [ESSER 1999]. **Wf+** [RENNER 2008b]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Euconus maeklinii* (MANNH., 1844): **MV+(-)** [KÖHLER Bohn]. **Sn+**: Großenhain, Zabelitz, JANTKE, 15.XII.95, 5 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, WEIGEL 2005]. **St+(-)** [JUNG 2007, ZIEGLER 2006b]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Euconus wetterhallii* (GYLL., 1813): **Br+(-)** [BARNDT 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald].
- Euconus rutilipennis* (MÜLL.KUNZE, 1822): **Br+(-)** [BÄSE 2007, RENNER 2008b, EICHLER et al. 1999].
- Euconus hirticollis* (ILL., 1798): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002, BARNDT 2007].
- Euconus finetarius* (CHAUD., 1845): **Br+(-)** [EICHLER et al. 2002, BARNDT 2007]. **Hs+(-)** [BRENNER 2007]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
- Scydmaenus tarsatus* MÜLL.KUNZE, 1822: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999].
- Scydmaenus rufus* MÜLL.KUNZE, 1822: **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003a, HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, MÖLLER 2003, KÖHLER Rüte]. **Not(?)** [coll. KÖHLER]. **Sn+(-)**: Zeughaus, JANTKE, 28.VII.94, 1 Ex. Meifen, Göhrich, JANTKE, 1990-96, 5 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007, GOLLKOWSKI 2008b]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005]. **Wt+(-)** [BRITZ et al. 2001].
- Scydmaenus perrisii* RTT., 1881: **Sn+(-)**: Dresden, Saubachtal, JANTKE, 27.VIII.94, 1 Ex. - Moritzburg, JANTKE, 1991 und 1995, 3 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007]. **St+(-)**: Dessau, Zadtitz, STIELER, 24. IV.56, 2 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, ZIEGLER 2006b, BÄSE 2007]. **Th+(-)** [RENNER 2002]. **Wt+** [MALZACHER & KONZELMANN 2001].
- Scydmaenus hellwigii* (HBST., 1792): **MV+(-)** [MÖLLER 2003]. **Sd+** [EISINGER 2006a, MÖLLER 2005]. **St+(-)**: Dessau, 12.V.70, STIELER, 2 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME].
- Familie PTILIIDAE**
- Nossidium pilosellum* (MARSH., 1802): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Ptenidium gressneri* ER., 1845: **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **Pf+(-)** [KÖHLER 2004a]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Ptenidium laevigatum* ER., 1845: **By+(-)** [BUSSLER & FUCHS 2006]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Ptenidium turgidum* THOMS., 1855: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wt+** [SZALLIES 2001, BENSE 2006a].
- Ptenidium intermedium* WANK., 1869: **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [RENNER 2002].
- Ptenidium brenskiei* FLACH, 1887: **No+** [coll. KÖHLER]. **Pf+** [ARK Bienwald].
- Ptenidium fuscicorne* ER., 1845: **Br+(-)** [EICHLER et al. 2003, BARNDT 2007]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Ptenidium punctatum* (GYLL., 1827): **MV+(-)** [ESSER 2001a].
- Ptenidium formicetorum* KR., 1851: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005, GOLLKOWSKI 2006]. **St+(-)** [BÄSE i.l. 2011]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Ptenidium longicorne* FUSS, 1868: **MV+** [GÜRLICH Cono]. **St+** [BÄSE i.l. 2011].
- Ptenidium pusillum* (GYLL., 1808): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999].
- Ptenidium reitteri* FLACH, 1887: **Pf+** [ARK Bienwald].
- Ptenidium nitidum* (HEER, 1841): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte, REIKE & ENGE 2011]. **St+(-)** [SCHOLZE 2007].
- Actidium boudieri* (ALLIB., 1844): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Oligella foveolata* (ALLIB., 1844): **Br+(-)** [RENNER 2002, BARNDT 2008]. **MV+** [ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [RENNER 2002].
- Oligella intermedia* BES., 1971: **Not+**: Rees-Bienen, RENNER, 14.VI. 2002, 1 Ex. im Autokescher [coll. RENNER].
- Oligella insignis* (MATTH., 1861): **Ne+** [MEYBOHM 2001].
- Micridium halidai* (MATTH., 1868): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a]. **Wf+** [RENNER 2011].
- Ptilium exaratum* (ALLIB., 1844): **Pf+** [ARK Bienwald]. **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Ptilium affine* ER., 1845: **Ne(+)**: irrümlicher Eintrag [MEYBOHM 1999b].
- Ptilium myrmecophilum* (ALLIB., 1844): **MV+(-)** [KÖHLER Rüte, RINGEL i.l. 2011, KLEEGER & BUSCH 2010]. **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Wf+(-)** [DREES 2002b].
- Ptilium canaliculatum* (ER., 1845): **WE+(-)** [FEHLMELDUNG, BELLMANN i.l. 2000].
- Ptilium horionii* ROSSK., 1934: **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Ptilium modestum* WANK., 1869: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **MV+** [GÜRLICH Cono]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+(-)** [JUNG 2001].
- Euryptilium saxonicum* (GILLM., 1845): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Bambara contorta* (DYBAS, 1966): **Ne+** [MEYBOHM 2005, SÖRENSSON & JOHNSON 2004]. **SH+** [MEYBOHM 2005].
- Ptiliola kunzei* (HEER, 1841): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte, REIKE & ENGE 2011]. **Th+(-)** [RENNER 2002].
- Ptiliola brevicolle* (MATTH., 1860): **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Ptiliolum schwarzi* (FLACH, 1887): **Hs+** [KÖHLER Gold, KÖHLER Loch]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Ptiliolum wuesthoffi* ROSSK., 1934: **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Ptiliolum spencei* (ALLIB., 1844): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **MV+(-)** [KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte].
- Ptiliolum fuscum* (ER., 1845): **Br+(-)** [EICHLER et al. 2003]. **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH User, REIKE & ENGE 2011]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Ptiliolum marginatum* (AUBE, 1850): **Hs+** [KÖHLER Loch]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wf+** [KÖHLER Hell].
- Microptilium palustre* KUNTZEN, 1914: **Br+(-)** [ESSER et al. 2006]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

- Microptilium pulchellum* (ALLIB., 1844): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Ptinella britannica* MATTH., 1858: **No!** [WENZEL 2005, sicher Fehlbestimmung]. **Rh+** [RENNER 1999a].
- Ptinella limbata* (HEER, 1841): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [KÖHLER Bohn]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+(-)** [JUNG 2001, RENNER 1999a].
- Ptinella denticollis* (FAIRM., 1857): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Ptinella aptera* (GUER., 1839): **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)** [KLASS et al. 2004]. **St+(-)** [JUNG 2001]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Ptinella tenella* (ER., 1845): **Ba+** [RENNER 2008b]. **Br+(-)** [EICHLER et al. 2003]. **Hs+**: auch schon bei HORION (1949) [BRENNER 2001, FLECHTNER 2003b, SCHAFFRATH 2001, KÖHLER Gold]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)** [BENSE 1998]. **St+(-)** [RENNER 1999a, JUNG 2010].
- Ptinella microscopica* (GILLM., 1845): **Hs+** [BRENNER 1997]. **Wf+** [KÖHLER Arms].
- Ptinella errabunda* JOHNS., 1975: **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005]. **Wf+** [KÖHLER Holt, KÖHLER Länd].
- Pteryx splendens* STRAND, 1960: **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Nephases titan* (NEWM., 1834): **Br+(-)** [EICHLER et al. 2003]. **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Bohn]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Baeocrara variolosa* (MULS.REY, 1867): **Br+(-)** [RENNER 2002]. **Hs+** [KÖHLER Loch]. **MV+** [GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005, GOLLKOWSKI 2010]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004]. **WE+(-)** [BELLMANN & MENKE 2005].
- Baeocrara japonica* (MATTH., 1884): **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [RENNER 2009a]. **Wf+** [KÖHLER Sieg].
- Acrotichis grandicollis* (MANNH., 1844): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KLEEBOERG & BUSCH 2010, REIKE & ENGE 2011]. **Th+(-)** [GOLLKOWSKI 2006].
- Acrotichis sanctaehelenae* JOHNSON, 1972: **Pf+** [GOLLKOWSKI 2008c].
- Acrotichis montandonii* (ALLIB., 1844): **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005, GOLLKOWSKI 2006]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Acrotichis chevrolathii* (ALLIB., 1844): **No+(-)** [coll. SIEDE, KÖHLER 2006a]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Acrotichis thoracica* (WALT., 1838): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Acrotichis sericans* (HEER, 1841): **Br+(-)** [EICHLER et al. 2003, ESSER et al. 2006]. **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, REIKE & ENGE 2011]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000, MENKE in Vorber.].
- Acrotichis dispar* (MATTH., 1865): **Br+(-)** [RENNER 2002]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hs+** [KÖHLER Loch]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte, REIKE & ENGE 2011]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Acrotichis nana* VORST & SOERENSSON, 2005: **No+** [coll. KÖHLER]. **Th+** [SOERENSSON 2007, KOPETZ et al. 2008].
- Acrotichis brevipennis* (ER., 1845): **MV+** [GÜRLICH Vilm, GÜRLICH Zipp]. **Th+(-)** [RENNER i.l. 2007].
- Acrotichis pumila* (ER., 1845): **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005, GOLLKOWSKI 2006]. **Wf+** [KONZELMANN 2010].
- Acrotichis silvatica* ROSSK., 1935: **Ba/(+)** [BÜCHE 2003]. **Br+** [GOLLKOWSKI 2006]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Acrotichis parva* ROSSK., 1935: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Ne+**: Holorfslöh/WL, MEYBOHM, 22.10.2000, in Anzahl im Autokescher [TOLASCH i.l. 2001].
- Acrotichis volans* (MOTSCH., 1845): **Hs+** [DOROW et al. im Druck]. **Ne+**: Holorfslöh/WL, MEYBOHM, 22.X.2000, in Anzahl im Autokescher [SOERENSSON det.] [TOLASCH i.l. 2001].
- Acrotichis cognata* (MATTH., 1877): **Ba+** [RENNER 2011]. **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Rh+** [KÖHLER Eisc]. **SH+** [MEYBOHM 1999b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
- Acrotichis insularis* (MAEKL., 1852): **Ba+** [RENNER 2005b, RENNER 2011]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Acrotichis arnoldi* ROSSK., 1935: **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Acrotichis intermedia* (GILLM., 1845): **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Acrotichis atomaria* (DEGEER, 1774): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999, RENNER 2002]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+(-)** [REIKE & ENGE 2011].
- Acrotichis matthewsi* WOLL., 1864: **No!** [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
- Acrotichis lucidula* ROSSK., 1935: **WE?(-)** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Acrotichis danica* SUNDT, 1958: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+** [BASE 2011].
- Acrotichis silkaensis* (MOTSCH., 1845): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, GOLLKOWSKI 2006, GÜRLICH Cono].
- Acrotichis henrici* (MATTH., 1872): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [REIKE & ENGE 2011]. **Ne+** [MEYBOHM 2001]. **SH+** [MEYBOHM 2001]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Acrotichis rosskohleni* SUNDT, 1971: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Acrotichis sjoeborgi* SUNDT, 1958: **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [KÖHLER 2003a]. **Rh+** [FRANZEN 1995].
- Acrotichis fascicularis* (HAST., 1792): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999, GOLLKOWSKI 2006]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+(-)** [KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **St+(-)** [SCHOLZE 2007]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, GOLLKOWSKI 2006].
- Acrotichis rugulosa* ROSSK., 1935: **Sn+** [GÜNTHER & PESCHEL 2001, GOLLKOWSKI 2006]. **St+** [BASE 2011]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Familie STAPHYLINIDAE

- Stagonium quadricorne* KIRBY, 1815: **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH Cono].
- Scaphisoma assimile* ER., 1845: **Sn+(-)** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].
- Scaphisoma boreale* LUNDBL., 1952: **By+** [SCHMIDL et al. 2005]. **MV+** [GÜRLICH Cono].
- Scaphisoma subalpinum* RTT., 1881: **Br/(+)** [ESSER 2005a, SCHÜLKE 2007b]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER et al. in Vorber.]. **Ne/(+)**: die Meldungen gehören zu *Scaphisoma balcanicum* [MEYBOHM 1999b]. **SH/(+)**: die Meldungen gehören zu *Scaphisoma balcanicum* [MEYBOHM 1999b].
- Scaphisoma balcanicum* TAMAN., 1954: **MV+** [ZIEGLER 2006a, GÜRLICH User]. **Ne+** [MEYBOHM 1999b]. **SH+** [MEYBOHM 1999b]. **St+** [JUNG 2007]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Thoracophorus corticinus* MOTSCH., 1837: **By+(-)** [HOFMANN 2001]. **No+** [MATERN 2004]. **Sn+** [LORENZ 2001b].
- Olisthaerus substriatus* (PAYK., 1790): **By+** [FLECHTNER 2005a].
- Dasyceus sulcatus* BRONGN., 1800: **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **St+** [JUNG 2007].
- Megarthus sinuaticollis* (LACORD., 1835): **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte].
- Megarthus hemipterus* (ILL., 1794): **By+** [SCHÜLKE 2007b].
- Proteinus ovalis* STEPH., 1834: **Br+** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **MV+(-)** [KLEEBOERG 2003, KÖHLER Rüte]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Proteinus crenulatus* PAND., 1867: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Proteinus atomarius* ER., 1840: **MV+** [KLEEBOERG 2003, KÖHLER Rüte].
- Micropeplus tessellatus* CURT., 1828: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br+** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
- Micropeplus staphylinoides* (MARSH., 1802): **No+(-)** [BAUMANN 2007, coll. KÖHLER]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Rh+** [RENNER 2008b].
- Micropeplus marietti* DUVAL, 1857: **MV+** [KLEEBOERG 2003]. **Pf+** [KÖHLER 2004b].
- Micropeplus longipennis* KR., 1859: **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Micropeplus ripicola* KERSTENS, 1964: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Micropeplus caelatus* ER., 1839: **St+(-)** [JUNG 2007].
- Eusphalerum anale* (ER., 1840): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Eusphalerum longipenne* (ER., 1839): **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **St+(-)** [JUNG 2001].
- Eusphalerum montivagum* (HEER, 1838): **St(?)** [SCHOLZE 2010].

- Eusphalerum primulae* (STEPH., 1834): **Br?** [SCHÜLKE 2007b].
Eusphalerum abdominale (GRAY., 1806): **Br?** [SCHÜLKE 2007b].
Eusphalerum luteum (MARSH., 1802): **Ba**(+): **Beleg** in coll. GLADITSCH, Mus. Stuttgart gehört zu *Eusphalerum limbatum*, WOLFSCHWENNINGER det. [WOLFSCHWENNINGER i.l.].
Eusphalerum pseudacupariae (STRAND, 1916): **St**- [SCHOLZE 2010].
Eusphalerum sorbi (GYLL., 1810): **WE**(+) [ROSE 2004].
Eusphalerum florale (PANZ., 1793): **Br?** [SCHÜLKE 2007b]. **WE?**(+) [ROSE 2004].
Acrulia inflata (GYLL., 1813): **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, GÜRLICH User]. **Sd**+ [MÖLLER 1998b].
Acalocha minuta (OL., 1795): **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999]. **WE**(-) [ROSE 2004].
Acalocha analis (HEER, 1838): **Pf**+ [KÖHLER Bien].
Acalocha pliginiskii (BERNH., 1913): **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Acalocha sulcula (STEPH., 1834): **By**+ [LIEPOLD 2003]. **MV**(-) [GÜRLICH 2005a, REIKE & ENGE 2011].
Phyllodrepa melanocephala (F., 1787): **MV**+; Marxhagen, Mürzikreis, BÜCHE 23.III.2000, 1 Ex an faulen Äpfeln in einem Kellerraum [BÜCHE i.l., KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH User].
Phyllodrepa salicis (GYLL., 1810): **Br**(-) [DREGER et al. 2002]. **St**+ [SCHOLZE 2010].
Phyllodrepa nigra (GRAY., 1806): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005].
Phyllodrepa puberula BERNH., 1903: **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002]. **MV**+ [KÖHLER Bohn]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Phyllodrepa melis HANSEN, 1940: **No**+ [GRÄF 2002]. **St**+ [HENNICKE & ECKERT 2001].
Phyllodrepa scabriuscula (KR., 1858): **Hs**+ [SCHAFFRATH 1999 (falsch)].
Phyllodrepa linearis (ZETT., 1828): **Hs**+; als „*scabriuscula*“ gemeldet [SCHAFFRATH 1999]. **No**(+) [KÖHLER 2006a]. **Rh**(+) [KÖHLER 2006a].
Phyllodrepa vilis (ER., 1840): **No**(-) [KÖHLER 2006a].
Phyllodrepa gracilicornis (FAIRM.LAB., 1856): **MV**+ [GÜRLICH Vilm, GÜRLICH Zipp].
Hapalaraea pygmaea (PAYK., 1800): **Sd**(-) [MÖLLER 1998b].
Hypopycna rufula (ER., 1840): **Sn**+ [HORNIG 2000b]. **St**+ [SCHOLZE 2010]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wt**+ [SZALLIES 2001].
Omalium validum KR., 1858: **MV?** [KLEEGER 2003]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Omalium septentrionis THOMS., 1856: **Ne**+ [HERRMANN 2003a].
Omalium oxyacanthae GRAY., 1806: **Br**(-) [RENNER 2008b, BEIER & KÖRGE 2001, BARNDT 2007aa, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008]. **By**(-) [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Sd**+ [EISINGER 2006a].
Omalium imitator LUZE, 1906: **No**/ [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
Omalium littorale KR., 1858: **WE**(-) [ROSE 2001, ROSE 2004].
Phloeonomus minimus (ER., 1839): **Ba**(+) [RENNER 2003b, SCHÜNGER 2001, BENSE 2006a]. **Br**+ [MÖLLER 2003]. **Sn**(-) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008]. **Wf**+ [KÖHLER Sieg]. **Wt**+ [BENSE 2006a].
Xylotiba monilicornis (GYLL., 1810): **Br**+ [DREGER et al. 2009, EICHLER et al. 2002]. **MV**+ [KLEEGER 2003]. **St**(-) [BASE 2007, JUNG 2001].
Xylotiba bosnicus (BERNH., 1902): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs**+ [BRENNER 2000, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV**+ [GÜRLICH Vilm]. **SH**+ [GÜRLICH 2006b]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
Phloeostiba lapponicus (ZETT., 1838): **St**(-) [BASE 2007].
Paraphloeostiba gayndahensis MACLEAY, 1871: **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**+ [GÜRLICH 2006b].
Xylodromus affinis GERH., 1877: **MV**+ [KLEEGER 2003, KÖHLER Rüte].
Xylodromus testaceus (ER., 1840): **Pf**(-) [KÖHLER 2004b].
Philorinum sordidum (STEPH., 1832): **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **St**(-) [JUNG 2007]. **WE**(-) [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000, ROSE 2004].
Micralymna marinum (STRÖM, 1783): **SH**(-): Hallig Gröde, BORCHERDING, 26.6.86, 1 Ex. (Bombus 3:163), später auch andere Sammler [TOLASCH i.l.2001]. **WE**(-) [ROSE 2004, BELLMANN et al. 2003].
Orachares angustatus (ER., 1840): **Br**(-) [ESSER 2010]. **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Phyllodrepoidea crenata GANGLB., 1895: **Pf**+ [KÖHLER 2000d]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Deliphrum algidum ER., 1840: **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002]. **St**(+): Im Harz verbreitet (Horion 1963), aber keine Funde in St [SCHOLZE i.l. 2009].
Anthobium melanocephalum (ILL., 1794): **Br**(-) [SCHÜLKE 2007b]. **WE?** [ROSE 2004].
Olophrum consimile (GYLL., 1810): **MV**+ [KLEEGER 2003].
Olophrum rotundicollis (SAHLB., 1817): **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008].
Acidota cruentata (MANNH., 1830): **Sd**(-) [EISINGER 2006a].
Lesteva sicula ER., 1840: **St**+ [SPRICK 2000].
Lesteva hansenii LOHSE, 1953: **MV**+ [KLEEGER 2003]. **St**+ [SCHOLZE 2010].
Geodromicus plagiatus (F., 1798): **Sn**(?): die Art ist in Sachsen nicht zu erwarten, frühere unbelegte Meldungen sind zu verwerfen [ZERCHER 2000].
Geodromicus nigrita (MÖLL., 1821): **Brv** [SCHÜLKE 2007b].
Anthophagus praustus MÖLL., 1821: **Br**+ [SCHÜLKE 2007b].
Anthophagus scutellaris ER., 1840: **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002].
Anthophagus alpinus (PAYK., 1790): **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Anthophagus angusticollis (MANNH., 1830): **Br**/ [SCHÜLKE 2007b]. **WE**(-) [ROSE 2004].
Anthophagus melanocephalus HEER, 1838: **Rh**+ [WENZEL & HANNIG 2002].
Eudectus giraudi REDT., 1858: **Ba**+ [SCHUNGER et al. 2001].
Coryphium angusticollis STEPH., 1834: **MV**+ [KLEEGER 2003, KÖHLER 2003a, MÖLLER 2003]. **Wt**+ [BRITZ et al. 2001].
Deilester dichrous (GRAY., 1802): **Pf**(-) [ARK Bienenwald].
Planeustomus palpalis (ER., 1839): **By**+; Kreuzvertheim, Mainufer, KÖHLER, 8.V.2011, 1 Ex. [coll. KÖHLER]. **MV**+ [KLEEGER 2003, KÖHLER 2003a, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte].
Ochtheophilus flexuosus (FAIRM.LAB., 1854): **Ba**+ [SCHÜLKE 2001a, SZALLIES 2001, RENNER 2005b]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [KUNZE & KACHE 1998].
Ochtheophilus rosenhaueri (KIESW., 1850): **St**- [SCHOLZE 2010].
Ochtheophilus omlinus (ER., 1840): **Br**+ [EICHLER et al. 1999, SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2007b]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008].
Ochtheophilus strandi (SCHEERP., 1950): **SH**(+): die holsteinischen Belege gehören zu *Ochtheophilus andalusiacus* [MAKRANCZY 2001, ASSING i.l. 2002]. **Wt**(+): Die artische Art kommt nicht in Mitteleuropa vor [MAKRANCZY 2001].
Ochtheophilus andalusiacus (FAGEL, 1957): **SH**+; Barnitz bei Treuholz, MEYBOHM, 10.III.2000, 10 Ex. (MAKRANCZY det.) [ASSING i.l. 2002].
Ochtheophilus aureus (FAUV., 1869): **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **Hs**+ [BRENNER 2006]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Ochtheophilus taticus (SMET., 1973): **Ba**+ [MAKRANCZY 2001, FRANK & KONZELMANN 2002].
Ochtheophilus angustatus (ER., 1840): **Ba**+ [KONZELMANN 2006b].
Ochtheophilus scheerpeltzi FAGEL, 1951: **Sn**(?) [MAKRANCZY i.l. 2002].
Carpelimus opacus (BAUDI, 1848): **Pf**+ [ARK Bienenwald].
Carpelimus similis (SMET., 1967): **Hs**+; Groß-Gerau, HANSEN, 22.V.54, 2 Ex. (BÖHME det., t. VOGEL) [coll. BÖHME, FLECHTNER 2003b]. **St**+; Rösslau-Steu, Elbufer, RENNER, 26.IV.2009, 1 Ex. im Ufersand [coll. RENNER]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Carpelimus gusarovi GILDENKOV, 1997: **Ba**+ [KONZELMANN 2006a]. **Wt**+ [KONZELMANN 2006a, KONZELMANN 2010].
Carpelimus fuliginosus (GRAY., 1802): **Hs**(+): Messel Eppertshausen, Autokescher, VOGT, 1962 [coll. VOGT im SMF]. **MV**(-) [KLEEGER 2003, ZIEGLER 2006a]. **St**(-) [SCHOLZE 2010]. **Th**(-) [APFEL 2003].
Carpelimus lindrothi (PALM, 1942): **Sd**+ [coll. KÖHLER].
Carpelimus impressus (LACORD., 1835): **Br**(-) [EICHLER & PÜTZ 2000]. **MV**+ [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte].
Carpelimus heidenreichi (BENICK, 1934): **Br**+ [SCHÜLKE 2007b]. **By**+ [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hs**+; Darmstadt Oberwaldhaus, VOGT, 1970 [coll. HÖHNER]. **MV**+ [KLEEGER 2003, KÖHLER 2003a, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Carpelimus punctatellus (ER., 1840): **Hs**(+) [BRENNER 2003]. **St**(-) [Bad Kösen, DORN, 19.V.55, 4 Ex. [coll. BÖHME].

- Carpelimus foveolatus* (SAHLB., 1823): **St+(-)** [GRUSCHWITZ 2003].
- Carpelimus halophilus* (KIESW., 1844): **St+(-)**: Salziger See zwischen Aseleben und Rößlingen am See, WRASE, 6.VI.1996 und SCHÖLKE, 8.06.1996 - Sülldorf bei Magdeburg, Salzstelle, SCHÜLKE, 23.07.1988 [coll. SCHÜLKE, Büche i.l., GRUSCHWITZ 2003].
- Carpelimus exiguus* (ER., 1839): **Pf+** [ARK Bienwald]. **SH+()** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Carpelimus zealandicus* (SHIP., 1900): **Ba+** [RENNER 2002, FRANK & KONZELMANN 2002]. **Br+** [ESSER 2002a, SCHÜLKE 2007b].
- Carpelimus gracilis* (MANNH., 1830): **MV+(-)** [ESSER 2002b, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte].
- Carpelimus subtilis* (ER., 1839): **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2008].
- Thinodromus dilatatus* (ER., 1839): **St-** [SCHOLZE 2010].
- Thinodromus hirticollis* (MULS.REY, 1879): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Thinodromus mannerheimi* (KOL., 1846): **Hs+** [FELDMANN 2000]. **No+** [coll. KÖHLER].
- Thinodromus distinctus* (FAIRM.LAB., 1856): **Wt+()** [KOSTENBADER 2009].
- Thinodromus arcuatus* (STEPH., 1834): **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **St+()** [JUNG 2002, BASE 2007].
- Aploderus caesus* (ER., 1839): **St+(-)** [GRUSCHWITZ 2003, SCHÜLKE 2001a].
- Oxytelus migrator* FAUV., 1904: **Br+** [SCHÜLKE & UHLIG 1988, SCHÜLKE 2007b].
- Oxytelus piceus* (L., 1767): **St+(-)** [BASE 2007, JUNG 2007]. **Th+(-)** [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Anotylus maritimus* THOMS., 1861: **MV+** [KLEEBOG 2003].
- Anotylus mutator* (LOHSE, 1963): **Br+** [SCHÜLKE 2007b].
- Anotylus hammondi* SCHÜLKE, 2009: **Sn+** [SCHÜLKE 2009b].
- Anotylus intricatus* (ER., 1840): **WE/** [ROSE in Vorber.].
- Anotylus clypeonitens* (PAND., 1867): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Anotylus speculifrons* (KR., 1858): **No+** [KÖLKEBECK & WAGNER 2007].
- Anotylus hamatus* FAIRM.LAB., 1856: **By+()** [HOFMANN & KÖHLER 2010 (affinis)]. **No+** [KÖLKEBECK 2010]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010 (affinis)]. **Th+()** [KOPETZ & WEIGEL 2000 (affinis)].
- Anotylus saulcyi* (PAND., 1867): **St+(-)**: Dessau, SCHÖNE, 31. XII.1984 (t. SCHOLZE) aus einem *Talpa*-Nest [SCHÖNE i.l. 2000]. **WE+()** [ROSE 2004].
- Platystethus degener* MULS.REY, 1879: **St-** [SCHOLZE 2010]. **WE/()** [ROSE in Vorber.].
- Platystethus alutaceus* THOMS., 1861: **By+()** [GOSSNER 2004, GOSSNER et al. 2008, HOFMANN & KÖHLER 2010].
- Platystethus capito* HEER, 1839: **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Platystethus nodifrons* MANNH., 1831: **St+(-)** [JUNG 2001, SCHÜLKE 2001a].
- Platystethus nitens* (SAHLB., 1832): **WE+()** [ROSE 2004].
- Bledius spectabilis* KR., 1857: **Su(+)**: die Art ist zu streichen; die gemeldeten Belege sind *Bledius limicola* [SCHOLZE 2010].
- Bledius limicola* TOTTH., 1940: **Sn+** [VOGEL 2010].
- Bledius unicornis* (GERM., 1825): **By+** [SCHMIDL et al. 2005].
- Bledius pallipes* (GRAV., 1806): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Bledius terebrans* SCHIDT., 1866: **Hs+**: Messel - Eppertshausen Autokesch, VOGT, 1966 [coll. HÖHNER].
- Bledius filipes* SHIP., 1911: **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **By+()** [SCHMIDL et al. 2005]. **No+()** [coll. KÖHLER]. **St+**: Beuster bei Seehausen, SCHÖNE, 24.VI.2000 (t. SCHOLZE) [SCHÖNE i.l. 2000]. **Th+()** [KOPETZ et al. 2004].
- Bledius procerulus* ER., 1840: **MV+** [KÖHLER Rüte].
- Bledius dissimilis* ER., 1840: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999].
- Bledius crassicornis* LACORD., 1835: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Bledius occidentalis* BONDR., 1907: **By+()** [WEICHSELBAUMER 2003a]. **MV+** [KLEEBOG 2003]. **St-** [SCHOLZE 2010].
- Bledius femoralis* (GYLL., 1827): **MV+** [KLEEBOG 2003, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Bledius atricapillus* (GERM., 1825): **Hs+()**: Messel - Eppertshausen Autokesch, VOGT, 1962 (STEEL det.) [coll. VOGT im SMF]. **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2008]. **WE?** [ROSE 2004].
- Bledius nanus* ER., 1840: **Br+()** [SCHÜLKE 2007b]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Pf+()** [ARK Bienwald]. **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2008].
- Bledius baudii* FAUV., 1870: **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
- Bledius pygmaeus* ER., 1839: **WE+()** [BÜCHE im Dr., ROSE 2001 (pusillus)].
- Bledius fergussoni* JOY, 1912: **No+** [coll. KÖHLER].
- Bledius talpa* (GYLL., 1810): **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2008].
- Bledius subterraneus* ER., 1839: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Bledius tibialis* HEER, 1839: **Pf+** [KÖHLER 2004b].
- Thinobius silvaticus* BERNH., 1899: **By+()** [SCHÜLKE 2001a].
- Thinobius linearis* KR., 1858: **Rh+** [KÖHLER 2006a]. **Wf+** [DREES 1998, KÖHLER Siegl].
- Thinobius brunneipennis* KR., 1858: **Rh+()** [KÖHLER 2006a].
- Thinobius longipennis* (HEER, 1841): **Br+** [EICHLER et al. 2002, SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2007b].
- Thinobius praetor* SMET., 1959: **Br+()** [EICHLER et al. 2002, SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2007b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Thinobius pusillimus* (HEER, 1839): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002, SCHÜLKE 2008b].
- Thinobius flagellatus* LOHSE, 1984: **Br+()** [EICHLER et al. 2002, SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2007b]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+()** [SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2008b].
- Thinobius brevipennis* KIESW., 1850: **SH+()** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+()** [SCHÜLKE 2001a].
- Thinobius gilvus* FAUVEL, 1899: **Su(?)**: vermutlich liegt bei dem einzigen Beleg eine Fundortverwechslung vor [ASSING & SCHÜLKE 2001].
- Oxyporus maxillosus* F., 1792: **Sd+** [MÖLLER 2005]. **Sn+()** [LORENZ 2005].
- Stenus guttula* MÜLL., 1821: **Br+()** [EICHLER et al. 1999, SCHÜLKE 2001a, SCHÜLKE 2007b]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf+** [ARK Bienwald].
- Stenus maculiger* WEISE, 1875: **No!** [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
- Stenus fossilatus* ER., 1840: **Br+()** [SCHÜLKE 2007b].
- Stenus guynemeri* DUVAL, 1850: **By+()** [HOFMANN & KÖHLER 2010].
- Stenus aterrimus* ER., 1839: **By+()** [HOFMANN & KÖHLER 2010, WEICHSELBAUMER 2003a]. **St+()**: Magdeburg nur ein alter Fund (URBAN 1915) [SCHOLZE i.l. 2009].
- Stenus calcaratus* SCRIBA, 1864: **MV+** [ZIEGLER 2006a].
- Stenus ater* MANNH., 1831: **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus hypoproditor* PUTHZ, 1965: **MV+** [KLEEBOG 2009].
- Stenus gallicus* THOMS., 1851: **No+()** [BAUMANN 2007].
- Stenus longitarsis* FAUV., 1872: **Hs+**: Groß-Gerau Mönchbruch, HÖHNER, 1994, 1999, 2002, 2003 [coll. HÖHNER].
- Stenus stigma* ER., 1840: **By+()** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **No+()** [KÖHLER 2006a]. **Rh+()** [FELDMANN 2001]. **St+()** [SCHOLZE i.l. 2008].
- Stenus palustris* ZETT., 1838: **Hs-**: Hanau Umgebung, KROGH, 1904 (PUHTZ det.) [coll. HÖHNER]. **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **SH+()** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Stenus ruralis* ER., 1840: **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus subdepressus* MULS.REY, 1861: **No+()** [KÖHLER 2006a]. **Wt+** [SZALLIES 2001].
- Stenus morio* GRAV., 1806: **WE+()** [ROSE 2004].
- Stenus excubitor* ER., 1839: **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **MV+()** [KLEEBOG 2003].
- Stenus atratulus* ER., 1839: **Hs+**: Traisa-Trautheim, HANSEN, 25.V.51, 1 Ex. (t. VOGEL) [coll. BÖHME, BRENNER 2006]. **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus fuscipes* GRAV., 1802: **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus argus* GRAV., 1806: **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+()** [BASE 2007].
- Stenus europaeus* PUTHZ, 1966: **St+()** [JUNG 2001, SCHÜLKE 2001a].
- Stenus cautus* ER., 1839: **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus mendicus* ER., 1840: **Br!** [SCHÜLKE 2007b].
- Stenus incanus* ER., 1839: **Br!** [SCHÜLKE 2007b]. **Wt+()**: die Art ist zurückzustufen, der der Meldung zugrunde liegende Beleg datiert aus dem Jahr 1937 [coll. JÜNGER, KONZELMANN i.l. 2001].
- Stenus nanus* STEPH., 1833: **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sd+** [EISINGER 2001, EISINGER 2006a].
- Stenus contumax* ASSING, 1994: **Sn+** [HORNIG 2000a]. **WE-** [ROSE 2004].
- Stenus circularis* GRAV., 1802: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **St+()** [SCHOLZE 2010].
- Stenus pusillo* ER., 1839: **Hs+** [BRENNER 1997]. **Pf+** [ARK Bienwald].
- Stenus phyllobates* PEN., 1901: **By+()** [BÜCHE i.l. 2007].
- Stenus formicetorum* MANNH., 1843: **Rh+** [WAGNER & WAGNER 2009].
- Stenus intermedius* REY, 1884: **Br+()** [SCHÜLKE 2007b].
- Stenus nigritulus* GYLL., 1827: **St+()** [SCHOLZE 2010].

- Stenus tarsalis* LJUNGH, 1804: **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Stenus bohemicus* MACH., 1947: **St-** [SCHOLZE 2010].
- Stenus solutus* ER., 1840: **MV+(-)** [KLEEBOERG 2003, KÖHLER 2003a, ZIEGLER 2006a].
- Stenus kiesewetteri* ROSH., 1856: **Pf+** [RENNER 2005a]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Stenus fornicatus* STEPH., 1833: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **WE+(-)** [ESSER 1999].
- Stenus palliarsis* STEPH., 1833: **Hs+(-)**: Vogelsberg Reichloser Teich, HOFMANN, 2004 [coll. HOFMANN]. **MV+(-)** [KLEEBOERG 2003]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Stenus niveus* FAUV., 1865: **Pf-** [EISINGER 2001].
- Stenus nitidisculus* STEPH., 1833: **MV+(-)** [KLEEBOERG 2003, KÖHLER 2003a]. **Pf+** [RENNER 2005a].
- Stenus picipennis* ER., 1840: **MV+** [KLEEBOERG 2003]. **St+(-)** [JUNG 2001].
- Stenus bifoveolatus* GYLL., 1827: **Br+** [SCHÜLKE 2007b].
- Stenus picipes* STEPH., 1833: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005, BORCHERDING 1994]. **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2009].
- Stenus brevipennis* THOMS., 1851: **Br+** [BARNDT 2008]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Stenus ludyi* FAUV., 1885: **MV+** [KLEEBOERG 2009].
- Stenus ochropus* KIESW., 1858: **MV+** [KLEEBOERG & SCHMIDT 2010].
- Stenus fuscicornis* ER., 1840: **MV+** [KLEEBOERG 2003]. **St+(-)** [JUNG 2007].
- Stenus subaeneus* ER., 1840: **Hs+** [BRENNER 2005]. **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Stenus glacialis* HEER, 1839: **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Stenus palustris* ER., 1839: **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Stenus flavipalpis* THOMS., 1860: **St+(-)** [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Stenus annulipes* HEER, 1839: **Sd+**: Perl-Nennig, Kiesgruben, VORST, 8.VI.1996, 1 Männchen (t. PUTHZ) aus einem gärenden Heuhaufen gesiebt [VORST 1998].
- Stenus montivagus* HEER, 1839: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Stenus pallipes* GRAV., 1802: **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Dianous coerulescens* (GYLL., 1810): **MV+** [KLEEBOERG 2001, KLEEBOERG 2002].
- Edaphus beszedesi* RTT., 1913: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Euaesthetus superlatus* PEYRHH., 1937: **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
- Euaesthetus ruficapillus* LACORD., 1835: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER et al. in Vorber.].
- Paederus limnophilus* ER., 1840: **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **St+(-)** [SCHOLZE i.l. 2008].
- Paederus fuscipes* CURT., 1826: **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Paederus littoralis* GRAV., 1802: **Br+**: Freyenstein, BÖHME, 22. VI.54, 1 Ex. (t. VOGEL) [coll. BÖHME].
- Paederidius ruficollis* (F., 1781): **St+(-)** [JUNG 2010].
- Astenus pulchellus* (HEER, 1839): **MV+** [ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Astenus immaculatus* STEPH., 1833: **MV+** [ESSER 2002b, KLEEBOERG 2003]. **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Astenus brevelytratus* COIFF., 1960: **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Rugilus scutellatus* (MOTSCH., 1858): **Br+** [EICHLEER et al. 1999, RENNER 2002].
- Rugilus subtilis* (ER., 1840): **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Rugilus geniculatus* (ER., 1839): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Rugilus mixtus* (LOHSE, 1956): **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2005, SCHÜLKE 2007b]. **No+** [ROHWEDDER 2006]. **St(+)**: Fundumstände und Finder nicht bekannt, wahrscheinlich Fehldetermination, die Art ist vorerst zu streichen [SCHOLZE i.l. 2009].
- Medon castaneus* (GRAV., 1802): **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999, KLEEBOERG 2003, KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Medon dilutus* (ER., 1839): **St+(-)** [BÄSE i.l. 2011].
- Medon piceus* (KR., 1858): **St+(-)** [JUNG 2007].
- Medon brunneus* (ER., 1839): **WE+(-)** [ROSE i.l. 2005].
- Medon fuscus* (MANNH., 1830): **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Medon ripicola* (KR., 1854): **Th+(-)** [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Medon apicalis* (KR., 1857): **St+(-)** [SCHOLZE 2010, JUNG 2010]. **Th+(-)** [APPEL 2003, RENNER 2002].
- Luzea nigrilata* (ER., 1840): **No(+)**: Die Art ist damit für die deutsche Fauna zu streichen [KÖHLER 2006a].
- Sunius melanocephalus* (F., 1792): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Chloecharis debilicornis* (WOLL., 1857): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Pseudomedon obscurus* (ER., 1840): **Pf+** [KÖHLER 2004b].
- Pseudomedon obsoletus* (NORDM., 1837): **St+(-)** [BÄSE i.l. 2011].
- Lithocharius ochracea* (GRAV., 1802): **MV+** [ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, REIKE & ENGE 2011].
- Scopaeus laevigatus* (GYLL., 1827): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **St+(-)**: Dessau, SCHÖNE, 19.IX.2000 [SCHÖNE i.l. 2000, JUNG 2001, BÄSE 2007].
- Scopaeus minutus* ER., 1840: **WE+** [ROSE 2004].
- Scopaeus pusillus* KIESW., 1843: **MV+** [KLEEBOERG 2009, KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Scopaeus ryei* WOLL., 1872: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Scopaeus minimus* (ER., 1837): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Scopaeus gracilis* (SPERK, 1835): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER et al. in Vorber.]. **No+(-)** [coll. KÖHLER].
- Domene scabricollis* (ER., 1840): **Brv(+)** [SCHÜLKE 2007b].
- Lathrobium picipes* ER., 1840: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Lathrobium angusticollis* LACORD., 1835: **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Lathrobium sodale* KR., 1857: **St+(-)**: Treseburg, April 1934, Behr (nach HORION 1965), neuere Meldungen sind nicht bekannt [SCHOLZE i.l. 2009].
- Lathrobium sphagnetorum* MUONA, 1977: **MV+** [KLEEBOERG 2003]. **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Lathrobium ruffipenne* GYLL., 1813: **Pf+** [ARK Bienwald].
- Lathrobium pallidipenne* HOCHH., 1851: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Lathrobium laevipenne* HEER, 1839: **Pf+** [ARK Bienwald].
- Lathrobium castaneipenne* KOL., 1846: **Ne(?)** [LOHSE 1948a].
- Lathrobium spadiceum* ER., 1840: **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Hs+**: Darmstadt Kranichsteiner Forst, VOGT, 1974 [coll. HÖHNER]. **MV?** [KLEEBOERG 2003]. **St(?)** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Pseudolathra manuelli* (FAUVEL, 1865): **Ba+** [RENNER 2002].
- Achenium depressum* (GRAV., 1802): **Ba+** [coll. REISSMANN]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Achenium humile* (NICOL., 1822): **MV+**: Rüterberg bei Dömitz, ZIEGLER, 16.I.2011 [ZIEGLER i.l. 2011].
- Leptobium gracile* (GRAV., 1802): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Cryptobium collare* RTT., 1884: **MV+** [ASSING 2009a]. **Th+** [ASSING 2009a].
- Leptacinus sulcifrons* (STEPH., 1833): **Hs+** [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+** [KLEEBOERG 2003, GÜRLICH CONO, REIKE & ENGE 2011]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Gauwopteris fulgidus* (F., 1787): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000].
- Gyrophypnus wagneri* (SCHEERP., 1926): **Br+** [ASSING 2003, SCHÜLKE 2007b]. **MV+** [ASSING 2003].
- Xantholinus flavocinctus* (GRAV., 1806): **Br+**: Trechwitz, SCHÖNE, 7.VIII.2000, 2 Ex. aus einem Grasschnitthaufen [SCHÖNE i.l. 2000]. **St+(-)**: Dessau, SCHÖNE, 6.VIII.2000, regelmäßig und häufig [SCHÖNE i.l. 2000].
- Xantholinus semirufus* (RTT.) STEEL, 1950: **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Xantholinus gallicus* COIFF., 1956: **Sn+** [PESCHIEL i.l. 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Xantholinus audrasi* COIFF., 1956: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Ne/ (+)**: alle Belege gehören zu *Xantholinus rhenanus* COIFF. [MEYBOHM 2000]. **SH/ (+)**: Die von LOHSE gemeldeten Belege (Bombus 2: 156) sowie alle späteren gehören zu *X. rhenanus* COIFF. [MEYBOHM 2000].
- Xantholinus dissimilis* COIFF., 1956: **Br+** [BARNDT et al. 2002]. **Ne/ (+)**: Alle Belege gehören zu *Xantholinus roubali* COIFF. [MEYBOHM 2000]. **SH/ (+)**: Alle Belege gehören zu *Xantholinus roubali* COIFF. [MEYBOHM 2000]. **St+** [SCHÖNE 2004]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Hypnogyra glabra* (NORDM., 1837): **MV+** [GÜRLICH 2005a, KLEEBOERG 2003, KÖHLER BOHN, MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Atreus longiceps* (FAUV., 1872): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sn+** [VOGEL 2010]. **Th+**: der publizierte Fundort liegt nicht in Thüringen, sondern in Sachsen-Anhalt, von wo die Art bekannt ist [HENNICKE & ECKERT 2001, HENNICKE i.l. 2001].
- Atreus pilicornis* (PAYK., 1790): **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Othius lapidicola* MAERK. KIESW., 1848: **Hs+**: Gründau Gettenbach, DEHNERT, 1975 [coll. HÖHNER].
- Othius laeviusculus* STEPH., 1832: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Othius volans* SAHLB., 1876: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Neobisnius procerulus* (GRAV., 1806): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sn+(-)**: Sagar, BÖHME, 9.VI.97, 1 Ex. (VOGEL det.) [coll. BÖHME].
- Neobisnius prolixus* (ER., 1840): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **Rh+(-)** [JUNKER 2009].

- Erichsonius ytenensis* (SHP., 1913): **Ba+** [WOLF-SCHWENNINGER & UHLIG 2005]. **By**(-) [WOLF-SCHWENNINGER & UHLIG 2005].
Erichsonius subopacus (HOCHH., 1851): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Hesperus rufipennis (GRAV., 1802): **By**(-) [SCHMIDL et al. 2005].
MV+ [MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, GÜRLICH USER]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**(-) [LORENZ 2001b]. **St**(-): Dessau, SCHÖNE, 9.V.2000 [SCHÖNE i.l. 2000, DIETZE 2005, BASE 2007]. **Wt+** [MALZACHER & KONZELMANN 2001, FRANK & KONZELMANN 2002].
Philonthus montivagus HEER, 1839: **Ba+** [KONZELMANN 2006a].
Philonthus sparsus LUC., 1849: **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **Hs+** [BRENNER 2003, BRENNER 2007]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th** [KOPETZ et al. 2004].
Philonthus atratus (GRAV., 1802): **Br+**: div. Fundorte 1980-2000 in coll. SCHÜLKE belegt [SCHÜLKE i.l. 1999, SCHÜLKE 2007b].
Philonthus alpinus EPPH., 1875: **MV**(-) [KLEEGER 2003]. **St+** [BASE 2007]. **WE**(?) [ROSE 2004].
Philonthus concinnus (GRAV., 1802): **WE**(-) [ROSE 2004].
Philonthus corsicus (GRAV., 1802): **MV+** [KLEEGER 2003, ZIEGLER 2006a, ESSER 2001a].
Philonthus caucasicus NORDM., 1837: **MV+** [KLEEGER 2003]. **WE**(-) [ROSE 2004].
Philonthus ebeninus (GRAV., 1802): **Sn**(-) [JÄKEL & GOLLOWSKI 2003]. **WE**? [ROSE 2004].
Philonthus nitidus (F., 1787): **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Philonthus cyanipennis (F., 1792): **Br?** [SCHÜLKE 2007b]. **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008].
Philonthus coerulescens (LACORD., 1835): **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Philonthus cephalotes (GRAV., 1802): **Sd** [EISINGER 2006a].
Philonthus nigriventris THOMS., 1867: **Hs+** [KÖHLER Loch]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH CONO]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Philonthus parvus SHP., 1874: **MV+** [GÜRLICH 2005, KLEEGER 2004]. **WE**(?) [ROSE 2004].
Philonthus pseudoparcus BRUNNE, 1976: **MV+** [KLEEGER 2004, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn]. **St** [SCHOLZE 2010]. **Th** [KOPETZ et al. 2004].
Philonthus nitidicollis (LACORD., 1835): **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Philonthus jurgans TOTTH., 1937: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH CONO]. **Pf+**: Mainz, Zitadelle, DOCKZKAL, VI-VIII.2006, 5 Ex. (KÖHLER det.) [coll. KÖHLER].
Philonthus confinis STRAND, 1941: **Hs+**: Hanau Umgebung, DEHNERT, 1987 [coll. HÖHNER]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **St** [SCHOLZE 2010]. **WE**(?) [ROSE in Vorber.].
Philonthus punctus (GRAV., 1802): **Hn**(-) [SPRICK et al. 2007].
Philonthus ventralis (GRAV., 1802): **Sn**(-) [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
Philonthus rufimanus ER., 1840: **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008].
Philonthus nitidulus (GRAV., 1802): **Hn**(-) [SPRICK et al. 2001].
Philonthus coprophilus JARR., 1949: **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [KLEEGER 2003].
Philonthus parvicornis (GRAV., 1802): **Ba**+: Bötzingen, Kaiserstuhl, ROSE, 4.VI.2000, 1 Ex. in Kuhdung auf einer sonnenexponierten Hangweide [ROSE i.l. 2000]. **Pf+** [ARK Bienwald].
Philonthus micantoides BEN. LOHSE, 1956: **St+** [BASE 2007].
Philonthus furcifer RENK., 1937: **WE**(-) [ROSE 2004].
Gabronthus thermarum (AUBE, 1852): **MV+** [REIKE & ENGE 2011]. **Sn**+ [VOGEL 2009].
Gabriu exiguus (NORDM., 1837): **Hs**+: Offenbach Umgebung, ZILCH, etwa 1930 [coll. HÖHNER]. **St**(-) [SCHOLZE i.l. 2008].
Gabriu tirolensis (LUZE, 1903): **No**+ [KÖHLER 2006a].
Gabriu astutus (ER., 1840): **Ba**(?) [KONZELMANN 2006b]. **Hs**(?) [BRENNER 2000]. **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011]. **Th**(?) [KOPETZ et al. 2004].
Gabriu astutoides (STRAND, 1946): **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Gabriu piliger MULS. REY, 1876: **St**+ [SCHOLZE i.l.]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].
Gabriu dieckmanni SMET., 1957: **St**+ [SCHÜLKE 2001a].
Gabriu ravinii GRID., 1920: **Hs**+: Kühkopf, HÖHNER, 1983 und 1986 [coll. HÖHNER].
Ontholestes haroldi (EPPH., 1884): **Sd**+: Jägersburg, EISINGER, IV.2011, 1 Ex. an einem schlammigen Bachufer [coll. EISINGER]. **Sn**+ [GLADITSCH 1970].
Emus hirtus (L., 1758): **Pf**(-) [ARK Bienwald]. **St**(-) [JUNG 2007].
Platydacus chalocephalus (F., 1801): **Sn**(-) [LORENZ 2005].
Dinothenarus pubescens (DEGEER, 1774): **St**(-): Dessau, SCHÖNE, 16.I.1996 [SCHÖNE i.l. 2000].
Staphylinus caesareus CED., 1798: **MV**+ [KLEEGER i.l. 2011].
Staphylinus dimidiaticornis GEMM., 1851: **WE**(-) [ROSE 2004].
Staphylinus fossor (SCOP., 1772): **MV**+ [KLEEGER i.l. 2011].
Ocypus tenebricosus (GRAV., 1846): **Br**+ [SCHÜLKE 2007b]. **Pf**(+) [KÖHLER 2008b]. **Sd**(+) [KÖHLER 2008b].
Ocypus pedemontanus (J.MÜLLER, 1924): **Pf**+ [KÖHLER 2008b]. **Rh**+ [KÖHLER 2008b]. **Sd**+ [KÖHLER 2008b].
Ocypus macrocephalus (GRAV., 1802): **Hs**+ [BRENNER 2000, SCHIAFFRATH 1999, KÖHLER & FLECHTER 2007].
Ocypus compressus (MARSH., 1802): **By**(-) [GOSSNER et al. 2008]. **Hs**+: Rodenbach, HÖHNER, 1993 [coll. HÖHNER]. **Sn**(?) [JÄKEL & GOLLOWSKI 2003].
Ocypus minax (MULS. REY, 1861): **No**(+) und **Sd**/ eine Revision aller publizierter Belege, zeigte dass es sich um hellbeinige *O. melanarius* handelte [t. SCHILLHAMMER, KÖHLER in Vorber.].
Ocypus globulifer (GEOFFR., 1785): **Sn**(?) die Art ist zu streichen, da die alte Meldung von BLOCK auf *Ocypus winkleri* zu beziehen ist [ZERCHER 2000]. **St**(-): Dessau, SCHÖNE, 13.VIII.2000 [SCHÖNE i.l. 2000].
Heterothops stiglundbergi ISRAELS., 1979: **Br**+ [SCHÜLKE 1984].
Heterothops quadripunctatus (GRAV., 1806): **MV**+ [ZIEGLER 2006a].
Heterothops minutus WOLL., 1860: **Br**(?) [RENNER 2008b, SCHÜLKE 1984, coll. SCHÜLKE, SCHÜLKE 2007b]. **Pf**+ [ARK Bienwald].
Euryporus picipes (PAYK., 1800): **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Astrapaes ulmi (ROSSI, 1790): **WE**? [ROSE 2004].
Velleius dilatatus (F., 1787): **St**(-) [JUNG 2007, DIETZE 2005].
Quedius truncicola FAIRM. LAB., 1856: **Hn**(-) [SCHMIDL et al. 2000]. **MV**+ [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH CONO]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2006].
Quedius infuscatus ER., 1840: **St**(-) [SCHOLZE 2010].
Quedius vexans EPPH., 1881: **Hs**+ [SCHIAFFRATH 2001].
Quedius balticus KÖRGE, 1960: **WE**(?) [ROSE in Vorber.].
Quedius simplicifrons FAIRM., 1861: **Br**+ [BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008].
Quedius umbrinus ER., 1839: **Br**+ [SCHÜLKE 2001a, EICHLER et al. 2002, BARNDT et al. 2002].
Quedius limbatus (HEER, 1834): **No**(/): der früher gemeldete *Quedius limbatoideus* ist synonym zu *limbatus* [KÖHLER 1994b]. **Sd**+ [EISINGER 2006a].
Quedius nemoralis BAUDI, 1848: **Wf**+ [KÖHLER Länd].
Quedius humeralis STEPH., 1832: **Wf**+ [KÖHLER Sieg].
Quedius auricomus KIESW., 1850: **Sd**(?) [SCHOLZE 2010].
Quedius lucidulus ER., 1839: **Br**+ [SCHÜLKE 2007b].
Quedius planus ER., 1840: **Hs**? [HORION 1965].
Quedius riparius KELLN., 1843: **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **St**+ [SCHOLZE 2010].
Quedius semiaeneus (STEPH., 1833): **St**(?) [SCHOLZE 2010].
Quedius paradisiacus (HEER, 1839): **St**(?) [SCHOLZE 2010]. **WE**(+) [ROSE 2004].
Quedius aridulus JANSS., 1939: **Pf**+ [ARK Bienwald]. **St**(+): die Art ist zu streichen [SCHOLZE i.l. 2009].
Quedius fulvicollis (STEPH., 1833): **MV**+ [KLEEGER 2003, KLEEGER 2009]. **WE**- [ROSE 2004].
Quedius persimilis MULS. REY, 1875: **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **St**+ [SCHOLZE 2010].
Acylophorus wagenschieberi KIESW., 1850: **MV**+ [KLEEGER 2003]. **Pf**+ [RENNER 2005b]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Acylophorus glaberrimus (Hbst., 1784): **MV**+ [KLEEGER 2003].
Atanygnathus terminalis (ER., 1839): **MV**+ [KLEEGER 2003].
Mycetoporus mulsanti GANGLB., 1895: **WE**+ [ROSE 2004].
Mycetoporus bosnicus LUZE, 1901: **Ba**+ [KÖHLER 2010d]. **Th**+ [SCHÜLKE 2009a].
Mycetoporus piceolus REY, 1882: **Br**? [SCHÜLKE 2007b].
Mycetoporus baudieri MULS. REY, 1875: **Pf**+ [ARK Bienwald].
Mycetoporus despectus STRAND, 1969: **Br**? [SCHÜLKE 2007b]. **SH**(?) [SCHÜLKE 2008a]. **WE**/ [ROSE in Vorber.].
Mycetoporus nigricollis STEPH., 1835: **Ba**(?) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Br**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000, SCHÜLKE 2007b]. **By**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Hn**(+) [SPRICK et al. 2001]. **Hs**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **MV**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Ne**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Rh**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Sd**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **SH**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Sn**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **St**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Th**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Wf**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Wt**(+) [SCHÜLKE & KOCIAN 2000].
Mycetoporus glaber (SPERK., 1835): **Br**+ [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **By**+ [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Hn**+ [SPRICK et al. 2001, SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Hs**+: Frankfurt Berger Hang, HÖHNER, 1974

- Lorch, HÖHNER, 1988 [coll. HÖHNER]. **Pf+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **SH+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Sn+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **St+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **WE+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Wf+** [DREES 2002b]. **Wt-** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000].
- Mycetoporus dispersus* SCHÜLKE & KOCIAN, 2000: **Ba+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **By+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Hn+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000, SPRICK et al. 2001]. **Pf+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **St+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000]. **Th+** [SCHÜLKE & KOCIAN 2000, KOPETZ & WEIGEL 2000, SKALE & WEIGEL 2001]. **Wt+** [KONZELMANN 2010].
- Mycetoporus forticornis* FAUV., 1872: **Wt+** [KONZELMANN 2010].
- Mycetoporus solidicornis* WOLL., 1864: **Br(+)** [SCHÜLKE 2007b]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Mycetoporus subpronus* RTT., 1909: **Br?** [SCHÜLKE 2007b].
- Mycetoporus montanus* LUZE, 1901: **St?** [SCHÜLKE 2002].
- Mycetoporus niger* FAIRM.LAB., 1856: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Mycetoporus corpulentus* LUZE, 1901: **Hs+** [FLECHTNER 2005b].
- Mycetoporus eppelsheimianus* FAGEL, 1968: **St+(-)** [SCHOLZE 2010, JUNG 2010].
- Mycetoporus brucki* (PAND., 1869): **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Ischnosoma longicornis* MAEKL., 1847: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Bryophacis rufus* (ER., 1839): **Br+** [DREGER et al. 2002]. **Sd-** [EISINGER 2010].
- Lordithon bicolor* (GRAV., 1794): **St(-)** [SCHOLZE 2010].
- Lordithon bimaculatus* (SCHIRANK, 1798): **Br+** [BARNDT 2008]. **By+** [SCHÜLKE 2000]. **Hn+** [SCHÜLKE 2000]. **Hs+** [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **Rh+** [MÜLLER & MÜLLER 2001]. **Sn+** [SCHÜLKE 2000]. **Th+** [SCHÜLKE 2000]. **WE-** [ROSE 2004]. **Wf+** [RENNER 2011].
- Lordithon pulchellus* (MANNH., 1830): **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **St+(-)**: Wörlitz, SCHÖNE, 11.VI.1996 [SCHÖNE i.l. 2000, BASE 2007].
- Carphacis striatus* (OL., 1794): **Ba+** [RENNER 2005b].
- Bolitobius formosus* (GRAV., 1806): **Br+(-)** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b]. **MV+** [KLEEGER 2003].
- Sepedophilus constans* (FOWLER, 1888): **Ba+** [KONZELMANN 2006b]. **Br!** [ESSER & KIELHORN 2005, SCHÜLKE 2007b].
- Sepedophilus pedicularius* (GRAV., 1802): **Pf!** [KÖHLER 2004b].
- Sepedophilus obtusus* (LUZE, 1902): **MV+(-)** [KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte].
- Sepedophilus nigripennis* (STEPH., 1832): **Ba+** [SCHÜLKE 1999a]. **Br+** [SCHÜLKE 1999a]. **By+** [SCHÜLKE 1999a]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Ne+** [SCHÜLKE 1999a]. **No+** [SCHÜLKE 1999a, KOLKEBECK 2010]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Rh+** [SCHÜLKE 1999a]. **SH+** [ZIEGLER 2004, SCHÜLKE 1999a]. **Wf+** [SCHÜLKE 1999a]. **Wt+** [SCHÜLKE 1999a].
- Sepedophilus binotatus* (GRAV., 1802): **Sd+** [MÖLLER 2005]. **St+?** [SCHOLZE 2010].
- Sepedophilus bipustulatus* (GRAV., 1802): **Hs+(/)** [BRENNER 2005]. **Pf+** [ARK Bienenwald, RENNER 2011].
- Tachyporus abdominalis* (F., 1781): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE?** [ROSE 2004].
- Tachyporus pallidus* SHP., 1871: **Ba+** [HENNICKE 2004]. **Sn+** [VOGEL 2010].
- Tachyporus tersus* ER., 1839: **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010].
- Tachyporus ruficollis* GRAV., 1802: **Br+?** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b]. **MV-** [KLEEGER 2003].
- Tachyporus scitulus* ER., 1839: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Tachyporus corpulentus* SAHLB., 1876: **MV+(/)** [KLEEGER 2003, KÖHLER Rüte]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Lamprindodes haematopierus* (KR., 1857): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Tachinus lignorum* (L., 1758): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Tachinus proximus* KR., 1855: **Br+(-)** [BARNDT 2008].
- Tachinus marginatus* GYLL., 1810: **No!** [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
- Tachinus bipustulatus* (F., 1792): **Ba+** [BENSE 2006b]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+(-)** [KÖHLER Rüte].
- Tachinus scapularis* STEPH., 1832: **Wt+(-)**: die Art ist zurückzustufen, da der zugrundeliegende neuere Beleg der coll. DYNORT fehlbestimmt ist [HORION 1951, KONZELMANN i.l. 2001].
- Tachinus rufipennis* GYLL., 1810: **St+(-)** [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Coproporus colchicus* KR., 1858: **Ba!**: als *colchicus* gemeldet, aber der seinerzeit noch unerkannte *C. immigrans* [SZALLIES 2001].
- Coproporus immigrans* SCHÜLKE, 2007: **Ba+**: als *colchicus* gemeldet, aber der seinerzeit noch unerkannte *C. immigrans* [SCHÜLKE 2007a]. **Br+** [SCHÜLKE 2007a, SCHÜLKE 2007b]. **Ne+** [SCHÜLKE 2007a]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Sd+** [EISINGER 2007]. **SH+** [SCHÜLKE 2007a]. **Sn+** [SCHÜLKE 2007a]. **Th+** [SCHÜLKE 2007a].
- Cilea silphoides* (L., 1767): **MV+** [KLEEGER 2003, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999].
- Cilea exilis* (BOHEMAN, 1848): **MV+** [REIKE & ENGE 2011]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [VOGEL 2009].
- Deinopsis erosa* (STEPH., 1832): **St+(-)** [BASE 2007, JUNG 2001].
- Myllaena kraatzii* SHP., 1871: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008].
- Myllaena elongata* (MATTH., 1838): **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Myllaena brevicornis* (MATTH., 1838): **Br+** [RUSCH 1993/94, EICHLER & PÜTZ 2000, SCHÜLKE 2001a, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b].
- Myllaena gracilis* (MATTH., 1838): **Rh+(/)** [FRANZEN 1995]. **St+(-)** [BASE 2007, SCHÜLKE 2001a].
- Myllaena masoni* MATTH., 1883: **SH+(/)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Diglotia submarina* (FAIRM.LAB., 1854): **MV+**: Boltenhangen, Halbinsel Tarnewitz/Wismarbuch, STUMPF, VI-VII.1996, 2 Ex. [STUMPF i.l. 1999].
- Pronomaea korgei* LOHSE, 1974: **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **Sn+** [VOGEL 2010].
- Oligota granaria* ER., 1837: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, KLEEGER 2009, KLEEGER & BUSCH 2010]. **Pf+** [RENNER 1999a].
- Oligota parva* KR., 1862: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte].
- Oligota inflata* MANNH., 1830: **Br+(-)** [BEIER & KÖRGE 2001, RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **St+(-)** [GRUSCHWITZ 2003].
- Holobus apicatus* (ER., 1837): **Br+(-)** [DREGER et al. 2009, RENNER 2008b]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn]. **Sn+** [VOGEL 2010]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Cypha imitator* (LUZE, 1902): **Hs+** [BRENNER 2007]. **Ne+** [MEYBOHM 1999b]. **Sn+** [VOGEL 2010]. **Wf+** [RENNER 1999c].
- Cypha tarsalis* (LUZE, 1902): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Cypha ovulum* (HEER, 1839): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Cypha discoidea* (ER., 1839): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte].
- Cypha suecica* (PALM, 1935): **By+** [ASSING 2004]. **Sn+** [VOGEL 2010].
- Cypha nitida* (PALM, 1935): **Hs+** [RENNER 2002]. **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Wf+** [RENNER 2011].
- Cypha seminula* (ER., 1839): **Hs+(-)** [SCHAFFRATH 2010b]. **Pf+(-)** [ARK Bienenwald]. **Sn+?** [LORENZ 2005].
- Cypha punctum* (MOTSCH., 1857): **Ba+**: Griesheim, KNAPP, 18.VI.2004, 1 Ex. (Wolf-SCHWENNINGER det.) [KNAPP 2009]. **Hs+** [KÖHLER Gold].
- Gyrophæna rousi* DVORAK, 1966: **St+** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [ROSE 2004].
- Gyrophæna nana* (PAYK., 1800): **Pf+(-)** [ARK Bienenwald]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Gyrophæna pseudonana* STRAND, 1939: **Ba+** [RENNER 2003b]. **No!** (?): Nachweis aus Gerolstein (KOCH 1992) zur falschen Region gestellt [KÖHLER 2006a]. **Rh?**: weiter fraglich, da Belege noch nicht geprüft [KÖHLER 2006a]. **Sn+** [VOGEL 2010]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Gyrophæna rugipennis* MULS.REY, 1861: **Ba+(-)**: die Art muss im Status zurückgestuft werden, da eine neuere Meldung auf einem EDV-Erfassungsfehler beruht [HORION 1967, KLESS i.l. 2001]. **Wf+** [RENNER 2003a].
- Gyrophæna poveri* CROTCH, 1866: **Br+(-)** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **By+** [HERBIG in Vorber.].
- Gyrophæna munsteri* STRAND, 1935: **Hs+**: Braunfels, KUNZ, 2009 [coll. KUNZ]. **No+(-)**: Erkelenz, HORION, X.1928, 1 Ex. (WÜSTHOFF det.) wird von KOCH (1968) genannt, von HORION (1955) als fraglich bezeichnet (*williamsi?*), Beleg im Krieg zerstört? [HORION 1967, KÖHLER NWZ9]. **Rh+** [coll. KÖHLER]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Gyrophæna congrua* ER., 1837: **St+**: Dessau, SCHÖNE, 19.VIII.2000 [SCHÖNE i.l. 2000]. **Wt+?**: die Art ist vorerst zu streichen, die Quelle „HORION 1951“ bezieht sich auf *Gyrophæna fasciata*, die zweite Quelle, ein Beleg in der coll. DYNORT, erwies sich als Fehlbestimmung [KONZELMANN i.l. 2001].
- Gyrophæna hansenii* STRAND, 1946: **Br+**: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999, SCHÜLKE 2007b].
- Gyrophæna williamsi* STRAND, 1935: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b].

- Gyrophæna fasciata* (MARSH., 1802): **Pf+** [KÖHLER 2004b].
Gyrophæna bihatata THOMS., 1867: **WE+**(-) [ROSE 2004].
Gyrophæna lucidula ER., 1837: **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **St+**(-):
 Wenddorf, BÜCHE 7.VI.1998, zahlreich und zum Teil frisch ent-
 wickelt, an *Pholiota spec.* an Weide - Rogätz, BÜCHE 12.VI.1998,
 zahlreich [BÄSE 2007, BÜCHE i.l., SCHÜLKE 2001a].
Gyrophæna jolyi WENDELER, 1924: **Sd+**(/) [MÖLLER 1998b]. **St+**:
 Rogätz, BÜCHE 12.VI.1998, Hangwall an der Ohremündung, in
 einiger Anzahl, z.T. frisch entwickelt, an Seitlingen (*Pleurotus*
spec.) an einem Ulmenstumpf [BÜCHE i.l., RENNER 1999a].
WE+(-) [ROSE 2004].
Gyrophæna polita (GRAV., 1802): **MV+** [KÖHLER 2003a, ZIEGLER
 2006a]. **Sd+**(-) [MÖLLER 1998b]. **St+**(-) [JUNG 2007].
Gyrophæna boleti (L., 1758): **MV+** [ZIEGLER 2004, ZIEGLER 2006a,
 GÜRLICH CONO]. **Ne+**(/) [ZIEGLER 2004]. **SH+**(/) [ZIEGLER 2004].
Agaricohæra latissima (STEPH., 1832): **Ne+**(/) [BURGARTH 2003].
SH+ [MEYBOHM 2006]. **St+** [JUNG 2001].
Placusa complanata ER., 1839: **MV+** [GÜRLICH CONO, GÜRLICH
 User].
Placusa incompleta SJÖB., 1934: **MV+** [GÜRLICH Zipp]. **St+**
 [SCHOLZE 2010]. **WE+**(-) [ROSE 2004]. **Wt+**(?) [FRANK & KON-
 ZELMANN 2002].
Placusa pumilio (GRAV., 1802): **St+**(-) [SCHOLZE 2010].
Silusa rubiginosa ER., 1837: **MV+**(-) [GÜRLICH Vilm].
Phytosus spinifer CURT., 1838: **MV+** [KLEEGER 2003b].
Phytosus balticus KR., 1859: **MV+**(-) [ESSER 2001a].
Rhopalocerinia clavigera (SCRIBA, 1859): **Ba+** [KONZELMANN 2006b,
 RENNER 2002]. **Ne+** [ZIEGLER 2006c]. **Rh+** [KÖHLER 2006b]. **St+**
 [JUNG 2007].
Pseudomicrodota jelineki (KRASA, 1914): **By**(+) [HOFMANN & KÖH-
 LER 2010].
Thecturota marchii (DODERO, 1922): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN
 2002]. **Hs+**: Hanau Umgebung, DEHNERT, 1972 [coll. HÖHNER].
MV+ [ESSER 2002b, KÖHLER Rüte]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **St+**:
 Rösslau-Streetz, RENNER, 27.IV.2009, 1 Ex. im Autokescher
 [coll. RENNER]. **Th+** [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2004].
Leptusa norvegica STRAND., 1941: **Br+** [NICOLAI & MACHANDER
 2000]. **Hs+** [SCHAFFRATH 2001]. **Sn+** [VOGEL 2010].
Leptusa ruficollis (ER., 1839): **Sn+**(-) [LORENZ 2005].
Leptusa flavicornis BRANCS., 1874: **Wt+** [SZALLIES & AUSMEIER
 2001b].
Leptusa gaisbergeri KAHLEN & PACE, 1993: **By+** [SZALLIES & AUS-
 MEIER 2001b, SCHMIDL & BUSSLER 2004]. **Wt+** [SZALLIES & AUS-
 MEIER 2001b].
Leptusa laevicauda SCHEERP., 1958: **By+**(-) [SCHMIDL & BUSSLER
 2004].
Euryusa optabilis HEER, 1839: **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER
 Bohn, MÖLLER 2003].
Euryusa sinuata ER., 1837: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+**(-) [SCHOLZE
 2010, JUNG 2007b]. **WE+**(-) [BELLMANN & ESSER 2006].
Euryusa coarctata MÄRK., 1844: **Br+**(-) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vor-
 ber.]. **Pf+**(-) [KÖHLER Bien].
Tachysuda gracilis (ER., 1837): **MV+** [KLEEGER 2009]. **St+** [JUNG
 2007].
Bolitochara bella MÄRK., 1844: **MV+**(-) [KÖHLER 2003a]. **SH+**(-)
 [ZIEGLER 2006c]. **St+**(-) [JUNG 2007, BÄSE 2007].
Bolitochara mulsanti SHP., 1875: **Hn+**(?) [SCHMIDT et al. 2000].
Bolitochara pulchra (GRAV., 1806): **WE+**(-) [ROSE 2004].
Autalia impressa (OL., 1795): **Hn+**(?) [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+**
 (-) [GÜRLICH User].
Autalia puncticollis SHP., 1864: **Br+** [SCHÜLKE 2007b].
Myrmecocephalus concinna (ER., 1839): **MV+** [ZIEGLER 2006a].
St+: Dessau, SCHÖNE, 21.VI.1992 [SCHÖNE i.l. 2000, JUNG
 2007b].
Falagrioma thoracica (CURT., 1833): **WE+** [KUNZE & KACHE
 1998].
Bohemellina flavipennis (CAMERON, 1920): **Ba+** [RENNER 2005b].
Tachysuda objecta (MULS.REY, 1870): **Pf+** [KÖHLER 2004b].
Tachysuda concinna HEER, 1839: **Ba+** [PASNIK 2006]. **Br+** [PASNIK
 2006, SCHÜLKE 2007b]. **By-** [PASNIK 2006]. **MV+** [PASNIK
 2006]. **Ne+**: Wendland, MELBER, III.1991 - Wendland, Penkefitz,
 ASSING, 24.VIII.1989 [coll. ASSING]. **Sn+** [PASNIK 2006]. **St+**
 [PASNIK 2006]. **Th+** [PASNIK 2006]. **Wt-** [PASNIK 2006].
Tachysuda constricta (ER., 1837): **MV+**(-) [ZIEGLER 2006a].
Tachysuda coarctata (ER., 1837): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Tachysuda coarctatoides PASNIK, 2006: **Ba-** [PASNIK 2006]. **By-** [PAS-
 NIK 2006].
Ischnopoda leucopus (MARSH., 1802): **Pf+**(-) [KÖHLER 2004b].
Ischnopoda umbratica (ER., 1837): **WE+** [KUNZE & KACHE 1998].
Dasygnypeta velata (ER., 1837): **WE+**(-) [ROSE 2004].
Gnypeta caerulea (SAHLB., 1831): **Wt-**: Meldung bei FRANK & KON-
 ZELMANN 2002, basierend auf coll. KÖSTLIN beruht auf Fehlbe-
 stimmung. Der Beleg gehört zu *Ischnopoda leucopus* (WOLF-
 SCHWENNINGER det.) [WOLF-SCHWENNINGER i.l.].
Gnypeta ripicola (KIESW., 1844): **St+**(-) [ESSER 2001c, ZIEGLER
 2006b]. **WE+**(-) [ROSE 2001, ROSE 2004].
Gnypeta carbonaria (MANNH., 1830): **Pf+**(-) [ARK Bienenwald]. **Wt-**
 (+): die Art muss im Status vorerst zurückgestuft werden, da die
 Quellen sich auf alte Belege beziehen [HORION 1951, coll. JÜN-
 GER].
Gnypeta rubrior TOTTH., 1939: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Pf+**
 [ARK Bienenwald].
Brachyusa concolor (ER., 1839): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Pf+**
 [ARK Bienenwald].
Dacriola fallax (KR., 1856): **No+**(-) [WENZEL 1997]. **Th+**(-) [RENNER
 2002].
Callicerus rigidicornis (ER., 1839): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Th+**
 [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Callicerus kaufmanni EPPH., 1887: **Sn**(?): die Angabe für Sachsen
 beruht mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer Fehldetermina-
 tion; die Art ist daher für Deutschland zu streichen [ASSING &
 SCHÜLKE 2001].
Schistoglossa viduata (ER., 1837): **Th+**(-) [APPEL 2003].
Schistoglossa gemina (ER., 1837): **St-** [SCHOLZE 2010].
Schistoglossa curtispennis (SHP., 1869): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL
 2000]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
Boreophila hercynica (RENN., 1936): **WE+**(-) [ROSE 2004].
Boreophila eremita (RYE, 1866): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN
 2002].
Hydrosinecta eximia (SHP., 1869): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+**
 [VOGEL 2010]. **Th+** [RENNER 2002]. **Wf+** [KÖHLER Sieg].
Hydrosinecta fragilis (KR., 1854): **Ba+**(-) [KONZELMANN 2006a].
By+(-) [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Wt+**(-): die Art muss im Sta-
 tus zurückgestuft werden, da der zugrundeliegende Beleg in der
 coll. JÜNGER aus dem Jahr 1938 stammt [coll. JÜNGER, KONZEL-
 MANN i.l. 2001].
Hydrosinecta longula (HEER, 1839): **Br+** [EICHLER et al. 2002,
 RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2001a]. **By+** [HOFMANN & KÖHLER
 2010]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
Hydrosinecta paralongula LOHSE, 1988: **St+**: Rösslau-Steuz, Elb-
 ufer, RENNER, 26.IV.2009, 15 Ex. im Ufersand [coll. RENNER].
Hydrosinecta delicatula (SHP., 1869): **Br+** [SCHÜLKE 2001a]. **By+**(-)
 [HOFMANN & KÖHLER 2010].
Hydrosinecta subtilissima (KR., 1854): **Ba+** [RENNER 2005b].
Br+ [SCHÜLKE 2001a]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf+** [KÖHLER
 Bien].
Hydrosinecta septentrionum (BENICK, 1969): **Ba+** [FRANK & KON-
 ZELMANN 2002, RENNER 2005b].
Hydrosinecta linkei BENICK, 1969: **Br**(?) [SCHÜLKE 2007b].
Aloconota eichhoffi (SCRIBA, 1867): **By+**(-) [HOFMANN & KÖHLER
 2010].
Aloconota planifrons (WTRL., 1864): **By+**(-) [HOFMANN & KÖHLER
 2010]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+**(-)
 [SCHOLZE 2010].
Aloconota cambrica (WOLL., 1855): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
St+(-) [JUNG 2007].
Aloconota pfefferi (ROUB., 1929): **By+**(-) [HOFMANN & KÖHLER
 2010].
Aloconota currax (KR., 1856): **Br+** [BARNDT 2010].
Aloconota sulcifrons (STEPH., 1832): **St+**(-) [SCHOLZE 2010]. **WE+**
 (-) [ROSE 2004].
Aloconota insecta (THOMS., 1856): **MV+** [KÖHLER Bohn, PESCHEL
 1991f].
Aloconota languida (ER., 1837): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf+** [ARK
 Bienenwald, RENNER 2011]. **Wf+**(-) [REHAGE & TERLUTTER 2003].
Aloconota ultima (BENICK LOHSE, 1959): **St+** [SCHOLZE 2010, RENNER
 2008b].
Aloconota longicollis (MULS.REY, 1852): **MV+** [GÜRLICH 2005a].
WE+(-) [ROSE 2004].
Aloconota coulsoni (LAST, 1952): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Th+**
 [APPEL 2003, KOPETZ et al. 2004]. **Wt+** [KONZELMANN 2006a].
Amischa forcipata MULS.REY, 1873: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE
 2007b]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Lypoglossa lateralis (MANNH., 1830): **St-** [SCHOLZE 2010].
Notothecta confusa (MÄRK., 1844): **Hn+**(-) [SPRICK et al. 2001].
Hs+(-) [BRENNER 2007]. **WE+**(-) [ROSE 2004].

- Neohilara subterranea* (Muls.Rey, 1853): **Pf+(-)** [Köhler Wein]. **St+(-)**: Obetal südl. Hundsbürg, BÜCHE, VII-VIII.2000, 1 Ex. in Barberfallen auf einer Wiesenbrache [BÜCHE i.l.].
- Dochmonota clancula* (Er., 1837): **St+(-)** [SCHOLZE 2010]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Dochmonota rudiventris* (Epph., 1886): **MV+** [Köhler Rüte]. **WE+** [BELLMANN et al. 2003, ROSE 2004].
- Tomoglossa luteicornis* (Er., 1837): **St+(-)** [SCHOLZE 2010]. **WE+?** [ROSE 2004].
- Taxicera sericophila* (BAUDI, 1869): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Taxicera deplanata* (Grav., 1802): **Sn+** [LORENZ 2001b]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Dinaraea linearis* (Grav., 1802): **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Dadobia immersa* (Er., 1837): **MV+(-)** [Köhler 2003a, GÜRLICH User]. **Sd+** [MÖLLER 1998b].
- Bellatheta fatrica* ROUB., 1928: **Sn+** [VÖGEL 2007a].
- Plataraea elegans* (Benick, 1934): **Rh+** [WAGNER 2002a].
- Plataraea nigrifrons* (Er., 1839): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sd?** [MOSBACHER 1987 fraglich]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Plataraea dubiosa* (Benick, 1934): **Br+(-)** [RUSCH 1993/94]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
- Liogluta granigera* (Kiesw., 1850): **MV+** [GÜRLICH Cono]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Liogluta longiuscula* (Grav., 1802): **MV+(-)** [Köhler Bohn]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald].
- Atheta pseudoelongatula* BERNH., 1907: **Br+** [VÖGEL 2007b, SCHÜLKE 2007b]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [VÖGEL 2007b]. **WE+** [VÖGEL 2007b].
- Atheta hygrobia* (Thoms., 1856): **MV+**: Drewitz, Drewitzer See, BÜCHE, 2.IX.2002, 1 Ex. im Röhricht auf Algenwatzen [ZIEGLER 2006a, BÜCHE i.l.]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta hygrotopora* (Kr., 1856): **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **WE+?** [ROSE 2004].
- Atheta luridipennis* (Mannh., 1830): **MV+(-)** [Köhler Rüte].
- Atheta terminalis* (Grav., 1806): **Hs+**: Offenthal - Messel Autokoscher, VOGT, 1962 [coll. HÖHNER]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **St+(-)** [JUNG 2001, SCHÜLKE 2001a]. **Wt+** [KONZELMANN 2010].
- Atheta grisea* (Thoms., 1852): **St+** [JUNG 2001].
- Atheta botildae* BRUNDIN, 1954: **MV+** [Köhler Rüte]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta imolosensis* BERNH., 1940: **St+** [SCHÜLKE 2001a].
- Atheta gyllenhali* (Thoms., 1856): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta melanocera* (Thoms., 1856): **St+(-)** [SCHÜLKE 2001a, BÄSE 2007].
- Atheta sequeania* (Bris., 1859): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta debilis* (Er., 1837): **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010].
- Atheta debileoides* STRAND, 1962: **SH(+)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Atheta parca* (Muls.Rey, 1873): **Br+(-)** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 1999b, DREGER et al. 2002, SCHÜLKE 2007b].
- Atheta kaiseriana* BRUNDIN, 1943: **Sn+** [VÖGEL 2010].
- Atheta ripicola* HANSEN, 1932: **Br+** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008].
- Atheta luteipes* (Er., 1837): **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta fleischeri* Epph., 1892: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Atheta vilis* (Er., 1837): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Pf+** [Köhler Bohn]. **St+** [ZIEGLER 2006b]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Atheta latipennis* (Thoms., 1856): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta fungivora* (Thoms., 1867): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta monticola* (Thoms., 1852): **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b]. **MV+** [Köhler Bohn, ZIEGLER 2006a]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta excellens* (Kr., 1856): **Ba+**: Rinken, Feldberg-Nordhang, ROSE, 3.VI.2000, 1 Ex. aus Totholz- und Rindenstreu gesiebt [ROSE i.l. 2000, FRANK & KONZELMANN 2002]. **St+(-)** [BÄSE 2007].
- Atheta spatula* (FAUV., 1872): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta euryptera* (STEPH., 1832): **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta divisa* (MÄRK., 1844): **St+(-)** [BÄSE 2007]. **Wt+** [KONZELMANN 2010].
- Atheta liturata* (STEPH., 1832): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2005b]. **MV+** [Köhler 2003a]. **St+(-)** [BÄSE 2007, GRUSCHWITZ 2003].
- Atheta nigrigula* (Grav., 1802): **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta corvina* (Thoms., 1856): **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta nitela* BRUNDIN, 1948: **St-** [SCHOLZE 2010].
- Atheta tricholomatobia* SEMENOV, 2002: **Hs+** [VÖGEL 2007b].
- Atheta soedermani* BERNH., 1931: **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010]. **Sn+** [VÖGEL 2010].
- Atheta fehsei* BENICK, 1970: **St(?)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta ammanni* BENICK, 1970: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta puberula* (SHp., 1869): **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Atheta kochi* ROUB., 1937: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta speluncicollis* BERNH., 1909: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta foveicollis* (Kr., 1856): **Hs+** [HOFMANN i.l. 2010].
- Atheta benickiella* BRUNDIN, 1948: **MV+** [Köhler Bohn]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
- Atheta amicorum* LOHSE, 1973: **MV+** [ESSER 2001a].
- Atheta pittonii* SCHEEP., 1950: **MV+** [Köhler Bohn].
- Atheta inquinula* (Grav., 1802): **MV+**: Marxhagen, BÜCHE, 11. IX.2002, 1 Ex. in Kuhdung und 20.IX.2002, 1 Ex. an Aasköder [Köhler 2003a, KÖHLER Rüte, BÜCHE i.l.]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta atricolor* (SHp., 1869): **Ne(+)**: Keine Belege vorhanden, vermutlich irrtümlich gemeldet (MEYBOHM, 2000) [MEYBOHM 2000].
- Atheta ganglbaueri* BRUNDIN, 1948: **Hs+**: Darmstadt, im Garten, VOGT, 1960 [coll. HÖHNER]. **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
- Atheta excelsa* BERNH., 1911: **Hs+**: Publikation in FLECHTNER 2000, aber *Atheta nitella* [FLECHTNER 2003b].
- Atheta subtilis* (SCRIBA, 1866): **St+(-)**: Blankenburg, BÖHME, 24. VI.1992, 1 Ex. (VÖGEL det.) [coll. BÖHME].
- Atheta aegra* (Heer, 1841): **Br+** [BARNDT 2008]. **MV+** [Köhler Rüte].
- Atheta atomaria* (Kr., 1856): **Ba+** [RENNER 2003b, RENNER 2011]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta excisoides* BENICK, 1974: **Ba+** [VÖGEL 2007b]. **Sn+** [VÖGEL 2007b].
- Atheta kerstensi* BENICK, 1968: **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta minuscula* (Bris., 1859): **Pf+**: Schaid, Bienwald, NWR Stuttgart, KÖHLER, 30.V.1996, 1 Ex. (det. et coll. VÖGEL) [VÖGEL i.l. 2001]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Atheta postcognita* BENICK, 1970: **Ba+** [RENNER 2011].
- Atheta glabratica* THOMS., 1867: **By+(-)** [GOSSNER et al. 2008, LIEPOLD 2003]. **MV+** [GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta indubia* (SHp., 1869): **Br+** [DREGER et al. 2002, RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta liliputana* (Bris., 1860): **By+** [LIEPOLD 2003]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta boreella* BRUNDIN, 1948: **MV+** [Köhler Rüte]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta acutivertens* VÖGEL, 2003: **Br+** [VÖGEL 2003, SCHÜLKE 2007b]. **Hn+** [VÖGEL 2003]. **Sn+** [VÖGEL 2010].
- Atheta cribrata* (Kr., 1856): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Pf+** [RENNER 2005a]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta mortuorum* THOMS., 1867: **Hs+** [Köhler Loch]. **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta testaceipes* (Heer, 1841): **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
- Atheta pervagata* BENICK, 1974: **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002].
- Atheta dilaticornis* (Kr., 1856): **Br+** [SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008]. **Hs+(-)** [SCHAFFRATH 1999].
- Atheta voeslaensis* BERNH., 1944: **Ba(?)**: bei dem von SZALLIES (1998) als *viennensis* publizierten und im ersten Nachtrag als fraglich gekennzeichneten Stück handelt es sich um *Atheta basicornis* [NEUMANN mdl. 1999]. **Sn+** [PESCHEL 2007, coll. VÖGEL]. **St+**: Rösslau-Streetz, RENNER, 27.IV.2009, 1 Ex. im Autokoscher [coll. RENNER]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
- Atheta pandionis* SCHEERPELTZ, 1958: **Br+** [ASSING & SCHÜLKE 2001, SCHÜLKE 2007b].
- Atheta hybrida* (SHp., 1869): **MV+** [GÜRLICH 2005a, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta hansseni* STRAND, 1943: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Atheta subglabra* (SHp., 1869): **Ba+** [RENNER 2005b, RENNER 2011]. **By+(-)** [LIEPOLD 2003]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **WE+(-)** [ROSE 2004].
- Atheta serrata* BENICK, 1938: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Sn+** [VÖGEL 2010]. **Th+** [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2004].

- Atheta melanaria* (MANNH., 1830): **Br?**: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999, SCHÜLKE 2007b]. **Hs+**(-): Messel - Eppertshausen Autokescher, VOGT, 1962 [LOHSE det.]. coll. VOGT im SMF]. **Sn+** [VOGEL 2010]. **St+**(-) [SCHOLZE i.l. 2011]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Atheta clientula* (ER., 1839): **St+**(-) [SCHOLZE i.l. 2008]. **Th+**(-) [APFEL 2003].
- Atheta fussi* BERNH., 1908: **Pf+** [RENNER 2005a].
- Atheta orbata* (ER., 1837): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Atheta negligens* (MULS.REY, 1873): **MV+** [KÖHLER Bohn]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta gilvicollis* SCHEERP., 1949: **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta subsinuata* (ER., 1839): **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Atheta canescens* (SHP., 1869): **St+**(-) [JUNG 2007].
- Atheta sordidula* (ER., 1837): **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b].
- Atheta exsecta* BENICK, 1974: **Br?**: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999].
- Atheta brunneipennis* (THOMS., 1852): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta castanoptera* (MANNH., 1831): **Br+** [DREGER et al. 2009, MÖLLER 2003]. **MV+**(-) [KÖHLER 2003a]. **St+**(-) [SCHOLZE 2007].
- Atheta aquatilis* (THOMS., 1867): **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **WE+** [KUNZE & KACHE 1998].
- Atheta incognita* (SHP., 1869): **MV+** [KÖHLER Rüte]. **St+**(-) [SCHOLZE 2007]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Atheta fimorum* (BRIS., 1860): **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010].
- Atheta intermedia* (THOMS., 1852): **Ba+** [RENNER 2005b]. **St+**(-) [RENNER 2008b]. **Th+**(-) [APFEL 2003, RENNER 2002].
- Atheta procerca* (KR., 1856): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Atheta basicornis* (MULS.REY, 1852): **MV+**(-) [GÜRLICH Cono]. **WE+**(-) [ROSE 2004]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002, KONZELMANN 2010].
- Atheta myrmecobia* (KR., 1856): **Pf+**(-) [KÖHLER 2000d, RENNER 2005a].
- Atheta nidicola* (JOH., 1914): **Hs+** [SCHAFFRATH 1999]. **MV+** [GÜRLICH User]. **St+**(-) [BASE 2007]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Atheta allocera* EPH., 1893: **By+**(-) [LIEPOLD 2003].
- Atheta boetophilina* (THOMS., 1856): **WE+**(-) [ESSER 2001d, ROSE 2004]. **Wf+** [RENNER 1999c].
- Atheta autumnalis* (ER., 1839): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf+**(-) [ARK Bienenwald].
- Atheta diversa* (SHP., 1869): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Atheta pilicornis* (THOMS., 1852): **MV+** [GÜRLICH 2005a, MÖLLER 2003]. **Sd+** [EISINGER 2001].
- Atheta paracrossicornis* BRUNDIN, 1954: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b].
- Atheta pfundleri* BENICK, 1940: **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Wf+** [FELDMANN 2006].
- Atheta macrocera* (THOMS., 1856): **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Th+**(-) [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Atheta puncticollis* BENICK, 1938: **Ba+** [RENNER 2011]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [KÖHLER Holt, RENNER 2004].
- Atheta cauta* (ER., 1837): **St+**(-) [SCHOLZE 2010].
- Atheta ischnocera* (THOMS., 1870): **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br+** [RENNER 2002, SCHÜLKE 2007b]. **Pf+** [ARK Bienenwald].
- Atheta setigera* (SHP., 1869): **St+** [SCHÜLKE i.l. 2011]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Atheta laevana* (MULS.REY, 1852): **MV+**(-): Marxhagen, BÜCHE, 8. und 10.IX.2002, zahlreich an Katzenkot-Köder im Wald [KÖHLER Rüte, BÜCHE i.l.]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Atheta subrugosa* (KIESW., 1848): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Atheta putrida* (KR., 1856): **Br+** [RUSCH 1993/94, BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b].
- Atheta europaea* LK., 1984: **Br+** [RUSCH 1993/94, BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008].
- Atheta cinnamoptera* (THOMS., 1856): **MV+**(-): Marxhagen, BÜCHE, 8. und 10.IX.2002, je 1 Ex. an Katzenkot-Köder im Wald [BÜCHE i.l.]. **MV+** [GÜRLICH Cono].
- Atheta paracipipennis* BRUNDIN, 1954: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b].
- Acrotone exigua* (ER., 1837): **Hs+**: Roßdorf, Ludwigsteich, VOGT, 1958 - Viernheimer Heide, HÖHNER, 1995 und 1996 [coll. HÖHNER].
- Acrotone sylvicola* (KR., 1856): **Ba+**: Karlsruhe-Neureut, Rheinauwald, BÜCHE, 8.XI.1993 [BÜCHE i.l.]. **Hs+**: Kühkopf, VOGT, 1952 - Hanau, Gr. Bulau, HÖHNER, 1993 [coll. HÖHNER]. **Pf+** [KÖHLER Bien]. **Sn+** [VOGEL 2010].
- Acrotone convergens* (STRAND, 1958): **Br?**: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999, SCHÜLKE 2007b]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+** [SCHOLZE 2010]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Acrotone obfusca* (GRAV., 1802): **Pf+** [ARK Bienenwald].
- Acrotone consanguinea* (EPH., 1875): **MV+**(-) [MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **No+**(-) [coll. KÖHLER].
- Acrotone pseudotenera* (CAM., 1933): **Br+** [BEIER & KÖRGE 2001, SCHÜLKE 2007b]. **MV+**: Graal-Müritz, BÜCHE, 3.X.2002, im durchsäften Mulm einer von *Cossus cossus* befallenen Eiche [BÜCHE i.l.]. **Ne+**: Freihafen/Hohe Schaar, ZIEGLER, 10.7.94, im Autokescher [TOLASCH i.l.2001, RENNER 2007]. **No+** [WENZEL 2003]. **Pf+** [ARK Bienenwald, RENNER 2011]. **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002]. **SH+** [RENNER 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+** [ROSE 2000].
- Acrotone piceorufa* (MULS.REY, 1873): **Br?**(-): die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999].
- Acrotone parens* (MULS.REY, 1852): **MV+** [KÖHLER Rüte].
- Acrotone muscorum* (BRIS., 1860): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+**(-) [SCHOLZE 2010].
- Acrotone benicki* (ALLEN, 1940): **MV+** [GÜRLICH Cono].
- Acrotone parvula* (MANNH., 1831): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+**(-) [BASE 2007]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Aleuonota rufotestacea* (KR., 1856): **Br?**(+) [SCHÜLKE 2007b]. **Hs+**(-) [SCHAFFRATH 1999, FLECHTNER 2000]. **MV+** [GÜRLICH 2005a].
- Aleuonota elegantula* (BRIS., 1863): **Br+** [SCHÜLKE 2007b, ASSING & WUNDERLE 2008]. **Hn+** [ASSING & WUNDERLE 2008]. **Hs+** [ASSING & WUNDERLE 2008]. **No+** [ASSING & WUNDERLE 2008]. **Pf+** [coll. KÖHLER]. **Rh+** [coll. KÖHLER]. **Wf+** [ASSING & WUNDERLE 2008].
- Aleuonota gracilenta* (ER., 1839): **Hs+**(-) [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+** [ASSING & WUNDERLE 2008]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Pachnida nigella* (ER., 1837): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Trichiusa immigrata* LOHSE, 1984: **Pf+** [ARK Bienenwald].
- Thamaraea cinnamomea* (GRAV., 1802): **St+**(-): Dessau, SCHÖNE, 4.V.2000 [SCHÖNE i.l. 2000].
- Thamaraea hospita* (MÄRK., 1844): **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+**(-) [LORENZ 2005]. **St+**(-): Dessau, SCHÖNE, 4.V.2000 [SCHÖNE i.l. 2000]. **WE+**(-) [ROSE 2004].
- Zyras collaris* (PAYK., 1800): **St+**(-) [BASE 2007].
- Zyras fulgidus* (GRAV., 1806): **Ba+** [SZALLIES 2001]. **St+**(-) [SCHOLZE 2010].
- Zyras haworthi* (STEPH., 1832): **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Zyras erraticus* (HAGENS, 1863): **St+** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Zyras funestus* (GRAV., 1806): **Pf+**(-) [KÖHLER 2004a].
- Zyras similis* (MÄRK., 1842): **St+**(-) [SCHOLZE 2010]. **WE?**(?) [ROSE in Vorber.].
- Zyras cognatus* (MÄRK., 1842): **Pf+**(-) [KÖHLER Bien]. **St+**(-) [JUNG 2007, SPRICK 2000, BASE 2007].
- Zyras lugens* (GRAV., 1802): **Hs+**(-): Viernheimer Heide, BÖHME, 26.V.80, 1 Ex. - Traisa-Trautheim, HANSEN, 14.V.63, 1 Ex. (BÖHME det.) [SCHAFFRATH 1999, coll. BÖHME].
- Zyras laticollis* (MÄRK., 1844): **MV+**(-) [KÖHLER 2003a].
- Myrmecia plicata* (ER., 1837): **Br+** [BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b].
- Lomechusoides strumosa* (F., 1792): **MV+** [ZIEGLER 2006a, KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Lomechusa paradoxa* GRAV., 1806: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Lomechusa pubicollis* (BRIS., 1860): **Hs+**: Schlüchtern, Hohenzell, BORNHOLDT, 1987 [coll. HÖHNER]. **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010]. **St+**(-) [SCHOLZE 2010].
- Dinarda dentata* (GRAV., 1806): **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Dinarda maerkelii* KIESW., 1843: **No+**(-) [coll. KÖHLER].
- Dinarda hagensii* WASM., 1889: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Phloeopora teres* (GRAV., 1802): **Sn+**(-) [BENSE 1998, LORENZ 2005].
- Phloeopora opaca* BERNH., 1902: **Br?**(+) [SCHÜLKE 2007b]. **SH+** [ZIEGLER 2004]. **St+** [JUNG 2007, RENNER 1999a].
- Phloeopora concolor* (KR., 1856): **SH+**(-) [ZIEGLER 2004]. **St+** [JUNG 2007]. **WE?**(?) [ROSE 2004].
- Phloeopora nitidiventris* FAUV., 1900: **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
- Phloeopora scribae* (EPH., 1884): **MV+** [GÜRLICH 2005a, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User].
- Phloeopora bernhaueri* LOHSE, 1984: **Br?**(+) [SCHÜLKE 2007b]. **Hs+** [SCHAFFRATH 2001]. **MV+** [WEIGEL & WOLF 2001]. **Sd+** [EISINGER

- 2006a]. **St+** [JUNG 2007]. **Th**?(?) [KOPETZ & WEIGEL 2000, WEIGEL 1996]. **WE+** [ROSE 2004].
- Phloeopora aliena* LOHSE, 1984: **Br**/(+) [SCHÜLKE 2007b]. **MV+** [MÖLLER 2003].
- Rhopalotella validiuscula* (KR., 1856): **St?** [SCHOLZE 2010]. **Th+** [APPEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Ilyobates propinquus* (AUBE, 1850): **SH**/(?) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Calodera uliginosa* ER., 1837: **Sn**+(+) [coll. GÜNTHER, PESCHEL i.l. 2005]. **St**+(+) [JUNG 2001]. **Wt**/(+): die Art ist zu streichen, da HORION sie als fehlend bezeichnet und eine zugrundeliegende Meldung aus der coll. BUCK auf einem Datenerfassungsfehler beruht [HORION 1967, KONZELMANN i.l. 2001].
- Calodera rufescens* KR., 1856: **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Rh+** [WAGNER 2002a]. **St**+(+) [SCHOLZE 2010]. **Wf+** [KÖHLER Holt, KÖHLER Länd].
- Calodera aethiops* (GRAV., 1802): **St**+(+) [JUNG 2001].
- Calodera cochlearis* ASSING, 1996: **Br+** [BARNDT 2007, SCHÜLKE 2007b].
- Chilomorpha longitarsis* (THOMS., 1867): **St+** [SCHOLZE 2010].
- Parocygna rubicunda* (ER., 1837): **MV**+(+) [USEDOM, PASKE, HORNING, 1987 [HORNIG i.l. 2000]]. **St**+(+) [JUNG 2001].
- Parocygna longitarsis* (ER., 1837): **Br+** [RUSCH 1993/94, BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008]. **MV**+(+) [KÖHLER 2003a].
- Ityocara rubens* (ER., 1837): **Ne+** [MEYBOHM 1999b]. **St**+(+) [SCHOLZE 2010].
- Amarochara umbrosa* (ER., 1837): **WE**?(+) [ROSE 2004].
- Amarochara bonnairei* (FAUV., 1865): **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **SH**+(+) [ZIEGLER 2004]. **St+** [SCHOLZE 2010].
- Amarochara forticornis* (LACORD., 1835): **MV+** [ESSER 2002b]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Ocalea rivularis* MILL., 1851: **Br+** [BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2001b, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008]. **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf**+(+) [ARK Bienenwald].
- Ocalea latipennis* SHP., 1870: **Br**/: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999, SCHÜLKE 2007b]. **SH+** [MEYBOHM 2005].
- Apimela mulsanti* (GANGLB., 1895): **WE+** [ROSE 2004].
- Apimela macella* (ER., 1839): **Th**- [KOPETZ et al. 2004].
- Meotica pallens* (REDT., 1849): **Br+** [EICHLER & PUTZ 2000, SCHÜLKE 2007b]. **Pf+** [KÖHLER Bienen]. **St**- [SCHOLZE 2010]. **WE+** [ROSE 2004].
- Meotica marchica* BENICK, 1954: **Br+** [SCHÜLKE 2007b].
- Meotica kochi* BENICK, 1968: **Rh**/(?) [Synonym, Art ist zu streichen [VOGEL 1998].
- Meotica exilis* (ER., 1837): **St**+(+) [SCHOLZE 2010]. **WE**+(+) [ROSE 2001, ROSE 2004].
- Meotica capitalis* (MULS.REY, 1873): **Br+** [EICHLER et al. 2002, SCHÜLKE 2007b]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **St+** [BÄSE 2007].
- Ocygma nigrata* (FAIRM.LAB., 1854): **Br+** [SCHÜLKE 2007b]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St**+(+) [SCHOLZE 2010].
- Ocygma nitidiventris* FAGEL, 1958: **Hs+** [BRENNER 2003]. **SH**/(+) [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+** [SCHOLZE i.l. 2009]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Zoosetha inconspicua* (ER., 1839): **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002].
- Ocyusida rufescens* (KR., 1856): **By+** [LIEPOLD 2003].
- Hygropora cunctans* (ER., 1837): **SH**+(+) [ZIEGLER 2004].
- Oxypoda lugubris* KR., 1856: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Oxypoda spectabilis* MÄRK., 1844: **MV**+(+) [KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Oxypoda funebris* KR., 1856: **Ne**/(+) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Oxypoda lentula* ER., 1837: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Pf**+(+) [ARK Bienenwald]. **St**+(+) [JUNG 2001]. **Th+** [APPEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
- Oxypoda abdominalis* (MANNH., 1830): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Oxypoda rufa* KR., 1856: **St**+(+) [JUNG 2001].
- Oxypoda lurida* WOLL., 1857: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+** [BELL-MANN et al. 2003]. **Wf** [DREES 2002b]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
- Oxypoda rugulosa* KR., 1856: **Hs**+: Dieburg Sandgrube, VOGT, 1962 (det. LOHSE) - Messel Autokescher, HANSEN, 1962 [coll. HÖHNER].
- Oxypoda mutata* SHARP, 1871: **St+** [BÄSE 2007].
- Oxypoda testacea* ER., 1837: **Br**+(+) [BEIER & KORGE 2001, EICHLER et al. 2002, SCHÜLKE 2007b]. **St**+(+) [HENNICKE & ECKERT 2001].
- Oxypoda tarda* SHP., 1871: **Pf+** [KÖHLER Bienen]. **St**+: Olbetal südl. Hundsburg, BÜCHE, V.2000, mehrere Ex. in Barberfallen auf Trockenrasen [BÜCHE i.l.].
- Oxypoda flavicornis* KR., 1856: **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Oxypoda nigrocincta* MULS.REY, 1875: **Pf+** [ARK Bienenwald]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St**+(+) [JUNG 2001].
- Oxypoda formicicola* MÄRK., 1841: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010]. **Pf**+(+) [KÖHLER 2000a].
- Oxypoda pratensis* LOHSE, 1967: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010]. **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002].
- Oxypoda bicolor* MULS.REY, 1853: **St**+(+) [SCHOLZE 2010].
- Maurachella pilosicollis* (BERNH., 1902): **Sn**+ [VOGEL 2010].
- Stichoglossa semirufa* (ER., 1839): **Br+** [MÖLLER 2003]. **Hn**+(+) [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, GÜRLICH User].
- Ischnoglossa obscura* WUNDERLE, 1990: **Wt+** [KONZELMANN 2006b, SZALLIES 2001].
- Pseudaphana vorbringeri* BERNH., 1907: **Wt+** [VOGEL & KONZELMANN 2011].
- Homoeusa acuminata* (MÄRK., 1842): **Sn**+(+) [LORENZ 2005]. **St**+(+) [JUNG 2010].
- Thiasophila lohsei* ZERCHE, 1987: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010].
- Thiasophila canaliculata* MULS.REY, 1874: **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010]. **St**+(+) [SCHOLZE i.l. 2008].
- Thiasophila wockii* (SCHNEID., 1862): **By+** [LIEPOLD 2003]. **Ne+** [MEYBOHM 2003]. **Sn**+ [VOGEL 2010].
- Thiasophila inquilina* (MÄRK., 1842): **MV+** [KLEEBOERG & BUSCH 2010]. **St**+(+) [JUNG 2010].
- Haploglossa gentilis* (MÄRK., 1844): **MV**+(+) [KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono]. **Sn**+(+) [WEIGEL 2005].
- Haploglossa marginalis* (GRAV., 1806): **St**+(+) [DESSAU, SCHÖNE, 17.VII.2000 [SCHÖNE i.l. 2000, BÄSE 2007]. **WE**+(+) [ROSE 2004].
- Haploglossa picipennis* (GYLL., 1827): **MV**+(+) [GÜRLICH Cono].
- Aleochara laticornis* KR., 1856: **St**+(+) [JUNG 2007].
- Aleochara haematodes* KR., 1862: **Br+** [RUSCH 1993/94, SCHÜLKE 2007b]. **MV**+(+) [KÖHLER Rüte]. **WE**+(+) [KUNZE & KACHE 1998].
- Aleochara spissicornis* ER., 1839: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Hs+** [BRENNER 2003]. **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002]. **Sn**+ [VOGEL 2010]. **St** [SCHOLZE 2010].
- Aleochara bellonata* KRASA, 1922: **Pf**-(?) [MUS. Frankfurt, BRENNER i.l.]. **Rh**+(+) [ASSING & SCHÜLKE 2001, WENZEL 2001, WENZEL & HANNIG 2002].
- Aleochara intricata* MANNH., 1830: **MV**+(+) [KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte].
- Aleochara tristis* GRAV., 1806: **Br+** [RUSCH 1993/94, BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b].
- Aleochara inconspicua* AUBÉ, 1850: **MV**+(+) [ZIEGLER 2006a].
- Aleochara stichai* LIKOVSKY, 1965: **Ne**/(+) [MEYBOHM 2003]. **St** [SCHOLZE 2007]. **Th** [KOPETZ et al. 2004].
- Aleochara kamila* LK., 1984: **Sn**+(?) [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
- Aleochara albopilosa* BERNH., 1901: **Hs**+ [BRENNER 2007]. **Th** [KOPETZ et al. 2004].
- Aleochara marmotae* DEVILLE, 1927: **Th**/(+) [KOPETZ et al. 2004].
- Aleochara peeziana* LOHSE, 1961: **Sn**+(?) [VOGEL 2010].
- Aleochara lygaea* KR., 1862: **Br+** [SCHÜLKE 2007b].
- Aleochara villosa* MANNH., 1830: **Br+** [EICHLER et al. 2003, RUSCH 1993/94, DREGER et al. 1999, SCHÜLKE 2007b]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **SH**+(+) [HH Woldorfer Wald, GÜRLICH, 18.V.-I. VI.1999, 1 Ex. in einer Bodenfauna [TOLASCH i.l.2001]. **WE**+(+) [ROSE 2004]. **Wf**+(+) [DREES 2002b].
- Aleochara sanguinea* (L., 1758): **MV**+(+) [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Aleochara fumata* GRAV., 1802: **Hs**+: Darmstadt Kranichsteiner Forst, Vogt, 1954 und 1955 - Rodenbach, HÖHNER, 1981 [coll. HÖHNER].
- Aleochara moerens* GYLL., 1827: **St**+(+) [BÄSE 2007].
- Aleochara maculata* BRIS., 1863: **Ne**/(+) [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th**+(+) [SKALE & WEIGEL 2001].
- Aleochara tertiaria* SEMENOV, 1998: **Br**+ [BARNDT et al. 2002, ASSING & SCHÜLKE 2000, SCHÜLKE 2007b, BARNDT 2008].
- Aleochara haemoptera* KR., 1856: **Ba**/(+) der Eintrag im 1. Nachtrag beruht auf einer Namensverwechslung mit *Aleochara haematoptera* (*haematodes*, *ripicola*) [MAUS i.l. 2000]. **Br**+(+) [ESSER 2005a, SCHÜLKE 2007b]. **MV**+ [KÖHLER Rüte]. **Rh**+(+) [KÖHLER 2006a]. **St**- [SCHOLZE 2010].
- Aleochara cuculorum* KR., 1858: **Hs**+(+) [BERGER Hang, DEHNERT, 25.IV.86, 1 Ex. (t. VOGEL) [coll. BÖHME].

- Aleochara peusi* WAGN., 1949: **MV+** [ESSER 2002b].
Aleochara ruficornis GRAV., 1802: **Br+** [BARNDT et al. 2002, SCHÜLKE 2007b].
Aleochara melichari (RTT., 1889): **By/(+)** [LOHSE & LUCHT 1989].
Aleochara erythroptera GRAV., 1806: **St+(-)** [SCHOLZE 2010].
Aleochara binotata KR., 1856: **MV+** [ESSER 2001a].
Aleochara verna SAY, 1836: **Br?(-)**: die Meldung von RUSCH (1993-94) ist zu überprüfen [SCHÜLKE & VOGEL i.l. 1999]. **Sn+** [VOGEL 2010].
Rheochara irmgardis (VOGT, 1954): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Familie PSELAPHIDAE**
Bibloporus minutus RAFFR., 1914: **Br?(+)** [SCHÜLKE 2007b]. **St+(-)** [JUNG 2001]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Bibloporus mayeti GUILLB., 1888: **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+** [JUNG 2001].
Meliceria sulciventris (GUILLB., 1888): **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Th+**: cf. Weibchen, BRACHAT det. [KOPETZ et al. 2004].
Biblopectus tenebrosus (RTT., 1880): **MV+** [KLEEBERG & BUSCH 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+** [BASE 2008, SCHOLZE 2010]. **Wf+** [DREES 2002a].
Biblopectus ambiguus (REICHB., 1816): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **WE+(-)** [BELLMANN & MENKE 2005].
Biblopectus minutissimus (AUBE, 1833): **By+** [LIEPOLD 2003]. **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
Biblopectus obtusus GUILLB., 1888: **No+** [coll. KÖHLER].
Biblopectus pusillus (DENNY, 1825): **MV+** [KÖHLER 2003a].
Euplectus kirbyi DENNY, 1825: **MV+** [GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **St+** [BASE i.l. 2011]. **Wf+** [RENNER 1999c].
Euplectus decipiens RAFFR., 1910: **MV+** [GÜRLICH 2005a]. **St+** [JUNG 2001].
Euplectus sparsus BES., 1964: **Ba+** [SZALLIES 2001]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+** [BENSE 2006a].
Euplectus infirmus RAFFR., 1910: **MV+** [KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User].
Euplectus besicidius RTT., 1881: **Ba+** [BENSE 2006b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+** [JUNG 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Euplectus sanguineus DENNY, 1825: **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte].
Euplectus bonvouloiri RTT., 1881: **By+** [BUSSLER et al. in Vorber.]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [DREES 2002a]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
Euplectus punctatus MULS., 1861: **Sn+** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St+(-)** [JUNG 2007].
Euplectus tholini GUILLB., 1888: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [MÖLLER 2003, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [LORENZ 2001b]. **St+** [JUNG 2010].
Euplectus fauveli GUILLB., 1888: **MV+** [ZIEGLER 2006a, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **Sd+** [MÖLLER 2005]. **St+(-)** [BASE i.l. 2011]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000, RENNER i.l. 2007]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Euplectus brunneus (GRIMM., 1841): **Hs+(-)** [FLECHTNER 2002]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH User]. **St+(-)** [JUNG 2007]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Euplectus dupontii AUBE, 1833: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
Leptoplectus spinolae (AUBE, 1844): **MV+** [KÖHLER Rüte]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005]. **Wt+** [BENSE 2006a].
Plectophloeus fleischeri MACH., 1929: **No+** [HADULLA 2002]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **Th-** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Plectophloeus erichsoni (AUBE, 1844): **Ba+** [BENSE 2006b]. **Sn+(-)** [coll. PESCHIEL].
Plectophloeus nubigena (RTT., 1876): **Br+** [MÖLLER 2003, ESSER 2007a, SCHOLZE 2007b]. **MV+** [KÖHLER 2003a, MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **Rh+** [KÖHLER 2001c, KÖHLER 2006b, KÄHLER Eisc]. **Sn+(-)** [coll. PESCHIEL].
Plectophloeus nitidus (FAIRM., 1857): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+(-)** [JUNG 2001].
Plectophloeus rhenanus (RTT., 1881): **By+** [BUSSLER et al. in Vorber.]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wf+** [BORCHERING 1994].
Plectophloeus fischeri (AUBE, 1833): **St+(-)** [JUNG 2010].
Saulcyella schmidtii (MÄRK., 1844): **Sn+** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
Trimium brevicorne (REICHB., 1816): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999, SCHÜLKE 2007b]. **WE+(-)** [BELLMANN & MENKE 2005].
Trichonyx sulcicollis (REICHB., 1816): **MV+(-)** [KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Batrissus formicarius AUBE, 1833: **MV+** [GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **St+** [DIETZE 2005, JUNG 2007b]. **Th+(-)** [PESCHIEL i.l. 2007].
Batrissodes delaportii (AUBE, 1833): **Sn+(-)**: Dresden, JANTKE, 14. II.93, 1 Ex. - Meißner-Zadel, 15.V.96, 1 Ex. - Moritzburg, JANTKE, 15.VI.94, 1 Ex. (BÖHME det., t. KÖHLER) [coll. BÖHME, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St+**: Dessau, Marke, STIELER, 17.III.55, 1 Ex. (KÖHLER det.) [BASE 2007, coll. BÖHME]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2006].
Batrissodes venustus (REICHB., 1816): **Sd+** [MÖLLER 2005]. **St+**: Dessau, Zadtitz, STIELER, 14.IV.56, 1 Ex. - Dessau, STIELER, 1955-70, 4 Ex. (KÖHLER det.) [coll. BÖHME, JUNG 2007].
Batrissodes adnexus (HAMPE, 1863): **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)** [coll. PESCHIEL]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2006].
Batrissodes buqueti (AUBE, 1833): **By+?** [SCHMIDL et al. 2005]. **Sn+**: Meissen, Göhrich, JANTKE, 15.V.96, 1 Ex. (KÖHLER det.) [coll. BÖHME, LORENZ 2005]. **St+**: Athenstedt, JUNG, VI.2006, 1 Ex. [BASE 2007, JUNG i.l. 2006].
Batrissodes unisexualis BES., 1988: **Hs+** [SKALE & HOFMANN 2005]. **MV+** [GÜRLICH CONO]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **St+** [coll. SCHOLZE, KÖHLER det.].
Batrissodes oculatus (AUBE, 1833): **Br?** [SCHÜLKE 2007b]. **Hs+** [BRENNER 2007].
Tychobrythius glabratus (RYE, 1870): **No+**: Köln, Innenstadt, HÖRREN, IV.2011, 1 Männchen aus bohem Ahorn gesiebt [HÖRREN im Dr.]. **Rh+**: Trier, 2011 [HÖRREN im Dr.]. **Sd+** [EISINGER 2005].
Bythinius macropalpus AUBE, 1833: **Br+(-)** [EICHLER & PÜTZ 2000]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a].
Bythinius burrelli DENNY, 1825: **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH CONO, KÖHLER Rüte].
Bythinius securiger (REICHB., 1816): **Br+** [ESSER 2008a]. **Hn+?** [KÖHLER & TERLUTTER 2006, SPRICK et al. 2007]. **No(?)** [KÖHLER & TERLUTTER 2006]. **Pf** [KÖHLER & TERLUTTER 2006]. **Rh** [KÖHLER & TERLUTTER 2006]. **Wf/(+)** [KÖHLER & TERLUTTER 2006]. **Wt+?**: die Art ist im Status zurückzustufen, da der zugrundeliegende Beleg aus dem Jahr 1912 stammt [coll. Mus. STUTTGART, KONZELMANN i.l. 2001].
Bythinius confusus BES., 1974: **No/(+)** [KÖHLER & TERLUTTER 2006]. **Rh/(-)** [KÖHLER & TERLUTTER 2006].
Bryaxis nodicornis (AUBE, 1833): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000, WINTER 1991]. **Wf+(-)** [KÖHLER Sieg].
Bryaxis collaris (BAUDI, 1859): **Pf+** [ARK Bienwald].
Bryaxis carinula (REY, 1888): **St+** [JUNG 2007].
Bryaxis puncticollis (DENNY, 1825): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002, SCHÜLKE 2007b]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, WEIGEL & WOLF 2001, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User].
Bryaxis nigripennis (AUBE, 1844): **Br+** [EICHLER et al. 2002]. **St+** [BASE i.l. 2011].
Bryaxis curtisii (LEACH, 1817): **Br+(-)** [SCHÜLKE 2001c, SCHÜLKE 2007b]. **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007].
Bryaxis bulbifer (REICHB., 1816): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Bryaxis clavicornis (PANZ., 1806): **Br+?** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, SCHÜLKE 2007b]. **St+** [JUNG i.l. 2006, SCHOLZE 2010].
Rybaxis longicornis (LEACH, 1817): **Wt+** [KONZELMANN 2010].
Brachygluta lefebvrei (AUBE, 1833): **WE?** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
Brachygluta xanthoptera (REICHB., 1816): **Br+(-)** [SCHÜLKE 2007b].
Brachygluta haematica (REICHB., 1816): **Br+(-)** [BEIER & KÖRGE 2001, ESSER & SCHNEIDER 2002]. **SH+?** [MEYBOHM 2005].
Brachygluta sinuata (AUBE, 1833): **Ba+**: Mannheim, Waldpark, SCHRADER, 25.IV.1992, 9 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME]. **Br+** [RENNER 2008b]. **Byi** [PERSON et al. 2006]. **Hs+**: Groß-Gerau, VOGT, 10.VIII.1958, 1 Ex. - Wiesbaden-Dotzheim, MÜLLER, 25. III.1926 (BÖHME det.) [coll. BÖHME]. **MV+**: Jürgenstorf, SCHRADER, 24.V.1988, 1 Ex. (BÖHME det.) im Autokescher [coll. BÖHME, GÜRLICH CONO]. **Ne+** [MEYBOHM 2005]. **Pf+**: Altrip, SCHRADER, 1.IV.1999, 1 Ex. (BÖHME det.) Hördt, Rheinaue, BÖHME, 29. IV.1994, 1 Ex. [coll. BÖHME, ARK Bienwald, RENNER 2011]. **SH+** [MEYBOHM 2005]. **St-**: Coswig, BORRMANN, 24.II.1935, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME].
Brachygluta simplicior RAFFRAY, 1904: **Ba+** [RENNER 2005b]. **SH+** [MEYBOHM 2005]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Brachygluta perforata (AUBE, 1833): **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].

Brachygluta haemoptera (AUBE, 1844): **Wf+** [KÖHLER Länd].
Brachygluta tristis HAMPE, 1863: **Pf+** [ARK Bienwald]. **Wf+** [DREES 2002a].
Brachygluta helferi (SCHM., 1836): **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a].
Reichenbachia juncorum (LEACH, 1817): **Br+(-)** [ESSER et al. 2006, SCHÜLKE 2007b].
Trissemus antennatus (AUBE, 1833): **HS-** [HORION 1949].
Pselaphaulax dresdensis (Hbst., 1792): **Br+(-)** [SCHÜLKE 2007b]. **St-** [SCHOLZE 2010]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Pselaphus heisei Hbst., 1792: **Br+(-)**: Elsterwerda, NSG Kleine Wiesen in den Horsten, Beutler, 24.VI.2000, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Bodenfallen [coll. KÖHLER, EICHLER et al. 1999, DREGER et al. 2002, SCHÜLKE 2007b]. **MV+(-)**: Kleines Niedermoor nordwestlich des Drewitzer Sees, Büche 22.IV.2000, 1 Ex gesiebt aus Pfeifengrashorsten [Büche i.l., KÖHLER 2003a].
Chennium bituberculatum LATR., 1807: **St-** [SCHOLZE 2010].
Centrotoma lucifuga HEYD., 1849: **Wt+(-)**: die Art ist im Status zurückzustufen, da der zugrundeliegende Beleg vor 1950 gefunden wurde [coll. MUS. STUTTGART, KONZELMANN i.l. 2001].
Claviger testaceus PREYSSL., 1790: **St+** [DIETZE 2005, JUNG 2010].
Claviger longicornis MÜLL., 1818: **MV+** [KLEEBERG & BUSCH 2010]. **St+**: Obetal südl. Hundsbürg, Büche, VI-VII.2000, 1 Ex. in Barberfallen auf Steppenrasen [Büche i.l.].

Familie LYCIDAE

Lopherus rubens (GYLL., 1817): **HS+** [HOFMANN i.l. 2010]. **Pf+** [KÖHLER 2004b].
Platycis cosnardi (CHEVR., 1829): **Br+?** [MÖLLER 2003]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, GÜRLICH User]. **Sn+(-)** [LORENZ 2005]. **St+(-)** [JUNG 2001].

Familie LAMPYRIDAE

Lamprohiza splendida (L., 1767): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002, DREGER et al. 2002]. **MV+(-)**: Marxbogen, Büche 20.IV.2000, eine Larve gesiebt an SW-exponierter Straßenböschung [Büche i.l., WEIGEL & WOLF 2000, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, LANGE 2003].
Phosphaneus hemipterus (GOEZE, 1777): **Br+(-)** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004].

Familie CANTHARIDAE

Podabrus alpinus (PAYK., 1798): **Br+(-)** [ESSER 2005a, BARNDT 2008].
Cantharis paradoxa HICK., 1960: **Wf+** [KÖHLER Länd].
Cantharis lateralis L., 1758: **Br+(-)** [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999].
Cantharis pagana ROSH., 1847: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005].
Cantharis sudetica LETZN., 1847: **St+(-)** [JUNG 2007]. **Wf+(-)** [KÖHLER Hell].
Cantharis decipiens BAUDI, 1871: **Br+?** [DREGER et al. 2009]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Cantharis cryptica ASHE, 1947: **Br+?** [BEIER & KÖRGE 2001, BARNDT et al. 2002, DREGER et al. 2002, BARNDT 2008]. **Sd+** [LILLIG 2006]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Cantharis figurata MANNH., 1843: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999].
Ancistronycha occipitalis (ROSH., 1847): **Ba+** [BRETZENDORFER 2006b]. **By+**: Zwieseler Waldhaus, Köhler, 8.VII.2011, 1 Ex. [coll. KÖHLER]. **Th-** [KOPETZ et al. 2008]. **Wt+** [BRETZENDORFER 2006b].
Ancistronycha cyanipennis (FALD., 1835): **HS+** [FLECHTNER 2003b, BATHON 1969]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, ZIEGLER 2006a].
Metacantharis discoidea (AHR., 1812): **Br+(-)** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004, DREGER et al. 2002, ESSER 2006a, BARNDT 2008].
Metacantharis chlypeata (ILL., 1798): **Sn?**: Beleg muss noch geprüft werden [PESCHEL i.l. 2007] [GÜNTHER & PESCHEL 2001 (fraglich)].
Absidia proluxa (MÄRK., 1851): **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Absidia rufolestacea (LETZN., 1845): **Br+** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
Absidia schoenherri (DEJ., 1837): **No+(-)** [WENZEL 2006].
Rhagonycha nigriceps (WALT., 1838): **Wt(+)** [BRETZENDORFER 2002b].
Rhagonycha elongata (FALL., 1807): **Ba+?**: vermutlich liegt bei allen alten Meldungen eine Verwechslung mit *Rhagonycha gallica* vor, ein Vorkommen ist daher fraglich [KONZELMANN i.l. 2001]. **Br+?** [ESSER 2006a]. **MV+(-)** [WEIGEL & WOLF 2001]. **Sn+?** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Wt+?**: vermutlich liegt bei allen alten Meldungen eine Verwechslung mit *Rhagonycha*

gallica vor, ein Vorkommen ist daher fraglich [KONZELMANN i.l. 2001].
Rhagonycha gallica PIC., 1923: **Br+?** [DREGER et al. 2009, ESSER 2006a]. **Sn+?** [LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007].
Silis ruficollis (F., 1775): **St+(-)** [JUNG 2001, GRUSCHWITZ & SCHORNACK 1999, BASE 2007, SCHOLZE 2007].
Malthinus serripunctatus KIESW., 1851: **Br+** [ESSER 2007a]. **MV+** [ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [BENSE 1998]. **St+(-)** [JUNG 2007].
Malthinus fasciatus (OL., 1790): **Br+** [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006]. **Sn+** [BENSE 1998, LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007]. **St+(-)** [JUNG 2007, BASE 2007].
Malthinus balteatus SUFFR., 1851: **Br+** [EICHLER et al. 1999]. **MV+** [SCHMIDT et al. 2007]. **Pf+** [KÖHLER 2004b].
Malthinus facialis THOMS., 1864: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [BENSE 1998]. **St+(-)** [BASE 2007]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Malthinus glabellus KIESW., 1852: **Pf+(-)** [KÖHLER 2004b]. **Sn+(-)** [WEIGEL 2005].
Malthinus frontalis (MARSH., 1802): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+(-)** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
Malthodes debilis KIESW., 1852: **St+(-)** [BASE 2007].
Malthodes flavoguttatus KIESW., 1852: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Malthodes dispar (GERM., 1824): **Br+(-)** [MÖLLER 2003]. **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001b, GOLIKOWSKI 2008b].
Malthodes europaeus WITTM., 1970: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Malthodes transeuropaeus WITTM., 1970: **Ba+** [BRETZENDORFER i.l. 2006]. **HS+** [BRETZENDORFER i.l. 2006]. **St-** [KOPETZ et al. 2008]. **Th-** [KOPETZ et al. 2008].
Malthodes fbulatus KIESW., 1852: **Br+** [MÖLLER 2003]. **By+(-)** [SCHMIDL & BUSSLER 2004]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Malthodes misellus KIESW., 1852: **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **No/** [KÖHLER 2006a]. **Rh(+)** [KÖHLER 2006a].
Malthodes maurus (CAST., 1840): **MV+(-)** [RINGEL i.l. 2011]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Malthodes fuscus (WALT., 1838): **St+(-)** [JUNG 2007, BASE 2007].
Malthodes minimus (L., 1758): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a].
Malthodes alpicola KIESW., 1852: **Wt+** [BRETZENDORFER 2002a, BENSE 2006a].
Malthodes guttifer KIESW., 1852: **Sd+** [EISINGER 2006a].
Malthodes marginatus (LATR., 1806): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Malthodes mysticus KIESW., 1852: **Br+(-)** [EICHLER et al. 2002, ESSER 2006a].
Malthodes trifurcatus KIESW., 1852: **Ba+** [BRETZENDORFER 2001].
Malthodes boicus KIESW., 1863: **Wt+** [KOSTENBADER 2008].
Malthodes pumilus (BREB., 1835): **Br+(-)** [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006, DREGER et al. 2002, coll. TAEGER]. **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a].
Malthodes spathifer KIESW., 1852: **Br+(-)**: Falkenberg, Tobbenberg im Freienwalder Stadtwald, TAEGER, 28.VI.1999, 2 Ex. (KÖHLER det.) [coll. TAEGER].
Malthodes lobatus KIESW., 1852: **Ba+** [REIBNITZ 2008b].
Malthodes crassicornis (MÄCKL., 1846): **Hn+** [BORCHERDING 1994]. **HS+** [HOFMANN i.l. 2010]. **MV+** [RINGEL & HAMPEL 2003, MÖLLER 2003]. **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+(-)** [JUNG 2007]. **Wt+(-)** [BRETZENDORFER 2006c].
Malthodes holdhausi KASZAB, 1955: **Br+** [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006]. **HS+** [SCHAFFRATH 1999, FLECHTNER 2002, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+** [MÖLLER 2003]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Malthodes brevicollis (PAYK., 1789): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002].

Familie MALACHIIDAE

Troglops albicans (L., 1767): **WE?** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Hypebaeus flavipes (F., 1787): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
Charopus concolor (F., 1801): **Br+** [DREGER et al. 2009, ESSER 2005a, BARNDT 2008].
Cyrtosus ovalis (CAST., 1836): **Ba+**: Mannheim, Friesenheimer Insel, 1.VI.2010, 3 Ex. aus der Vegetation geklopft (Fotobeleug, L. KÖHLER & CONSTANTIN) [www.kerbtier.de].
Malachius scutellaris ER., 1840: **Sn+(-)**: Leipzig, SCHLENSTEDT, 1981 in einem Auwald [HORNIG i.l. 2000]. **St+(-)**: Bitterfeld-Frie-

dersdorf, Muldestausee, SCHORNACK, 17.V.2000 [SCHORNACK i.l. 2001].

Malachius rubidus Er., 1840: **Ne+** [ZIEGLER 2006c]. **St+(-)**: Plötzkau, NSG Elbaue, SKONIECZNY, 2002, mehrfach (Fotobelege, KÖHLER det.). Alte Elbe bei Rogätz-Sandkrug, ESSER 13. VI.1998, 1 Weibchen, geklopft aus Totholz einer anbrüchigen Kiefer auf Sandtrockenrasen [BÜCHE i.l., KÖHLER i.l.].

Clanoptilus spinipennis (GERM., 1824): **Sn?**(-) [GÜNTHER & PESCHIEL 2001].

Clanoptilus elegans (OL., 1790): **Br+** [EICHLER et al. 1999].

Clanoptilus geniculatus (GERM., 1824): **Sn+** [GÜNTHER & PESCHIEL 2001, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b, GOLLOWSKI 2008b]. **St+**: Bitterfeld-Friedersdorf, Muldestausee, SCHORNACK, 17.V.2000 [SCHORNACK i.l. 2001, BASE 2007].

Anthocomus coccineus (SCHALL., 1783): **Br+(-)** [ESSER & KIELHORN 2005, ESSER & SCHNEIDER 2002, HORNIG i.l. 2000].

Anthocomus humeralis MORAW., 1861: **Hs+** [BATHON 1985].

Ceraphes terminatus (MENETR., 1832): **Br+(-)** [BASE 2007, BEIER & WELLMANN 2007]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER & FUCHS 2006]. **Rh+** [MÜLLER & MÜLLER 2001].

Atalapha analis (PANZ., 1796): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999, ESSER 2006a].

Sphinginus lobatus (OL., 1790): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].

Ebaeus thoracicus (GEOFFR., 1785): **St+(-)** [DIETZE & SCHORNACK 1999].

Ebaeus pedicularius (F., 1777): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000, BORCHERTING 1994]. **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999].

Ebaeus appendiculatus Er., 1840: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005, GOLLOWSKI 2008b].

Ebaeus flavicornis Er., 1840: **Ba+**: Bötzingen, Kaiserstuhl, KRUMM, 2011 mehrfach (KÖHLER det.). [coll. KÖHLER]. **Br+** [EICHLER et al. 1999]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th+?** [KOPETZ et al. 2008].

Familie MELYRIDAE

Aplocnemus impressus (MARSH., 1802): **MV+(-)** [KÖHLER Rüte, RINGEL i.l. 2011].

Aplocnemus tarsalis (SAHLB., 1822): **Sn+(-)** [LORENZ 2005].

Trichoclebe floralis (OL., 1790): **Hs+(-)**: Braunfels, Rupp, 2008 [coll. Rupp].

Trichoclebe memnonia (KIESW., 1861): **MV+(-)** [MÖLLER 2003, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St+(-)** [JUNG 2007, DIETZE & SCHORNACK 1999].

Dasytes obscurus GYLL., 1813: **Hs+(-)** [FLECHTNER i.l. 2006]. **WE?** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].

Dasytes nigrocyaneus MULS.REY, 1868: **Rh+(-)** [WENZEL & HANNIG 2002].

Dasytes virens (MARSH., 1802): **Br+** [coll. BRUNK, DREGER et al. 2009].

Dasytes subaeneus SCHÖNH., 1817: **Br+(-)** [BEIER & KÖRGE 2001, ESSER & SCHNEIDER 2002]. **St+(-)** [JUNG 2007, ESSER 2001c].

Dasytes fuscus (ILL., 1801): **Br+(-)** [BEIER & KÖRGE 2001, DREGER et al. 2002]. **Sn+(-)** [GÜNTHER & PESCHIEL 2001, WEIGEL 2005].

Psilothrix viridicoeruleus (GEOFFR., 1785): **MV+** [PESCHIEL 1991f].

Danacea pallipes (PANZ., 1793): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].

Danacea nigritarsis (KÜST., 1850): **Sd+** [EISINGER 2006a].

Dasytes terminalis (JACQU., 1861): **SHv** [ZIEGLER 2006c].

Familie PHLOIOPHILIDAE

Phloiophilus edwardsii STEPH., 1830: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+(-)** [JUNG 2007b].

Familie CLERIDAE

Thaneroclerus buqueti (LIEFV., 1835): **WEi** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].

Allonyx quadrimaculatus (SCHALL., 1783): **MV+** [KÖHLER Rüte]. **No+(-)** [REISSMANN 2006a].

Opilo pallidus (OL., 1795): **Sn+(-)** [BERNHARD 1999, LORENZ 2000]. **Wt+** [WURST leg., BENSE i.l. 2006].

Opilo mollis (L., 1758): **WE+(-)** [BELLMANN & MENKE 2005].

Opilo domesticus (STURM, 1837): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **Hs+(-)** [BRENNER 2000]. **MV+(-)**: Marxhagen, Müritzkreis, BÜCHE 25.XI.2000, eine Flügeldecke in Gesiebe aus Stroh in einem Schuppen [BÜCHE i.l., HAUSTEIN & VON LAAR 2007].

Trichodes apiarius (L., 1758): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **Sd+** [HERDER & HIMMELSTOSS 1895, EISINGER 2006a]. **SH+(-)** [ZIEGLER et al. 2001].

Trichodes alvearius (F., 1792): **Br+?** [EICHLER et al. 1999, EICHLER et al. 2002]. **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999, BASE 2007]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2006].

Dermestoides sanguinicollis (F., 1787): **Br+(-)** [ESSER 2005a]. **Sn+(-)** [BERNHARD 2003b].

Tarsostenus univittatus (ROSSI, 1792): **Hs+**: LANGE leg. 2008 [coll. LANGE]. **Pf+** [NIEHUIS & SEILER 2004].

Korynetes ruficornis STURM, 1837: **Hs+** [SCHAFERATH 1999].

Necrobia ruficollis (F., 1775): **Th+(-)** [WEIPERT 2003].

Necrobia rufipes (DEGEER, 1775): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002].

Opetiopalpus scutellaris (PANZ., 1797): **Hs+**: Offenthal Messel Autokescher, VOGT, 1962 [coll. HÖHNER].

Tilloidea notata (KLUG, 1843): **Bai** [GEIS 2002]. **Byi** [GEIS 2002].

Familie TROGOSITIDAE

Nemosoma caucasicum MENETR., 1832: **Ba+** [PANKOW 2010].

Tenebroides mauritanicus (L., 1758): **Br+** [EICHLER et al. 1999].

Familie PELTIDAE

Thymalus limbatus (F., 1787): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002].

Familie LOPHOCATERIDAE

Grynocharis oblonga (L., 1758): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].

Familie LYMEXYLONIDAE

Lymexylon navale (L., 1758): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000].

Familie ELATERIDAE

Ampepus erythrogonus (MÜLL., 1821): **Wf+(-)**: nicht bei KROKER 1980 [KÖHLER Atms, WESTHOFF 1882].

Ampepus rufipennis (STEPH., 1830): **St+** [DIETZE 2005]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Ampepus praestus (F., 1792): **Ba+** [LANGE 2005]. **St+(-)** [DIETZE 2005, JUNG 2001]. **Sn+?** [LORENZ 2006].

Ampepus aethiops (LACORD., 1835): **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

Ampepus brunnicornis GERM., 1844: **MV+** [GÜRLICH User]. **St+** [DIETZE 2005].

Ampepus quercicola (BUYS., 1887): **By+** [GOSSNER 2004, GOSSNER et al. 2008, SCHUBERT 1998]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].

Ampepus triangulum (DORN, 1925): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Sn+(+)** [SIEBER et al. 2011]. **St+** [ZIEGLER 2006b].

Ampepus melanurus MULS.GUILLB., 1855: **Hs+** [HOFMANN i.l. 2010].

Ampepus elegantulus (SCHÖNH., 1817): **No+?** [HANNIG & REISSMANN 2005]. **Wf+(-)**: Wiederfund, auf bisherigen Meldungen nach 1950 handelte es sich um Fehler [HANNIG & REISSMANN 2005].

Ampepus vandalitiae LOHSE, 1976: **St+** [DIETZE 2005].

Ampepus nigrinus (HBST., 1784): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **St+** [DIETZE 2005].

Brachygonus megerlei (LACORD., 1835): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Brachygonus dubius (PLATYCATÉ, 1990): **Br+** [ESSER 2005a]. **By+** [HERBIG in Vorber.].

Brachygonus rufipes (MULS.GUILLB., 1855): **Sn+?** [JANTKE 1984].

Ischnodes sanguinicollis (PANZ., 1793): **By+(-)** [WEICHELBAUMER 2003a]. **MV+(-)** [MÖLLER 2003]. **No+(-)** [KÖHLER Sieb]. **Sd+** [MÖLLER 2003b].

Megapenthes lugens (REDT., 1842): **MV+(-)** [MÖLLER 2003]. **Ne+** [ZIEGLER 2006a]. **St+(-)** [DIETZE 2005].

Procerus tibialis (LACORD., 1835): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005].

Podeontus acuticornis (GERM., 1824): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **St?** [DIETZE 2005]. **Wt+** [WURST i.l. 2009].

Porthmidius austriacus (SCHIRK., 1781): **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

Elater ferrugineus L., 1758: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].

Sericus brunneus (L., 1758): **Br+(-)**: Berlin-Lichtenberg, Biesenhorster Sand, BÜCHE, 18.V.2002, 1 Ex. auf Sandtrockenrasen [BÜCHE i.l., DREGER et al. 2002, ESSER & SCHNEIDER 2002].

Sericus subaeneus (REDT., 1842): **St+** [JUNG 2007].

Agriotes pallidulus (ILL., 1807): **Br+(-)** [BARNDT et al. 2002, DREGER et al. 2002, BARNDT 2008].

Agriotes ustulatus (SCHALL., 1783): **Br+(-)** [coll. BRUNK, EICHLER et al. 2002, BARNDT 2008]. **WE+(-)** [BELLMANN & ESSER 2006].

Agriotes pilosellus (SCHÖNH., 1817): **Br+(-)** [BEIER & KÖRGE 2001, DREGER et al. 2002].

Agriotes sordidus (ILL., 1807): **Sn+** [coll. PESCHIEL]. **WE+**: Sehestedt, 1.VIII.2006, MEHNERT, 3 Ex. (ZEISING det., coll. GOLLOWSKI) auf Grünland außerhalb [coll. GOLLOWSKI, ZEISING i.l. 2007, GOLLOWSKI 2007].

Idolus picipennis (BACH, 1852): **Hn+**(-) [SPRICK et al. 2001].
Synaptus filiformis (F., 1781): **Br+**(-) [ESSER & SCHNEIDER 2002, BARNDT 2008].
Adrastus axillaris ER., 1842: **No+** [KÖHLER 2006a].
Adrastus lacertosus ER., 1842: **Ba+**(-) [BENSE 2009]. **St-** [DIETZE 2005].
Adrastus rachifer (GEOFFR., 1785): **Br+**(?) [ESSER 2005b].
Melanotus brunneipes (GERM., 1824): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Melanotus castanipes (PAYK., 1800): **Br+** [BEIER & KÖRGE 2001, MÖLLER 2003]. **Hs+** [NOLTE et al. 1997, SCHAFFRATH 1999, FLECHTNER 2000, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **St+** [BÄSE 2007, coll. HORNIG, DIETZE 2005].
Melanotus punctolineatus (PELERIN, 1829): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
Melanotus crassicolis (ER., 1841): **Hs+**(-) [SCHAFFRATH 1999, FLECHTNER 2003b]. **St+**(-) [DIETZE 2005].
Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
Lacon lepidopteris (PANZ., 1801): **Hn+** [LORENZ 2006].
Lacon querceus (HBST., 1784): **Sd+** [MÖLLER 2005]. **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999].
Danosoma fasciatum (L., 1758): **Sn+**(+) Korrektur des Zeithorizontes (HORNIG i.l.) [RUDOLPH 1982].
Ctenicera virens (SCHRK., 1781): **St+**(-) [DIETZE 2005].
Ctenicera heyeri (SAX., 1838): **St+**(-) [DIETZE 2005].
Ctenicera pectinicornis (L., 1758): **Br+**(-) [ESSER 2005b].
Anostirus purpureus (PODA, 1761): **St+** [JUNG 2007, DIETZE 2005, SCHOLZE 2007].
Anostirus gracilicollis (STIERL., 1896): **Hs+** [SCHAFFRATH 1999]. **St+** [DIETZE 2005].
Anostirus sulphuripennis (GERM., 1843): **Ba+** [LANGE 2001, FRANK & KONZELMANN 2002].
Haplotalarsus incanus (GYLL., 1827): **Br+**(-) [ESSER 2005a, BARNDT 2008].
Haplotalarsus angustulus (KIESW., 1858): **St-** [DIETZE 2005].
Selatossomus melancholicus (F., 1798): **Sn/** [SIEBER & HORNIG 2009]. **St/** [SIEBER & HORNIG 2009]. **Th/** [SIEBER & HORNIG 2009].
Selatossomus latus (F., 1801): **Br+**(?) [DREGER et al. 2009].
Selatossomus cruciatus (L., 1758): **St+**(-) [JUNG 2007, SCHOLZE 2007].
Neopristilophus depressus (GERM., 1822): **Wt/**(+) Namensverwechselung, nicht in coll. REIBNITZ [Reibnitz 2001].
Mosotalesus impressus (F., 1792): **Br+**(-) [BEIER & KÖRGE 2001, BARNDT et al. 2002, DREGER et al. 2002, BARNDT 2008]. **St+**(-) [JUNG 2007]. **Wt+**(/) [REIBNITZ 2001].
Mosotalesus nigricornis (PANZ., 1799): **Br+**(-) [ESSER 2005b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Wt+** [REIBNITZ 2001].
Pseudanostirus globicolis (GERM., 1843): **St+**(-) [DIETZE 2005].
Calambus bipustulatus (L., 1767): **St+** [DIETZE 2005, BÄSE 2007].
Denticollis rubens PILL.MITT., 1783: **MV+** [ZIEGLER 2006a].
Cidnopus pilosus (LESKE, 1785): **Br+**(-) [BARNDT i.l.].
Cidnopus aeruginosus (OL., 1790): **Hn+** [SPRICK et al. 2001, SCHMIDT et al. 2000].
Kibunea minutus (L., 1758): **Br+**(-): Ziegenhals bei Berlin, HORNIG, 1984 [HORNIG i.l. 2000, DREGER et al. 2002, BARNDT 2008].
Nothodes parvulus (PANZ., 1799): **Br+**(?) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **MV+** [GÜRLICH Cono]. **WE+**(?) [BELLMANN & ESSER 2010].
Limoniis aeneoniger (DEGEER, 1774): **Br+**(-) [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999, ESSER 2006a, BARNDT 2008].
Limoniis poneli LESEIGNER & MERTLIK, 2007: **Br+** [ESSER 2011]. **Hs+**: zahlreiche Belege aus Hessen, RUPP, 1977–2008 [coll. RUPP]. **Hs+**: zur Beschreibung s. LESEIGNER & MERTLIK (2007) [coll. RUPP]. **MV+** [coll. RUPP]. **No+** [coll. KÖHLER]. **Rh+** [KÖHLER & WAGNER 2010]. **Wt+** [coll. ESSER].
Limonicus violaceus (MÜLL., 1821): **By+**(-): München, Forstentrieder Park, Eichelgarten, WURST, 1994, 1 Larve [WURST & KLAUSNITZER 2003]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Sd+** [MÖLLER 2003b].
Diacanthos undulatus (DEGEER, 1774): **St?** [DIETZE 2005].
Stenagostus rufus (DEGEER, 1774): **St+**(-) [BÄSE 2007, DIETZE 2005, JUNG 2007].
Stenagostus rhombeus (OL., 1790): **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2005, KRÜGER 2005].
Hemicrepidius hirtus (HBST., 1784): **Br+**(-) [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006, coll. TAEGER].
Crepidophorus mutilatus (ROSH., 1847): **Rh+**(/) [coll. KÖHLER]. **Sd+** [MÖLLER 2005]. **St+**(-) [JUNG 2007, DIETZE 2005].
Athous bicolor (GOEZE, 1777): **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008].

Athous campyloides NEWM., 1833: **Hs+**: Kassel Umgebung, SCHAFFRATH [coll. SCHAFFRATH]. **No+**(/) [JUNKER & KÖHLER 2005, HADULLA 2008, JUNKER & KÖHLER 2010].
Hypnoidus rivularius (GYLL., 1808): **By+**(-): Oberstdorf, HANSEN, 25.VI.52, 1 Ex. (SCHIMMEL det.) [coll. BÖHME].
Hypnoidus consobrinus (MULS.GUILLB., 1855): **Sn+** [SIEBER & HORNIG 2009].
Negastrius pulchellus (L., 1761): **Ba+** [KONZELMANN 2006b].
Zoroachros minimus (LACORD., 1835): **Br+**(-) [EICHLER et al. 2002, BARNDT et al. 2002].
Zoroachros difformis (BUYSS., 1851): **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008]. **Sn+** [REIKE et al. 2002]. **St+** [ESSER 2001c].
Zoroachros flavipes (AUBÉ, 1850): **Sn+** [SIEBER & HORNIG 2009].
Zoroachros meridionalis (CAST., 1840): **Pf+** [PERSOHN i.l. 2009].
Quasimus minutissimus (GERM., 1817): **Sd+** [EISINGER 2006b].
Cardiophorus gramineus (SCOP., 1763): **Hn-** [SCHMIDT et al. 2005]. **St+**(-) [JUNG 2007, DIETZE 2005].
Cardiophorus atramentarius ER., 1840: **Pf+** [RENNER 2005a]. **St+**(-) [JUNG 2007, DIETZE 2005].
Cardiophorus vestigialis ER., 1840: **Br+**(-) [ESSER 2005b].
Cardiophorus ebeninus (GERM., 1824): [RENNER 2002, BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
Cardiophorus asellus ER., 1840: **Br+**(-) [EICHLER et al. 1999].
Dicronychus rubripes (GERM., 1824): **Hs+**: Hanau Großauheim, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER].
Dicronychus equisetoides LOHSE, 1976: **MV+**(?) [RINGEL i.l. 2011]. **Sn+**: Mühlrose, BÖHME, 8.VI.97, 1 Ex. (SCHIMMEL det.) [coll. BÖHME, SIEBER & HORNIG 2009].
Dicronychus equiseti (HBST., 1784): **Br+**(?) [EICHLER et al. 1999].
Paracardiophorus musculus (ER., 1840): **Br+**(-) [EICHLER et al. 1999, ESSER 2006a, BARNDT 2008]. **St+**(-) [DIETZE 2005].

Familie CEROPHYTIDAE

Cerophytum elateroides (LATR., 1804): **Sn+** [BERNHARD 2003a].

Familie EUCNEMIDAE

Isorhipis melasoides (CAST., 1835): **MV+**(-) [KÖHLER 2003a, WEIGEL & WOLF 2001, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **No+**(-) [coll. KÖHLER]. **Sn+**(/) [LORENZ 2005]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Dromaolus barnabita (VILLA, 1838): **No+**(-) [REISSMANN 2008a, KÖHLER NWZ9]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Rhacopus sahlgbergi (MANNH., 1823): **Ba+**(-) [REIBNITZ 2009]. **Wt+**(+): die Art ist im Status zurückzustufen, da der zugrundeliegende Beleg aus dem Jahr 1946 stammt [coll. Mus. Stuttgart, REIBNITZ 1992b].
Rhacopus attenuatus (MAEKL., 1845): **Hs+**: Darmstadt Kranichsteiner Wald, LANGE, 2009 [coll. LANGE, coll. HOFMANN].
Dirhagus emyi (ROUGET, 1855): **MV+** [KÖHLER 2003a].
Dirhagus pygmaeus (F., 1792): **No+** [KÖHLER NWZ9]. **St+**(-) [JUNG 2001]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, SKALE & WEIGEL 2001].
Dirhagus palmi OLEXA, 1963: **By+** [BAIL 2006, BUSSLER & FUCHS 2006].
Dirhagus lepidus (ROSH., 1847): **SH?**(+) [GÜRLICH et al. i.V.].
Epiphaniis cornutus ESCHZ., 1829: **No+** [coll. KÖHLER].
Hylis olexai PALM, 1955: **MV+** [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [LORENZ 2006, JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
Hylis cariniceps Rtt., 1902: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
Xylophilus corticalis (PAYK., 1800): **Wt+** [LANGE 2005].

Familie LISSOMIDAE

Drapetes cinctus (PANZ., 1796): **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

Familie THROSCIDAE

Trixagus gracilis WOLL., 1854: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br+** [ESSER 2005a]. **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hs+** [BRENNER 2005]. **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **No+** [KÖHLER 2006a, KÖHLER & KINKLER 2010, KÖLBECK 2010]. **Pf+** [KÖHLER 2006a, ARK Bienvald, RENNER 2011]. **Rh+** [KÖHLER 2006a]. **Sd+** [EISINGER 2006b]. **Sn+** [HORNIG 2005]. **St+** [JUNG 2007]. **Th+** [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [DREES 2002b, KÖHLER Sieg]. **Wt+** [LANGE 2001, FRANK & KONZELMANN 2002, KONZELMANN 2010].
Trixagus leseigneuri MUONA, 2002: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br+** [ESSER 2010]. **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010, HERBIG in Vor-]

ber.]. **Hs+** [MUONA 2002]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **Ne+** [MEYBOHM 2003]. **No+** [coll. KÖHLER]. **Pf+** [KÖHLER Bien]. **Rh+** [coll. KÖHLER]. **Sd+** [Saarbrücken, EISINGER, IV.2011, 1 Männchen [coll. EISINGER]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [HORNIG 2002d, HORNIG 2005, MUONA 2002]. **St+** [Athenstedt, JUNG, VII.2006 [JUNG i.l. 2006]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf+** [RENNER 2004].

Trixagus meyhohmi LESEIGNEUR, 2005: **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010, HERBIG in Vorber.]. **Hs+** [LESEIGNEUR 2005, KÖHLER Gold]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Rüte]. **Ne+** [LESEIGNEUR 2005]. **No+** [KÖHLER & KINKLER 2010]. **Pf+** [KÖHLER Bien]. **Rh+** [KÖHLER & NIEHUIS 2006]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [HORNIG 2005, LESEIGNEUR 2005, GOLLKOWSKI 2008b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf+** [RENNER 2008a].

Trixagus elateroides (HEER, 1841): **Br/**(+) [ESSER 2005a]. **Sn+** [HORNIG 2002a, HORNIG 2005, PESCHIEL i.l. 2007].

Trixagus duvali (BONV., 1859): **Hn**(+) [SCHMIDT et al. 2005]. **Ne**(+) [MEYBOHM 2001]. **SH**(+) [MEYBOHM 2001]. **Sn+** [HORNIG 2002a, HORNIG 2005]. **WE**(+) [BELLMANN & ESSER 2010].

Trixagus obtusus (CURT., 1827): **By**(-) [HOFMANN & KÖHLER 2010, HERBIG in Vorber.]. **MV+** [KÖHLER Bohn]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **No**(+) [KÖHLER 2006a]. **Pf**(+) [KÖHLER 2006a]. **Rh**(+) [KÖHLER 2006a]. **Sn**(+) [HORNIG 2002a, HORNIG 2005]. **St**(-) [JUNG 2007, JUNG 2007b]. **Th**(-) (+): nach Überprüfung von KOPETZ ist die Art nur vor 1950 belegt [HORNIG i.l. 2002]. **Wf**(+) [KÖHLER 2006a].

Trixagus exul BONV., 1859: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+** [Rüterberg bei Dömitz, ZIEGLER, 29.9.2001 [ZIEGLER i.l. 2011]. **Ne+** [MEYBOHM 2001]. **No+** [coll. KÖHLER]. **SH+** [MEYBOHM 2001]. **Sn+** [HORNIG 2002a, HORNIG 2005]. **St+** [HORNIG 2002a, JUNG 2007b]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, RENNER 2002]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

Trixagus alticus RTT., 1921: **No+** [KÖHLER 2006a]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sd+** [EISINGER 2006b]. **Sn+** [HORNIG 2002a, HORNIG 2005]. **St+** [JUNG i.l. XII.2006]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wf+** [KÖHLER 2006a].

Aulonothoriscus brevicollis (BONV., 1859): **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

Familie BUPRESTIDAE

Acmaeodera degener (SCOP., 1763): **Hs**(/) [HORNIG 1955].

Chalcophora mariana (L., 1758): **Sd** [NIEHUIS 2004].

Poecilontha variolosa (PAYK., 1799): **Br+**(-) [GOTTWALD & HORN-
BURG 2005].

Scintillatrix dives GUILLEB., 1889: **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Scintillatrix mirifica (MULS., 1855): **Pf**(?) [NIEHUIS 2004]. **Rh+** [NIEHUIS 2004].

Palmar festiva (L., 1758): **Ba+** [HEMMANN 2007].

Buprestis haemorrhoidalis HBST., 1780: **Br+**(-) [GOTTWALD & HORN-
BURG 2004].

Buprestis novemmaculata L., 1767: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sd** [NIEHUIS 2004]. **WE** [HORNIG 1955, BELLMANN i.l. 2000].

Buprestis octoguttata L., 1758: **MV**(-) (+): Prerow, A. RICHARD, 23. VII.2009, 1 Ex. (Fotobeleag) [A. RICHARD i.l. 2009, KÖHLER Rüte]. **Sd** [NIEHUIS 2004].

Melanophila acuminata (DEGEER, 1774): **Hn**(-) (+) [SCHMIDT et al. 2005].

Phaenops formeneki JACOBS., 1913: **MV+** [KÖHLER Rüte]. **St+** [BASE i.l. 2011].

Anthaxia manca (L., 1767): **Sd+** [EISINGER 2006a].

Anthaxia candens (PANZ., 1789): **Br**(/) [GOTTWALD & HORN-
BURG 2007, BARNDT 2008]. **No**(-) (+) [KÖHLER & KÖHLER 2009b]. **St**(-) (+) [BRECHTEL & KOSTENBADER 2002].

Anthaxia salicis (F., 1777): **Br+** [GOTTWALD & HORN-
BURG 2007]. **MV+** [ZIEGLER 2006a].

Anthaxia semicuprea KÖST., 1851: **Ba**(/) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **By**(/) (+): alle bisherigen Meldungen dieser Art sind auf *Anthaxia suzannae* zu beziehen. Sichere Nachweise: [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Hs+** [NIEHUIS & MÜLLER 2005, SCHAFFRATH 1999]. **Rh**(/) (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **St+** [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Th**(/) (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Wt**(/) (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005].

Anthaxia suzannae THÉRY, 1942: **Ba+** [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **By** (+): hierher alle bisherigen Meldungen für *Anthaxia semicuprea* [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Pf** (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Rh** (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Th** (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005]. **Wt** (+) [NIEHUIS & MÜLLER 2005].

Anthaxia fulgurans (SCHRK., 1789): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Anthaxia podolica MANNH., 1837: **Br+** [GOTTWALD & HORN-
BURG 2005]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Anthaxia nitidula (L., 1758): **MV**(-) (+) [DEUTSCHMANN 2010, RINGEL i.l. 2011].

Anthaxia helvetica STIERL., 1868: **Br+** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002].

Anthaxia godeti LAP. GORY, 1839: **WE+** [BELLMANN et al. in Vor-
ber.].

Chrysobothris affinis (F., 1794): **WE**(+) [BELLMANN & ESSER 2010].

Chrysobothris solieri LAP. GORY, 1838: **Br**(/) (+) [GOTTWALD & HORN-
BURG 2004]. **Ne**(/) (+) [GÜRLICH et al. i.V.].

Chrysobothris igniventris RTT., 1895: **Br+** [DREGER et al. 2002, GOTTWALD & HORN-
BURG 2004]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Coraeus undatus (F., 1787): **Hs**(-) (+) [NOLTE et al. 1997].

Coraeus elatus (F., 1787): **Hs**(-) (+) [NIEHUIS i.l.].

Agilus guerini LACORD., 1835: **Hs**(/) (+) [NIEHUIS 2004]. **Rh+** [NIE-
HUIS 2004]. **Sd+** [NIEHUIS 2001b].

Agilus ater (L., 1767): **Sd+** [NIEHUIS 2004]. **St**(-) (+): Altwasser bei Schartau und Ohreawe bei Rogätz, Anfang V.1998 Fraßbilder an zahlreichen Hybridpappeln gefunden (BÜCHE). Am ersten Fundort ESSER & GOTTWALD 21.VI.1998, 4 Ex an Stämmen stehender, anbrüchiger Pappeln laufend [BÜCHE i.l.]. **Th+** [STUMPF 2004a, KOPETZ et al. 2008].

Agilus hastulifer (RATZ., 1837): **SH** [GÜRLICH et al. i.V.].

Agilus deraesofasciatus LACORD., 1835: **No+** [NIEHUIS & MÜLLER 2002, KÖLBECK 2010]. **Sn+** [ESSER 2006c].

Agilus olivicolus KIESW., 1857: **Sd+** [NIEHUIS 2004]. **WE+** [BELL-
MANN et al. 2003].

Agilus convexicollis REDT., 1849: **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

Agilus subauratus (GEBL., 1833): **MV+** [LUDWIGSLUST, Truppen-
übungsplatz, ZIEGLER, 2.V.2007 [ZIEGLER i.l. 2007].

Agilus betuleti (RATZ., 1837): **MV**(-) (+) [RINGEL i.l. 2011].

Agilus pseudocyanus KIESW., 1857: **Ba**(/) (+), **Br** von [EICHLER et al. 1999] sicher falsch, **Pf**(/) (+) und **Th**(/) (+): Die Art kommt nicht in Deutschland vor (Rußland, Polen, Österreich, Schweiz) [JENDEK 1995].

Agilus delphinensis AB., 1897: **Ba+**, **Pf+** und **Th-**: ist eine von *Agilus pseudocyanus* verschiedene Art, für die spärliche Fundangaben von der Mongolei bis Frankreich und Finnland bis Norditalien vorliegen [JENDEK 1995], hierher sicher auch **Br+** von [EICHLER et al. 1999] (*pseudocyanus*).

Agilus pratensis (RATZ., 1837): **MV+** [ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **SH**(-) (+) [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**(-) (+) [coll. WAGNER, BELL-
MANN i.l. 2000].

Agilus ribesi SCHAEF., 1946: **Sn+** [ESSER 2006c]. **St+**: In einem ver-
wilderten Garten nördl. Rogätz, BÜCHE 15.VI.1998, mehrere Ex. an verkümmerten, voll besonnenen Johannisbeersträuchern (*Ribes rubrum*) [BÜCHE i.l.]. **Th+** [ESSER 2006b].

Agilus cuprescens MENETRIER, 1832: **Hs**(/) (+): Groß-Gerau, HANSEN, 17.VI.1951, 1 Ex. (BOHME det., t. NIEHUIS) [coll. BÖHME].

Agilus hyperici (CREUTZ., 1799): **Br**(/) (+) [EICHLER et al. 1999, BARNDT 2008].

Agilus auricollis KIESW., 1857: **Ba+** [LANGE 2005]. **Sn+** [DIETZE & WOLSCHE 2005, coll. SCHAFFRATH]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Agilus sinuatus (OL., 1790): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **MV+** [BÜ-
CHE & ESSER 1999]. **WE+** [ESSER 2001d].

Aphanisticus pusillus (OL., 1790): **SH**(-) (+) [ZIEGLER 2004].

Trachys troglodytes GYL., 1817: **WE**(/) (+) [coll. KERSTENS, BELL-
MANN i.l. 2000].

Trachys subglabra REY, 1891: **Br+** [GOTTWALD & HORN-
BURG 2007].

Trachys troglodytiformis OEBEN., 1916: **Pf** (+) [ARK Bienwald].

Trachys scrobiculatus KIESW., 1857: **Br**(/) (+) [ESSER 2001, GOTTWALD & HORN-
BURG 2004, BARNDT 2007]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs+**: Wispertal, NIEHUIS, 2002 [NIEHUIS i.l.]. **No+** [KÖHLER 2006b, WAGNER 1997]. **Sd**(-) (+) [NIEHUIS 2004].

Trachys fragariae BRIS., 1874: **Sd**(-) (+) [NIEHUIS 2004].

Familie CLAMBIDAE

Calyptomerus alpestris REDT., 1849: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sn**(-) (+) [LORENZ 2005]. **Th** [KOPETZ et al. 2004].

Calyptomerus dubius (MARSH., 1802): **MV**(/) (+) [KÖHLER Bohn, ZIE-
GLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Th**(-) (+) [APFEL 2003].

Clambus pubescens REDT., 1849: **Hs+**(-) [KÖHLER Loch]. **MV+**(-) [BÜCHIE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, RINGEL & MÜLLER-MOTZFELD 2002].

Clambus simsoni BLACKBURN, 1902: **Ba+** [RENNER 2002, RENNER 2000a, FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2005b]. **Hs+** [KÖHLER Loch]. **MV+** [GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **No+** [KÖHLER 2002a, JUNKER & KÖHLER 2005, KÖHLER & KINKLER 2010]. **Pf+** [KÖHLER Bien]. **Rh+** [KÖHLER Etsch]. **Sd+** [EISINGER 2005]. **St+** [JUNG 2007b]. **Th+** [RENNER i.l. 2007, KOPETZ et al. 2008]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Clambus lohsei MEYBOHM, 2004: **Ne+** [MEYBOHM 2004]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Clambus punctulum (BECK, 1817): **MV+**(-) [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & MÜLLER-MOTZFELD 2002, GÜRLICH]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Clambus gibbulus (LEC., 1850): **By+** [SCHMIDL et al. 2005]. **Ne**(+): die Angabe bei MEYBOHM (2000) beruhte auf fehldeterminierten *Cl. punctulum* und *Cl. pallidulus* [TOLASCH i.l. 2001].

Clambus pallidulus RTT., 1911: **Ba+**: Wyhl, Rhein-Auwald, RENNER, 27.V.2006, 3 Ex. im Autokeschler [coll. RENNER]. **MV+** [GÜRLICH Cono]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **St+** [JUNG 2007]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Clambus nigrellus RTT., 1914: **Br+** [EICHLER et al. 2002]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Clambus minutus (STURM, 1807): **Ne**(+): Grippel, Forst Landwehr, ZIEGLER, 21.VI.1998, 1 Ex. im Autokeschler (KÖHLER 2000) ist *Clambus simsoni* [ZIEGLER mdl. Mitt. 1999]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Clambus nigriclavus STEPH., 1835: **Hs+** [FLECHTNER 2003b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Familie DASCILLIDAE

Dascillus cervinus (L., 1758): **Br+**(-) [ESSER & SCHNEIDER 2002].

Familie SCIRTIDAE

Elodes pseudominuta KLAUSN., 1971: **MV+** [RINGEL i.l. 2011].

Elodes elongata TOURN., 1868: **No+** und **Rh+**: Im Verzeichnis wurde der Eintrag im Suppl. 4 zu den Arten 3 *elongata* (koelleri) und 4 *tricuspis* (*elongata*) übersehen! [KÖHLER 1992c, KÖHLER & KINKLER 2010].

Elodes tricuspis NYHOLM, 1985: **No**(+) und **Rh**(+): die rheinischen Belege gehören zu *Elodes elongata* (koelleri) FHL 6, 13 [KÖHLER 1992c].

Elodes gedleri KIESW., 1863: **By**(+) [HECKES et al. 2006].

Cyphon palustris THOMS., 1855: **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000, MENKE in Vorber.].

Cyphon hilaris NYH., 1944: **St+** [BÄSE 2011].

Scirtes orbicularis (PANZ., 1793): **By**(+) [HECKES et al. 2006].

Familie PTILODACTYLIDAE

Ptilodactyla exotica CHAPIN, 1927: **No+**: Köln, Botanischer Garten, HÖRREN, 2009 ff., wiederholt in Tropenhäusern [HÖRREN i.l. 2011].

Familie EUCINETIDAE

Eucinetus haemorrhoidalis (GERM., 1818): **Sd+** [EISINGER 2006a].

Familie DRYOPIIDAE

Pomatius substriatus (MÜLL., 1806): **Hs+**: Seeheim-Jugenheim, Balkhäuser Tal, VOGT, 1959 [coll. HÖHNER].

Dryops striatellus (FAIRM.BRIS., 1859): **By**(+) [HECKES et al. 2006].

Dryops luridus (ER., 1847): **MV+**(-) [ZIEGLER 2006a].

Dryops auriculatus (GEOFFR., 1785): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].

Dryops similaris BOLLOW, 1936: **Hs+**: Pfungstädter Moor, VOGT, 1954 - Rodenbach, HÖHNER, 1975 - Mainhausen, Badeseen, HOFMANN, 1991 [coll. HÖHNER, coll. HOFMANN]. **Pf+** [SONDERMANN & ERDNOSS 2002].

Dryops griseus (ER., 1847): **No**(-) [coll. KÖHLER]. **Rh**(+/-) [HADULLA 2008a]. **Th**(-) [SKALE & BELLSTEDT 2001]. **Sn**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Dryops anglicanus EDW., 1909: **Ba?** [FRANK & KONZELMANN 2002, aber fraglich]. **WE-** [HORION 1955, BELLMANN i.l. 2000].

Dryops subcaneus (KUW., 1890): **By**(+) [HECKES et al. 2006].

Dryops lutulentus (ER., 1847): **WE+** [SCHNEIDER 1900, BELLMANN i.l. 2000]. **Sn**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Dryops nitidulus (HEER, 1841): **Ba**(+) und **Wt**(+): die Art ist vorerst zu streichen, da HORION (1951) die Art für die Region nicht explizit erwähnt und eine weitere Quelle (coll. ULBRICH) auf einer Fehlbestimmung beruht [KONZELMANN i.l. 2001].

Familie ELMIDAE

Stenelmis canaliculata (GYLL., 1808): **SH**(-): Beleg vid. TOLASCH, Bestimmung richtig, jedoch ist der Fundortzettel mit Sicherheit vertauscht [TOLASCH i.l. 2001].

Elmis maugetii LATR., 1798: **MV**(+?) [WEIGEL & WOLF 2001]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].

Elmis aenea (MÜLL., 1806): **Br+** [BRAUNS 2003, HENDRICH & MÜLLER 2006].

Elmis obscura (MÜLL., 1806): **Br+** [EICHLER et al. 1999]. **No+** [HADULLA 2004]. **Pf**(-) [ARK Bienenwald]. **Rh**(+/-): Altenahr-Kreuzberg, Ahr, HADULLA, 13.VI.2010, 1 Ex. [coll. HADULLA].

Esolus parallelepipedus (MÜLL., 1806): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].

Oulimnius tuberculatus (MÜLL., 1806): **MV**(-) [WOLF 1998].

Oulimnius troglodytes (GYLL., 1827): **MV**(+) [BÜCHIE i.l.].

Limnius opacus MÜLL., 1806: **No+** [coll. KÖHLER].

Riolus cupreus (MÜLL., 1806): **WE?** [HOLLMANN 1884, BELLMANN i.l. 2000].

Macronychus quadratuberculatus MÜLL., 1806: **Pf**(-) [ARK Bienenwald, WESTERMANN 1997].

Familie HETEROCERIDAE

Heterocerus fossor KIESW., 1843: **Br**(?) [EICHLER et al. 1999].

Heterocerus obsoletus CURT., 1828: **Br**(-) [EICHLER et al. 1999].

Heterocerus marginatus (F., 1787): **Br**(-) [EICHLER et al. 2002, BARNDT 2008].

Heterocerus fenestratus (THUNB., 1784): **Br**(-) [EICHLER et al. 1999].

Heterocerus fuscus KIESW., 1843: **Br**(-) [EICHLER et al. 1999].

Heterocerus hispidulus KIESW., 1843: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Br**(-) [EICHLER et al. 1999]. **By**(-) [HECKES et al. 2006]. **Wt**(+): die Art ist vorerst zu streichen, da HORION (1951) die Art für die Region nicht explizit erwähnt und eine weitere Quelle (coll. Mus. Stuttgart) falsch ist [HORION 1951, coll. Mus. Stuttgart].

Heterocerus pruinosis KIESW., 1851: **Rh**(-): neuere Belege sind *crinitus*, RENNER det. [RENNER i.l.].

Heterocerus intermedius KIESW., 1843: **Br**(-) [EICHLER et al. 1999]. **No+** [coll. KÖHLER]. **St+** [SCHOLZE 2007]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Heterocerus crinitus KIESW., 1950: **No+** [coll. KÖHLER]. **Rh+** [coll. KÖHLER, coll. RENNER].

Heterocerus sericans KIESW., 1843: **WE** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000]. **Wt**(+): der der Meldung zugrundeliegende Beleg aus der coll. BUCK erwies sich als Fehlbestimmung [HORION 1955: fragl., KONZELMANN i.l. 2001].

Familie PSEPHENIDAE

Eubria palustris GERM., 1818: **Ba**(+): die Art ist im Status zurückzustufen, da die einzige neuere Meldung aus der coll. KNAPP auf einer Fehlbestimmung beruhte [HORION 1955, KONZELMANN i.l. 2001]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wf**(-) [RENNER 2008a]. **Wt+** [KOSTENBADER 2009].

Familie LIMNICHIDAE

Pelochares versicolor (WALT., 1838): **Br**(-) [ESSER 2010].

Limnichus pygmaeus (STURM, 1807): **Br**(-) [BEIER & KÖRGE 2001, ESSER & SCHNEIDER 2002].

Limnichus sericeus (DUFT, 1825): **Br**(-) [ESSER 2010]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

Familie DERMESTIDAE

Dermestes undulatus BRAHM., 1790: **MV**(-): Speck, Müritz-Nationalpark, SPRICK, 14.IX.1995, 1 Ex. (t. KÖHLER) unter toter Eichde [coll. SPRICK, KÖHLER Rüte].

Dermestes szekessyi KALIK, 1950: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Dermestes gyllenhali CAST., 1840: **Br**(-) [EICHLER et al. 1999, ESSER & SCHNEIDER 2002]. **MV**(-) [GÜRLICH Vilm]. **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **SH**(-): Kiel, Umgebung, HANSEN, 8.VII.51, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME].

Dermestes aurichalceus KÜST., 1846: **Wt+** [KALIK 1992, FRANK & KONZELMANN 2002].

Dermestes ater DEGEER, 1774: **Sn**(-) [GOLLKOWSKI 2008b].

Dermestes peruvianus CAST., 1840: **Wt**(+): die Art ist zu streichen, da HORION die Art nicht aus Württemberg erwähnt und der Beleg aus der coll. DYNORT zu einer anderen Art gehört [HORION 1955, KONZELMANN i.l. 2001].

Dermestes haemorrhoidalis KÜST., 1852: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999].

Attagenus smirnovi ZHANTIEV, 1973: **By+**: München, X.2007, in Altbauwohnung [www.entomologie.de]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

No+ [MÜLLER 2006]. **Sd+**: Saarbrücken (L. HERRMANN) [LILLIG i.l. 2008]. **Sn+** [GÜNTHER & PESCHEL 2001, LORENZ 2001b, GOLLOWSKI 2008b].

Attagenus brunneus FALD., 1835: **Ne+** [HERRMANN 2007].

Attagenus punctatus (SCOP., 1772): **MV+**(.) [ZIEGLER 2006a, KÖHLER RÜTE]. **No+** [HADULLA 2008a]. **Sn+** [HORNIG 2000a, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St+**(-) [BÄSE 2007, JUNG 2007].

Trogoderma angustum (SOL., 1849): **MV+**: Schwerin, Innenstadt, RÖSSNER, 28.IX.2007 [ZIEGLER i.l. 2007].

Trogoderma megatomoides RTT., 1880: **Pfi**: Neuhausen, BÖHME, 31.VII.89, 1 Ex. synanthrop [coll. BÖHME]. **Rh+** [BAUMANN & KÖHLER 2000].

Trogoderma granarium EVERTS, 1898: **St+** [SCHOLZE 2007].

Trogoderma versicolor (CREUTZ., 1799): **Br+**(-) [EICHLEER et al. 1999]. **Hs+** [BRENNER 2009]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+**(-) [CIUPA & SCHORNACK 2001].

Globicornis nigripes (F., 1792): **MV+**(.) [ZIEGLER 2006a, KÖHLER RÜTE]. **St+**(-) [DIETZE & SCHORNACK 1999, BÄSE 2007, KNOBBE 2008].

Globicornis fasciata (FAIRM., 1859): **Br+** [ESSER et al. 2006].

Globicornis marginata (PAYK., 1798): **Hs+**(.) [SCHAFFRATH 2010b]. **MV+**(-) [MÖLLER 2003].

Globicornis corticalis (EICHH., 1863): **St+** [BÄSE 2007]. **Sn+** [HORNIG 2006].

Anthrenus olgae KALIK, 1946: **Br+** [ESSER 2000].

Trinodes hirtus (F., 1781): **Rh+**(-) [FRANZEN 1995].

Anthrenocerus australis (HOPE, 1843): **Ba+** [BÜCHE 2003]. **By+**: München, Stadtgebiet, HENSE, 2009 wiederholt im Haus am Fenster [HENSE i.l. 2009]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [WEIGEL 2005]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].

Reesa vespalae (MILL., 1939): **Br+**(?) [EICHLEER et al. 1999, ESSER 2001]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **WE+** [ESSER 2001d].

Familie NOSODENDRIDAE

Nosodendron fasciculare (OL., 1790): **Pf+** [KÖHLER BIEH]. **Sn+**(-) [LORENZ 2001b]. **St+**(-) [DIETZE 2005, ZIEGLER 2006b].

Familie BYRRHIDAE

Morychus aeneus (F., 1775): **Hs+**: Lampertheimer Wald, BRENNER, 1994 [coll. HÖHNER].

Lamprobyrrhus nitidus (SCHALL., 1783): **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].

Byrrhus arietinus STEFF., 1842: **SH+**(-): HH Wohldorfer Wald, GÜRLICH, 18.V.-1.VI.1999, 1 Ex. in einer Bodenfalle [TOLASCH i.l. 2001].

Byrrhus signatus PANZ., 1809: **MV+** [coll. RINGEL]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Curinus erinaceus (DUFT., 1825): **WE?** [HOLLMANN 1884, BELLMANN i.l. 2000].

Chaetophora spinosa (ROSSI, 1794): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+**(-) [JUNG 2001].

Curimopsis nigrita (PALM, 1934): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].

Familie BOTHRIDERIDAE

Bothridereus bipunctatus (GMEL., 1790): **Ba+** [ROPPEL 2010]. **St+** [BÄSE 2007].

Oxylaemus cylindricus (PANZ., 1796): **Br+**(-) [JAKOBITZ & ZIESCHKE in Vorber.].

Oxylaemus variolosus (DUF., 1843): **Br+**(-) [MÖLLER 2003]. **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **St+**: Umg. Dessau, STIELER, 1.1956, 1 Ex. [coll. NÜSSLER, HORNIG 2000f].

Anommatus reitteri GÄNGL., 1899: **Sn+** [HORNIG 2001].

Anommatus duodecimstriatus (MÜLL., 1821): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+**(-) [JUNG 2007b, JUNG 2010].

Anommatus diecki RTT., 1875: **Sn+** [HORNIG 2001].

Familie CERYLONIDAE

Philothermus evanescens RTT., 1876: **MV+** [MÖLLER 2003].

Cerylon ferrugineum STEPH., 1830: **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2001, SCHOLZE 2007].

Cerylon impressum ER., 1845: **St+** [JUNG 2010].

Murmidioides ovalis (BECK, 1817): **Sn+** [HORNIG 2002b].

Familie SPHAEROSOMATIDAE

Sphaerosoma pilosum (PANZ., 1793): **MV+**(.) [GÜRLICH 2005a, MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO].

Sphaerosoma piliferum (MÜLL., 1821): **By+**(.) [GOSSNER et al. 2008].

Familie NITIDULIDAE

Carpophilus ligneus MURR., 1864: **Wt+** [REIBNITZ 2001].

Carpophilus sexpustulatus (F., 1791): **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER RÜTE].

Carpophilus hemipterus (L., 1758): **MV+**: Marxhagen, 30.IX.2002, BÜCHE, 1 Ex. an einer Wildfutterstelle in Silagegetreide [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, KÖHLER RÜTE, BÜCHE i.l.]. **Sn+** [GOLLOWSKI 2008b].

Carpophilus dimidiatus (F., 1792): **Sn+** [GOLLOWSKI 2008b]. **Th+**(i) [WEIGEL 1996].

Carpophilus truncatus MURRAY, 1864: **MV+** [ESSER 2002b]. **No+** [KÖHLER 2006a]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+** [SCHOLZE 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Carpophilus mutilatus ER., 1843: **Bai** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Br+**(i) [MÖLLER 2003]. **Hn+**(i) [BORCHERDING 1994]. **WE+** [coll. BELLMANN].

Carpophilus nepos MURRAY, 1864: **WE+** [BELLMANN & MAUS 2007].

Carpophilus extensus GROUV., 1908: **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].

Meligethes solidus (ILL., 1798): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].

Meligethes denticulatus (HEER, 1841): **Sn+** [LORENZ 2001b, HORNIG 2000a, PESCHEL i.l. 2007].

Meligethes flavimanus STEPH., 1830: **MV+** [SCHMIDT et al. 2007]. **Sn+** [DIETZE & WOLSCHE 2005, PESCHEL i.l. 2007, LORENZ 2001a].

Meligethes subrugosus (GYLL., 1808): **Sn+** [LORENZ 2001a]. **WE+**(-) [BELLMANN & MENKE 2005].

Meligethes caudatus GUILLEBEAU, 1897: **Hs+** [FLECHTNER 2003b, SCHMIDT 2002]. **Sn+** [KONZELMANN 2006a].

Meligethes corvinus ER., 1845: **Hn+** [SPRICK et al. 2001, BORCHERDING 1994].

Meligethes reitteri SCHILSKY, 1894: **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Wf+** [TERLUTTER 2003].

Meligethes subaeneus STURM, 1845: **Sn+**(-) [LORENZ 2001b, GOLLOWSKI 2008b]. **St+** [JUNG 2001].

Meligethes matronalis AUDIS. SPORN., 1990: **Ba+** [RENNER 2005b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Sn+** [PESCHEL 2010]. **Th+** [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [ESSER 1999].

Meligethes coracinus STURM, 1845: **MV+**(-) [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003].

Meligethes longulus SCHILSKY, 1894: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Rh+** [BAUMANN & KÖHLER 2000]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Meligethes humerosus RTT., 1871: **St+** [BÄSE 2006b].

Meligethes viridescens (F., 1787): **MV+**(-) [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, KÖHLER RÜTE].

Meligethes czwalinae RTT., 1871: **St+** [ESSER 2001c].

Meligethes lepidii MILL., 1852: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].

Meligethes bidens BRIS., 1863: **Ne+**(+) [MEYBOHM 2003]. **Sn+**(-) [LORENZ 2001a].

Meligethes sulcatus BRIS., 1863: **Br+**(-) [DREGER et al. 2002, EICHLEER et al. 1999, BARNDT 2008].

Meligethes atramentarius FÖRST., 1849: **Br+** [BEIER & KÖRGE 2001]. **Sn+**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Meligethes difficilis (HEER, 1841): **MV+**(-) [BÜCHE & ESSER 1999, RINGEL et al. 2007].

Meligethes kunzei ER., 1845: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Meligethes ochropus STURM, 1845: **Br+** [DREGER et al. 2009, EICHLEER et al. 2003]. **By+**(-) [BUSSLER & FUCHS 2006]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007].

Meligethes morosus ER., 1845: **MV+**(-) [RINGEL & HAMPEL 2003]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [LORENZ 2001b].

Meligethes brunnicornis STURM, 1845: **MV+**(-) [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, KÖHLER RÜTE].

Meligethes haemorrhoidalis FÖRST., 1849: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000, BORCHERDING 1994]. **Sn+**(-) [LORENZ 2001b].

Meligethes byssoni BRIS., 1882: **St+** [ESSER 2001c].

Meligethes persicus FALD., 1837: **Hs+**(-) [FLECHTNER 2000]. **St+**(-) [SPRICK 2000, BORCHERT 1951].

Meligethes pedicularius (GYLL., 1808): **MV+** [RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999].

Meligethes serripes (GYLL., 1827): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].

Meligethes nanus ER., 1845: **Ba+**(-): die Art ist im Status zurückzustufen, da der letzte Nachweis aus dem Jahr 1937 datiert und die neue Meldung in der coll. ULBRICH nicht belegt ist [HORNIG 1960, KONZELMANN i.l. 2001].

Meligethes ruficornis (MARSH., 1802): **Pf+**(-) [KÖHLER 2004a]. **Sn+**: Bautzen, SCHRADER, 13.VI.2000, 1 Ex. (JELINEK det.) [coll. BÖH-

- ME]. **Th+**(-): Kattenberg/Kyffhäuser, Hahlbohm, 7.V.2000, 1 Ex. [Sprick i.l. 2001]. **Wf+**(-): [Renner 2003a].
- Meligethes ovatus* Sturm, 1845: **Sd+** [Eisinger 2006a]. **Sn+**(-) [Lorenz 2001b].
- Meligethes incanus* Sturm, 1845: **Wf+**(-) [Sprick & Terlutter 2006].
- Meligethes maurus* Sturm, 1845: **Br+**(-) [Renner 2008b]. **WE?** [Brüggemann 1873, Bellmann i.l. 2000]. **Wf+**(-) [Sprick & Terlutter 2006].
- Meligethes obscurus* Er., 1845: **Sn+** [Lorenz 2001b].
- Meligethes distinctus* Sturm, 1845: **Hs+** [Konzelmann 2006a]. **St+**(?) [Jung 2007]. **Wt+** [Konzelmann 2006a].
- Meligethes exilis* Sturm, 1845: **Br+** [Eichler et al. 1999]. **Th+** [Kopetz et al. 2004].
- Meligethes acicularis* Bris., 1863: **Th+** [Kopetz et al. 2004].
- Meligethes lugubris* Sturm, 1845: **Hs+** [Schmidt et al. 2000].
- Meligethes gagatinus* Er., 1845: **Hn+**(-) [Schmidt et al. 2005]. **Wf+**(-) [Köhler Sieg, Terlutter 2003].
- Meligethes egenus* Er., 1845: **Br+**(-) [Esser 2001e]. **St+**(-) [Bäse 2007]. **Sn+**(-) [Klausnitzer et al. 2009].
- Meligethes erichsoni* Bris., 1863: **Hn+** [Schmidt et al. 2000].
- Meligethes bidentatus* Bris., 1863: **Hn+**(-) [Schmidt et al. 2000]. **No+** [Gräf & Koch 1981]. **Rh+** [Baumann 1999].
- Meligethes brachialis* Er., 1845: **Hn+**(-) [Schmidt et al. 2005]. **Ne+**(-) [Meybohm 2001].
- Meligethes nigrescens* Steph., 1830: **WE+**(-) [Menke in Vorber.].
- Meligethes assimilis* Sturm, 1845: **Br+**(-) [Renner 2008b].
- Meligethes symphyti* (Heer, 1841): **MV+**(-) [Ringel & Hampel 2003].
- Meligethes tristis* Sturm, 1845: **Hn+** [Schmidt et al. 2000].
- Epiraea guttata* (Oll., 1811): **Hn+** [Sprick et al. 2001].
- Epiraea fuscicollis* (Steph., 1832): **By+**(-) [Hofmann & Köhler 2010, Bussler et al. in Vorber.]. **Th+**(-) [Apfel 2003]. **WE+**(-) [Koll. Kerstens, Bellmann i.l. 2000].
- Epiraea neglecta* (Heer, 1841): **Th+** [Weigel 1996, Kopetz et al. 2004].
- Epiraea laeviuscula* (Gyll., 1827): **Th+**(-) [Jung 2007].
- Epiraea deubeli* Rtt., 1898: **Hs+** [Schaffrath 1999].
- Epiraea thoracica* Tour., 1872: **Br+** [Dreger et al. 2002, Möller 2003]. **WE+**(-) [coll. Kerstens, Bellmann i.l. 2000]. **Wt+** [Frank & Konzelmann 2002].
- Epiraea angustula* Sturm, 1844: **Wt+** [Frank & Konzelmann 2002].
- Epiraea oblonga* (Hbst., 1793): **Ba+** [Bense 2006b].
- Epiraea boreella* (Zett., 1828): **Th+** [Kopetz & Weigel 2000].
- Epiraea marseuli* Rtt., 1872: **St+**(-) [Bäse 2007, Jung 2001, Scholze 2007].
- Epiraea pygmaea* (Gyll., 1808): **MV+**(-) [Köhler 2003a, Köhler Bohn, Ringel & Hampel 2003, Ziegler 2006a, Gürlich User]. **St+** [Bäse 2007, Jung 2001].
- Epiraea binotata* Rtt., 1872: **St+**(-) [Jung 2007]. **Th+** [Apfel 2003, Kopetz et al. 2004].
- Epiraea distincta* (Grimm., 1841): **Br+** [Esser & Schneider 2002]. **Sn+**(-) [Lorenz 2003, Lorenz 2001a]. **St+** [Bäse 2007, Renner 2008b]. **Th+** [Kopetz et al. 2004]. **Wf+**: Hagen, Erlenbruch, J. Bückler, IV.2009, 1 Ex. (Fotobeleag, Köhler det.) [www.insektenfotos.de].
- Epiraea biguttata* (Thunb., 1784): **Hn+** [Borchering 1994]. **Sd+** [Möller 2005]. **WE+**(-) [coll. Kerstens, Bellmann i.l. 2000].
- Epiraea muehli* Rtt., 1908: **No+** [Köhler NWZ9]. **Rh+** [Köhler Eisc]. **Sd+** [Möller 2005].
- Epiraea silacea* (Hbst., 1784): **Hs+**(-) [Schaffrath 1999]. **Pf+**(-) [Köhler Bien].
- Epiraea melina* Er., 1843: **MV+**(-) [Köhler Bohn, Ringel & Hampel 2003, Ziegler 2006a, Gürlich Cono].
- Epiraea rufomarginata* (Steph., 1830): **St+**(-): Stiege/Harz, Böhme, 24.VI.92, 1 Ex. (Jelinek det.) [coll. Böhme].
- Epiraea ocularis* Fairm., 1849: **Ba+** [Konzelmann 2001, Renner 2000a, Frank & Konzelmann 2002, Schunger 2001]. **Br+** [Esser & Schneider 2002]. **By+** [Hofmann & Köhler 2010, Herbig in Vorber.]. **Hn+** [Sprick et al. 2007]. **Hs+** [Brenner 2006]. **Ne+** [Burgart 2005]. **No+** [Junker & Köhler 2005, Junker 2009, Junker & Köhler 2010, Kölbeck 2010]. **Pf+** [Konzelmann 2001]. **Rh+** [Köhler Naub]. **Sd+** [Eisinger 2006a]. **SH+** [Gürlich et al. i.V.]. **S+**: Leipzig-Mockau, 30.X.2009, in Anzahl [Richter 2009, Gollkowski 2008b, Peschel 2010]. **St+** [Jung 2007b]. **Th+** [Kopetz et al. 2008]. **WE+** [Bellmann et al. 2003]. **Wf+** [Junker & Köhler 2005]. **Wt+** [Konzelmann 2001, Frank & Konzelmann 2002].
- Nitidula carnaria* (Schall., 1783): **Hn+**(-) [Sprick et al. 2001].
- Amphotis marginata* (F., 1781): **MV+**(-): Ulrichshusen, Büche 21. IV.2000, 1 Ex und Neu Gaartz, Büche 22.04.00, mehrere Ex., bei *Lasius fuliginosus* [Büche i.l.].
- Soronina punctatissima* (Ill., 1794): **Sn+** [Dietze & Wolsch 2005, Günther & Peschel 2001, Lorenz 2001a]. **Th+**(-) [Apfel 2003].
- Selidota geminata* (Say, 1825): **Ba+** [Köhler 2009a]. **Hs+**: Seeheim-Jugenheim, Lange, 2008 [coll. Lange]. **Pf+**: Herxheim, Persohn, 10.VIII.2009, an vergorenen Weintrauben [Köhler 2009a]. **Wt+** [Köhler 2009a].
- Ipidia binotata* Rtt., 1875: **Sn+** [Lorenz 2006, Klausnitzer & Klausnitzer 2009].
- Pocadius adustus* Rtt., 1888: **Sn+** [Weigel 2005, Gollkowski 2008b]. **St+**: Blankenburg, Böhme, 24.VI.92, 1 Ex. [Bäse 2007, coll. Böhme, Dietze 2005]. **Th+** [Kopetz & Weigel 2000].
- Cychramus variegatus* (Hbst., 1792): **Pf+** [coll. Reissmann]. **Sn+**(-) [Lorenz 2005].
- Cryptarcha strigata* (F., 1787): **St+**(-) [Dietze & Schornack 1999, Jung 2001, Bäse 2007, Scholze 2007].
- Cryptarcha undata* (Oll., 1790): **Sn+** [Dietze & Wolsch 2005, Gollkowski 2008b, Lorenz 2001a]. **St+** [Dietze 2005, Bäse 2007, Scholze 2007].

Familie KATERETIDAE

- Kateretes pusillus* (Thunb., 1794): **Hs+**: Kühkopf, Vogt, 1952 [coll. Höhner]. **St+**(-) [Jung 2001, Bäse 2007]. **Th+** [Kopetz & Weigel 2000]. **WE+** [Schneider 1900, Bellmann i.l. 2000].
- Heterhelus scutellaris* (Heer, 1841): **Br+**(?) [Gandenitz, Böhme, 15.V.97, 1 Ex. [coll. Böhme].
- Heterhelus solani* (Heer, 1841): **Hn+**(-) [Sprick et al. 2001]. **Sn+**(-) [Gollkowski 2008b]. **St+** [Bäse 2007].
- Brachypterus fulvipes* Er., 1843: **WE+** [coll. Esser, Bellmann i.l. 2000].
- Brachypterus linariae* (Steph., 1830): **St+** [Bäse 2007, Jung 2007b]. **Th+** [Kopetz et al. 2004].
- Brachypterus antirrhini* Murr., 1864: **No+**(-) [Gräf & Koch 1981, coll. Köhler]. **St+**(-) [Jung 2001, Bäse 2007, Scholze 2007].
- Brachypterus vestitus* Kiesw., 1850: **MV+** [Köhler Bohn]. **Ne+** [Gürlich et al. i.V.]. **St+** [Jung 2001]. **WE+** [Bellmann & Esser 2010].

Familie CYBOCEPHALIDAE

- Cybocephalus fodori* E.-Y., 1965: **MV+** [Köhler Bohn, Köhler Rüte]. **Sn+** [Klausnitzer et al. 2009, Jakobitz & Ziesche in Vorber.].
- Cybocephalus politus* (Gyll., 1813): **MV+**(-): Marxhagen, Müritzkreis, Büche 2.III.1999, 1 Ex gesiebt aus Bodenstreu in einem kleinen, von *Prunus*-Arten dominierten Feldgehölz [Büche i.l.].

Familie MONOTOMIDAE

- Monotoma angusticollis* (Gyll., 1827): **Hn+** [Schmidt et al. 2000].
- Monotoma spinicollis* Aubé, 1837: **MV+**(-) [Ziegler 2006a]. **Sn+**(-) [Dietze & Wolsch 2005].
- Monotoma brevicollis* Aubé, 1837: **MV+** [Kleeberg & Busch 2010]. **Sn+** [Lorenz 2001a].
- Monotoma bicolor* Villa, 1835: **MV+** [Büche & Esser 1999].
- Monotoma quadricollis* Aubé, 1837: **Br+** [Esser 2010]. **By+** [Vorst 1999]. **Ne+** [Meybohm 2000]. **No+** [Katschak 2000, Junker 2001, coll. Köhler]. **Pf+** [Renner 2005a]. **Rh+** [Renner 1999b, Wenzel & Hannig 2002]. **Sd+** [Vorst 1999]. **SH+** [Meybohm 2000]. **Th+** [Renner 1999b, Kopetz et al. 2008]. **WE+** [Vorst 1999]. **Wf+** [Köhler Sieg]. **Wt+** [Konzelmann 2010].
- Monotoma testacea* Motsch., 1845: **MV+** [Esser 2002b, Köhler Rüte].
- Rhizophagus grandis* Gyll., 1827: **Ba+** [Schunger 2001]. **Br+** [Dreger et al. 2009]. **Hn+**(-) [Schmidt et al. 2000]. **MV+** [Ringel & Hampel 2003]. **Sn+**(-) [Lorenz 2006, Sieber et al. 2011].
- Rhizophagus ferrugineus* (Payk., 1800): **MV+**(-) [Gürlich 2005a, Köhler 2003a, Köhler Bohn, Ringel & Hampel 2003, Gürlich Cono, Gürlich User, Köhler Rüte].
- Rhizophagus parallelocollis* Gyll., 1827: **St+**(-) [Dietze 2005, Jung 2001].

Rhizophagus picipes (OL., 1790): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
Rhizophagus oblongicollis BLATCH, HORNER, 1892: **Hs+**: Vogelsberg, Ober-Mooser Teich, FLÜGEL, 2004 [coll. HÖHNER]. **St+** [BÄSE 2011].
Rhizophagus nitidulus (F., 1798): **St+(-)** [DIETZE 2005, JUNG 2001].
Cyanostolus aeneus (RICHT., 1820): **St+(-)** [BÄSE 2007].

Familie CUCUJIDAE

Cucujus cinnaberinus (SCOP., 1763): **Ba+(-)**: Rastatt, Münchfeld-Siedlung, SCHNEIDER, 12.X.2003, 1 Ex. mittags im Garten fliegend [SCHNEIDER mdl. Mitt. 2003, REIBNITZ 2008a].
Pediacus depressus (Hbst., 1797): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000].
Pediacus dermestoides (F., 1792): **Hn(+)** [SCHMIDT et al. 2005]. **Pf+** [ARK Bienwald].

Familie SILVANIDAE

Oryzaephilus mercator (FAUV., 1889): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **No+(i)** [HÖRNER 2010b]. **Sn+** [HORNIG 2000a].
Silvanus rcticollis Rtt., 1876: **Bai** [REIBNITZ 2009]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Silvanoporus fagi (GUER., 1844): **MV+(-)** [GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte].
Dendrophagus crenatus (PAYK., 1799): **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Familie PHLOEOSTICHIDAE

Phloeostichus denticollis REDT., 1842: **Rh+** [KÖHLER Eisc].

Familie EROTYLIDAE

Triplax melanocephala (LATR., 1804): **Br?**: Havelland, Königshorst, 1919, ohne Beleg und daher zweifelhaft [HORION 1960, HORNIG i.l. 1999].
Triplax lepida (FALD., 1835): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005, BORCHERDING 1994]. **No+** [REISSMANN 2006, KÖHLER Sieb]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000].
Triplax rufipes (F., 1775): **Hs+** [FLECHTNER 2004, BRENNER 2006]. **Th+**: die von HORION (1960) aufgeführten Belege vom Kyffhäuser gehören zu *Triplax lepida* [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **WE+()** [BELLMANN & ESSER 2010].
Triplax collaris (SCHALL., 1783): **Hs-()** [BRENNER 2007].
Dacne notata (GM., 1788): **Hs+(-)**: Groß-Gerau Sauergrund, R. BECKER, etwa 1982 [coll. R. BECKER].
Dacne rufifrons (F., 1775): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007].
Dacne picta CROUCH., 1873: **Bai** [NOLTE i.l. 2007 www.entomologie.de].

Familie BIPHYLLIDAE

Diplocoelus fagi GUER., 1844: **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].

Familie CRYPTOPHAGIDAE

Telmatophilus caricis (OL., 1790): **MV+()** [DEGEN 1999].
Telmatophilus sparganii (AHR., 1812): **No+(-)** [WENZEL 2003]. **St+(-)** [BÄSE 2007].
Telmatophilus brevicollis AUBE, 1862: **Br+(-)** [ESSER & KIELHORN 2005]. **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a]. **No+(-)** [coll. KÖHLER].
Telmatophilus schoenherrii (GYLL., 1808): **St+(-)** [BÄSE 2007].
Paramesoma melanocephalum (Hbst., 1793): **Br+(-)** [EICHLEHNER et al. 2002, BARNDT et al. 2002]. **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald].
Henoticus serratus (GYLL., 1808): **MV+** [ZIEGLER 2006a].
Pteryngium crenatum (F., 1798): **No+(-)** [KÖHLER NWZ9]. **SH+** [ZIEGLER 2004].
Cryptophagus angustus GANGLB., 1899: **MV+()** [WEIGEL & WOLF 2001]. **Sn+** [HORNIG 2007, LORENZ 2001a]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Cryptophagus cylindrus KIESW., 1858: **MV+()** [ZIEGLER 2006a].
Cryptophagus fallax BALF.-BROWN, 1953: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **Th-** [KOPETZ et al. 2008]. **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptophagus quercinus KR., 1852: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn+** [GÜNTHER & PESCHEL 2001]. **WE-?** [ESSER 1999b]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptophagus badius STURM, 1845: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptophagus populi PAYK., 1800: **No+** [HADULLA 2002, HADULLA 2008b]. **Sn+()** [WEIGEL 2005]. **WE+(-)** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+()** [KÖHLER Sieg]. **Wt+?** [LANGE 2001].

Cryptophagus lapponicus GYLL., 1827: **Hn+(-)** [BORCHERDING 1994]. **WE+()** [coll. MENKE, ESSER det.].
Cryptophagus subdepressus GYLL., 1827: **Pf+()** [KÖHLER Bien].
Cryptophagus subfumatus KR., 1856: **Br+** [EICHLEHNER et al. 1999]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+** [BÄSE 2007, SCHOLZE 2007]. **Wt+()** [BRETZENDORFER 2006a].
Cryptophagus micaceus REY, 1889: **By+** [BUSSLER & FUCHS 2006, HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **St+** [JUNG 2010]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
Cryptophagus saginatus STURM, 1845: **Th+(-)**: Schraplau, DORN, 3.VIII.55, 4 Ex. [coll. BÖHME].
Cryptophagus fuscicornis STURM, 1845: **Br+()** [MÖLLER 2003]. **Rh+** [HADULLA 2008a]. **Wt+** [ESSER 2003].
Cryptophagus labilis ER., 1846: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **St+()** [BÄSE 2007]. **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006, BENSE 2006a, REIBNITZ 2010c].
Cryptophagus confusus BRUCE, 1934: **Br+** [ESSER & LANDECK 2010]. **Sn+()** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Cryptophagus intermedius BRUCE, 1934: **Hs+** [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+** [ZIEGLER 2006a, MÖLLER 2003]. **Sn+** [HORNIG 2007]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+** [KONZELMANN 2006a].
Cryptophagus acuminatus COOMBS WOODR., 1955: **Hs+** [FLECHTNER 2000].
Cryptophagus rotundatus COOMBS WOODR., 1955: **Ne+()** [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH+()** [GÜRLICH et al. i.V.].
Cryptophagus pseudodontatus BRUCE, 1934: **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Cryptophagus dorsalis SAHLB., 1834: **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **St+()** [BÄSE 2007].
Cryptophagus corticinus THOMS., 1863: **Wf+** [RENNER 2008a].
Cryptophagus scanicus (L., 1758): **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte].
Cryptophagus postpositus SAHLB., 1903: **MV+** [RINGEL & HAMPEL 2003].
Cryptophagus thomsoni Rtt., 1875: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf+** [BORCHERDING 1994, RENNER 2004].
Cryptophagus cellaris (SCOP., 1763): **MV+()** [BÜCHE & ESSER 1999].
Cryptophagus laticollis LUCAS, 1849: **WE+(-)** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptophagus setulosus STURM, 1845: **MV+(-)** [GÜRLICH Cono, KLEEGER & BUSCH 2010].
Cryptophagus nitidulus MILL., 1858: **Rh+** [HADULLA 2008a]. **Sn+()** [LORENZ 2005]. **St+** [JUNG 2001].
Cryptophagus sporadium BRUCE, 1934: **Sn+** [GOLLOWSKI 2008b]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Cryptophagus deubeli GANGLB., 1897: **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Sn+()** [HORNIG 2000c].
Micrambe bimaculatus (PANZ., 1798): **Sn+()** [HORNIG 2007].
Micrambe lindbergorum (BRUCE, 1934): **Br+()** [ESSER 2005a]. **Sn+** [HORNIG 2007]. **St+** [JUNG 2001]. **WE+** [BELLMANN & MAUS 2007].
Micrambe villosus (HEER, 1841): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [ESSER 2002b, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, SKALE & WEIGEL 2001].
Micrambe vini (PANZ., 1797): **WE-** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000, ESSER 1999b].
Micrambe abietis (PAYK., 1798): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Spavius glaber (GYLL., 1808): **St+** [DIETZE 2005, JUNG 2010].
Antherophagus canescens GROUV., 1916: **MV+()**: Insel Rügen, SCHRADER, 21.VI.2000, 1 Ex. (Böhme det.) [coll. BÖHME]. **St+** [BÄSE 2007, SPRICK 2000].
Caenoscelis subdeplanata BRIS., 1882: **By+** [KÖHLER 1999a]. **St+** [JUNG 2007]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Caenoscelis ferruginea (SAHLB., 1820): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005, BORCHERDING 1994]. **MV+()** [GÜRLICH User]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **Rh+()** [HADULLA 2008a]. **Wf+()** [BORCHERDING 1994].
Caenoscelis sibirica Rtt., 1889: **MV+** [MÖLLER 2003]. **St+** [JUNG 2007]. **Wt+** [BENSE 2006a].
Atomaria impressa ER., 1846: **Ba+()** [RENNER 2005b]. **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008].
Atomaria plicata Rtt., 1875: **Hs+** [BRENNER 2005]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Atomaria munda ER., 1846: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999].

Atomaria nigripennis (KUG., 1794): **MV**+(.) [ZIEGLER 2006a].
Atomaria ornata HEER, 1841: **MV**+(.) [ZIEGLER 2006a].
Atomaria fuscipes (GYLL., 1808): **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**/(+) [HORNIG 2007]. **We**+(.) [BELLMANN & MAUS im Druck].
Atomaria soedermani Sjöb., 1947: **Br**/(+) [ESSER 2005a]. **MV**+ [GÜRLICH Zipp].
Atomaria zetterstedti (ZETT., 1838): **No**+(?) [coll. KÖHLER]. **Pf**+(.) [ARK Bienenwald, RENNER 2011]. **St**+(.) [BÄSE 2011]. **Wf**+ [RENNER 2011].
Atomaria pseudatra RTT., 1887: **Hs**-. Raunheim, H. MÜLLER, 1925 [coll. HÖHNER].
Atomaria atra (HBST., 1793): **MV**+(.) [BÜCHE & ESSER 1999].
Atomaria gutta NEWM., 1834: **MV**+(.) [BÜCHE & ESSER 1999].
Atomaria rhenana KR., 1853: **By**+ [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV**+ [ESSER 2001a].
Atomaria basalis ER., 1846: **MV**+(.) [KÖHLER 2003a, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **Sn**+ [HORNIG 2007, LORENZ 2001a].
Atomaria scutellaris (MOTSCH., 1849): **No**+ [KATSCHAK 2009].
Atomaria analis ER., 1846: **Hs**+(?) [FLECHTNER 2003b, SCHAFFRATH 1999, KÖHLER & FLECHTNER 2007].
Atomaria nitidula (MARSH., 1802): **Hs**+. Habichtswald, BÖHME, 14.V.92, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. BÖHME]. **Sn**+ [HORNIG 2007].
Atomaria rubricollis BRIS., 1863: **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Atomaria gibbula ER., 1846: **St**+(.) [JUNG 2007].
Atomaria atilla RTT., 1878: **Pf**+ [ARK Bienenwald]. **St**+: (t. KÖHLER) [coll. JUNG]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Atomaria turgida ER., 1846: **Hs**+(.) Lindenfels, Odenwald, BÖHME, 30.IV.83, 1 Ex. (t. KÖHLER) [SCHAFFRATH 1999, coll. BÖHME, KÖHLER & FLECHTNER 2007].
Atomaria apicalis ER., 1846: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000]. **We**+(.) [coll. KERSTENS, Bellmann i.l. 2000].
Atomaria basicornis RTT., 1887: **Ba**+ [RENNER 2005b].
Atomaria testacea STEPH., 1830: **Hn**+ [BORCHERING 1994].
Atomaria fimetaria (HBST., 1793): **MV**+(.) [ZIEGLER 2006a]. **St**+(.) [DIETZE 2005]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Atomaria umbrina (GYLL., 1827): **St**+(.) [JUNG 2001].
Atomaria diluta ER., 1846: **Br**+ [MÖLLER 2003]. **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **St**+(.) [JUNG 2001]. **Th**+(.) [RENNER i.l. 2007].
Atomaria barani BRIS., 1863: **Th**+ [RENNER 2002, KOPETZ et al. 2004]. **Wt**+ [KONZELMANN 2010].
Atomaria nigrirentis STEPH., 1830: **Br**+(.) [DREGER et al. 2002]. **Sd**+(?) [EISINGER 2006a].
Atomaria punctithorax RTT., 1887: **MV**+ [GÜRLICH Zipp]. **No**+ [KÖHLER 2006a, JUNKER 2009]. **Rh**+ [WENZEL & HANNIG 2002].
Atomaria puncticollis THOMS., 1868: **Ba**+ [KONZELMANN 2006a]. **Br**+ [MÖLLER 2003]. **We**+ [MENKE in Vorber.]. **Wt**+ [KONZELMANN 2006a, KONZELMANN 2010].
Atomaria nigrirostris STEPH., 1830: **Br**+ [DREGER et al. 2002, EICHLER et al. 1999].
Atomaria alpina HEER, 1841: **By**+(.) [KÖHLER 1997e]. **We**/ [HOLLMANN 1884, BELLMANN i.l. 2000].
Atomaria abietina RTT., 1887: **Sn**+: Weibchen „Bestätigung mit Männchen muß abgewartet werden“ [HORNIG 2007].
Atomaria elongatula ER., 1846: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **St**+ [BÄSE 2011]. **We**+ [BELLMANN & MENKE 2005].
Atomaria pulchra ER., 1846: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **St**+(.) [JUNG 2001].
Atomaria atrata RTT., 1875: **Sd**+ [MOSBACHER 1987]. **We**+ [MENKE in Vorber.].
Atomaria procerula ER., 1846: **St**+(.) [ZIEGLER 2006b, JUNG 2001].
Atomaria ihsseni JOHNS., 1978: **Br**+ [DREGER et al. 2002]. **Hs**+: Messel - Eppertshausen Autokesch, VOGT, 1972 [coll. HÖHNER].
Atomaria bella RTT., 1875: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **MV**+(.) [KÖHLER Bohn]. **Pf**+ [KÖHLER 2000d]. **Sn**+(.) [HORNIG 2007]. **St**+(.) [JUNG 2007, ZIEGLER 2006b]. **Wf**+ [KÖHLER Holt, RENNER 2003a].
Atomaria lohsei JOHNS.STRAND, 1968: **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **St**+ [JUNG 2001].
Atomaria wollastoni SHP., 1867: **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.].
Atomaria badia ER., 1846: **By**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs**+ [HOFMANN i.l. 2010]. **Sn**+ [LORENZ 2005]. **St**+ [JUNG 2001].
Ootypus globosus (WALT., 1838): **St**+(.) [JUNG 2001].
Ephistemus retitteri CASEY, 1900: **Br**+ [EICHLER et al. 1999]. **By**+ [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER 2003a, KÖHLER Rüte]. **Ne**+ [RENNER 2007]. **No**+ [KÖLKEBECK 2010]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **We**+ [ESSER 2001d]. **Wf**+ [KÖHLER Sieg].

Curelius exiguus ER., 1846: **Ba**/(+): die Art ist zu streichen, da von HORION (1951, 1960) keine expliziten Funde aus Baden mitgeteilt werden und die einzige neuere Meldung aus der coll. MAUS fehlbestimmt ist [KONZELMANN i.l. 2001]. **Sn**+ [SIEBER et al. 2011].

Familie LANGURIIDAE

Cryptophilus integer (HEER, 1838): **Hs**+ [BRENNER 2006]. **MV**+ [GÜRLICH 2005a, ZIEGLER 2006a]. **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005]. **Th**+ [APPEL 2003, KOPETZ et al. 2004]. **We**+ [ESSER 1999].
Cryptophilus obliteratus RTT., 1874: **Br**+ [ESSER et al. 2006, ZIEGLER 2006a]. **Pf**+ [KÖHLER 2004b, RENNER 1999a, BENISCH i.l.2006]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **St**+ [JUNG 2007, RENNER 1999a]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].

Familie PHALACRIDAE

Phalacrus corsicus (PANZ., 1797): **MV**+(.) [RINGEL et al. 2007]. **Ne**+(.) [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+ [LORENZ 2005]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Phalacrus fimetarius (F., 1775): **Wf**+(.) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Phalacrus grossus ER., 1845: **Br**+(.) [BARNDT et al. 2002]. **Rh**+ [WENZEL & HANNIG 2002].
Phalacrus championi GUILLB., 1892: **MV**+: Kühnlenhagen, RINGEL, 12.V.2006 [RINGEL i.l. 2011].
Phalacrus substriatus GYLL., 1813: **MV**+(.) [RINGEL i.l. 2011]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
Phalacrus caricis STURM, 1807: **Hs**+(.) [BRENNER 2005]. **Th**+(.) [APPEL 2003]. **We**+(.) [BELLMANN et al. in Vorber.]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Olibrus baudieri FLACH, 1888: **Br**+(.) [ESSER 2002a, ESSER & KIELHORN 2005]. **St**+ [BÄSE 2007]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Olibrus gerhardti FLACH, 1888: **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Olibrus pygmaeus (STURM, 1807): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **MV**+(.) [ESSER 2002b, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **We**+(.) [BELLMANN & MENKE 2005]. **Wf**+(.) [SPRICK & TERLUTTER 2006, RENNER 1999c].
Olibrus flavicornis (STURM, 1807): **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Olibrus norvegicus MUNST., 1901: **Sn**+ [LORENZ 2001b]. **St**+ [BÄSE 2011].
Olibrus affinis (STURM, 1807): **Br**+ [EICHLER et al. 1999]. **MV**+: Altenkirchen/Rügen, HORNIG, 28.VI.1986, 1 Ex. [coll. HORNIG, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte].
Olibrus liquidus ER., 1845: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000]. **St**+ [BÄSE 2007, JUNG 2007].
Olibrus bicolor (F., 1792): **Ne**+(.) [MEYBOHM 2001]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **St**+(.) [BÄSE 2007, DIETZE 2005, ESSER 2001c, JUNG 2007].
Olibrus bimaculatus KÜST., 1848: **Br**+(.) [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002]. **Hs**+(.) [BRENNER 2006]. **MV**+(.) [GÜRLICH Cono]. **Pf**+ [ARK Bienenwald]. **Sn**+(.) [SIEBER et al. 2011]. **St**+(.) [BÄSE 2007, JUNG 2007].

Familie LAEMOPHLOEIDAE

Laemophloeus monilis (F., 1787): **Hn**+(.) [SPRICK et al. 2007]. **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sd**+ [MÖLLER 2005].
Laemophloeus kraussi GÄNGLB., 1897: **Br**+(.) [ESSER & SCHNEIDER 2002].
Placonotus testaceus (F., 1787): **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **MV**+ [KÖHLER Bohn]. **We**+: Südmentzhausen, SCHWIND, 12.IX.2010, 1 Ex. (MACZEY det.) [MACZEY i.l. 2010].
Notolaemus castaneus (ER., 1845): **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2005b]. **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **MV**+ [KÖHLER Rüte]. **Sn**+(.) [LORENZ 2005]. **St**+(.) [JUNG 2007, RENNER 2008b]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Notolaemus unifasciatus (PAYK., 1801): **Br**+(.) [MÖLLER 2003]. **Hs**+ [SCHAFFRATH 1999]. **MV**+(.) [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPPEL 2003, ZIEGLER 2006a, MÖLLER 1993, KÖHLER Rüte]. **Pf**+ [KÖHLER 2004a]. **St**+ [JUNG 2007, ZIEGLER 2006b]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Cryptolestes pusillus (SCHÖNLI., 1817): **Sn**+ [HORNIG 2000a, LORENZ 2001b].
Cryptolestes pusilloides (STEE.HOWE, 1952): **Ba**+ [HADULLA 2001, FRANK & KONZELMANN 2002]. **No**+ [HADULLA 2002]. **SH**+(i)

[GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**: BELLMANN & MAUS 2007 ist fehldeterminiert [BELLMANN i.l. 2011]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptolestes turcicus (GROUV., 1876): **Br+** [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **St+** [BÄSE 2007]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptolestes corticus (ER., 1846): **MV+(-)** [MÖLLER 2003, KÖHLER RÜTE]. **Sn+** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Cryptolestes spartii (CURT., 1834): **Wf+** [KÖHLER Sieg].
Cryptolestes capensis (WALT., 1832): **No(+)** [FEHLEINGABE]. **Rh/** **(+)** [Fehleingabe]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Cryptolestes weisei (RTT., 1879): **MV+** [MÖLLER 2003]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Leptophloeus juniperi (GROUV., 1874): **By+(-)** [WEICHELBAUMER 2003b]. **Ne+** [BURGARTH 2003]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Rh+** [coll. KÖHLER].
Leptophloeus clematidis (ER., 1846): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Ne+** [BURGARTH 2003]. **St+**: Weferlingen, Drachenberg, JUNG, VI.2006, 1 Ex. [DIETZE 2005, JUNG i.l. 2006, JUNG 2007b]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Lathropus sepicola (MÜLL., 1821): **MV+** [MÖLLER 2003]. **No+(-)** [KÖHLER & KÖHLER 2009b].

Familie LATRIDIIDAE

Latridius anthracinus (MANNH., 1844): **MV+** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER RÜTE]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Latridius pseudominutus (STRAND, 1958): **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Latridius nidicola (PALM, 1944): **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [RENNER i.l. 2008].
Latridius hirtus (GYLL., 1827): **Rh+(-)** [KÖHLER Eisc]. **Sn+(-)** [BENSE 1998, LORENZ 2001, REIKE 2001, PESCHEL i.l. 2007].
Latridius consimilis (MANNH., 1844): **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Latridius brevicollis (THOMS., 1868): **Hs+** [HOFMANN i.l. 2010]. **Wt/** **(+)**: die Art ist zu streichen, da es sich bei den der Meldung zugrundeliegenden Belegen aus der coll. LANGE und der coll. SZALIES um Fehlbestimmungen handelt [KONZELMANN i.l. 2001].
Enicmus brevicornis (MANNH., 1844): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+** [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001a]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
Enicmus planipennis STRAND, 1940: **Br+** [DREGER et al. 2002, MÖLLER 2003]. **MV+** [RINGEL & HAMPEL 2003]. **Sn+** [REIKE et al. 2005]. **Wf+** [RENNER 2004].
Enicmus testaceus (STEPH., 1830): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002, SCHUNGER 2001]. **Sn+** [LORENZ 2001a, LORENZ 2005]. **Wt+** [REIBNITZ im Druck, BENSE 2006a].
Enicmus atriceps HANSEN, 1962: **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
Enicmus geminatus RÜCKER, 1981: **Hs+** [BRENNER 2007].
Enicmus amici LOHSE, 1981: **St+** [BÄSE 2007].
Dienerella ruficollis (MARSH., 1802): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER RÜTE]. **Pf+** [BRECHTEL i.l. 1999]. **St+(-)** [JUNG 2010].
Dienerella filiformis (GYLL., 1827): **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Dienerella strupii (HÖLZEL, 1944): **Wt+** [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
Dienerella argus (RTT., 1884): **By+** [REIKE & JUNKER 2002]. **Sn+** [REIKE et al. 2002].
Dienerella filum (AUBE, 1850): **St+** [BÄSE 2007].
Cardore constricta (GYLL., 1827): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **St+(-)**: Athenstedt, JUNG, VII-18.2006, 20 Ex. [JUNG i.l. 2006].
Cardore bifasciatus (RTT., 1877): **MV+** [GÜRLICH Cono, RINGEL i.l. 2011].
Cardore norvegica (STRAND, 1940): **Hs+**: Darmstadt, HANSEN, VIII.1963, 1 Ex. (KÖHLER det.). Traisa-Trautheim, HANSEN, 16.VIII.1963, 1 Ex. (t. KÖHLER) [coll. BÖHME]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **WE+** [MENKE in Vorber.].
Adistemia watsoni (WOLL., 1871): **By+** [REIKE & LIEPOLD 2004]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001].
Stephostethus rybinskii (RTT., 1894): **St+** [BÄSE 2011]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Stephostethus pandellei (BRIS., 1863): **MV+** [KÖHLER 2003a]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **St+** [JUNG 2007]. **Wt+** [BENSE 2006a].
Stephostethus simulatocollis (FALD., 1837): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wt+** [KONZELMANN 2010].

Stephostethus alternans (MANNH., 1844): **Sn+(-)** [LORENZ 2005]. **St+** [ZIEGLER 2006b]. **Th+(-)** [APFEL 2003].
Stephostethus rugicollis (OL., 1790): **Th+(-)**: Dünhelbetal, BÖHME, 24.VI.92, 1 Ex. [coll. BÖHME].
Thes bergrothii (RTT., 1880): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Corticaria pineti LOHSE, 1960: **Br+** [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **Wf+** [DREES 2002b].
Corticaria fulva (COM., 1837): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Corticaria longicornis (HBST., 1793): **By+?** [WEICHELBAUMER 2003b, RÜCKER 2003a].
Corticaria lapponica (ZETT., 1838): **St+** [BÄSE 2010d].
Corticaria serrata (PAYK., 1798): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Corticaria obscura BRIS., 1863: **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **SH+** [MEYBOHM 2005].
Corticaria interstitialis MANNH., 1844: **By+** [REIKE & LIEPOLD 2004]. **Hn+** [REIKE & LIEPOLD 2004, SPRICK et al. 2007]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Corticaria abietorum MOTSCH., 1867: **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn+(-)** [REIKE 2001, GOLKOWSKI 2008b].
Corticaria foveola (BECK, 1817): **Wt+(-)**: die Art ist im Status vorerst zurückzustufen, da nur ein alter Beleg vorliegt, das dem Eintrag zugrundeliegende neuere Stück in der coll. BENSE muss noch geprüft werden [HORION 1961, KONZELMANN i.l. 2001].
Corticaria polyptori SAHLB., 1900: **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, RINGEL & HAMPEL 2003]. **Sn+** [REIKE et al. 2002]. **St+** [JUNG 2007b]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ et al. 2004].
Corticaria lateritia MANNH., 1844: **Br+** [JAKOBITSCH & ZIESCHE in Vorber.]. **Hn+**: Nienburg, Nienburger Bruch, WINTER, 10.VI.-8. VII.1998, 1 Männchen (KÖHLER det.) in einem offenen Stammelektor an einer Buche, Nadelhölzer im Mischbestand vorhanden [WINTER i.l. 2001, SCHMIDT et al. 2005].
Corticaria allenii JOHNS., 1974: **Br+**: Falkenberg, Tobbenberg im Freienwalder Stadtwald, TAAGER, 10.VIII.1999, 1 Männchen (Genitalpräparat, KÖHLER det.) [coll. TAAGER, ESSER & SCHNEIDER 2002, DREGER et al. 2009]. **Hs+** [FLECHTNER 2003b]. **Sn+** [LORENZ 2001a, REIKE et al. 2002]. **St+** [JUNG 2007]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000].
Corticaria dubia DAJÓZ, 1970: **Ne+** [BURGARTH 2003]. **St+** [JUNG 2007b].
Corticaria absoleta STRAND, 1940: **By+** [REIKE & LIEPOLD 2004].
Corticaria longicollis (ZETT., 1838): **Th+(-)** [APFEL 2003].
Corticaria inconspicua WOLL., 1860: **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999].
Corticaria bella REDT., 1849: **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Corticaria fagi WOLL., 1854: **Br+** [EICHLER et al. 1999]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **Sn+(-)** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+** [JUNG 2010].
Corticaria ferruginea MARSH., 1802: **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Corticarina similata (GYLL., 1827): **St+(-)** [BÄSE 2007, DIE 2005].
Corticarina lambiana (SHF., 1910): **Hn/** **(+)** [nach RÜCKER 2003b]. **Hs/** **(+)** [nach RÜCKER 2003b]. **Ne+** = *lambiana* neu [MEYBOHM 2003]. **No/** **(+)** [nach RÜCKER 2003b]. **Rh/** **(+)** [nach RÜCKER 2003b]. **Sn+** [REIKE 2001]. **Wt+** [nach RÜCKER 2003b].
Corticarina obfuscatra STRAND, 1937: **Hn+** [nach RÜCKER 2003b]. **Hs+** [RÜCKER 2003b, SCHAFFRATH 1999]. **MV+** [KÖHLER RÜTE]. **No/** **(/)** [nach RÜCKER 2003b]. **Rh+** [nach RÜCKER 2003b]. **Sn+**: At? [LORENZ 2001b, REIKE 2001]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [RENNER 2008a]. **Wt/** **(+)** [nach RÜCKER 2003b].
Corticarina latipennis (SAHLB., 1871): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wf+** [DREES 2002b]. **Wt+** [KONZELMANN 2006a, FRANK 2009].
Melanophthalma curticolis (MANNH., 1844): **Br+** [DREGER et al. 2002]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2007b]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Melanophthalma suturalis (MANNH., 1844): **Br+** [BARNDT 2007]. **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+** [BÄSE 2007, ZIEGLER 2006b]. **Wf+** [REHAGE & TERLUTTER 2003].
Melanophthalma distinguenda (COM., 1837): **Ne+** [MEYBOHM 2001].
Melanophthalma maura MOTSCH., 1866: **SH+** [ZIEGLER 2004]. **Sn+** [LORENZ 2001b, REIKE 2001]. **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2007]. **Wt+** [REIBNITZ 2009].
Melanophthalma phragmiticola FRANZ, 1967: **Br+** [EICHLER et al. 1999, ESSER 2007a].

Melanophthalma sericea (MANNH., 1844): **Hs+** [BRENNER 2000].
Melanophthalma taurica (MANNH., 1844): **Ba+**: Weinstetten, Rheinaue, ESSER, 3.XI.1997, 1 Ex. - Grissheim, Rheinaue, NEUMANN, 11.1994, 3 Ex. an vertrockneter Königskeuze [NEUMANN mdl. 2001]. **By+** [GOSSNER 2004, GOSSNER et al. 2008]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Ne(+)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Rh+** [RÜCKER 2005]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **St+** [RENNER 2008b]. Alle Belege sind auf die beiden folgenden Arten zu prüfen (vgl. RÜCKER & JOHNSON 2007).
Melanophthalma rhenana RÜCKER & JOHNSON, 2007: **Ba+** [REIBNITZ 2009, KNAPP & RHEINHEIMER 2010]. **Hs+**: Kühkopf [coll. SCHAFF-RATH]. **Rh+** [RÜCKER & JOHNSON 2007]. **St+** [RENNER 2009a]. **Wt+** [KONZELMANN 2010].
Melanophthalma rispini RÜCKER & JOHNSON, 2007: **Ba+** [REIBNITZ 2009]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
Migneauxia orientalis RTT., 1877: **Ba+** [RENNER 2005b, REIBNITZ 2008c]. **Br+** [ESSER 2001b]. **By+** [REIKE & LIEPOLD 2004]. **No+** [JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER 2009]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Familie MYCETOPHAGIDAE

Triphyllus bicolor (F., 1792): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005, BORCHERDING 1994].
Litargus balleatus LEC., 1856: **Br+** [EICHLEER et al. 1999, ESSER 2001b, DREGER et al. 2009]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Hs+** [BRENNER 2005, KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH User]. **Ne(+)** [MEYBOHM 2001]. **No+** [JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010]. **Pf+** [KÖHLER 2004b, RENNER 2008b]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [BENSE 1998, LORENZ 2000, LORENZ 2001b]. **Wf+** [KÖHLER Holt, KÖHLER Länd]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001, coll. LAN-GE].
Mycetophagus ater (RTT., 1879): **Sd+** [MÖLLER 2005].
Mycetophagus salicis BRIS., 1862: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+** [GÜRLICH 2005a]. **Sn+** [LORENZ 2001a, PESCHEL i.l. 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Mycetophagus decempunctatus F., 1801: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, MÖLLER 2003, GÜRLICH User]. **Ne+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Mycetophagus multipunctatus F., 1792: **Sn+** [LORENZ 2005]. **Wf+(-)** [KÖHLER Hell].
Mycetophagus fulvicollis F., 1792: **Ba+** [SCHUNGER 2001]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **No+(-)** [REISSMANN 2006a]. **Sn+(-)** [DIETZ & WOLSCHE 2005, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b, PESCHEL i.l. 2007]. **St+(-)** [BÄSE 2007, JUNG 2007]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Mycetophagus populi F., 1798: **St+(-)** [JUNG 2007, ESSER 2001c].
Typhaea decipiens LOHSE, 1989: **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Berginus tamarisci WOLL., 1854: **Hs+** [BRENNER 2005]. **No+** [HADULLA 2008a, KÖLKEBECK 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Rh+** [MATERN 2004]. **Sd+** [EISINGER 2005]. **Wt+** [REIBNITZ 2009].

Familie COLYDIIDAE

Aglenus brunneus (GYLL., 1813): **Hs+**: Hanau Großauheim, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER]. **MV+** [BÜCHE & ESSER 1999]. **St+** [KNOBBE 2008].
Orthocerus clavicornis (L., 1758): **St+** [GRUSCHWITZ & SCHORNACK 2005, DIETZ 2005].
Orthocerus crassicornis (ER., 1845): **St+(-)** [JUNG 2007].
Langelandia anophthalma AUBÉ, 1842: **Pf+** [KÖHLER 2004a].
Synchita separanda (RTT., 1882): **By+(-)** [BUSSLER et al. in Vorber.]. **MV+** [MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono]. **Sn+** [HORNIG 2002b, LORENZ 2005]. **Th+** [APFEL 2003, KOPETZ & WEIGEL 2000].
Synchita mediolanensis VILLA, 1833: **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sn+(-)** [HORNIG 2002b]. **St+(-)**: BORCHERT 1951 ist zu überprüfen [HORNIG i.l. 2002]. **Th+(-)** [HORNIG 2002b].
Cicones undatus (GUER., 1844): **Ba+**: Schriesheim, BENISCH 2004/05, 17 Ex. Schwetzingen, Ketscher Wald, BENISCH, 11.VIII.2005, 4 Ex. (t. REISSMANN) [REIBNITZ & BENSE 2003, BENSE 2006b]. **By+** [BUSSLER & FUCHS 2006]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Colobicus hirtus (ROSSI, 1790): **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].

Colydium elongatum (F., 1787): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+(-)** [GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **No+** [KÖHLER Drei, KÖHLER Litt, KÖHLER Sieb, REISSMANN 2002, KÖHLER NWZ9]. **Sd+** [MÖLLER 2005]. **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+** [KÖHLER Holt].
Colydium filiforme F., 1792: **Hs+(-)** [BRENNER 2006].
Aulonium trisulcum (GEOFFR., 1785): **St+(-)** [JUNG 2007].

Familie CORYLOPHIDAE

Sacium pusillum (GYLL., 1810): **Ba+** [KNAPP 2003, BENSE 2006b]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2006, WEICHELBAUMER 2003b, BUSSLER et al. in Vorber., GOSSNER 2004, GOSSNER 2008]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Sacium nanum (MULS.REY, 1861): **Br+** [MÖLLER 2003, ESSER 2008a]. **MV+(-)** [MÖLLER 2003]. **Rh+** [coll. KÖHLER]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [LORENZ 2000, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St+(-)** [JUNG 2007].
Sacium brunneum BRIS., 1863: **Br+** [BARNDT 2010]. **Hs+** [FLECHTNER 2003b]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Clypastraea reitteri BOWESTEAD, 1999: **St+** [BÄSE 2010a].
Arthrolips obscurus (SAHLB., 1833): **Sn+** [WEIGEL 2005].
Arthrolips aequalis WOLL., 1857: Br: Berlin, ERICHSON, vor 1900, 1 Ex. im Mus. Berlin [BOWESTEAD 1999].
Arthrolips piceus (COM., 1837): **SH+** [ZIEGLER 2004]. **St+** [BÄSE 2009].
Orthoperus punctatus WANK., 1865: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **SH+** [ZIEGLER 2006c].
Orthoperus punctulatus RTT., 1876: **Ba+** [BENSE 2006b, BENSE 2009]. **Ne(+)**: keine Belege in coll. LOHSE, vom publizierten Fundort nur *Orthoperus atomus* belegt [MEYBOHM 1999b]. **Pf+** [ARK Bienwald].
Orthoperus atomus (GYLL., 1808): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000, BORCHERDING 1994]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Orthoperus mundus MATTH., 1885: **MV+** [coll. BORCHARDT, KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Sn+** [BENSE 1998]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Orthoperus intersitus BRUCE, 1951: **By+** [BOWESTEAD 1999, HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Th-** [BOWESTEAD 1999]. **Wf+(-)** [KÖHLER Sieg].
Orthoperus brunipennis (GYLL., 1808): Br: [BOWESTEAD 1999]. **MV+(-)** [GÜRLICH Vilm]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Orthoperus nigrescens STEPH., 1829: **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010, GOSSNER 2004, GOSSNER et al. 2008, HERBIG in Vorber.]. **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St+** [ZIEGLER 2006b].
Orthoperus atomarius (HEER, 1841): Br: [BOWESTEAD 1999]. **Th+(-)** [BOWESTEAD 1999].

Familie ENDOMYCHIDAE

Holoparamesus caularum (AUBE, 1843): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Pf+** [KÖHLER Bien]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wt+** [BRITZ et al. 2001].
Symbiotes latus REDT., 1849: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+** [GÜRLICH Cono].
Symbiotes gibberosus (LUC., 1849): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Rh+** [GEISSEN 2003]. **Sd+** [coll. EISINGER]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
Leiesthes seminigra (GYLL., 1808): **Hs+** [SINGER 1955]. **Sn+** [LORENZ 2007a].
Dapsa denticollis (GERM., 1817): **Sn+** [DIETZ 2001a].
Lycoperdina bovisiae (F., 1792): **MV+(-)** [ESSER 2002b].
Mycetina cruciata (SCHALL., 1783): **MV+(-)**: Rostock, NSG Schnattermann, GÜRLICH, 1994 [coll. GÜRLICH]. **Rh+** [BAUMANN 1999]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].

Familie COCCINELLIDAE

Novius cruentatus (MULS., 1846): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007].
Scymnus apetzi MULS., 1846: **St+(-)** [JUNG 2007].
Scymnus pallidiformis GÜNTHER, 1958: **Th+(-)** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [KÖHLER Sieg].
Scymnus doriai CAPRA, 1924: **Br+** [ESSER & LANDECK 2010]. **Sn+** [LORENZ 2005, KLAUSNITZER et al. 2009].
Scymnus mimulus CAPRA-FÜRSCH, 1967: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf+** [REHAGE & TERLUTTER 2003].
Scymnus interruptus (GOEZE, 1777): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Ne(+)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf+(-)** [KÖHLER Sieg].

Scymnus femoralis GYLL., 1827: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
Scymnus ferrugineus (MOLL., 1785): **WE+** [coll. KÖNNEMANN, BELL-MANN i.l. 2000].
Scymnus impexus MULS., 1850: **Pf+**: Schaidt, NWR Stuttgart, KÖHLER, 24.VIII.1996, 1 Ex. an einem Leimring [coll. KÖHLER].
Scymnus limbatus STEPH., 1831: **Hn+**(-) [SPRICK et al. 2007].
Scymnus subvillosus (GOEZE, 1777): **Hs+**(-) [FLECHTNER i.l. 2006].
Nephus bipunctatus (KUG., 1794): **MV**+(?) [KÖHLER Rüte, RINGEL i.l. 2011].
Nephus bisignatus (BOH., 1850): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Hs+** [BRENNER 2000].
Clitostethus arcuatus (ROSSI, 1794): **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [KEITEL & KLAUSNITZER 2002].
Cryptolaemus montrouzieri MULS., 1853: **No+** [KOLKEBECK & BATHON 2005].
Exochomus nigromaculatus (GOEZE, 1777): **MV**+(-) [KÖHLER Rüte].
Hyperaspis campestris (HBST., 1783): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Pf+**(-) [KÖHLER Bien].
Hyperaspis concolor SUFFR., 1843: **Wt+** [KONZELMANN 2006a].
Hyperaspis pseudopustulata MULS., 1853: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Hyperaspis repens (HBST., 1783): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **MV**+ [ZIEGLER 2006a].
Hippodamia septemmaculata (DEGEER, 1775): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
Hippodamia undecimnotata (SCHNEID., 1792): **Rh+** [WAGNER 2002a, KÖHLER 2006a].
Adalia conglomerata (L., 1758): **No+** [HÖRREN 2010a]. **Rh**/(+): der Datenbankeintrag war falsch [KÖHLER i.l. 2010].
Oenopia impustulata (L., 1767): **Ba**+(-) [KNAPP 2003]. **Hs+** [BRENNER 1997]. **St+** [DIETZE 2005, SPRICK 2000].
Harmonia axyridis (PALLAS, 1773): **Ba+**: Rheinhausen-Oberhausen, VI.2004 Schwetzingen, Schwetzingen Hardt, VII.04 - Mannheim, Schwetzingen Vorstadt, XI.2004, omnia BENISCH vid. - Ortenau, X.2005 - Vörsdten, X.2005 - Denzlingen, X.2005, alle JELINEK - Karlsruhe, RIEDEL, IX.2004 [JELINEK i.l. 2005, RIEDEL & BASTIAN 2005]. **Br+**: Berlin, Mitte, MEYER, VI.2004, Larven und Imagines in Blumenkästen [SCHÖLLER 2003, MEYER i.l. 2004, ESSER 2005a]. **By+**: München, KÜHN, X.2004 - Ammersee, SCHMID-EGGER, V.2007 - Amstein, MÜLLER, 2006 [www.entomologie.de, ROPPEL 2006, SCHMIDT-EGGER i.l., MÜLLER i.l., HERBIG in Vorber.]. **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Hs+** [BRENNER 2003 und div. andere Quellen]. **MV**+: Schwerin, LEBENHAGEN, XI.2005 Rüterberg, KÖHLER, VI.2006 [www.entomologie.de, coll. KÖHLER, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **Ne+**: zahlreiche Funde [zahlreiche Quellen]. **No+** [JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010, KÖHLER & KINKLER 2010]. **Pf**+: Kaolingrube Monshiem, REDER, 15.V.2005, 1 Ex. auf Crataegus [REDER i.l. 2005]. **Rh**+: JUNKER & KÖHLER 2005, KÖHLER & KÖHLER 2009a, KÖHLER & WAGNER 2010]. **Sd**+: verschiedene Fundorte [LILLIG i.l. 2008]. **SH**+: [TOLASCH 2002, zahlreiche Quellen]. **Sn**+: [KLAUSNITZER, U. 2005, KLAUSNITZER, B. 2006]. **St**+: Gemrode, Stadtgebiet, SCHOLZE, IX.2006 [JUNG 2007, GRUSCHWITZ & SCHORNACK 2005, LIEBENOW 2005, SCHOLZE 2007]. **Th**+: [KOPETZ et al. 2008]. **WE**+: Bremen [KLAUSNITZER i.l. 2004, BELLMANN & MENKE 2005]. **Wf**+: Herten bei Recklinghausen, ADLER, 9.VII.2004 und Ennepetal, W. TRAUB, 2.X.2004, Larve, Fotobelege (KÖHLER det.) Dortmund, STIEBEINER, X.2004, in Anzahl - Bielefeld, PETERS - Netphen, BLANER-MÜLLER, X.2006 [ADLER 2004, TRAUB 2004, STIEBEINER i.l. 2004, BLANER-MÜLLER m.dl. 2006]. **Wt**+: Stuttgart, IX.2005 - Vellberg, X.2006, in Anzahl [TOLASCH i.l. 2005, WEISENBÖHLER i.l. 2006, KONZELMANN 2006a, KONZELMANN 2010].
Sospita vigintiguttata (L., 1758): **Wf**+(.) [REHAGE & TERLUTTER 2003].
Calvia quindecinguttata (F., 1777): **Sn**+(.) [PESCHIEL i.l. 2007]. **Th**+(?) [KOPETZ et al. 2008].
Vibidia duodecinguttata (PODA, 1761): **Hs**+(.) Gelnhausen, V. WAGNER, 15.IX.2009, Fotobeleg Biebesheim, RÖDER, 17.09.2010 auf Efeu (Fotobeleg) [www.entomologie.de, www.insektenfotos.de]. **Sd**+(/) [LILLIG & EISINGER 2008]. **WE**? [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].

Familie ASPIDIPHORIDAE

Arpidiphorus lareymiei DUVAL, 1859: **Wt**+ [MALZACHER 2005].

Familie CISIDAE

Xylographus bostrychoides (DUF., 1843): **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Hs**+ [REIBNITZ im Druck].
Wagaicis wagai (WANK., 1869): **Pf**+ [KÖHLER 2004b].
Sulcaxis bidentatus (ROSH., 1847): **No**+(/) [HOLTER 2005, KÖHLER NW29]. **WE**+(+): in der Quelle fehlt *Sulcaxis fronticornis*, also sicher Fehlbestimmung [BELLMANN i.l. 2010].
Sulcaxis bicornis (MELL., 1848): **Br**+ [MÖLLER 2003]. **MV**+ [MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User].
Cis lineatociribratus MELL., 1848: **Sd**+ [MÖLLER 2005]. **Sn**+(.) [LORENZ 2005].
Cis jacquemartii MELL., 1848: **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **Th**+ [RENNER i.l. 2007, KOPETZ et al. 2004].
Cis hansenii STRAND, 1965: **MV**+ [ZIEGLER 2006a].
Cis glabratus MELL., 1848: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Rh**+(?) [KÖHLER 2006a]. **St**+ [JUNG 2007, SCHOLZE 2007].
Cis comptus GYLL., 1827: **MV**+ [MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User].
Cis striatulus MELL., 1848: **Hs**+ [FLECHTNER 2003b, REIBNITZ 1999]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000, SKALE & WEIGEL 2001].
Cis setiger MELL., 1848: **MV**+ [KÖHLER 2003a].
Cis micans (F., 1792): **MV**+(.) [KÖHLER 2003a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User].
Cis rugulosus MELL., 1848: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005].
Cis quadridens MELL., 1848: **Pf**+ [REIBNITZ 1999].
Cis punctulatus GYLL., 1827: **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999, RINGEL & HAMPEL 2003, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **St**+ [JUNG 2001, SCHOLZE 2007].
Cis fagi WALT., 1839: **Pf**+(?) [REIBNITZ 1999].
Cis multidentatus (PIC, 1912): **SH**!(i) [REIBNITZ 2010a].
Cis chinensis LAWRENCE, 1991: **Bai** [REIBNITZ 2010a]. **SH**! [REIBNITZ 2010a].
Cis dentatus MELL., 1848: **Hn**+ [WINTER 1991].
Cis bidentatus (OL., 1790): **Br**+ [MÖLLER 2003]. **St**+(.) [JUNG 2001].
Cis laminatus MELL., 1848: **Th**-(?) [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Cis fissicornis MELL., 1848: **MV**+ [GÜRLICH Zipp].
Orthocis linearis (SAHLB., 1901): **Hs**+ [FLECHTNER 2000b].
Orthocis pygmaeus (MARSH., 1802): **By**+(.) [HOFMANN & KÖHLER 2010, HERBIG in Vorber.]. **St**+(.) [JUNG 2007].
Orthocis vestitus (MELL., 1848): **Sn**+ [BENSE 1998, LORENZ 2001a].
Orthocis festivus (PANZ., 1793): **St**+(.) [JUNG 2001, SCHOLZE 2007].
Ennearthron pruinosulum (PERRIS, 1864): **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].
Ennearthron palmi LOHSE, 1966: **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Hadreule elongatulum (GYLL., 1827): **Sn**+ [LORENZ 2005].

Familie LYCTIDAE

Troxoxylon impressum (COM., 1837): **Sdi** [EISINGER 2006a].
Lyctus brunneus (STEPH., 1830): **Hs**+(i) [NOLTE et al. 1997]. **St**+ [JUNG 2010]. **Th**- [KOPETZ et al. 2004].
Lyctus africanus LESNE, 1907: **Bai** [GEIS 2002]. **Bri** [GEIS 2002].
Byi [GEIS 2002]. **Sdi** [LILLIG 2006]. **SHi** [GEIS 2002]. **Sni** [GEIS 2002]. **Wfi** [GEIS 2002].
Lyctus planicollis LEC., 1858: **Hs**+ [SCHAFFRATH 1999].
Lyctus cavicollis LEC., 1805: **Hs**+(i) [NOLTE et al. 1997]. **No**+ [GEIS 2002, JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010]. **Rh**+ [KÖHLER 2006a]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **St**+ [JUNG 2010]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
Lyctus pubescens PANZ., 1793: **Ba**+(.) Ketsch, Böhme, 10.VI.62, 4 Ex. [coll. BÖHME]. **Br**+ [EICHLER et al. 1999, RENNER 2002]. **By**+(.) Furth im Wald, in altem Haus [ALTMANN i.l. 2007]. **Sn**+(.) [LORENZ 2005].
Lyctus linearis (GOEZE, 1777): **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **MV**+(.) [KÖHLER Rüte].
Minthea rugicollis (WALK., 1858): **Bai** [GEIS 2002]. **Bri** [GEIS 2002].
Lyctus discedens BLACKB., 1888: **Bai** [GEIS 2002].
Lyctus simplex RTT., 1879: **SHi** [GEIS 2002].
Troxoxylon aequale (WOLL., 1867): **Nei** [TOLASCH 2005a].
Troxoxylon praeustum (ER., 1847): **Wfi** [GEIS 2002]. **Wti** [GEIS 2002].

Familie BOSTRICHIDAE

Rhyzopertha dominica (F., 1792): **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Dinoderus minutus (F., 1775): **Bri** [EICHLER et al. 2002, GEIS 2002].
Bostrichus capucinus (L., 1758): **MV**+(.) [ZIEGLER 2006a]. **SH**+(?) [ZIEGLER et al. 2001]. **WEi**?(.) [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].

Lichenophanes varius (ILL., 1801): **Hn**(-) [SCHMIDT et al. 2005]. **MV**+(.) [GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].

Heterobostrychus brunneus (MURR., 1867): **MVi** [GEIS 2002]. **SHi** [GEIS 2002].

Bostrychophilus cornutus (OL., 1790): **Bri** [GEIS 2002].

Sinoxylon sexdentatum (OL., 1790): **Br**+: bodenständig? [LIEBENOW 2007].

Xylopertha retusa (OL., 1790): **St**+ [BÄSE 2007, DIETZE 2005, JUNG 2007].

Bostrychophiles zickeli (MARS., 1867): **SHi** [GEIS 2002].

Bostrychopsis jesuita (F., 1775): **Bai** [GEIS 2002].

Bostrychopsis parallela (LESNE, 1895): **SHi** [GEIS 2002].

Heterobostrychus aequalis (WATERH., 1884): **MVi** [GEIS 2002]. **Nei** [GEIS 2002]. **SHi** [GEIS 2002].

Heterobostrychus hamatipennis (LESNE, 1895): **SHi** [GEIS 2002].

Micrapate xyloperthoides (JACQU., 1859): **SHi** [GEIS 2002].

Sinoxylon ceratoniae (L., 1758): **SHi** [GEIS 2002].

Sinoxylon conigerum (GERST., 1885): **Bai** [GEIS 2002]. **Bai** [GEIS 2002]. **Byi** [GEIS 2002]. **MVi** [GEIS 1998]. **MVi** [GEIS 2002].

Sinoxylon conigerum (GERST., 1885): **SHi** [GEIS 2002]. **Sti** [GEIS 2002].

Sinoxylon crassum LESNE, 1897: **WEi** [GEIS 2002].

Sinoxylon senegalense KARST., 1881: **SHi** [GEIS 2002].

Sinoxylon sudanicum LESNE, 1895: **SHi** [GEIS 2002].

Tetrapriocera longicornis (OLIV., 1795): **SHi** [GEIS 2002].

Xylobiops basilaris (SAY, 1824): **WEi** [GEIS 2002].

Xyloperthella crinitarsis (IMHOFF, 1843): **SHi** [GEIS 2002].

Familie ANOBIIDAE

Hedobia regalis (DUFT., 1825): **St**+(.) [DIETZE 2005].

Grynobius planus (F., 1787): **Hn**- [SCHMIDT et al. 2000]. **Rh**+ [KÖHLER EISEN].

Dryophilus anobioides CHEVR., 1832: **By**+(.) [GOSSNER et al. 2008]. **MV**+ [KÖHLER Bohn]. **Wf**+ [KÖHLER Sieg]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].

Dryophilus rugicollis (MULS.REY, 1853): **No**+ [JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010, KÖHLER & WAGNER 2010]. **Pf**+ [ARK Bienenwald]. **Rh**+ [GEISSEN 2002a, KÖHLER & WAGNER 2010].

Ochira pinoides (MARSH., 1802): **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999]. **St**+(.) [SCHORNACK & GRUSCHWITZ 2000].

Episernus striatellus (BRIS., 1862): **Ba**+(.) [BENSE 2009]. **By**+(.) [SCHMIDT et al. 2005]. **WE** [WIEPKEN 1886 2.Nachtrag, BELLMANN i.l.]. **Wt**+ [LANGE 2001, FRANK & KONZELMANN 2002, BENSE 2006a].

Episernus granulatus WEISE, 1887: **Br**+ [ESSER 2006a].

Ermobius longicornis (STURM, 1837): **Sn**+ [DIETZE & WOLSCHE 2005, LORENZ 2001b].

Ermobius pruinosis (MULS.REY, 1863): **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].

Ermobius abietis (F., 1792): **MV**+(.) [ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999].

Ermobius angusticollis (RATZ., 1847): **MV**+(.) [MARXHAGEN, BÜCHE, V.2002, 1 Ex. aus einer Zweiggalle an Fichte (Lausgalle) gezogen [ZIEGLER 2006a, BÜCHE i.l.].

Ermobius pini (STURM, 1837): **MV**+(.) [KÖHLER Rüte]. **Pf**+(.) [ARK Bienenwald]. **Sn**+(.) [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].

Oligomerus pilinoides (WOLL., 1854): **Thi** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Oligomerus brunneus (OL., 1790): **Hn**+(.) [SCHMIDT et al. 2005].

Gastrallus immarginatus (MÜLL., 1821): **Br**+(.) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **No**+ [coll. KÖHLER]. **St**+(.) [JUNG 2007].

Gastrallus laevigatus (OL., 1790): **Sn**+ [LORENZ 2005].

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK, 1996: **By**+ [SCHMIDT & BUSSLER 2004]. **Hs**+ [BRENNER 2007].

Anobium hederarum IHSS., 1949: **Pf**+ [KÖHLER 2004b].

Anobium inexpectatum LOHSE, 1954: **MV**+ [RINGEL i.l. 2011].

Anobium costatum ARRAG., 1830: **Sn**+ [GÜNTHER & PESCHEL 2001, LORENZ 2005].

Anobium rufipenne (DUFT., 1825): **By**+: coll. WEIGEL, BÜCHE det. [BÜCHE i.l. 2007, HERBIG in Vorber.].

Anobium rufipes F., 1792: **Hn**- [SCHMIDT et al. 2005]. **MV**+(.) [KÖHLER Bohn, WEIGEL & WOLF 2001].

Anobium pertinax (L., 1758): **Pf**+ [KÖHLER 2004a].

Xyletinus laticollis (DUFT., 1825): **Br**+ [BEIER & KORGE 2001]. **Rh**+ [Koch 1968].

Xyletinus pectinatus (F., 1792): **Hs**+(.) [SCHAFFRATH 1999]. **MV**+(.) [KÖHLER Rüte]. **Sn**- [KLAUSNITZER et al. 2009]. **Wt**+(+) die Art

muß im Status zurückgenommen werden, da die Meldung von vor 1950 stammt [coll. Mus. Stuttgart, KONZELMANN 2001].

Xyletinus fibyensis LUNDBLAD, 1949: **Hs**+ [BRENNER 2001]. **No**+(?) [KÖHLER NWZ9]. **Sn**+(.) [DIETZE & WOLSCHE 2005]. **St**+: Alte Elbe bei Rogätz-Sandkrug, BÜCHE & ESSER 13.VI.1998, 10 Ex. von toten Zweigen von Hybridpappeln geklopft. Fraßbilder in Zweigen auch nördl. Beberlat, IV.2000, Pappeln in Windschutzstreifen [BÜCHE i.l., JUNG 2001].

Xyletinus vaereroensis LUNDBERG, 1969: **St**+ [SPRICK 2000].

Xyletinus longitarsis JANSS., 1942: **Ba**+ [RENNER 2005b]. **By**+ [SCHMIDT & BUSSLER 2004]. **Hs**+ [FLECHTNER 2003b]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Mesocoleopus niger (MÜLL., 1821): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000]. **MV**+(.) [RINGEL i.l. 2011]. **Sn**+(.) [WEIGEL 2005]. **St**+(.) [SCHORNACK & GRUSCHWITZ 2000, BÄSE 2007].

Stagetus pilula (AUBE, 1861): **Ba**+(?) pilula und borealis sind gute Arten [BÜCHE i.l. 2001], alle deutschen Meldungen sind nach wie vor auf pilula zu beziehen [SZALLIES 2001, FRANK & KONZELMANN 2002]. **By**+(i): KÖHLER det. [HERBIG in Vorber.]. **Pf**+ [KÖHLER Bienen].

Dorcatoma flavicornis (F., 1792): **Pf**+ [KÖHLER 2004a]. **St**+(.) [DIETZE 2005, JUNG 2007].

Dorcatoma setosella MULS.REY, 1864: **MV**+ [GÜRLICH CONO].

Dorcatoma chrysomelina STURM, 1837: **Sn**+ [BENSE 1998, DIETZE & WOLSCHE 2005, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].

Dorcatoma androgyna BÜCHE, 2000: **Ba**+ [BÜCHE 2000]. **Br**+ [BÜCHE 2000]. **Hs**+ [BÜCHE 2000]. **MV**+ [GÜRLICH CONO]. **Sn**? [KLAUSNITZER et al. 2009]. **Th**+: Erfurt, Stedter Wald, KOPETZ, 18.VII. und 18.VIII.1998, je 1 Ex. (BÜCHE det.) [BÜCHE i.l., KOPETZ et al. 2004]. **Wt**+ [BÜCHE 2003].

Dorcatoma ambioerni BARANOWSKI, 1985: **Hs**+ [SCHAFFRATH 2010a].

Dorcatoma substriata HUMMEL, 1829: **Hn**+(.) [SCHMIDT et al. 2005]. **MV**+: Nahe Marxhagen, BÜCHE, in einiger Anzahl gezüchtet aus *Inonotus radiatus* an *Alnus incana* in Feldgehölz. Eingetragen November 2000, geschlüpft Februar 2001 [BÜCHE i.l., KÖHLER Bohn, GÜRLICH CONO]. **Sn**+(.) [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].

Dorcatoma minor ZAHRADNIK, 1993: **Br**+ [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **By**+ [GOSSNER et al. 2008]. **No**+ [KÖHLER 2006a, KÖHLER NWZ9]. **Sd**+ [REIBNITZ 2001, EISINGER 2006a].

Dorcatoma punctulata MULS.REY, 1864: **Pf**+ [KÖHLER Bienen]. **Sn**+ [LORENZ 2001b].

Dorcatoma robusta STRAND, 1938: **Sd**+ [MÖLLER 1998b].

Caenocara affinis (STURM, 1837): **Rh**+ [KÖHLER & NIEHUS 2006].

Caenocara subglobosa MULS.REY, 1864: **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].

Anitys rubens (HOFFM., 1803): **Sn**+(.) [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **Th**+(.) [APPEL 2003].

Familie PTINIDAE

Gibbium psylloides (CZENP., 1778): **Br**+(.) [ESSER 2001e]. **St**+ [BÄSE 2007].

Sphaeriscus gibboides (BOIELD., 1854): **Hni**: Hildesheim, Firma DETIA, 15.VIII.82, 5 Ex. synanthrop (BÖHME det.) [SPRICK et al. 2001, coll. BÖHME]. **Sn**+ [LORENZ 2005]. **Wti** [SCHAWALLER im Druck].

Ptinus coarcticollis STURM., 1837: **Sn**+(.) [LORENZ 2001b].

Ptinus lichenum MARSH., 1802: **Pf**+(.) [KÖHLER 2004b].

Ptinus clavipes PANZ., 1806: **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **WE**+(.) [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].

Ptinus moorei KINZ.KARAP., 1991: **WE**! [BRÜGGEMANN 1873 falsch, BELLMANN i.l.].

Ptinus villiger RTT., 1884: **St**+ [DIETZE & SCHORNACK 1999]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].

Ptinus calcaratus KIESW., 1877: **Th**+ [WEIGEL 1996].

Ptinus pilosus MÜLL., 1821: **MV**+(.) [KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte]. **Sn**+ [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].

Ptinus tectus BOIELD., 1856: **Br**+(.) [EICHLER et al. 1999]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].

Ptinus dubius STURM, 1837: **Wt**+ [REIBNITZ 2010b].

Ptinus sexpunctatus PANZ., 1795: **MV**+(.) [GÜRLICH Vilm].

Ptinus raptor STURM, 1837: **Br**+(.) [EICHLER et al. 1999].

Ptinus schlerehi RTT., 1884: **Thi** [KOPETZ et al. 2004].

Ptinus bidens OL., 1790: **WE**! [WIEPKEN 1883 falsch, BELLMANN i.l. 2000].

Ptinus japonicus RTT., 1877: **Nei** [HERRMANN 2006].

Familie OEDMERIDAE

Nacerdes melanura (L., 1758): **Nov**(i) [HADULLA 2002]. **Sn**+ [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].

Anogcodes rufiventris (SCOP., 1763): **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Anogcodes ustulata (F., 1787): **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
Chrysanthia viridissima (L., 1758): **WE/(-)** [BRÜGGEMANN 1873, WESSEL 1878, BELLMANNUL].
Ischnomera sanguinicollis (F., 1787): **MV+(-)** [MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono].
Ischnomera caerulea (L., 1758): **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, MÖLLER 2003, KÖHLER Rüte]. **Sn+(-)**: Moritzburg, BÖHME, 20.VI.91, 1 Männchen [coll. BÖHME, LORENZ 2005].
Ischnomera cyanea (F., 1792): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2, RENNER 2002].
Oedemera flavipes (F., 1792): **Ne+** [MEYBOHM 2001]. **Sn+** [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
Oedemera croceicollis (GYLL., 1827): **Ba?** [FRANK & KONZELMANN 2002, aber fraglich]. **Sdv**: Saarbrücken, 13.VI.2011, 1 Ex. auf einem Kalkmagerrasen [coll. EISINGER].
Oedemera subulata OL., 1794: **Hn+** [BORCHERDING 1994]. **Hs+(-)**: Zwingenberg, HANSEN, 15.VII.56, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME]. **St+(-)** [SCHOLZE 2007].
Oedemera tristis SCHM., 1846: **Wf+** [BORCHERDING 1994].
Oedemera nobilis (SCOP., 1763): **Ne+** [HENGSMITH 2001]. **SH+** [HENGSMITH 2001].
Oedemera femoralis (OL., 1803): **Wf+** [SCHULZE 1985].

Familie PYTHIDAE

Pytho depressus (L., 1767): **St+** [GRUSCHWITZ & SCHORNACK 1999, JUNG 2001, BASE 2007, DIETZE 2005].

Familie SALPINGIDAE

Rabocerus foveolatus (LJUNGH, 1823): **MV+(-)** [RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a]. **St+(-)** [SCHOLZE 2007].
Rabocerus gabrieli (GERH., 1901): **MV+(-)** [MÖLLER 2003]. **St+(-)** [BASE 2007].
Sphaeriestes reyi (AB., 1874): **Sn(+)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Sphaeriestes aeratus (MULS., 1859): **By+(-)** [BUSSLER et al. in Vorbereitung].

Familie PROSTOMIDAE

Prostomis mandibularis (F., 1801): **Br+** [ESSER 2011].

Familie PYROCHROIDAE

Pyrochroa serraticornis (SCOP., 1763): **Br+** [MÖLLER 2003]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].

Familie SCRAPTIIDAE

Scraptia fuscata MÜLL., 1821: **MV+** [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, MÖLLER 2003, GÜRLICH User, KÖHLER Rüte]. **WE+** [BELLMANN 2001].
Cyrtanaspis phalerata (GERM., 1831): **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **St+** [JUNG 2007]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Anaspis humeralis (F., 1775): **St+(-)** [BASE 2007].
Anaspis bohemica SCHILSKY, 1898: **Sn+** [LORENZ 2005].
Anaspis lurida STEPH., 1832: **Br+** [ESSER 2001e]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Anaspis marginicollis LINDBERG, 1925: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, KOPETZ et al. 2004].
Anaspis ruficollis (F., 1792): **St+(-)** [BASE 2007]. **Wf+(-)** [KÖHLER Holt].
Anaspis pulicaria COSTA, 1854: **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Anaspis regimbarti SCHILSKY, 1895: **MV+** [MÖLLER 2003]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Anaspis garneyi FOWL., 1889: **Hs+** [FLECHTNER 2003b].
Anaspis melanostoma COSTA, 1854: **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+(-)** [JUNG 2007].
Anaspis costai EM., 1876: **Br+** [DREGER et al. 2009]. **St+(-)** [ESSER 2001c].
Anaspis labiata COSTA, 1854: **St+** [ESSER 2001c].
Anaspis brunnipes MULS., 1856: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Anaspis varians MULS., 1856: **Hn+** [SPRICK et al. 2007].
Anaspis quadrimaculata GYLL., 1817: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **WE?** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Anaspis palpalis (GERH., 1876): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **St+** [GRUSCHWITZ 2002]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Anaspis mulsanti BRIS., 1859: **Rh+(-)**: Bad Münster am Stein, Rotenfels, KÖHLER, 11.VI.2000, 1 Ex. auf einem Trockenrasen gekeschert [MÜLLER & MÜLLER 2001].

Familie ADERIDAE

Phytobaenus amabilis SAHLB., 1834: **Ba+** [BENSE 2006b]. **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
Euglenes pygmaeus (DEGEER, 1774): **Br+(-)** [DREGER et al. 2002]. **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, SCHMIDT & BUSSLER 2004]. **MV+(-)** [RINGEL & HAMPEL 2003]. **Pf+** [KÖHLER 2000d]. **Sd+(-)** [MÖLLER 1998b].
Euglenes oculus (PAYK., 1798): **St+** [CIUPA & GRUSCHWITZ 1998, SPRICK 2000, JUNG 2007].
Euglenes nitidifrons (THOMS., 1886): **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Wf+** [KÖHLER Sieg].
Otoleus symphonicus KLINGER, 2000: **Th+**: Thuringia, REITTER, 1 Ex. in coll. KANABE, einziger (unsicherer?) Nachweis aus Deutschland [KLINGER 2000].
Vanonus brevicornis (PERRIS, 1869): **MV+** [ZIEGLER 2006a].
Pseudeuglenes pentatomus (THOMS., 1864): **MV+** [ZIEGLER 2006a].

Familie ANTHICIDAE

Notoxus trifasciatus ROSSI, 1794: **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **St+(-)** [DIETZE & SCHORNACK 1999].
Mecynotarsus serricornis (PANZ., 1796): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b]. **St+(-)** [BASE 2007, JUNG 2010].
Formicomus pedestris (ROSSI, 1790): **Nev** [BURGARTH 2003].
Anthicus luteicornis SCHM., 1842: **Hn(+)** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [GÜRLICH Vilm].
Anthicus flavipes (PANZ., 1797): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sd+** [coll. KÖHLER].
Anthicus bimaculatus (ILL., 1801): **Sn+** [LORENZ 2001b]. **St+** [RENNER 2008b].
Cyclodinus constrictus (CURT., 1838): **Hs+** [BRENNER 2007]. **St+**: 1.VII. und 16.VIII.1996 BÜCHE, Kalihalde bei Beendorf - Salzweide bei Loitsche, 6.VIII.1998 BÜCHE & ESSER; jeweils in Anzahl auf naktigem Salzboden. Die Art ist mutmaßlich oft als *C. humilis* verkannt worden. [BÜCHE i.l.].
Omonadus bifasciatus (ROSSI, 1792): **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Omonadus formicarius (GOEZE, 1777): **WE+** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
Cordicomus gracilis (PANZ., 1797): **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
Cordicomus sellatus (PANZ., 1797): **St+(-)** [SPRICK 2000, BORCHERT 1951, DIETZE 2004b]. **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
Stricticomus tobius (MARS., 1879): **St+** [RENNER 1999a].
Hirticomus hispidus (ROSSI, 1792): **St+** [CIUPA & GRUSCHWITZ 1998, JUNG 2007b].
Microhoria necarina (PANZ., 1797): **St+(-)** [DIETZE 2004b].
Microhoria fasciata CHEVR., 1838: **Ba?** [FRANK & KONZELMANN 2002: fraglich]. **St+** [DIETZE 2004b].
Leptaleus rodriguezi (LATR., 1804): **Noi** [KÖHLER 2006a].

Familie MELOIDAE

Lytta vesicatoria (L., 1758): **Sd+** [HERDER & HIMMELSTOSS 1895, EISINGER 2006a].
Alosimus syriacus (L., 1764): **Bav** [WURST 2009].
Cerocoma muehlfeldi GYLL., 1817: **Br+(-)**: der Beleg MÜLLERS aus dem Jahre 1912 (HORION 1956) im Mus. Berlin gehört zu *Cerocoma schaefferi*. Die Art ist für die deutsche Fauna zu streichen [LÜCKMANN i.l. 2001].
Cerocoma schaefferi (L., 1758): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002].
Meloe proscarabaeus L., 1758: **Sd+** [HERDER & HIMMELSTOSS 1895, EISINGER 2006a].
Meloe variegatus DON., 1793: **Wt+(-)**: die Art muss im Status zurückgenommen werden, da die Meldung von vor 1950 stammt [coll. Mus. Stuttgart, KONZELMANN 2001].
Meloe cicatricosus LEACH, 1811: **Hs+(-)** [HORION 1954/55].
Meloe coriarius Br+Er., 1832: **Br+(-)** [BEIER & HEILMANN 2003].
Meloe brevicollis PANZ., 1793: **Pf+(-)**: Grünstadt-Neuleiningen, Gemeindeberg, BETTAG, 7.V.2001, 1 Ex. (det. et coll. NIEHUIS) in einem aufgelassenen Steinbruch [NIEHUIS i.l. 2001].
Meloe scabriusculus Br+Er., 1832: **WE/** [WIEPKEN 1883 falsch, BELLMANN i.l. 2000].
Meloe rugosus MARSH., 1802: **Sn+(-)** [KLAUSNITZER 2004]. **Wf+** [LÜCKMANN & HOLSTE 2005].
Stenoria analis (SCHAUH, 1859): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999].
Sitaris muralis (FORST., 1771): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Ne+** [TOLASCH 2007]. **Sd+**: Bexbach, FÄSSLER, 15.VIII.2010, Fotobeleg [INSEKTENFOTOS.DE]. **Th+** [LÜCKMANN i.l. 2005]. **Wf+** [HANNIG et al. 2007]. **Wt+** [WURST 2009].

Familie RHIPIPHORIDAE

Pelecotoma fennica (PAYK., 1799): **St+**: Athenstedt, JUNG, VII-VII.2006, 3 Ex. [DIETZE 2001b, ESSER 2001c, JUNG i.l. 2006].
Metoeus paradoxus (L., 1761): **MV+**: Marxhagen, Müritzkreis, BÜCHE Mitte IX.1999, 4 Ex aus frei hängendem Wespennest auf einem Dachboden [BÜCHE i.l., WEIGEL & WOLF 2000]. **Pf+** [NIEHUIS i.l. 2009].

Familie MORDELLIDAE

Variimorda villosa (SCHRANK, 1781): **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

Variimorda briantea (COM., 1837): **St+** [BÄSE 2007].

Variimorda basalis (COSTA, 1854): **St+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Variimorda mendax MEQ., 1946: **Br+**(-) [ESSER & KIELHORN 2005].

Mordella huetheri ERM., 1956: **Ne**(+): nach BOROWIEC (1996) synonym zu *aculeata* [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**(+): nach BOROWIEC (1996) synonym zu *aculeata* [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].

Mordella aculeata L., 1758: **WE**(+) [Fehlbestimmung, BELLMANN i.l. 2000].

Mordella brachyura MULS., 1856: **MV**(-) [ZIEGLER 2006a].

Mordella holomelaena APFLB., 1914: **MV**(-) [KÖHLER Bohn].

Hoshihananomia perlata (SULZ., 1776): **SH+** [ZIEGLER et al. 2001].

Hoshihananomia gacognei (MULS., 1852): **Hn+** [LOMPE i.l. 2009, www.coleo-net.de].

Curtimorda maculosa (NAEZ., 1794): **Br+** [ESSER 2001b]. **MV+** [KÖHLER Rüte]. **Pf+** [KÖHLER 2000d]. **Sn**(-) [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St+** [JUNG 2007].

Curtimorda signata (REDT., 1849): **By**(-) [SCHMIDL et al. 2005]. **Pf+** [ARK Bienenwald].

Mordellistenula perrisi (MULS., 1856): **Ba**(-) [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Sn**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula parvula (GYLL., 1827): **Br+** [RENNER 2008b, EICHLER et al. 1999]. **MV**(-) [KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a].

Mordellistenula falsoparvula ERM., 1956: **Hn+** [BORCHERING 1994]. **MV**(-): Marxhagen, BÜCHE, 3.VI.2000 und 26.V.2001, 1 Ex. auf einer trockenen Brachfläche [BÜCHE i.l.]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **St+** [SCHOLZE i.l. 2008]. **Sn**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula pseudoparvula ERM., 1956: **Br+** [BÜCHE im Dr., EICHLER, ESSER & PÜTZ in Vorber.]. **Hs+**: Darmstadt Kranichsteiner Forst, VOGT, 1971. Assmannshausen, HOFMANN, 2006 [coll. HÖHNER, coll. HOFMANN]. **MV+**: Marxhagen, BÜCHE, 10.-24.V.2002, 5 Ex. aus Stengeln von *Cirsium vulgare* und *arvense* von einer Viehweide gezogen [BÜCHE i.l.]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **St+**: Olbetal südl. Hundsbürg, BÜCHE 5. und 21.V.2000, 1 Ex. in einem Stengel von *Cirsium vulgare* [BÜCHE i.l.]. **Sn**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula parvuloides ERM., 1956: **Hs+** [BRENNER 2001].

Mordellistenula stoekleinii ERM., 1956: **Hs+**: Hirschroda, Hirschrodaer Graben, ESSER 23.VI.2000, 2 Ex (BÜCHE det.) auf Trockenrasen [BÜCHE i.l.].

Mordellistenula inexpectata ERM., 1967: **By+** [WEICHELBAUMER 2003b]. **Sn**(-) [WEIGEL 2005, GOLLOWSKI 2008b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Mordellistenula reichei EM., 1876: **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula bicoloripilosa ERM., 1967: **Br+** [BÜCHE im Dr.]. **By+** [BUSSLER & FUCHS 2006]. **MV+**: Nahe Marxhagen, BÜCHE 3.VI.2000, auf einer Brachfläche von *Artemisia vulgaris* gekeschert, mehrere Ex. [BÜCHE i.l., ZIEGLER i.l. 2000]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula weisei SCHILSKY, 1895: **Br**(-) [BÜCHE im Dr., EICHLER, ESSER & PÜTZ in Vorber.]. **Pf+** [ARK Bienenwald]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **WE?** [HORION 1971, BELLMANN i.l. 2000].

Mordellistenula episternaloides ERM., 1963: **St+**: Weischütz bei Freyburg, NÜSSENBERG, ESSER 22.VI.2000, 2 Ex (BÜCHE det.) auf Trockenrasen - Zscheiplitz, Schafberg, ESSER 24.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Halbtrockenrasen - Bad Kösen, Himmelreich, ESSER 24.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Halbtrocken [BÜCHE i.l.].

Mordellistenula kraatzii EM., 1876: **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellistenula rhenana ERM., 1956: **Wf+** [KÖHLER Sieg]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002].

Mordellistenula austriacensis ERM., 1956: **Rh+** [KÖHLER & NIEHUIS 2006].

Mordellistenula dvoraki ERM., 1956: **St+** [BÄSE 2011].

Mordellistenula tarsata MULS., 1856: **St+**: Weischütz bei Freyburg, NÜSSENBERG, ESSER 22.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Trockenrasen - Karsdorf bei Freyburg, ESSER 23.VI.2000, 2 Ex (BÜCHE

det.) auf Halbtrockenrasen - Bad Kösen, Geiersberg, ESSER 24.VI.2000, 2 Ex (BÜCHE det.) [BÜCHE i.l.].

Mordellistenula brevicauda (BOH., 1849): **Br+** [ESSER 2005b]. **St+**: Olbetal südl. Hundsbürg, BÜCHE 5.V. und 9.VI.2000, in Anzahl an *Euphorbia cyparissias* und anderen Blüten [BÜCHE i.l., ESSER 2001c, GRUSCHWITZ 2002, BÄSE 2007]. **Wf**(-) [RENNER 2004].

Mordellistenula pseudobrevicauda ERM., 1963: **Hs+**: Lorch, HÖHNER, 1988 [coll. HÖHNER]. **St+**: Zscheiplitz, Schafberg, ESSER 24.VI.2000, 5 Ex (BÜCHE det.) auf Halbtrockenrasen - Bad Kösen, Himmelreich, ESSER 24.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Halbtrockenrasen [BÜCHE i.l.].

Mordellistenula confinis COSTA, 1854: **Hs**(-) [BRENNER 2001]. **Pf**(+): die Belege aus Wachenheim gehören zu *Mordellistenula reitteri* (KÖHLER det. 2001) [coll. KÖHLER]. **Rh**(+) [KÖHLER & NIEHUIS 2006].

Mordellistenula reitteri SCHILSKY, 1894: **Pf+**: Wachenheim, Weinbergslagen, KÖHLER, VII.-VIII.1995, 22 Ex. in Malaisefallen [coll. KÖHLER].

Mordellistenula luteipalpis SCHILSKY, 1895: **Br**(-) [BÜCHE im Dr., EICHLER, ESSER & PÜTZ in Vorber.].

Mordellistenula micantoides ERM., 1954: **Br**(-) [ESSER et al. 2006].

Hs+: Weiterstadt, Rotbühl, HÖHNER, 2001 [coll. HÖHNER]. **St+**: Hirschroda, Hirschrodaer Graben, ESSER 23.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Trockenrasen - Weischütz bei Freyburg, NÜSSENBERG, ESSER 22.VI.2000, 1 Ex (BÜCHE det.) auf Trockenrasen [BÜCHE i.l., GRUSCHWITZ 2002]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Mordellistenula thuringiaca ERM., 1963: **St+** [BÄSE 2011].

Mordellistenula aertsi ERM., 1963: **Rh**(-) [BÜCHS et al. 1996, KOCH & GRÄF 1982].

Mordellistenula pygmaeola ERM., 1956: **St+** [BÄSE 2007].

Mordellistenula pumila (GYLL., 1810): **MV**(-) [KÖHLER Bohn, KÖHLER Rüte].

Mordellistenula secreta HORÁK, 1983: **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Mordellistenula dieckmanni ERM., 1963: **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].

Mordellistenula breddini ERM., 1963: **Th+** [KOPETZ et al. 2008].

Mordellistenula koelleri ERM., 1956: **Br+** [BARNDT et al. 2002].

Mordellistenula pentas MULS., 1856: **Sn**(-) [SIEBER et al. 2011]. **St+** [BÄSE 2011].

Mordellistenula variegata (F., 1798): **MV**(-) [GÜRLICH User].

Mordellistenula humeralis (L., 1758): **St+** [BÄSE 2007, SPRICK 2000, ZIEGLER 2006b, SCHOLZE 2007].

Mordellistenula pseudonana ERM., 1956: **Br+** [BÜCHE im Dr., EICHLER, ESSER & PÜTZ in Vorber.]. **WE**(+) [Fehlbestimmung, BELLMANN i.l. 2000].

Mordellistenula acuticollis SCHILSKY, 1895: **MV+**: Nahe Marxhagen, BÜCHE, 3.VI.2000, auf einer Brachfläche von *Artemisia vulgaris* gekeschert, mehrere Ex. [BÜCHE i.l.]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].

Mordellochroa abdominalis (L., 1775): **Sn**(-) [LORENZ 2005].

Mordellochroa milleri (EM., 1876): **Ba+**: Bannwald Bechtaler Wald bei Weisweil, NEUMANN, 2.VI.2000, 2 Ex. [NEUMANN i.l. 2010, BENISCH in Vorber.]. **By+** [FUCHS & KÖHLER in Vorber.]. **Pf+** [ARK Bienenwald].

Tolida artemisiae MULS., 1856: **Rh+** [KÖHLER & NIEHUIS 2006].

Familie MELANDRYIDAE

Eustrophus dermestoides (F., 1792): **St**(-) [DIETZE & SCHORNACK 1999].

Hallomenus axillaris (ILL., 1807): **Sn**(-) [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].

Orchesia acicularis RTT., 1886: **Sn+** [GOLLOWSKI 2008b].

Orchesia micans (PANZ., 1794): **Sd+** [MÖLLER 2005].

Orchesia minor WALK., 1837: **St**(-) [DIETZE & SCHORNACK 1999, JUNG 2001].

Orchesia fasciata (ILL., 1798): **MV**(-) [WEIGEL & WOLF 2000, KÖHLER 2003a]. **No+** [KÖHLER 1997c]. **Pf+** [KÖHLER 2004a]. **Sn**(-) [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].

Anisoxya fuscula (ILL., 1798): **St**(-) [JUNG 2001, DIETZE 2005].

Andera affinis (PAYK., 1799): **Sd+** [MÖLLER 2005]. **Th**(-): Burgk, Eisbrücke, CONRAD, 3.VII.2000, in Anzahl in *Inonotus dryophilus* an einer lebenden Alteiche [CONRAD i.l. 2000].

Andera quadrifasciata (CURT., 1829): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002]. **Pf+** [KÖHLER 2004a].

Andera triguttata (GYLL., 1810): **Sn+** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b]. **St**(-) [BÄSE 2007, DIETZE 2005, JUNG 2007].

Dircaea australis FAIRM., 1856: **Th+(-)** [APFEL 2003].
Phloiomyia rufipes (GYLL., 1810): **Br+** [ESSER & SCHNEIDER 2002].
St+ [JUNG 2007, SCHOLZE 2007].
Xylita laevigata (HELL., 1786): **MV+(-)** [RINGEL & HAMPEL 2003].
Serropalpus barbatus (SCHALL., 1783): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
MV+ [GÜRLICH 2005a, KÖHLER RÜTE]. **Ne+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001b]. **St+(-)** [JUNG 2007b]. **WE+**: Gut Hahn, SCHWIND, 9.VIII.2010, 1 Ex. (MACZEY det.) [MACZEY i.l. 2010].
Hypulus quercinus (QUENSEL, 1790): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005, BORCHERDING 1994]. **Pf+** [KÖHLER BIEHL]. **St+(-)** [BÄSE 2007, DIETZE 2005, SCHOLZE 2007].
Hypulus bifasciatus (F., 1792): **Sn+(-)** [LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].
Zilora sericea (STURM, 1807): **Wt+** [KOSTENBADER 2008].
Melandrya barbata (F., 1792): **Th(+)** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Melandrya dubia (SCHALL., 1783): **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, KÖHLER BOHN]. **St+(-)** [DIETZE & SCHORNACK 1999]. **Th+(-)** [SKALE & WEIGEL 2001].
Osphyia bipunctata (F., 1775): **Wf+(-)** [KÖHLER SIEG].

Familie TETRATOMIDAE

Tetratoma desmarestii LATR., 1807: **Pf+** [WURST i.l. 2007].
Tetratoma ancora F., 1790: **St+** [JUNG 2007].

Familie LAGRIIDAE

Lagria atripes MULS. GUILLB., 1855: **St+(-)** [DIETZE & SCHORNACK 1999, ESSER 2001c, JUNG 2007]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
WE+ [BELLMANN 2001]. **Wf+** [KÖHLER SIEG].

Familie ALLECULIDAE

Allecule rhenana BACH, 1856: **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010, BUSSLER et al. in Vorber.]. **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002].
Prionychus melanarius (GERM., 1813): **Hs+(-)** [SCHAFFRATH 1999].
St+ [JUNG 2007].
Hymenalia rufipes (F., 1792): **Sn+(-)** [HORNIG 2003].
Pseudocistella ceramoides (L., 1761): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
St+(-) [JUNG 2007, NEUMANN & SCHNEIDER 2008].
Gonodera luperus (HBST., 1783): **Sd+** [LILLIG 2000]. **WE+(-)** [BELLMANN et al. 2003].
Isomira semiflava (KÖST., 1852): **St+(-)** [JUNG 2007].
Isomira icteropa (KÖST., 1852): **Sn+** [HORNIG 2003].
Mycetochara axillaris (PAYK., 1799): **Pf+** [ARK Bienenwald].
WE+(-) [BELLMANN & MENKE 2005].
Mycetochara humeralis (F., 1787): **St+(-)** [JUNG i.l. 2006, HORNIG 2003].
Ctenioptus flavus (SCOP., 1763): **No-** [KOCH 1968].
Ctenioptus sulphuripes (GERM., 1824): **Br+** [ESSER & KIELHORN 2005].
Omophlus betulae (HBST., 1783): **Br+(-)** [EICHLER et al. 2002]. **MV+(-)** [HORNIG 2003]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+(-)** [HORNIG 2003].
Omophlus lividipes MULS., 1856: **Sn+(-)** [HORNIG 2003]. **St+(-)** [HORNIG 2003].

Familie TENEBRIONIDAE

Blaps mortisaga (L., 1758): **Br+(-)** [EICHLER et al. 1999, BARNDT et al. 2002]. **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **No+(-)**: Erlstadt, KELLER, VIII.1966, 2 Ex. [coll. KÖHLER].
Blaps lethifera MARSH., 1802: **Br+** [ESSER 2006a]. **MV+(-)**: Neven bei Wismar, HORNIG, 1986 [HORNIG i.l. 2000]. **Sd-** [LILLIG 2000]. **Sn+(-)**: Dresden, BÖHME, 15.VIII.52, 6 Ex. [coll. BÖHME].
Blaps mucronata LATR., 1804: **Br+(-)** [ESSER 2006a]. **MV+(-)**: Schwerin, Schlachtestraße, RÖSSNER, 13.XII.2009, 2 Ex. in einem Keller (t. KÖHLER) [RÖSSNER i.l., RINGEL i.l. 2011].
Melanimon tibiale (F., 1781): **Sd+** [LILLIG 1999].
Eledonoprius armatus (PANZ., 1799): **MV+** [MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **Sn+(-)**: Dresden, HETZER, um 1900, 3 Ex. ex coll. HÄNEL [Mus. Dresden, HORNIG i.l. 1999].
Neomida haemorrhoidalis (F., 1787): **Br+** [ESSER & LANDECK 2010]. **No+** [EINWALLER 2004]. **Pf+(-)** [REIBNITZ im Druck].
Platydema violaceum (F., 1790): **Sn+** [DIETZE & WOLSCHE 2005, SIEBER & KLAUSNITZER 2005, WEIGEL 2005].
Cynaetus angustus (LEC., 1851): **Ba+** [REIBNITZ & SCHAWALLER 2006]. **Pf+** [REIBNITZ & SCHAWALLER 2006]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008].
Myrmecixenus subterraneus (CHEVR., 1835): **St+** [DIETZE 2005, JUNG 2010].

Myrmecixenus vaporariorum (GUER., 1843): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [HORNIG 2002c].
Corticeus longulus GYLL., 1827: **St+** [DIETZE 2005, JUNG 2010].
Th+ [KOPETZ et al. 2008].
Corticeus fraxini KUG., 1794: **Ba(+)** [KNAPP 2003].
Corticeus pini PANZ., 1799: **St+(-)**: Blankenburg, Osterholz, JUNG, V.2006, 1 Ex. [JUNG i.l. 2006].
Corticeus suturalis PAYK., 1800: **By+** [REIBNITZ 2001].
Corticeus bicoloroides (ROUB., 1933): **MV+** [KÖHLER BOHN, MÖLLER 2003, GÜRLICH CONO, GÜRLICH User]. **SH+** [GÜRLICH 2005b]. **Sn+** [HORNIG 2002c, LORENZ 2001a, LORENZ 2001b].
Corticeus fasciatus F., 1790: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **Sd+** [MÖLLER 2005].
Palorus subdepressus (WOLL., 1864): **Hs+** [SCHAFFRATH 1999, BRENNER 2006]. **MV+** [KÖHLER BOHN]. **No+** [JUNKER 2001, JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010]. **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+** [BELLMANN & MENKE 2005].
Palorus depressus (F., 1790): **No+(-)** [HADULLA 2008, coll. KÖHLER]. **SH+** [ZIEGLER 2004].
Tribolium madens (CHARP., 1825): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002, MÖLLER 2003]. **Sn+(-)** [HORNIG 2003].
Tribolium confusum DUAL, 1863: **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **WE+(-)** [coll. A. WAGNER, BELLMANN i.l. 2000].
Alphitobius diaperinus (PANZ., 1797): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999, GÜRLICH 2005a, KÖHLER BOHN].
Alphitobius laevigatus (F., 1781): **Br+(-)** [ESSER 2010].
Diachina fagi (PANZ., 1799): **MV+** [KÖHLER RÜTE]. **Sd+** [LILLIG 1999].
Th+ [KOPETZ et al. 2004]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Latheticus oryzae WTRL., 1880: **Hs+** [SCHAFFRATH 1999]. **MV+** [KÖHLER RÜTE]. **No+(-)** [JUNKER 2001, JUNKER & KÖHLER 2005, JUNKER & KÖHLER 2010]. **Rh+** [WENZEL & HANNIG 2002]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+** [JUNG 2007b, JUNG 2010].
Uloma culinaris (L., 1758): **No+(-)**: Siegaue bei Troisdorf, HADULLA, 4.IV.2006, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Pappelmulm [HADULLA 2008]. **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+(-)** [KÖHLER HELL].
Uloma rufa (PILL.MITT., 1783): **Br+** [EICHLER et al. 1999, ESSER 2006a].
Menephilus cylindricus (HBST., 1784): **Br+(-)** [ESSER 2009b]. **Sn+(-)**: nur eine fragliche alte Literaturangabe [HORNIG 2002c].
Tenebrio opacus DUFT., 1812: **Sn+** [DIETZE & WOLSCHE 2005, HORNIG 2003].
Zophobas morio (F., 1776): **Sdi** [LILLIG 1999].
Stenomax aeneus (SCOP., 1763): **No+(-)** [WENZEL 2005]. **Sd+** [LILLIG 1999].
Nalassus laevioctostriatus (GOEZE, 1777): **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008]. **MV+(-)** [RINGEL i.l. 2011].
Xanthomus pallidus (CURT., 1830): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].

Familie BORIDAE

Boros schneideri (PANZ., 1795): **Byl** [HORION 1956].

Familie TROGIDAE

Trox perlatus (GOEZE, 1777): **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Trox hispidus (PONT., 1763): **MV+(-)** [RÖSSNER & STEGEMANN 2005, KÖHLER RÜTE]. **No+(-)** [KÖHLER & SCHARF 2010]. **Sd(+)** [EISINGER 2006a].
Trox niger ROSSI, 1792: **By+**: früher als Unterart des *T. hispidus* geführt, dessen süddeutsche Funde einer Revision bedürfen [RÖSSNER 2006].
Trox evermannii KRYN., 1832: **Br+(-)** [RÖSSNER & KALZ 2002].
Trox perrisi FAIRM., 1868: **Br+(-)** [ESSER 2002a]. **By+(-)** [SCHMIDT & BUSSLER 2004]. **MV+** [RINGEL & HAMPEL 2003]. **Rh+(-)** [HADULLA 2003]. **St+(-)** [DIETZE 2004a, JUNG 2007].

Familie GEOTRUPIDAE

Geotrupes mutator (MARSH., 1802): **Pf+(-)** [ARK Bienenwald].

Familie SCARABAEIDAE

Euoniticellus fulvus (GOEZE, 1777): **Pf+(-)** [ARK Bienenwald].
Copris lunaris (L., 1758): **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Caccobius schreberi (L., 1767): **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Onthophagus taurus (SCHREB., 1759): **Pf+(-)** [ARK Bienenwald].
Rh+(-) [HADULLA 2003]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+(-)** [BELLMANN 2002]. **Wf+(-)** [SCHULZE 1996].
Onthophagus illyricus (SCOP., 1763): **By+** [WEICHELBAUMER 2003b]. **Hs+**: Kühkopf, HANSEN, 9.VI.51, 1 Ex. (BÖHME det., t. KRELL) [coll. BÖHME].
Onthophagus verticicornis (LAICH., 1781): **WE+** [BELLMANN 2002].

- Onthophagus ovatus* (L., 1767): **WE** [BELLMANN 2002].
Onthophagus baraudi NICOLAS, 1964: **By+** [RÖSSNER 2008c].
Onthophagus lemuri (F., 1781): **WE** [BELLMANN 2002].
Onthophagus vacca (L., 1767): **By-**: bislang gesicherte Nachweise nur aus der Umgebung von München, zuletzt 1906 [RÖSSNER et al. 2010], alle anderen Regionen zu folgender Art:
Onthophagus medius (KUG., 1792): **D**: fast alle Meldungen für *Onthophagus vacca* sind auf *Onthophagus medius* zu beziehen [RÖSSNER et al. 2010].
Onthophagus fracticornis (PREYSSL., 1790): **WE** [BELLMANN 2002].
Euonithophagus amyntas (OL., 1789): **Hs!** [RÖSSNER 2010b].
Ochodaea chrysomeloides (SCHRK., 1781): **St+** [JUNG 2001]. **Th+** (-) [RÖSSNER 1999c].
Aegialia rufa (F., 1792): **Br+(-)** [HILLERT 2010]. **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Aegialia sabuleti (PANZ., 1797): **Ba/(+)** [RÖSSNER 2006]. **By/(+)** [RÖSSNER 2006]. **No/(-)** [RÖSSNER 2006]. **St/(-)** [RÖSSNER 2006]. **Th?** [KOPETZ & WEIGEL 2000, RÖSSNER 2006, KOPETZ et al. 2008]. **Wf/(+)** [RÖSSNER 2006]. **Wt/(+)** [RÖSSNER 2006].
Aegialia mimica (PITTO, 2006): **Ba!** [coll. BENISCH, BELLMANN det.]. **By+** [RÖSSNER 2006]. **Hs**: Rothenburg/Fulda, RIEHL, vor 1900 [coll. RIEHL, Marburg, I. SCHAFFRATH, i.l. 1999 als *sabuleti*] [RÖSSNER 2006]. **No** [vgl. RÖSSNER 2006]. **St+** [RÖSSNER 2006]. **Th+** [RÖSSNER 2006, KOPETZ et al. 2008]. **Wf+**: als „Rheinland-Pfalz“ bei RÖSSNER 2006 [coll. KÖHLER, BELLMANN det.]. **Wt+**: noch zu prüfen, nach Fundort aber wohl auch *mimica* [coll. BUCK u.a.].
Aegialia latipuncta (GREY., 1866): **By+**: Alpenart, bislang nur aus Südbayern bekannt [RÖSSNER 2006].
Aphodius brevis (ER., 1848): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Aphodius hydrochaeris (F., 1798): **St+(-)** [JUNG 2001]. **Th?(-)** [RÖSSNER 1999a].
Aphodius luridus (F., 1775): **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Aphodius satellitus (HBST., 1789): **Pf+(-)** [ARK Bienwald]. **WE+(-)** [BELLMANN 2002].
Aphodius maculatus STURM, 1800: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Aphodius zenkeri GERM., 1813: **Wf+** [BORCHERING 1994].
Aphodius coenosus (PANZ., 1798): **Rh+(-)** [MÜLLER & MÜLLER 2001].
Aphodius paracoenosus BALTIHRUB., 1960: **Ba+** [RÖSSNER 2005a].
By+ [WEICHSELBAUMER 2003b, RÖSSNER 2005a]. **Hs+** [RÖSSNER 2005a]. **No+** [RÖSSNER 2005a]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, RÖSSNER 2005a]. **Wt+** [RÖSSNER 2005a].
Aphodius quadrimaculatus (L., 1761): **Th+(-)** [RÖSSNER 1999c].
Aphodius biguttatus GERM., 1824: **Br!**: bei dem Beleg zu RENNER (2002) handelt es sich um ein Weibchen von *Aphodius coenosus* [RÖSSNER 2008a]. **WE?** (+) [BELLMANN 2002].
Aphodius conspurcatus (L., 1758): **Br+(-)** [RÖSSNER & WOOG 2006]. **Hs+(-)** [RÖSSNER & WOOG 2006]. **MV+(-)** [RÖSSNER & WOOG 2006]. **Sn+** [RÖSSNER & WOOG 2006]. **Wf+** [RÖSSNER & WOOG 2006].
Aphodius melanostictus SCHM., 1840: **Hs(-)**: Belege aus Hessen sind verschollen und höchstwahrscheinlich fehldeterminiert [SCHAFFRATH i.l. 1999]. **Sd?** [MOSSBACHER 1987 fraglich]. **WE?** (?) [BELLMANN 2002].
Aphodius pictus STURM, 1805: **Sd+** [BAUMANN i.l. 2005].
Aphodius obliteratus PANZ., 1823: **Th+(-)** [RÖSSNER 1997].
Aphodius affinis PANZ., 1823: **WE!** [BELLMANN 2002].
Aphodius reyi Rtt., 1892: **Th+** [KOPETZ et al. 2008, RÖSSLER 2008b].
Aphodius punctatosulcatus STRM., 1805: **Br+(-)** [ESSER 2008a]. **Sn+**: Moritzburg, BÖHME, 14.IV.1991, 1 Ex. (KRELL det.) [coll. BÖHME]. **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Aphodius sphaelatus (PANZ., 1798): **Br+** [HILLERT 2010].
Aphodius consputus CREUTZ., 1799: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005].
Aphodius tomentosus (MÜLL., 1776): **SH+(-)**: Sylt, Kampen, DIETZE & SCHORNACK, 4.V.1999, mehrere Ex. (SCHUMANN det.) in Pferdekot [DIETZE & SCHORNACK 2000]. **WE?** (?) [BELLMANN 2002].
Aphodius foetens (F., 1787): **Th+(-)** [RÖSSNER 2001].
Aphodius gibbus GERM., 1817: **Br/(+)**: Falscheintrag [RÖSSNER i.l. 2002].
Aphodius fasciatus (OL., 1789): **Pf+** [KÖHLER 2004b]. **Wf+** [RENNER 2008a].
Aphodius piceus GYLL., 1808: **WE?** (?) [BELLMANN 2002].
Aphodius convexus ER., 1848: **Hs+** [KÖHLER Gold]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+** [RÖSSNER 2003b]. **WE!** [BELLMANN 2002].
Aphodius satyrus Rtt., 1892: **By+(-)** [RÖSSNER 2007a, RÖSSNER 2008c].
Aphodius constans DUFT., 1805: **By/(+)** [RÖSSNER 2010a]. **Hn/(-)** [RÖSSNER 2010a]. **Pf/(+)**: Beleg nicht geprüft, aber sicher Fehldetermination (vgl. RÖSSNER 2010) [KÖHLER i.l. 2010].
Aphodius borealis GYLL., 1827: **Th+** [RÖSSNER 1996a].
Aphodius nemoralis ER., 1848: **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
Euheptaulacus sus (HBST., 1783): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Ataenius horticolae HAROLD, 1869: **Byv** [HORION 1958].
Psammodytes asper (F., 1775): **Th+** [KOPETZ et al. 2008]. **Wt+**: Ludwigsbürg-Eglosheim, KONZELMANN, 13.VII.2007 [coll. KONZELMANN].
Psammodytes pierottii PITTONI, 1979: **Ba+** [RENNER 2005b, RÖSSNER 2006].
Rhyssalus germanus (L., 1767): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
Diastictus vulneratus (STURM, 1805): **Br+(-)** [RÖSSNER & KALZ 2002]. **Sn/(-)** [RÖSSNER 2010b].
Serica intermixta BLATCHLEY, 1910: **Wt+**: aus Nordamerika eingeschleppt [AHRENS & KLESS 2001, RÖSSNER 2006].
Omalothea nigromarginata (HERBST, 1785): **Br+** [RÖSSNER & KALZ 2002, RÖSSNER 2003a]. **Sn+(-)** [LORENZ 2001].
Omalothea ruficollis (F., 1775): **Br/(+)** [RÖSSNER 2003a].
Miltotrogus aequinoctialis (HBST., 1790): **Th!** [RÖSSNER 1999c].
Amphimallon ochraceum (KNOCH, 1801): **Ba/(+)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Br/(+)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **By/(+)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Hn/(+)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Hs?(-)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Rh?(-)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Sd!**: der morgens schwärmende und als *A. ochraceum* publizierte Käfer gehört zu *A. solstitialis* [EISINGER 2006a, EISINGER i.l. 2010]. **SH/(-)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Sn/(+)** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **WE!** (-) [BELLMANN 2002, RÖSSNER & KRELL 2009]. **Wt!** [RÖSSNER & KRELL 2009].
Amphimallon fallenii (GYLL., 1817): **By!** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Hn-** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **Ne-** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **SH-** [RÖSSNER & KRELL 2009]. **WE+**: hierher wohl alle Meldung für *Amphimallon ochraceum* [BELLMANN 2002, RÖSSNER & KRELL 2009].
Amphimallon atrum (HBST., 1790): **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, RÖSSNER & WEIPERT 2002].
Amphimallon burmeisteri (BRENSKE, 1892): **Hs+** [RÖSSNER & KRELL 2000].
Melolontha pectoralis MEGERLE, 1812: **Br/(-)** [RÖSSNER 2010b]. **Wt+(-)** [FRANK & KONZELMANN 2002].
Polyphylla fullo (L., 1758): **WE!** (?) [BELLMANN 2002].
Anisoplia villosa (GOEZE, 1777): **Th!** [RÖSSNER 1996b].
Hoplia pratensis DUFT., 1805: **Sn/(-)** [RÖSSNER 2008a]. **Th?(-)** [RÖSSNER 2008a].
Hoplia argentea (PODA, 1761): **Th?(-)** [RÖSSNER 2001].
Hoplia graminicola (F., 1792): **St+(-)** [BASE 2007, JUNG 2007b]. **Wt+(-)**: die Art muß im Status zurückgenommen werden, da die Meldung von vor 1950 stammt [coll. Mus. Stuttgart, KONZELMANN 2001].
Tropinota hirta (PODA, 1761): **MV+(-)** [RÖSSNER 2005b]. **Rh+(-)** [KÖHLER 1997c].
Oxythyrea funesta (PODA, 1761): **Brv** [HENDRICH 2005]. **No+(-)**: Bergheim, Erlaufe, HÖRREN, 3.VIII.2007 [JUNKER & KÖHLER 2010]. **Wf+(-)**: Morsbach, BUCHEN, VI.2010 (Fotobeleg) Hagen, BÜCKER, 24.VIII.2010 (Fotobeleg) [GERHARD i.l. 2007, insektenfotos.de].
Protaetia aeruginosa (DRURY, 1770): **Sd+**: Göttingen, LILLIG, 15.V.2011, 1 Ex. [LILLIG i.l. 2011].
Protaetia fieberti (KR., 1880): **Hn-** [HORION 1938]. **Th+(-)** [RÖSSNER 2008a].
Protaetia lugubris (HBST., 1786): **No+(-)**: Hamminkeln-Mehrhoog, Heide, HOFMANN, 3.VI.1994, 1 Ex. (BAUMANN det.) [BAUMANN i.l. 2001]. **WE?** (?) [BELLMANN 2002].
Valgus hemipterus (L., 1758): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE+** [BELLMANN & MAUS 2007].
Gnorimus variabilis (L., 1758): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Th+(-)** [STUMPF 2004b, RÖSSNER 1999b].
Trichius zonatus GERM., 1831: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Rh+(-)** [KÖHLER 2006a]. **Th+** [RÖSSNER & SCHULZE 1999, KOPETZ et al. 2004].
Trichius sexualis BEDEL, 1906: **Th/(-)** [RÖSSNER & SCHULZE 1999].
Amphimallon fuscum (SCOP., 1786): **WE!** [BELLMANN 2002].
Familie LUCANIDAE
Platycerus caprea (DEGEER, 1774): **Hn+** [SPRICK et al. 2007].
Ceruchus chrysomelinus (HOCHENW., 1785): **Hs+(-)**: die Meldung aus Hessen bezieht sich auf das Vorkommen im bayerischen Spessart [SCHAFFRATH i.l. 1999].
Aesalus scarabaeoides (PANZ., 1794): **Hs+(-)**: Braunfels, RUPP, 2008 [coll. RUPP].

Familie CERAMBYCIDAE

Megopsis scabricornis (Scop., 1763): **By**+(.) [HOFMANN 2001].
Ergates faber (L., 1767): **Sd** [NIEHUIS 2001].
Tragosoma deparium (L., 1767): **Thv** [FLOSSMANN 2006a].
Tetropium fuscum (F., 1758): **Hn**+(.) [SCHMIDT et al. 2000].
Tetropium gabrieli Weise, 1905: **Hn**+(.) [SCHMIDT et al. 2000]. **Sdv** (-) [NIEHUIS 2001].
Oxyrinus cursor (L., 1758): **Sd**± [NIEHUIS 2001].
Stenocorus quercus (GÖTZ, 1783): **No**+(.) [KÖHLER 2006a].
Pachyta quadrimaculata (L., 1758): **Hn**+(.) [SPRICK et al. 2007].
Gaurates virginea (L., 1758): **No**+(.) [JUNKER & KÖHLER 2005, coll. KÖHLER]. **Pf**+(.) [ARK Bienwald].
Acmacops septentrionis (THOMS., 1866): **MV**± [KULBE & RINGEL 2002, RINGEL & HAMPEL 2003, RINGEL & PECHMANN 2005].
Acmacops marginatus (F., 1781): **MV**± [RINGEL & HAMPEL 2003, RINGEL & PECHMANN 2005, KÖHLER Rüte]. **St**+(.) [JUNG 2007].
Pidonia lurida (F., 1792): **Hn**+(.) [SPRICK et al. 2001].
Cortodera femorata (F., 1787): **Hn**± [SCHMIDT et al. 2005].
Leptura arcuata (PANZ., 1793): **MV**±(.) [KÖHLER 2003a]. **Pf**?(.) : nur unbelegte Altmeldungen [NIEHUIS 2001].
Anoplodera rufipes (SCHALL., 1783): **Sd**+(.) [NIEHUIS 2001].
Vadonia unipunctata (F., 1787): **Sn** [HORION 1974].
Corymbia erythroptera (HAGENB., 1822): **MV**-(v) [KÖHLER & LEHMANN 2005].
Corymbia maculicornis (DEGEER, 1775): **Br**± [DREGER et al. 2009]. **WE**? [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Corymbia cordigera (FUESSL., 1775): **By**+(.) : Dachau, Leitenberg, 5.VIII.1998, 1 Ex. (Fotobeleag), event. verschleppt [SCHWIBINGER i.l. 2007]. **Rh**(v): Fundortverwechslung nach HORION (1974) [NIEHUIS 2001].
Anastrangalia reyi (HEYDEN, 1889): **Ba**± [FRANK & KONZELMANN 2002].
Lepturobosca virens (L., 1758): **WE**/ [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Judolia sexmaculata (L., 1758): **WE**/ [BRÜGGEMANN 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Pachytodes cerambyciformis (SCHRK., 1781): **Br**±(-) [ESSER 2005a, BARNDT 2008].
Pachytodes erraticus (DALM., 1817): **By**± [BUSSLER et al. in Vorber.].
Pedostangalia revestita (L., 1767): **Hn**±(-) [SCHMIDT et al. 2000].
Pedostangalia pubescens (F., 1787): **Sd**± : aus 1960 eine sicher falsche Angabe [NIEHUIS 2001].
Stenurella bifasciata (MÜLL., 1776): **WE**? [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Necydalis ulmi CHEVR., 1838: **MV**±(-) [GÜRLICH Zipp, SCHEUNE-MANN 2010]. **Rh**±(-) [coll. KÖHLER]. **Th**- [FLOSSMANN 2006a].
Axinopalpis gracilis (KRYN., 1832): **HS**± [WEBER 1903]. **MV**± [BRINGMANN 1998, KULBE & RINGEL 2002].
Obrium cantharinum (L., 1767): **Hn**+(.) [SPRICK et al. 2007]. **MV**± : Gessin, RINGEL, 9.VII.2008 [GÜRLICH Cono, RINGEL i.l. 2011]. **St**±(-) [JUNG 2007, DIETZE 2005].
Molochrus kiesenwetteri MULS.REY, 1861: **Sn**/ [HORION 1974]. **St**/ [HORION 1974]. **Wt**/ [HORION 1974].
Molochrus marmottani BRIS., 1863: **Ba**± [FRANK & KONZELMANN 2002].
Stenopteris rufus (L., 1767): **Br**± [EICHLER et al. 1999, NEUMANN & SCHNEIDER 2008, BARNDT 2008].
Callimus angulatus (SCHRK., 1789): **Br**± [MÖLLER 2003].
Ropalopus ungaricus (HBST., 1784): **Wf**±(-) [REJZEK & HADULLA 2000].
Ropalopus spinicornis (AB., 1869): **Hn**± [SCHMIDT et al. 2000]. **No**± [REISSMANN 2008a]. **Th**±(-): Ichtstedt, FUCHS, 4.VI.1994, 1 Ex. (t. FRIESER) am Rande eines Laubwaldes auf einer Umbelliferenblüte [FUCHS i.l. 2001].
Ropalopus clavipes (F., 1775): **WE**±(-) [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
Leioderes kollari REDT., 1849: **Th**± [KOPETZ et al. 2004]. **Wt**± [FLOSSMANN 2006a, LANGE 2005].
Semanotus undatus (L., 1758): **WE**/ [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Phymatodes glabratus (CHARP., 1825): **Hn**±(-) [SPRICK et al. 2007].
Phymatodes pusillus (F., 1787): **Hn**± [SPRICK et al. 2001]. **MV**± [BRINGMANN 1998, KULBE & RINGEL 2002].
Phymatodes rufipes (F., 1776): **St**±(-) [DIETZE & SCHORNACK 1999, JUNG 2007].
Xylotrechus rusticus (L., 1758): **Hn**± [SPRICK et al. 2001]. **No**±(./) [HAMERS & KÖHLER 2005]. **Th**±(-) [FLOSSMANN 2006b]. **Wt**±(-) [FRANK & KONZELMANN 2002].

Xylotrechus antilope (SCHÖNH., 1817): **Hn**±(-) [SCHMIDT et al. 2005]. **WE**± [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf**±(-): Werne, MEDGER, V.2011, 1 Ex. (Fotobeleag, t. KÖHLER) [MEDGER i.l. 2011].
Xylotrechus arvicola (OL., 1795): **WE**? [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Xylotrechus stebbingi GAHAN, 1906: **Ba**±(i) [JUNKER & KÖHLER 2005]. **HS**± [BRENNER 2006]. **No**± [JUNKER & KÖHLER 2005].
Clytus lama MULS., 1847: **Pf**v [NIEHUIS 2001]. **WE**v [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Cyrtoclytus capra (GERM., 1824): **Wt**± [BENSE 2005].
Plagionotus detritus (L., 1758): **No**±(v) [coll. KÖHLER]. **SH**±(-) [GÜRLICH et al. i.v.].
Neoclytus acuminatus F., 1775: **Rhi** [NIEHUIS 2001].
Chlorophorus varius (MÜLL., 1766): **Hn**? [SCHMIDT et al. 2005].
Chlorophorus sartor (MÜLL., 1766): **Sd**- [NIEHUIS 2001]. **St**±(-) [BASE & MALCHAU 2011].
Purpuricenus kaehleri (L., 1758): **Wf**±(.) : Halle i. W., K.H. MEYER, 20.VII.1952 [SCHULZE 2009].
Dorcadion fuliginator (L., 1758): **No**±(-) [HAMERS & KÖHLER 2005, BAUMANN 2007].
Anoplophora glabripennis (MOTSCH., 1853): **By**± [LOBINGER et al. 2005, BUSSLER & FUCHS 2006]. **No**± [KÖHLER 2008a].
Anoplophora chinensis (FORST., 1771): **Bri** [SCHMIDT & SCHMIDT 1990]. **Noi** [KÖHLER 2008a].
Monochamus sartor (F., 1787): **Thv**±(-) [STUMPF 2001]. **Wt**±(-) [FRANK & KONZELMANN 2002].
Monochamus saltuarius GEBL., 1830: **Ba**± [HADULLA 2009]. **Pf**v [NIEHUIS 2001]. **Wt**± [HADULLA 2009a].
Mesosa nebulosa (F., 1781): **Sd**± [NIEHUIS 2001].
Oplosia femica (PAYK., 1800): **MV**± [BRINGMANN 1998, KULBE & RINGEL 2002].
Anaesthetus testacea (F., 1781): **WE**±(.) [KRUMMEN 1997]. **Wf**±(.) [KÖHLER Sieg].
Pogonocherus ovatus (GOEZE, 1777): **MV**±(-) [KULBE & RINGEL 2002, RINGEL & HAMPEL 2003, RINGEL & PECHMANN 2005]. **SH**±(.) [GÜRLICH et al. i.v.].
Acanthoderes clavipes (SCHRK., 1781): **Hn**±(.) [SPRICK et al. 2001].
Leioptus linnei WALLIN et al. 2009: **Br**± [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **By**± [HERBIG in Vorber.]. **HS**± [KÖHLER Loch]. **MV**± [GÜRLICH Cono, GÜRLICH Vilm., GÜRLICH Zipp]. **Ne**± [GÜRLICH et al. i.v.]. **No**± [KÖHLER NW29]. **Pf**± [ARK Bienwald]. **Rh**± [KÖHLER & WAGNER 2010]. **SH**± [GÜRLICH et al. i.v.]. **Sn**± [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].
Leioptus punctulatus (PAYK., 1800): **Ba**± [T. BÜCHE, BENSE i.l.]. **Br**±(-) [MÖLLER 2011]. **Wt**± [T. BENSE, BENSE i.l.].
Leioptus femoralis FAIRM., 1859: **No**± : Meckenheim, Krautfabrik, JUNKER, 13.VII.2007, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einer Lichtfalle [JUNKER & KÖHLER 2010]. **Rh**± : Urwald von Taben, TOLASCH, 19.VI.2009, mehrfach [TOLASCH i.l. 2009]. **Sd**± [GEREND & MEYER 2007].
Acanthocinus aedilis (L., 1758): **Sd**- [NIEHUIS 2001].
Acanthocinus reticulatus (RAZM., 1789): **Pf**? [NIEHUIS 2001]. **Rh**v [NIEHUIS 2001].
Acanthocinus griseus (F., 1792): **MV**± [BRINGMANN 1998, RINGEL & PECHMANN 2005, KÖHLER Rüte].
Exocentrus adspersus MULS., 1846: **Hn**± [SCHMIDT et al. 2005].
Exocentrus punctipennis MULS.GUILL., 1856: **MV**± [KULBE & RINGEL 2002, DÖRING 2000, GÜRLICH Cono]. **Sd**± [MÖLLER 2005].
Agapanthia dahl (RICHT., 1821): **Rh**± [NIEHUIS 2001].
Agapanthia violacea (F., 1775): alle Meldungen für *Agapanthia violacea* sind auf *A. intermedia* zu beziehen.
Agapanthia intermedia GANGLB., 1884: Hierher alle Meldungen für *A. violacea*.
Saperda punctata (L., 1767): **Ba**± [WURST 2009]. **Pf**± [ARK Bienwald]. **Th**± [KOPETZ et al. 2008, FLOSSMANN 2009].
Saperda octopunctata (Scop., 1772): **No**/ [BAUMANN 1997].
Saperda candida F., 1787: **SH**v : Fehmarn, VI.2008, Larven und Imagines aus *Sorbus* [coll. NOLTE, www.entomologie.de, NOLTE & KRIEGER 2008].
Oberea pupillata (GYLL., 1817): **Hn**± [SCHMIDT et al. 2000].
Oberea erythrocephala (SCHRK., 1776): **MV**± [BRINGMANN 1998].
Stenostola ferrea (SCHRK., 1776): **MV**± [BRINGMANN 1998]. **St**± [BASE 2007]. **Th**± [KOPETZ & WEIGEL 2000, SKALE & WEIGEL 2001].
Phytoecia scutellata (F., 1792): **Pf**± [NIEHUIS 2001].
Phytoecia nigripes (VOET, 1778): **Pf** [NIEHUIS 2001].
Phytoecia nigricornis (F., 1781): **Br**± [EICHLER et al. 1999]. **Sd**± [NIEHUIS 2001].

Phytoecia julii MULS., 1863: **Hs+**: Lorch und Eppertshausen, HÖHNER, 1988 (bisher nicht von *nigricornis* abgetrennt) [coll. HÖHNER].
Phytoecia icterica (SCHALL., 1783): **Br+**(-) [EICHLER et al. 1999]. **MVv** [KULBE & RINGEL 2002, RINGEL & PECHMANN 2005]. **Sd+** [NIEHUIS 2001].
Phytoecia caerulea (SCOP., 1772): **MV+** [BRINGMANN 1998].
Phytoecia uncinata (REIDT., 1842): **Ba**(+): bei dem Beleg im Mus. Frankfurt handelt es sich um ein männliches Zwergexemplar von *Phytoecia coerulescens* [HOFMANN i.l. 2007].
Tetrops starkii CHEVR., 1859: **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **Sd+** [NIEHUIS 2001, MÖLLER 2005]. **WE+** [BELLMANN i.l. 2007].
Chlorophorus annularis (F., 1787): **Rhi**: Roth, Ortslage, STOCK, IV.2001, 2 Ex. aus einer Bambusflöte [STOCK 2001]. **Thi** [KOPETZ et al. 2008].

Familie CHRYSOMELIDAE

Macrolea appendiculata (PANZ., 1794): **St+** [BÄSE 2004].
Donacia dentata HOPPE, 1795: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+** [BÄSE 2004, DIETZE 2005].
Donacia malinovskyi AHR., 1810: **St+**(-) [BÄSE 2004, coll. HEIDENREICH].
Donacia sparganii AHR., 1810: **Ba**(+): der von KLESS (1969) publizierte Fund ist nicht nachprüfbar [KONZELMANN i.l. 2001]. **Hn+**(-) [SPRICK et al. 2001]. **Wt**(+): kein Beleg in der coll. KÖSTLIN, daher zu streichen [KONZELMANN i.l. 2001].
Donacia aquatica (L., 1758): **St+** [BÄSE 2004, DIETZE & SCHORNACK 1999].
Donacia impressa PAYK., 1799: **St+** [BÄSE 2007].
Donacia brevicornis AHR., 1810: **Sn+**(-) [KLAUSNITZER et al. 2009]. **St+** [BÄSE 2004].
Donacia marginata HOPPE, 1795: **Sd+** [EISINGER 2006a].
Donacia obscura GYLL., 1813: **MV+**(-) [DEGEN 1999b, FRITZLAR 2001]. **St+** [BÄSE 2007b].
Donacia thalassina GERM., 1811: **Pf+** [ARK Bienwald].
Donacia simplex F., 1775: **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
Donacia tomentosa AHR., 1810: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+** [BÄSE 2004, coll. BAUMGARTEN].
Plateumaris braccata (SCOP., 1772): **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2001].
Orsodacne cerasi (L., 1758): **MV+** [DRILLING & KLAAS 2008].
Orsodacne lineola (PANZ., 1795): **Rh+**: Duchroth, Gangelsberg, BENISCH, 7.V.2011, 1 Ex. auf Weißdorn [BENISCH i.l. 2011].
Zeugophora turneri POWER, 1863: **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Zeugophora frontalis SUFFR., 1840: **Wf+**(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Oulema septentrionis (WSE., 1880): **Th** [FRITZLAR 2001]. **WE+**(-) [BELLMANN i.l. 2000].
Oulema tristis (HBST., 1786): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+** [BÄSE 2005a].
Oulema rufocyanea (SUFFR., 1847): **Br+** [EICHLER et al. 1999]. **Hs+**: Traisa-Trautheim, HANSEN, 15.VI.51, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME].
Crioceris quatuordecimpunctata (SCOP., 1763): **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010].
Crioceris quinquepunctata (SCOP., 1763): **By**(-) [SPRICK i.l. 2007].
Lilioceris merdigera (L., 1758): **WE+**(-) [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
Labidostomis tridentata (L., 1758): **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999, FRITZLAR 2003].
Lachnaia sexpunctata (SCOP., 1763): **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999].
Smaragdina salicina (SCOP., 1763): **MV+**(-): Marxhagen, BÜCHE, 26.V.2001, 3 Ex. an einem Feldgehölz auf Brachland [BÜCHE i.l.].
Smaragdina affinis (ILL., 1794): **St+** [JUNG 2001, SCHOLZE 2007].
Smaragdina xanthaspis (GERM., 1824): **Ba+** [KOSTENBADER & TRAUTNER 2008].
Cheilotoma musciformis (GOEZE, 1777): **Hs+** [BRENNER 2008].
Coptocephala scopulina (L., 1767): **By**(-), **Pf**(-), **Rh**(+) und **Wt**(-): alte Meldungen beziehen sich auf *Coptocephala quadrimaculata* [KIPPENBERG 1994]. **WE** [BRÜGGEMANN 1873 falsch, BELLMANN i.l.].
Coptocephala rubicunda (LAICH., 1781): **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006, RENNER 2004].
Coptocephala quadrimaculata (L., 1767): **By+**: München, Stadtgebiet, WANNTORP, VI.2004 [WANNTORP i.l. 2004]. **MV?**(-) [SPRICK i.l. 2007]. **Pf** [ERBER 1983, KÖHLER 1997a]. **Rh+** [HORION 1951]. **Wt** [HORION 1951].

Pachybrachis sinuatus MULS.REY, 1859: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Pachybrachis picus WEISE, 1882: **Pf**(-) [ARK Bienwald].
Cryptocephalus coryli (L., 1758): **St+** [JUNG 2001].
Cryptocephalus cordiger (L., 1758): **St+** [ESSER 2001c]. **WE?** [HOLLMANN 1884, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus sexpunctatus (L., 1758): **MV+**(-) [DEGEN 1999b].
Cryptocephalus distinguendus SCHNEID., 1792: **St+** [BÄSE 2007].
Cryptocephalus primarius HAR., 1872: **St+** [ESSER 2001c].
Cryptocephalus imperialis LAICH., 1781: **Br**(-) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St+**: Dübener Heide, ANONYMUS, 19.VII.2009, Fotobeleg (BÜCHE det.) [www.insektenfotos.de]. **Th+**(-) [FRITZLAR 2001].
Cryptocephalus bipunctatus (L., 1758): **Hn+** [KOCH 2006, SPRICK et al. 2007]. **WE+**(-) [BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus biguttatus (SCOP., 1763): **MV+** [RINGEL & KULBE 2006]. **St+** [FRITZLAR 2001, SCHOLZE 2007].
Cryptocephalus aureolus SUFFR., 1847: **WE+**(-) [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus sericeus (L., 1758): **WE**(+) [Fehlbestimmung, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus hypochaeridis (L., 1758): **WE** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus transiens FRANZ, 1949: **Sn** [FRITZLAR 2009].
Cryptocephalus violaceus LAICH., 1781: **WE** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus marginellus OL., 1791: **St**(+) [BÄSE 2009b].
Cryptocephalus nitidulus F., 1787: **Rh+**(-) [WENZEL & HANNIG 2002].
Cryptocephalus pallifrons GYLL., 1813: **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **WE** [WIEPKEN 1886 i.Nachtrag, BELLMANN i.l.].
Cryptocephalus parvulus MÜLL., 1776: **MV+**(-) [DEGEN 1999b, ZIEGLER 2006a].
Cryptocephalus caerulescens SAHLB., 1839: **St+** [DIETZE & SCHORNACK 1999, FRITZLAR 2001]. **WE+**(-) [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus marginatus F., 1781: **WE** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus quadripustulatus GYLL., 1813: **St+** [GRUSCHWITZ 2003, JUNG 2007]. **WE+**(-) [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus bameuli DUHALDEBORDE, 1999: **By+** [MATERN & SIEDE 2001, FRITZLAR 2001]. **Pf+**: Grünstadt-Neuleiningen, Gemeindeberg, W. & F. KÖHLER, 18./19.VI.1993, 1 Ex. [MATERN & SIEDE 2001, coll. KÖHLER, coll. HÖHNER]. **Rh+** [MATERN & SIEDE 2001]. **St+**: Freiburg/Unstrut [MATERN & SIEDE 2001]. **Th+** [FRITZLAR 2001].
Cryptocephalus vittatus F., 1775: **Br+**(-) [ESSER 2005a]. **WE+**(-) [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus bilineatus (L., 1767): **No+**(-) [HADULLA 2002, HADULLA 2008].
Cryptocephalus strigosus GERM., 1823: **WE?** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Cryptocephalus chrysopus GM., 1788: **Wf+**(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Cryptocephalus frontalis MARSH., 1802: **Hn+**(-) [BORCHERDING 1994]. **St+** [JUNG 2007].
Cryptocephalus saliceti ZEBE, 1855: **Pf+** [KÖHLER 2000d].
Cryptocephalus querceti SUFFR., 1848: **WE?**(-) [HORION 1951, BELLMANN i.l. 2000]. **Wt+**(-) [FRANK & KONZELMANN 2002].
Cryptocephalus pygmaeus F., 1792: **Sd+** [EISINGER 2006a].
Cryptocephalus macellus SUFFR., 1848: **St+** [ESSER 2001c, FRITZLAR 2001].
Cryptocephalus ochroleucus STEPH., 1834: **Th** [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
Cryptocephalus populi SUFFR., 1848: **Hn+**(-) [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs**(/): Kühkopf, HANSEN, 6.VIII.50, 2 Ex. Kühkopf, Fährte Guntersblum, MÜLLER, 6.VII.1974 und Kälberkopf, 2.VII.1977 (KIPPENBERG det.) - Viernheimer Heide, MÜLLER, 7.IX.1996 [coll. BÖHME, E.MÜLLER mdl. 2001].
Cryptocephalus rufipes GOEZE, 1777: **Hn+**(-) [KOCH 2006, SPRICK et al. 2007]. **Rh+**(-) [WAGNER 2002a, KÖHLER & WAGNER 2010].
Pachnephorus pilosus (ROSSI, 1790): **Pf+**(-) [ARK Bienwald]. **WE** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Eumolpus asclepiadeus (PALL., 1776): **St+** [ESSER 2001c].
Chrysolina herbacea (DUFT., 1825): **WE+**(-) [ESSER 1999].
Chrysolina coerulans (SCRIBA, 1791): **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].

- Chrysolina cerealis* (L., 1767): **Hs+(-)**: Traisa, Trautheim, HANSEN, 9.IX.51, 3 Ex. - Roßdorf, Roßberg, BÖHME, 18.IX.55, 1 Ex. [coll. BÖHME]. **MV+(-)** [DEGEN 1999b].
- Chrysolina americana* (L., 1758): **Byi** [HOFMANN i.l. 2002]. **Hsi**: Seglingenstadt, Gärtnerrei, HOFMANN, 2009 [coll. HOFMANN]. **WEi** [coll. DEI, BELLMANN i.l. 2000]. **Wti**: Vellberg, WEISENBÖHLER, 12.VI.2004, 1 Ex. (Fotobeleag, KÖHLER det.) an frisch gepflanztem Lavendel [WEISENBÖHLER i.l. 2004].
- Chrysolina rufa* (DUFT., 1825): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Hs+(-)** [FLECHTNER 2003b, KÖHLER & FLECHTNER 2007].
- Chrysolina purpurascens* (GERM., 1817): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Chrysolina kuesteri* (HELLIES., 1911): **St+** [SCHOLZE 2007].
- Chrysolina gypsophilae* (KÜST., 1845): **Sn+?** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Chrysolina didymata* (SCRIBA, 1791): **Pf+?** [ARK Bienwald].
- Chrysolina bruvicensis* (GRAV., 1807): **MV+** [RINGEL & KULBE 2006].
- Chrysolina quadrigemina* (SUFFR., 1851): **WE-** [ROBEN 1908, BELLMANN i.l. 2000].
- Chrysolina carnifex* (SUFFR., 1851): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+** [BÄSE 2007].
- Chrysolina analis* (L., 1767): **Hs+(-)** [BRENNER 2008].
- Chrysolina marginata* (L., 1758): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007].
- Oreina bifrons* (F., 1792): **St+(-)** [BÄSE 2009b].
- Colaphus sophiae* (SCHALL., 1783): **Wt+(-)**: die Art ist im Status zurückzustufen, da der Beleg vor 1950 gefunden wurde [coll. Mus. Stuttgart, KONZELMANN i.l. 2001].
- Sclerophaedon carniolicus* (GERM., 1824): **St+(-)** [BÄSE 2009b].
- Sclerophaedon orbicularis* (SUFFR., 1851): **Rh+(-)** [BAUMANN & KÖHLER 2000].
- Chrysomela cuprea* F., 1775: **MV+** [RINGEL & KULBE 2006]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Chrysomela viginipunctata* SCOP., 1763: **MV+(-)** [RINGEL & KULBE 2006]. **St+** [BÄSE 2007].
- Chrysomela collaris* L., 1758: **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Chrysomela saliceti* (WEISE, 1884): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000].
- Goniocetena kaufmanni* (MILL., 1880): **Byl+(-)** und **Wtl+(-)**: Südalpenart, frühere Meldungen gehören zu *Goniocetena holdhausi* [SPRICK i.l. 2007].
- Goniocetena holdhausi* (LEEDER, 1950): **Wtl+** [SPRICK i.l. 2007].
- Goniocetena decemnotata* (MARSH., 1802): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+(-)** [BÄSE 2007, DIETZE & SCHORNACK 1999].
- Goniocetena linnaeana* (SCHRR., 1781): **Br+(-)** [BARNDT 2004, ESSER 2006a].
- Goniocetena formicata* (BRÜGG., 1873): **Ba+** [REISSMANN et al. 2008]. **Hs+** [REISSMANN et al. 2008].
- Goniocetena intermedia* (HELL., 1913): **Rh+** [KÖHLER 2006a]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
- Goniocetena pallida* (L., 1758): **Sn+** [FRITZLAR 2009, KLAUSNITZER et al. 2009]. **WE-** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Goniocetena interposita* (FRANZ & PALMÉN, 1950): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Phratora tibialis* (SUFFR., 1851): **WE+(-)** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Timarcha metallica* (LAICH., 1781): **Ne+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Timarcha goettingensis* (L., 1758): **Sn+(-)** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Galerucella aquatica* (GEOFFR., 1785): **MV+** [DEGEN 1999a, DEGEN 2000, DEGEN et al. 2002]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Galerucella kerstensi* LOHSE, 1989: **Br+** [BEIER & KÖRGE 2001]. **Hs+**: Mühlthal Traisa-Trautheim, HANSEN, 1964 Vogelsberg Schalksbachtal, HOFMANN, 2004 [coll. BÖHME, coll. HOFMANN]. **MV+** [SCHMIDT et al. 2007]. **Wf+** [REHAGE & TERLUTTER 2003].
- Xanthogaleruca luteola* (MÜLL., 1766): **WE+** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Galeruca interrupta* L., 1802: **St+**: Alte Elbe bei Bertingen, ESSER 13.VI.1998, Sandrockenrasen, 1 Ex. [BÜCHE i.l., DIETZE 2005, FRITZLAR 2003]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Galeruca pomonae* (SCOP., 1763): **WE+(-)** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Galeruca laticollis* SAHLB., 1837: **St+(-)**: Feuchtwiese in der Ohreniederung nördlich Haldensleben, BÜCHE, 24.5.1997, zahlreiche Larven an *Thalictrum flavum*; eine Suche nach Imagines blieb erfolglos (durch Fraßpflanze jedoch sicher anzusprechen) [BÜCHE i.l.].
- Galeruca dahli* (JOANN., 1866): **MV+** [BENICK 1921]. **WE+(-)** [Fehlbestimmung, BELLMANN i.l. 2000].
- Lochmaea suturalis* (THOMS., 1866): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Diabrotica virgifera* LEONTE, 1868: **Ba+** [www.biosicherheit.de]. **By+** [www.biosicherheit.de]. **No+** [HÄNDEL 2010].
- Luperus saxonicus* (GM., 1790): **Br+(-)** [BARNDT et al. 2002]. **MV+(-)** [DEGEN 1999b, ZIEGLER 2006a]. **Wt+?**: die Art ist vorerst fraglich, da der Beleg von KOSTENBERGER (1976) revidiert werden sollte [KONZELMANN i.l. 2001].
- Calomicrus circumfusus* (MARSH., 1802): **Wf+(-)** [TERLUTTER 2003].
- Calomicrus pinicola* (DUFT., 1825): **MV+** [RINGEL & KULBE 2006].
- Phyllotreta christinae* HKTR., 1941: **Hn+** [KÖCH 2006, SPRICK et al. 2007]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Wf+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Phyllotreta dilatata* THOMS., 1866: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Phyllotreta flexuosa* (ILL., 1794): **St+** [BÄSE 2007].
- Phyllotreta striolata* (F., 1803): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Phyllotreta cruciferae* (GOEZE, 1777): **MV+** [RINGEL & KULBE 2006, RINGEL et al. 2007].
- Phyllotreta scheuchii* HKTR., 1941: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
- Phyllotreta astrachanica* LOPATIN, 1977: **MV+** [RINGEL & KULBE 2006, ZIEGLER 2006a, RINGEL et al. 2007]. **Sd-** [EISINGER 2001]. **St+**: Halle, MOHR, 3.VI.1963, 1 Ex. (DÖBERL det.) [coll. BÖHME, BÄSE 2007, FRITZLAR 2001, ZIEGLER 2006b].
- Phyllotreta punctulata* (MARSHAM, 1802): **Sn+** [LORENZ 2001b].
- Phyllotreta striolata* HKTR., 1909: **Th+** [FRITZLAR 2009].
- Phyllotreta nigripes* (F., 1775): **MV+** [RINGEL & KULBE 2006].
- Phyllotreta nodicornis* (MARSH., 1802): **Ne+(-)** [MEYBOHM 1999b].
- Luperomorpha xanthodera* (FAIRM., 1888): **Ba+** [KRUMM 2009, DÖBERL & SPRICK 2009, SPRICK 2009]. **Br+** [KRUMM 2009, DÖBERL & SPRICK 2009]. **Hn+** [DÖBERL & SPRICK 2009]. **Hs+** [DÖBERL & SPRICK 2009, SPRICK 2009]. **Wf+** [DÖBERL & SPRICK 2009, SPRICK 2009]. **Wt+** [DÖBERL & SPRICK 2009].
- Aphthona cyathissiae* (KOCH, 1803): **Sn+(-)** [LORENZ 2001b].
- Aphthona abdominalis* (DUFT., 1825): **Rh+(-)** [KÖHLER 2006a]. **St+** [ESSER 2001c].
- Aphthona lutescens* (GYLL., 1808): **WE+(-)** [KRUMMEN 2008b]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Aphthona violacea* (KOCH, 1803): **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **St+** [BÄSE 2011a].
- Aphthona pygmaea* (KUTSCH., 1861): **MV+** [ESSER 2002b]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Aphthona atrocoerulea* (STEPH., 1831): **Hs+(-)** [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000].
- Aphthona venustula* (KUTSCH., 1861): **Br+** [DREGER et al. 2009]. **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Aphthona euphorbiae* (SCHRR., 1781): **Ba+** [BENSE 2009]. **Pf+**: Eich-Gimbsheim, H.-Tabue-See, SKALE, 13.III.2002 [SKALE i.l. 2002, KÖHLER i.l. 2007]. **WE+(-)** [FUHRMANN 2001].
- Aphthona ovata* FOUDR., 1862: **Th+(-)** [FRITZLAR 2001].
- Aphthona atrovirens* (FORST., 1849): **Ba+** [KÖCH 2009]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Longitarsus ochroleucus* (MARSH., 1802): **Pf+** [ARK Bienwald]. **WE+**: Borkum, Nordstrand, BÜCHE, 25.VII.1999, 1 Ex. in den Dünen [WIEPKEN 1883, KRUMMEN 2008b, coll. BÜCHE].
- Longitarsus jacobaeae* (WTRH., 1858): **MV+(-)** [ESSER 2002b].
- Longitarsus symphyti* HKTR., 1912: **Sn+(-)** [LORENZ 2005].
- Longitarsus noricus* LEONARDI, 1976: **Pf+** [ARK Bienwald].
- Longitarsus aeruginosus* (FOUDR., 1860): **Pf+**: Eich-Gimbsheim, H.-Tabue-See, SKALE, 25.IV.2002 [SKALE i.l. 2002].
- Longitarsus foudraisi* WEISE, 1893: **Pf+** [coll. KÖHLER]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Longitarsus agilis* (RYE, 1868): **Hs+** [BRENNER 2005].
- Longitarsus lycopi* (FOUDR., 1860): **Ne+** [ZIEGLER 2004].
- Longitarsus ferrugineus* (FOUDR., 1860): **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus membranaceus* (FOUDR., 1860): **Hn+?** [SPRICK et al. 2001, KÖCH 2006]. **Wt+** [MALZACHER 2005].
- Longitarsus callidus* WARCH., 1967: **Hs+** [DONATH et al. 2006].
- Longitarsus kutscherae* (RYE, 1872): **WE+(-)** [KRUMMEN 2008a].
- Longitarsus curtus* (ALL., 1860): **Ba+** [KÖCH 2009]. **WE+** [coll. KERSTENS, BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus monticola* KUTSCH., 1863: **Sn+** [LORENZ 2005]. **St+** [FRITZLAR 2009]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
- Longitarsus pulmonariae* WEISE, 1893: **Hs+** [BRENNER 2007].
- Longitarsus cerinthae* (SCHRR., 1798): **Th+(-)** [FRITZLAR 2001].
- Longitarsus longipennis* KUTSCH., 1863: **Hs+** [BRENNER 1998].

- Longitarsus lewisii* (BALY, 1874): **Ba**(+) [BÜCHE 2003]. **Br**+ [FRITZLAR 2009]. **Sn**+ [SIEBER et al. 2011]. **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Longitarsus scutellaris* (REY, 1873): **Sn**+ [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Longitarsus reichiei* (ALLARD, 1860): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001, KOCH 2006]. **MV**+ [RINGEL i.l. 2011]. **Pf**+ [KOCH 2006]. **St**+ [KOCH 2006, FRITZLAR 2009].
- Longitarsus ballotae* (MARSH., 1802): **WE**+ [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus celticus* LEONARDI, 1975: **Ba**+ [KOCH 2009].
- Longitarsus strigicollis* WOLL., 1864: **Pf**+: Eich-Gimbsheim, Altrhein und Sandgrube, SKALE 4.IV.2002 und 13.III.2002 [SKALE i.l. 2002].
- Longitarsus gracilis* KUTSCH., 1864: **Th**+(-) [FRITZLAR 2001]. **Sn**+(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Longitarsus longiseta* WEISE, 1889: **Br**+(-) [BARNDT 2007]. **Hs**+ [BRENNER 2003]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
- Longitarsus ganglbaueri* HKTR., 1912: **MV**+ [HENNICKE et al. 1997].
- Longitarsus brisouti* HKTR., 1912: **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001, SKALE & WEIGEL 2001]. **Wt**+ [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Longitarsus aeneicollis* (FALD., 1837): **Th**+(-) [FRITZLAR 2001].
- Longitarsus nasturtii* (F., 1792): **MV**+(-) [RINGEL et al. 2007]. **WE**+(-) [BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus dorsalis* (F., 1781): **By**+(-) [HOFMANN & KÖHLER 2010, SPRICK & SCHMIDT 2004]. **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf**+(-): Dortmund-Schützen, STIEBEINER, 14.V.2000, 3 Ex. (t. KÖHLER) auf einer Industriebrache [coll. STIEBEINER, RENNER 2003a, SPRICK & TERLUTTER 2006]. **Wt**+ [REIBNITZ 2009].
- Longitarsus quadriguttatus* (PONT., 1765): **Hn**+(-) [SPRICK et al. 2001]. **Hs**+ [BRENNER 2007]. **Sn**+ [LORENZ 2005]. **WE**+ [WIEPKEN 1886, BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus apicalis* (BECK, 1817): **WE**? [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus holsaticus* (L., 1758): **Pf**+(-) [ARK Bienwald]. **St**+ [JUNG 2001].
- Longitarsus fulgens* (FOUDR., 1860): **No**+ [coll. KÖHLER]. **Pf**+: Schaidt, NWR Mörderhäufel, KÖHLER, 28.VI.1997, 1 Ex. [coll. KÖHLER]. **Sn**+ [FRITZLAR 2009, KLAUSNITZER et al. 2009]. **St**+ [FRITZLAR 2009].
- Longitarsus tristis* WSE., 1888: **MV**+: Rüterberg bei Dömitz, ZIEGLER, 16.I.2011 [ZIEGLER i.l. 2011].
- Longitarsus languidus* KUTSCH., 1863: **St**+ [JUNG 2001]. **Th**+(-): Sachsenburg (coll. HEYMES, Mus. Erfurt, t. FRITZLAR), damit für Deutschland bestätigt, Wiederfunde: Rudolstadt 1997 - Günserode, Wipperfurth 1999 - Oberheldungen, Kahle Schmücke 1999 - Jena, Forst 2000 [FRITZLAR 2001].
- Longitarsus minusculus* (FOUDR., 1860): **Sn**- [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
- Longitarsus fuscoaeneus* REDT., 1849: **WE**? [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Longitarsus weisei* GUILLB., 1895: **St**+ [JUNG 2001, FRITZLAR 2001].
- Longitarsus niger* (KOCH, 1803): **St**+: Hagholz bei Weferlingen, BÜCHE, 21.VII.1996, zahlreiche am Südrand des Waldes an *Pulmonaria officinalis* [BÜCHE i.l.].
- Longitarsus nigerrimus* (GYLL., 1827): **Br**+(-) [BARNDT 2010]. **Sn**+ [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Longitarsus parvulus* (PAYK., 1799): **Pf**+: Bad Bergzabern, Albertskreuz, DOCKAL, 20.VI.2002, 2 Ex. (KÖHLER det.) [coll. KÖHLER]. **WE**+(-) [KRUMMEN 2008a]. **Wf**+(-) [RENNER 1999c, KÖHLER Hell, KÖHLER Sieg].
- Longitarsus pinguis* WEISE, 1888: **St**+ [FRITZLAR 2001].
- Longitarsus absinthii* KUTSCH., 1862: **Ba**+ [KOCH 2009].
- Longitarsus salviae* GRUEV, 1975: **St**+: Freyburg, Rödelplateau, MOHR, 31.V.62, 1 Ex. (DOBERL det.) [BÜCHE im Dr., ESSER 2001c, coll. BÖHME, KOCH 2006].
- Longitarsus obliteratoides* GRUEV, 1973: **Br**+ [BARNDT et al. 2002]. **By**+ [GERSTMAYER 1999]. **Hs**+ [BRENNER 2000].
- Altica aeneascens* WEISE, 1888: **Th**?+(-) [FRITZLAR 2001].
- Altica brevicollis* FOUDR., 1860: **Hs**+: Darmstadt Lichtwiese, VOGT, 1950 - Roßdorf Ludwigsteich, VOGT, 1951 [coll. HÖHNER]. **MV**+ [RINGEL & KULBE 2006].
- Altica tamaricis* SCHRK., 1785: **MV**+(-): Boltenhagen, Halbinsel Tamewitz/Wismarbucht, STUMPF, VI-VII.1996, 1 Ex [STUMPF i.l. 1999].
- Altica palustris* WEISE, 1888: **MV**+ [DEGEN et al. 2002, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Sn**+(-) [KLAUSNITZER et al. 2009]. **Th**+(-) [FRITZLAR 2001].
- Altica longicollis* (ALLARD, 1860): **Rh**+: der Beleg von der Nahe (BÖHME & HÖHNER 2003) gehört zu *Altica palustris* (SIEDE det.) [SIEDE mdl. 2001]. **St**+ [FRITZLAR 2001].
- Altica impressicollis* (REICHE, 1862): **Hs**+: Rüsselsheim, Dachnau, VOGT, 1958 [coll. HÖHNER].
- Batophila rubi* (PAYK., 1799): **Br**+ [EICHLEH et al. 1999].
- Neocrepidodera brevicollis* DAN., 1904: **St**+: Beleg muss noch geprüft werden, PESCHEL i.l. 2007 [GÜNTHER & PESCHEL 2001 (fraglich)].
- Neocrepidodera motschulskii* KONSTANTINOV, 1991: **St**+ [BÄSE 2007]. **WE**+ [BELLMANN et al. 2003].
- Neocrepidodera interpunctata* MOTSCH., 1859: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005].
- Neocrepidodera nigrifolia* (GYLL., 1813): **Br**+ [DREGER et al. 2002]. **St**+ [FRITZLAR 2003, JUNG 2001]. **Th**+(-) [FRITZLAR 2001].
- Derocrepis rufipes* (L., 1758): **MV**+(-) [RINGEL i.l. 2011].
- Hippuriphila modeeri* (L., 1761): **Pf**+ [ARK Bienwald].
- Crepidodera plutus* (LATR., 1804): **MV**+(-) [ZIEGLER 2006a].
- Crepidodera lamina* BEDEL, 1901: **Br**+ [EICHLEH et al. 2002, BARNDT 2008]. **Sn**+(-) [LORENZ 2005].
- Epitrix atropae* FOUDR., 1860: **SH**?(?) [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Minota obesa* (WALT., 1839): **Ba**+(-): Feldberg, Nähe Zastlerthalhütte, ESSER, 3.VI.2000, 2 Ex [NEUMANN mdl. 2001].
- Podagrica fuscicornis* (L., 1767): **Br**+(-) [BARNDT et al. 2002, ESSER 2006a, BARNDT 2008]. **SH**+(-) [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
- Podagrica malvae* (ILL., 1807): **Hn**+(+) [SPRICK et al. 2001].
- Podagrica fuscipes* (F., 1775): **No**+(-) [KOLKEBECK & WAGNER 2007]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2006].
- Mantura obtusata* (GYLL., 1813): **St**+ [SCHOLZE 2007].
- Mantura matthewsi* (STEPH., 1832): **Th**+(-) [APFEL 2003, FRITZLAR 2001].
- Chaetocnema tibialis* (ILL., 1807): **Hs**+ [BRENNER 2007].
- Chaetocnema conducta* (MOTSCH., 1838): **Hs**+: Knüllwald Niederbeisheim, FLÜGEL, 2005 [coll. HÖHNER]. **Sd**+: Königsbruch 30.05.1971, t. DOBERL, von Unbekannt mit Etikett „Fundortwechselung?“ versehen [LILLIG 2006].
- Chaetocnema obesa* (BOIELD., 1859): **Th**- [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Chaetocnema aerea* (LETZN., 1846): **Br**+(-) [EICHLEH et al. 1999, FRITZLAR 2001]. **St**+ [FRITZLAR 2001, FRITZLAR 2003].
- Chaetocnema confusa* (BOHL., 1851): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000].
- Chaetocnema arenacea* (ALL., 1860): **By**+(+): Herkunft der Meldung unklar [SPRICK i.l. 2007].
- Chaetocnema arida* FOUDR., 1860: **Th**+(-) [FRITZLAR 2001]. **WE**+(-) [KRUMMEN 2008b].
- Chaetocnema subcoerulea* (KUTSCH., 1864): **Br**+(-) [ESSER 2005a, BARNDT 2008]. **Th**+(-) [FRITZLAR 2001].
- Chaetocnema procerula* (ROSH., 1856): **By**+(-) [SCHMIDT et al. 2005]. **Th**+ [FRITZLAR 2009].
- Chaetocnema compressa* (LETZN., 1846): **WE**+ [coll. DEI, BELLMANN i.l. 2000].
- Apteropeda splendida* ALL., 1860: **No**+(-) [KÖHLER 2006a].
- Mniophila muscorum* (KOCH, 1803): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000].
- Dibolia schillingii* LETZN., 1846: **Sn**- [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
- Dibolia rugulosa* REDT., 1849: **St**+: Obelbat südl. Hundisburg, BÜCHE 1.VII.1997, Steppenrasen an Südhang, 1 Ex [BÜCHE i.l., ESSER 2001c].
- Dibolia cynoglossi* (KOCH, 1803): **Hs**+(-) [BRENNER 2007]. **St**+ [ESSER 2001c]. **Wt**+(+): die Art ist vorerst zu streichen, da HORION (1951) Wt nicht explizit erwähnt und die neuere Meldung (KONZELMANN 1981) auf einer Fehlbestimmung beruht [KONZELMANN 1981].
- Dibolia occultans* (KOCH, 1803): **Hs**+(-) [BRENNER 2006].
- Dibolia timida* (ILL., 1803): **Sn**+(-) [LORENZ 2005].
- Dibolia cryptocephala* (KOCH, 1803): **Th**+(-) [FRITZLAR 2001].
- Psylliodes luteolus* (MÜLL., 1776): **Hs**+: Rodenbach 1978, Hanau Umgebung 1979, Gründau Breitenborn 1979, Bad Nauheim Wisselsheim, jew. HÖHNER 1985 [coll. HÖHNER]. **Th**+(+) [FRITZLAR 2001]. **WE**+ [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Psylliodes picinus* (MARSH., 1802): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Psylliodes attenuatus* (KOCH, 1803): **Br**+ [HEINIG & HIELSCHER 2009].
- Psylliodes chrysocephalus* (L., 1758): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Psylliodes laticollis* KUTSCH., 1864: **WE**+ [KRUMMEN 2008a].

- Psylliodes sophiae* HKTR., 1914: **MV+** [ZIEGLER 2006a]. **WE+** [KRUMMEN 2008b].
- Psylliodes thlaspiis* FOU DR., 1860: **Th+(-)** [FRITZLAR 2001]. **Wt(+)**: kein Beleg in der Sammlung ULBRICH (t. WOLF-SCHWENNINGER), die Art ist daher zu streichen [KONZELMANN i.l. 2001].
- Psylliodes toelgi* HKTR., 1914: **By+(-)** [FRITZLAR 2009]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008, FRITZLAR 2009].
- Psylliodes cupreus* (KOCH, 1803): **Sd(+)** [EISINGER 2006a].
- Psylliodes isatidis* HKTR., 1912: **Pf+** [KÖHLER Gund].
- Psylliodes cupreatus* (DUFT., 1825): **WE/** [WIEPKEN 1883 falsch, BELLMANN i.l. 2000].
- Psylliodes instabilis* FOU DR., 1860: **Ba+** [RENNER 2005b].
- Psylliodes aereus* FOU DR., 1860: **Th-** [KOPETZ & WEIGEL 2000, FRITZLAR 2001].
- Psylliodes cucullatus* (ILL., 1807): **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000].
- Psylliodes reitteri* WEISE, 1888: **St+** [FRITZLAR 2001, JUNG 2007]. **Th+** [KOPETZ et al. 2008, FRITZLAR 2009].
- Pilemostoma fastuosa* (SCHALL., 1783): **Br+(-)** [BARNDT 2010].
- Hypocassida subferruginea* (SCHR., 1776): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+** [BRÜGGE-MANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Cassida hemisphaerica* HBST., 1799: **St+** [BASE 2007].
- Cassida canaliculata* LAICH., 1781: **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b].
- Cassida bergeali* BORDY, 1995: **Ba+** [BÜCHE 2003]. **Th+** [FRITZLAR 2001].
- Cassida leucanthemi* BORDY, 1995: **Br+** [FRITZLAR 2009]. **By+** [FRITZLAR 2009]. **No-** [FRITZLAR 2009]. **Th+** [FRITZLAR 2009]. **Wt-** [FRITZLAR 2009].
- Cassida panzeri* WEISE, 1907: **Sn(-)**: aktuelle Meldung bei KLAUSNITZER et al. (2009) zu streichen, Statusänderung nach JORDAN (1960) mit Nachweise 1934 [HORNIG i.l. 2011]. **WE?** [BRÜGGE-MANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Cassida rufovirens* SUFFR., 1844: **Sn+** [LORENZ 2005]. **WE+** [coll. DEI, BELLMANN i.l. 2000].
- Cassida sanguinolenta* MÜLL., 1776: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2005, KOCH 2006]. **MV+(-)** [KÖHLER 2003a, ZIEGLER 2006a].
- Cassida prasina* ILL., 1798: **Hs+(-)** [BRENNER 2007]. **Sd-** [EISINGER 2001].
- Cassida nobilis* L., 1758: **Sd+** [EISINGER 2006a].

Familie BRUCHIDAE

- Spermophagus sericeus* (GEOFFR., 1785): **SH(+)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Spermophagus kuesteri* SCHILSKY, 1905: **Hs+**: Wetlar, WEINREICH, 1963 [coll. HÖHNER].
- Spermophagus calystegiae* LUKI.TER-MIN., 1957: **MV+**: Rüterberg bei Dömitz, ZIEGLER, 26.VI.1999 [ZIEGLER i.l. 2011]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Bruchus rufimanus* BOH., 1833: **MV+(-)** [KÖHLER Bohn].
- Bruchus affinis* FRÖL., 1799: **MV+** [ESSER 2002b, ZIEGLER 2006a].
- Bruchus pisorum* (L., 1758): **Ba+** [KOSTENBADER & TRAUTNER 2008]. **St+(-)** [KNOBBE 2008].
- Bruchus ervi* FRÖL., 1799: **Ba+** [KOSTENBADER & TRAUTNER 2008]. **Noi(+)** [KOCH 1968]. **Rhi(+)** [KOCH 1968]. **Sni(+)**: nur importiert, betrifft wahrscheinlich alle Regionen [WENDT 1986]. **Sti(+)** [WENDT 1986]. **Th(+)**: Irrtümliche Meldung, kein Beleg in coll. WEIGEL [SPRICK i.l.]. **Wt(+)**: die Art muss im Status zurückgestuft werden, da der Beleg vor 1950 gefunden wurde [coll. MUS.STUTTGART, KONZELMANN i.l. 2001].
- Bruchus lentis* FRÖL., 1799: **Hsi**: Wiesbaden, Umgebung, H. MÜLLER, 1922 [coll. HÖHNER]. **Noi(+)** [KOCH 1968]. **Rhi(+)** [KOCH 1968]. **Sdi** [EISINGER 2001]. **Sni(+)** [WENDT 1986]. **WEi** [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Bruchus brachialis* FAHR., 1839: **MV+**: Kühnlenhagen, RINGEL, 2006 [RINGEL i.l. 2011]. **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **St+**: Haldensleben, BÜCHE 22.V.2000, mehrere Ex gekeschert von *Vicia villosa* auf einer Brachfläche [JUNG 2001, BÜCHE i.l.]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004].
- Bruchus rufipes* HBST., 1783: **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Bruchus luteicornis* ILL., 1794: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+(-)** [DREES 2002b, KÖHLER Länd].
- Bruchidius marginalis* (F., 1777): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Pf+** [KÖHLER 2004a].
- Bruchidius cisti* (F., 1775): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Bruchidius nanus* (GERM., 1824): **Ba(+)**: Beleg ist *Bruchidius villosus* ANTON det. (coll. Mus. Dresden) [SPRICK i.l.]. **Hs(+)**: kein Beleg [SPRICK i.l.]. **Pf?**(+): Beleg müsste geprüft werden [SPRICK

- i.l.]. **Th(-)**: kein Beleg [SPRICK i.l.]. **Wf?**: REHAGE & TERLUTTER 2003, Beleg müsste geprüft werden [SPRICK i.l.]. **Wt?**(+): Beleg müsste geprüft werden - die Wirtspflanzen *Medicago orbicularis* und *disciformis* kommen in Deutschland nicht vor [SPRICK i.l.].
- Bruchidius imbricornis* (PANZ., 1795): **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010]. **By+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **No+** [HÖRREN in Vorber.].
- Bruchidius varius* (OL., 1795): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009, PESCHEL i.l. 2007]. **WE+** [BELLMANN et al. 2003].
- Bruchidius lividimanus* (GYLL., 1833): **Sn+** [PESCHEL i.l. 2007].
- Bruchidius seminarius* (L., 1767): **By+** [SCHMIDT et al. 2005].
- Callosobruchus maculatus* (FABR., 1775): **Bri** [ESSER 2010].
- Acanthoscelides obtectus* (SAY, 1831): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **WE+(i)** [ESSER 2001d].
- Acanthoscelides pallidipennis* (MOTSCH., 1874): **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Bruchidius tonkineus* (PIC, 1904): **Bri**: Chemnitz, 1980, 2 Ex. (DECELLE det.) in einem Hotelzimmer in trockenen Samen einer *Phaseolus*-Art aus Vietnam [WENDT 1980].

Familie URODONIDAE

- Urodon suturalis* (F., 1792): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Urodon conformis* SUFFR., 1845: **Hs+(-)** [BRENNER 2001]. **WE(+)** [Fehlbestimmung, BELLMANN i.l. 2000].

Familie ANTHRIBIDAE

- Tropideres albostris* (HBST., 1783): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+(-)** [KÖHLER Rüte]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Allandrus undulatus* (PANZ., 1795): **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Enebreutes sepicola* (F., 1792): **St+(-)** [JUNG 2007, ZIEGLER 2006b].
- Rhaphitropis marchicus* (HBST., 1797): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005].
- Rhaphitropis oxyacanthae* (BRIS., 1863): **Hs+** [FLECHTNER 2003b]. **Pf+** [BRECHTEL i.l. 1999].
- Dissoleucas niveostris* (F., 1798): **WE+(-)** [BELLMANN & ESSER 2006].
- Brachytarsus fasciatus* (FORST., 1771): **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000]. **Wt(+)**: die Art ist vorerst zu streichen, da die angegebenen Quellen die Art nicht für Wt erwähnen (HORION 1951) oder eine Falschmeldung beinhalten (BRETZENDORFER 1986) [KONZELMANN i.l. 2001].
- Araecerus fasciculatus* (DEG., 1775): **Hsi**: Darmstadt, HEIDENREICH, 1956 [coll. HÖHNER]. **Noi** [GEILENKEUSER 1896]. **WEi** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
- Choragus horni* WOLFR., 1930: **MV+** [GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **No(+)**: alle nordrheinischen Belege gehören zu *Choragus sheppardi* [BRAUNERT det.] [BRAUNERT i.l. 2010]. **WE/**: alle Belege gehören zu *Choragus sheppardi* [BELLMANN i.l. 2011]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Choragus sheppardi* KIRBY, 1818: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2005]. **MV+(-)** [GÜRLICH 2005a, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **St+(-)** [DIETZE 2005].
- Pseudochoragus piceus* (SCHAUM, 1845): **By+** [BUSSLER & FUCHS 2006].

Familie SCOLYTIDAE

- Scolytus mali* (BECHST., 1805): **MV+(-)** [BÜCHE & ESSER 1999].
- Scolytus carpini* (RATZ., 1837): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **SH+** [ZIEGLER 2006c].
- Scolytus laevis* CHAP., 1873: **Ba+** [SCHUNGER 2001].
- Scolytus pygmaeus* (F., 1787): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b]. **MV+** [ZIEGLER 2006a, BÜCHE & ESSER 1999, KÖHLER Rüte].
- Scolytus scolytus* (F., 1775): **MV+(-)** [ZIEGLER 2006a].
- Scolytus ensifer* EICHH., 1881: **MV+** [GÜRLICH Cono].
- Phthorophloeus spinulosus* REY, 1883: **No+(-)** [JUNKER & KÖHLE 2005].
- Phloeophthorus rhododactylus* (MARSH., 1802): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **St+(-)** [JUNG 2001].
- Hylastes linearis* Er., 1836: **No+(-)** [BAUMANN 2007]. **Pf+(-)** [ARK Bienwald].
- Hylastes attenuatus* Er., 1836: **MV+(-)** [KÖHLER Rüte, RINGEL i.l. 2011]. **St+(-)** [SCHOLZE 2007].
- Hylastes angustatus* (HBST., 1793): **Rh+(-)** [KÖHLER 2006a].
- Hylurgops glabratus* (ZETT., 1828): **WE-** [RÖBEN 1908, BELLMANN i.l. 2000].
- Tomicus minor* (HARTIG, 1834): **MV+(-)** [RINGEL i.l. 2011]. **St+(-)** [BASE 2006a].
- Dendroctonus micans* (KUG., 1794): **St+(-)** [SCHOLZE 2007].

- Carphoborus minimus* (F., 1801): **Ba*** [GEBHARD 2003a]. **Pf**+(-) [GEBHARD 2003a].
- Polygraphus grandiclavus* THOMS., 1886: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Ne**+ [ZIEGLER 2004]. **We**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
- Polygraphus subopacus* THOMS., 1871: **By**+(-) [GOSSNER et al. 2008].
- Hylesinus crenatus* (F., 1787): **By**+(-) [GOSSNER et al. 2008, HERBIG in Vorber.]. **We**+(-): Borkum, Ostland, BÜCHE, 27.VII.1999, Fraßbilder und tote Imagines in alter Esche [BÜCHE i.l., BELLMANN & MENKE 2005].
- Hylesinus oleiperda* (F., 1792): **MV**+ [KÖHLER Bohn]. **St**+(-) [JUNG 2007b].
- Leperisus orni* (FUCHS, 1906): **Hs**+ [HOFMANN i.l. 2010]. **MV**+ [ZIEGLER 2006a]. **St**+ [JUNG 2007b]. **We**+ [BELLMANN & MAUS 2007].
- Hylastinus obscurus* (MARSH., 1802): **Ne**+(-) [coll. KÖHLER].
- Kissopagus hederæ* (SCHMITT, 1843): **We**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
- Phloeosinus thujæ* (PERRIS, 1855): **St**+ [JUNG 2007b].
- Phloeosinus aubei* (PERRIS, 1855): **Br**+ [ESSER 2005a, SOBCEZYK & LEHMANN 2007]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+ [SOBCEZYK & LEHMANN 2007]. **St**+ Halberstadt, JUNG, VII-XI.2006, 16 Ex. e.l. [JUNG i.l. 2006]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008, RENNER 2009a]. **Wt**+ [BRETZENDORF 2010a].
- Liparthrum bartschi* MOHL, 1891: **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Crypturgus cinereus* (Hbst., 1793): **SH**+ [MEYBOHM 2005].
- Crypturgus subcristosus* EGGERS, 1933: **Ne**+ [MEYBOHM 2005]. **SH**+ [MEYBOHM 2005].
- Crypturgus hispidulus* THOMS., 1870: **St**+ [JUNG 2001].
- Lymantora coryli* (PERRIS, 1855): **MV**+(-) [ZIEGLER 2006a]. **Rh**+(-) [RINK 2002]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009]. **St**+(-) [ZIEGLER 2006b]. **We**+ [BELLMANN & MENKE 2005].
- Lymantora aceris* LINDEM., 1875: **MV**+ [KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a].
- Xylocleptes bispinus* (DUFT., 1825): **MV**+ [BÜCHE & ESSER 1999]. **SH**+(-) [GÜRLICH et al. i.V.]. **We**+ [BELLMANN et al. 2003].
- Thamnurgus kaltenbachii* (NACH, 1849): **Wt**+ [REIBNITZ 2009].
- Dryocoetes alni* (GEORG, 1856): **We**+(-) [MENKE in Vorber.].
- Coccotrypes dactyliperda* (F., 1801): **Hsi** [BATHON 2007]. **Thi** [KOPETZ et al. 2004]. **Wei** [coll. SCHILSKY, BELLMANN i.l. 2000].
- Trypophloeus granulatus* (RATZ., 1837): **St**+ [JUNG 2001].
- Trypophloeus rybinskii* RTT., 1894: **Ba**+ [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Trypophloeus asperatus* (GYLL., 1813): **By**+(-) [SCHMIDL & BUSSLER 2004, BUSSLER et al. in Vorber.]. **MV**+ [ESSER 2002b, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a].
- Cryphalus piceae* (RATZ., 1837): **By**+(-) [GOSSNER et al. 2008]. **Sn**+(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Cryphalus intermedius* FERR., 1867: **Ne**+ [ZIEGLER 2006d]. **Sn**+ Strahwalder Anhöhen, Sieber, 9.V.1998, 1 Ex. (LIEBENOW det.) im Autokescher - neu für Deutschland [Sieber 1999b]. **St**+ [BÄSE 2006a, JUNG 2007].
- Ernoporus caucasicus* LINDEM., 1876: **Hs**+ [FLECHTNER 2003b]. **MV**+ [WEIGEL & WOLF 2000]. **Ne**+(-) [KÖHLER & KÖHLER 2009b]. **St**+(-) [BÄSE 2006a, JUNG 2007]. **We**+ [BELLMANN & MENKE 2005]. **Wf**+ [RENNER 1999c].
- Ernoporus tiliae* (PANZ., 1793): **Hn**+ [BORCHERDING 1994]. **St**+(-) [BÄSE 2006a, JUNG 2007]. **We**+ [BELLMANN & ESSER 2006].
- Pityophthorus pityographus* (RATZ., 1837): **MV**+(-) [RINGEL & HAMPEL 2003]. **St**+(-) [ZIEGLER 2006b]. **We**+(-) [BELLMANN i.l. 2000]. **Wf**+(-) [coll. GRUNWALD].
- Pityophthorus micrographus* (L., 1758): **Sn**+(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Pityophthorus pubescens* (MARSH., 1802): **MV**+(-) [KÖHLER Bohn, RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, KÖHLER Rüte]. **Sn**+ [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St**+ [BÄSE 2006a, DIETZE 2005, JUNG 2007]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008]. **We**+(-) [BELLMANN & MENKE 2005].
- Pityophthorus lichtensteini* (RATZ., 1837): **MV**+(-) [RINGEL & HAMPEL 2003, KÖHLER Rüte].
- Pityophthorus carnolicus* WICHM., 1910: **Sn**+ [SIEBER et al. 2011].
- Pityophthorus glabratus* EICHII., 1879: **St**+(-) [BÄSE 2006a, JUNG 2007].
- Gnathotrypes materiarius* (FITCH, 1855): **Br**+ [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **MV**+ [KÖHLER Rüte]. **Sn**+ [LORENZ 2005]. **St**+ [BÄSE 2006a]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008]. **We**+ [BELLMANN et al. in Vorber.].
- Taphrorychus bicolor* (Hbst., 1793): **Sn**+(-) [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Taphrorychus villifrons* (DUF., 1843): **By**+ [BUSSLER & FUCHS 2006, HERBIG in Vorber.]. **No**+ [GEBHARDT 2003b, KÖHLER NWZ9]. **Pf**+ [GEBHARDT 2003b]. **Rh**+ [KÖHLER & WAGNER 2010]. **Wt**+ [GEBHARDT 2003b].
- Pityogenes trepanatus* (NÖRDL., 1848): **MV**+ [RINGEL & HAMPEL 2003]. **We**+ [BELLMANN & ESSER 2010]. **Sn**+(-) [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Pityogenes irkutensis* EGGERS, 1910: **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].
- Pityogenes conjunctus* (RTT., 1887): **By**+ [BUSSLER et al. in Vorber.]. **Sn**+ [REIKE & SOBCEZYK 2007].
- Pityogenes quadridens* (HARTIG, 1834): **St**+(-) [BÄSE 2006a, JUNG 2007].
- Orthotomicus suturalis* (GYLL., 1827): **St**+(-) [BÄSE 2006a].
- Orthotomicus proximus* (EICHH., 1867): **Pf**+ [ARK Bienwald]. **We**+(-) [BELLMANN i.l. 2000].
- Orthotomicus longicollis* (GYLL., 1827): **Br**+ [EICHLER et al. 1999]. **MV**+ [BENSE i.l. 2009].
- Ips acuminatus* (GYLL., 1827): **MV**+ [RINGEL & HAMPEL 2003].
- Ips amitinus* (EICHH., 1871): **Br**+ [ESSER 2005a]. **We**+ [BELLMANN & ESSER 2010].
- Ips sexdentatus* (BOERNER, 1767): **Rh**+(-) [HADULLA in Vorber.]. **We**+(-) [BELLMANN & ESSER 2010].
- Xyleborus cryptographus* (RATZ., 1837): **Hs**+ Alsfeld, EGGERS, 1907 - Viernheimer Heide Autokescher, BÖHME, 1976 [coll. HÖHNER, BATHON 1982]. **St**+(-) [BÄSE 2006a, ZIEGLER 2006b]. **Th**+(-) [RENNER i.l. 2007]. **Wf**+ [BORCHERDING 1994].
- Xyleborus monographus* (F., 1792): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Xyleborus pfeili* (RATZ., 1837): **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Xyleborus dryographus* (RATZ., 1837): **MV**+(-) [KÖHLER Rüte]. **Sn**+(-) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **We**+(-) [BELLMANN i.l. 2000].
- Xyleborus germanus* (BLANDF., 1894): **Br**+ [DREGER et al. 2002, ESSER & SCHNEIDER 2002]. **MV**+ [KÖHLER Bohn, GÜRLICH Cono, GÜRLICH User]. **Ne**+ [GÜRLICH 2005b]. **SH**+ Hamburg Wohldorfer Wald, GÜRLICH, 18.V.-I.VI.1999, 2 Ex. in einer Bodenfalle [TOLASCH i.l.2001, GÜRLICH 2005b]. **Sn**+ [WEIGEL 2005]. **St**+ [JUNG i.l. 2006, BÄSE 2006a]. **Th**+ [APPEL 2003, RENNER i.l. 2007, KOPETZ et al. 2004].
- Xyleborus alni* NIJIMA, 1909: **Ba**+ [GEBHARD 2002, BENSE 2006b, BENSE 2009]. **By**+ Ingolstadt, Zuchering, WEICHELBAUMER, 11. IV.98, 2 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME, WEICHELBAUMER 2003b, GOSSNER 2004, GOSSNER et al. 2008, HERBIG in Vorber.]. **MV**+ [GÜRLICH 2005a]. **St**+ [BÄSE 2006a]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Cyclorhipidion bodoanus* (RTT., 1913): Sibirische Art; der Name tritt für *Xyleborus peregrinus* ein, dessen Typus sich als aberanter *X. savexeni* erwies (BUSSLER 2006). **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Hs**+ [SCHAFFRATH 2001, BRENNER 2001]. **MV**+ [KÖHLER Rüte]. **Ne**+ [ZIEGLER 2004]. **SH**+ [ZIEGLER 2004]. **Sn**+ [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St**+ Sargstedt, Huy, JUNG, 9.V.2011, 1 Ex. unter Eichenrinde [coll. JUNG]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].
- Xyloterus signatus* (F., 1787): **MV**+ [KÖHLER 2003a, RINGEL & HAMPEL 2003, ZIEGLER 2006a, GÜRLICH User]. **St**+(-) [BÄSE 2006a, DIETZE & SCHORNACK 1999].

Familie PLATYPODIDAE

Platypus cylindrus (F., 1792): **MV**+(-) [GÜRLICH 2005a, KÖHLER Bohn, ZIEGLER 2006a, MÖLLER 2003, GÜRLICH Cono, KÖHLER Rüte]. **SH**+ [ZIEGLER 2006c]. **Sn**+ [BENSE 1998, KLAUSNITZER et al. 2009].

Familie NEMONYCHIDAE

Nemonyx lepturoides (F., 1801): **Wf**/(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].

Familie RHYNCHITIDAE

Lasiorhynchites olivaceus (GYLL., 1833): **We**+ [BELLMANN & ESSER 2006].

Caenorhinus interpunctatus (STEPH., 1831): **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **We**+(-) [BELLMANN & ESSER 2010].

Rhynchites pubescens (F., 1775): **Wf**/(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].

Rhynchites caeruleus (DEGEER, 1775): **Br**+(-) [EICHLER et al. 1999]. **We**+ [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].

Rhynchites cupreus (L., 1758): **Br**+(-) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.].

Rhynchites bacchus (L., 1758): **MV**+(-) [RINGEL i.l. 2011].
Deporaus tristis (F., 1794): **Hn**+(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **WE**+
 [coll. LOMPE, BELLMANN i.l.].

Familie ATTELABIDAE

Apoderus coryli (L., 1758): **Sd**+ [EISINGER 2006a, LILLIG 2006].
Apoderus erythropterus (Gm., 1790): **Ba**/(+) [SPRICK i.l. 2007].

Familie APIONIDAE

Omphalopapilion laevigatum (PAYK., 1792): **Hs**+(-) [BRENNER 2009].
Not+(-) [STUMPF 1990].
Ceratopion penetrans (GERM., 1817): **Hn**/(+) [SCHMIDT et al. 2005].
Ceratopion basicorne (ILL., 1807): **MV**+ [RINGEL 2002, RINGEL et al. 2007].
Ceratopion carduorum (KIRBY, 1808): **By**+ [SPRICK & SCHMID 2004]. **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000, BORCHERDING 1994]. **SH**+ [MEYBOHM 2006]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2004]. **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Ceratopion armatum (GERST., 1854): **MV**+ [GÜRLICH 2005a]. **Wf**/(+): die Art ist zu streichen, da die Meldung auf einem Datenerfassungsfehler beruhte [KONZELMANN i.l. 2001].
Ceratopion austriacum (WAGN., 1904): **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000].
Diaplacion confluens (KIRBY, 1808): **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Sd**+ [EISINGER 2006b].
Diaplacion detritum (MULS. & REY, 1859): **By**+ [SPRICK & SCHMID 2004].
Taphrotopium sulcifrons (HBST., 1797): **Ne**+ [MEYBOHM 2006]. **Wf**/(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Aspidapion validum (GERM., 1817): **Ba**+ [GUTKNECHT 2006]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **Sn**+(-) [SIEBER et al. 2011].
Aspidapion aeneum (F., 1775): **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Alocentron curvirostre (GYLL., 1833): **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wt**+ [REIBNITZ 2005].
Squamapion elongatum (GERM., 1817): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001].
Squamapion vicinum (KIRBY, 1808): **Hn**+(-) [SCHMIDT et al. 2000].
Squamapion oblivium (SCHILSKY, 1902): **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009].
Kalcapion semivittatum (GYLL., 1833): **St**+ [BÄSE & SCHOLZE i.l. 2009, JUNG 2010].
Taenipapion urticarium (HBST., 1784): **WE**+(-) [BELLMANN & MAUS 2007].
Pseudapion rufirostre (F., 1775): **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Malvapion malvae (F., 1775): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
Rhopalapion longirostre (OL., 1807): **Br**+ [WINKELMANN & BAYER 2004]. **By**+ [HOFMANN & KÖHLER 2010, GERSTMEIER 2000]. **Rh**+ [KÖHLER & WAGNER 2010]. **Sn**+ [KLAUSNITZER et al. 2009, WAGNER i.l. 2007]. **St**+ [BASE 2010b]. **WE**+ [BELLMANN 2001]. **Wf**+: Bochum-Langendreier, FRIESE, 10.VI.2011 (Fotobeleg, t. KÖHLER) [FRIESE i.l. 2011]. **Wt**+ [REIBNITZ 2001, FLUNDT 2005].
Trichopterapion holosericeum (GYLL., 1833): **Ba**+ [RHEINHEIMER 2009].
Isapion variegatum (WENCK., 1864): **Br**+(-) [WINKELMANN & BAYER 2004]. **Hs**+(-) [REIBNITZ 2001]. **Sn**+ [SIEBER et al. 2011].
Exapion difficile (HBST., 1797): **WE**+ [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Exapion corniculatum (GERM., 1817): **Wt**+(-) [FRANK & KONZELMANN 2002].
Exapion ulicis (FORST., 1771): **WE**? [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Pseudoprotapion elegantulum (GERM., 1818): **Wf**/(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Pseudoprotapion astragali (PAYK., 1800): **No**+(-) [KÖHLER 2006a]. **Pf**+: Dexheim, Steinbruch, SKALE, 25.IV.2002 [SKALE i.l. 2002]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **WE**+ [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
Protapion gracilipes (DIETR., 1857): **Sn**+ [LORENZ 2005].
Protapion interjectum (DESBR., 1895): **MV**+(-) [KÖHLER Rüte]. **WE**+ [BELLMANN et al. in Vorber.].
Protapion varipes (GERM., 1817): **Pf**+(-) [KÖHLER Bien]. **Wf**?(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Protapion dissimile (GERM., 1817): **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006, RENNER 2004].
Protapion difforme (GERM., 1818): **Pf**+ [ARK Bienwald].
Pseudoperapion brevisrostre (HBST., 1797): **WE**+ [coll. BELLMANN].
Pseudostenapion simum (GERM., 1817): **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006, KÖHLER Sieg].
Aizobius sedi (GERM., 1818): **WE**+ [KRUMMEN 2008a].

Perapion affine (KIRBY, 1808): **Hn**+(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **Sd**+ [EISINGER 2001].
Apion rubiginosum GRILL, 1893: **No**+(-) [STÜBEN 1997].
Stenopterapion tenue (KIRBY, 1808): **Sn**+(-) [LORENZ 2005].
Ischnopterapion modestum (GERM., 1817): **Wt**+ [FRANK & KONZELMANN 2002].
Synapion ebeninum (KIRBY, 1808): **Br**+(-) [EICHLEH et al. 1999].
Holotrichapion pisi (F., 1801): **WE**+(-) [KRUMMEN 2008b].
Hemitrichapion waltoni (STEPH., 1839): **Hs**+ [BRENNER 2006].
Hemitrichapion lanigerum (GEMM., 1871): **Rh**+ [KÖHLER 2006a].
Hemitrichapion pavidum (GERM., 1817): **WE**+ [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
Mesotrichapion punctirostre (GYLL., 1839): **By**+ [SPRICK & SCHMID 2004].
Cyanapion platealea (GERM., 1817): **Hn**+(-) [SCHMIDT et al. 2000]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **Wf**/(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Cyanapion afer (GYLL., 1833): **Br**+ [WINKELMANN & BAYER 2004]. **Sd**+ [EISINGER 2006a].
Cyanapion gyllenhalii KIRBY, 1808: **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Oxystoma opeticum (BACH, 1854): **Hn**+(-) [SCHMIDT et al. 2005].
Oryxolaemus flavifemoratus (HBST., 1797): **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Eutrichapion melancholicum (WENCK., 1864): **Hs**+: Wetzlar Magdalenenhausen, FLECHTNER, 1999 [coll. FLECHTNER im SMF].
Eutrichapion vorax (HBST., 1797): **WE**+(-) [BELLMANN i.l. 2000].
Eutrichapion punctigerum (PAYK., 1792): **WE**+ [KRUMMEN 2008b, BELLMANN et al. in Vorber.].
Eutrichapion facetum (GYLL., 1839): **Hs**+(-) [BRENNER 2001].
Nanophyes brevis BOH., 1845: **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **Wt**+ [coll. REISSMANN].
Nanophyes globulus (GERM., 1821): **Br**+ [WINKELMANN & BAYER 2004]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **Sn**+(-) [LORENZ 2005]. **Wf**+(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
Nanomimus circumscriptus (AUBÉ, 1864): **Hs**+ [BRENNER 2006]. **Sn**+(-) [SIEBER et al. 2011].
Microon sahlbergi (SAHLB., 1834): **No**+ [coll. KÖHLER].

Familie CURCULIONIDAE

Otiorhynchus chrysocoomus GERM., 1824: **Byv**+(-): nur in den Zentralalpen, kein Beleg aus Bayern bekannt, früher allenfalls verschleppt [SPRICK i.l. 2009].
Otiorhynchus dieckmanni MAGN., 1979: **WE**+ [SPRICK 2009]. **Wf**+ [SPRICK 2009].
Otiorhynchus gemiculus (GERM., 1817): **No**+ [HADULLA 2003].
Otiorhynchus salicicola HEYD., 1908: **Ba**+ [coll. ESSER, SPRICK 2009]. **Br**+: Fahrland, ZWÖLFE, VII.2008, ein Pärchen in einem Garten (Fotobeleg, KÖHLER det.) [KÖHLER i.l., SPRICK 2009]. **By**+: München-Neuperlach, IX.2007 (Fotobeleg, KÖHLER det.) [KÖHLER i.l., SPRICK 2009]. **Not**+: in den Niederlanden eingebürgert und in Gärtnereien schädlich [KÖHLER 2006a]. **Pf**+: Flonheim, GOEBEL-BERGOLD, 22.VI.2010, 1 Ex. auf der Hauste-rasse (Fotobeleg, KÖHLER det.) [KÖHLER i.l.]. **Rh**+ [coll. ESSER]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V., SPRICK 2009]. **Wt**+ [SPRICK 2009].
Otiorhynchus armadillo (ROSSI, 1792): **St**+ [SCHOLZE 2007].
Otiorhynchus aurifer (BOH., 1843): **Wt**+ [SPRICK 2009].
Otiorhynchus meridionalis GYLL., 1834: **Ba**+ [MAUS 1998b]. **Ne**+ [HERRMANN 1999]. **Wt**+ [SPRICK 2009].
Otiorhynchus fuscipes (OL., 1807): **No**+ [STUMPF 1990].
Otiorhynchus ludunensis BOH., 1843: **St**+(-) [JUNG 2007]. **WE**+ [SPRICK 2009].
Otiorhynchus laevigatus (F., 1792): **MV**+v) [ZIEGLER 2006a]. **Pf**+ [KÖHLER & KÖHLER 2009b].
Otiorhynchus morio (F., 1781): **St**+v) [SCHOLZE 2007].
Otiorhynchus arcticus (O.F., 1780): **By**?(-): Vorkommen im gesamten Alpengebiet fraglich [SPRICK i.l. 2009].
Otiorhynchus nocturnus RTT., 1913: **By**+(-): kein Beleg, Fundort zweifelhaft [SPRICK i.l. 2007].
Otiorhynchus scaber (L., 1758): **Br**+ [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2004]. **Sd**+ [LILLIG 2006].
Otiorhynchus punctifrons STIERL., 1888: **No**/ [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
Otiorhynchus austriacus (F., 1801): **Wt**+ [KONZELMANN 2010].
Otiorhynchus lepidopterus (F., 1794): **Br**+ [ESSER 2010].
Otiorhynchus eremicola ROSH., 1847: **By**?(+): Beleg in coll. BÖHME war *O. auricoma* (KIPPENBERG det.), pauschale Angabe von FRIESER (1981) fraglich [SPRICK i.l. 2009].

- Otiorhynchus corruptor* (HOST, 1789): **Bri** [EICHLER et al. 2002].
No!: Bonn-Endenich, Stadtgebiet, Forst, 25.IX.1993, 1 Ex. (SPRICK det.) [KÖHLER 2006a].
- Otiorhynchus rugosus* HUMMEL, 1827: **No!** [WENZEL 2006, sicher Fehlbestimmung].
- Otiorhynchus smreczynskii* CMOL., 1968: **Hs+**: Seeheim-Jugenheim, LANGE, 2008 [coll. LANGE]. **WE+** [ESSER 1999, FUHRMANN 2001].
Wt+: Heilbronn, SCHRAMMEYER, 13.VII.2003 an einer Ligusterhecke [MAUS i.l.].
- Otiorhynchus crataegi* GERM., 1824: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **No+** [GERMANN et al. 2005, KÖLKEBECK 2010]. **SH+** [SPRICK 2009]. **Sn+** [SIEBER et al. 2011]. **St+** [coll. SCHOLZE]. **WE+** [SPRICK 2009].
- Otiorhynchus fullo* (SCHRK., 1781): **Br+(-)** [ESSER 2008a].
- Simo variegatus* (BOH., 1843): **Hs+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Caenopsis waltoni* (BOH., 1843): **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Peritelus leucogrammus* GERM., 1824: **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Peritelus sphaeroides* GERM., 1824: **SH+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Phyllobius sinuatus* (F., 1801): **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDL 2005].
- Phyllobius roboretanus* GRELL., 1882: **Br+** [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Phyllobius arborator* (HBST., 1797): **St+** [coll. SCHOLZE].
- Parascythopus exulans* HEIJERMAGNANO, 2000: **Hn+** [SPRICK 2009]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE+** [SPRICK 2009].
- Omas rotundatum* (F., 1792): **Br+(-)** [ESSER 2005a].
- Omiatima mollina* (BOH., 1834): **By+(-)** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Omiatima concinna* (BOH., 1834): **Hs-**: Hanau Umgebung, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER].
- Trachyploeus spinimanus* GERM., 1824: **Wf/(+)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Polydrusus impar* GOZ., 1882: **Br+** [WINKELMANN & BAYER 2004, BARNOT 2008]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Polydrusus marginatus* STEPH., 1831: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [GÜRLICH Cono]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Polydrusus corruscus* GERM., 1824: **MV+** [ZIEGLER 2006a].
- Polydrusus flavipes* (DEGEER, 1775): **Wf?(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Polydrusus impressifrons* GYLL., 1834: **Ne+** [ZIEGLER 2004]. **WE+** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2007].
- Polydrusus mustus* GERM., 1824: **Ba+** [SPRICK i.l., BENISCH i.l.].
- Polydrusus ruficornis* (BONSD., 1785): **Hn?** [SPRICK et al. 2001].
- Polydrusus picus* (F., 1792): **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Polydrusus sparsus* GYLL., 1834: **Pf+** [ARK Bienwald, RENNER 2011, BENISCH in Vorb.].
- Scythopus mustela* (HBST., 1797): **Br+** [DREGER et al. 2009, ESSER 2006a].
- Pachyrhinus lethierryi* DESBR., 1875: **Ba+** [RHEINHEIMER 2003]. **Hn+** [SPRICK 2009]. **No+** [GERMANN et al. 2005]. **Pf+** [RHEINHEIMER 2003]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **St+**: Landsberg bei Halle, STROBL, V.2005, 1 Ex. (BEHNE det.) [SCHOLZE 2007]. **WE+** [SPRICK 2009]. **Wf+** [SPRICK 2009]. **Wt+**: Herrenberg, WILL, VI.2007 (Fotobeleag, KÖHLER det.) [www.fotocommunity.de].
- Sciaphobus rubi* (GYLL., 1813): **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDL 2004].
- Sciaphobus scitulus* (GERM., 1824): **Wt/(-)**: kein Beleg in der coll. ULBRICH (t. WOLF-SCHWENNINGER), die Art ist daher zu streichen [KONZELMANN i.l. 2001, HORION 1951].
- Eusomus ovulum* GERM., 1824: **Wf?(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Brachysomus setiger* (GYLL., 1840): **Wf/(+)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Brachysomus hirtus* (BOH., 1845): **St+(-)** [JUNG 2007].
- Brachysomus echinatus* (BONSD., 1785): **WE+(-)** [FUHRMANN 2001].
- Foucartia squamulata* (HBST., 1795): **MV+** [WEIGEL & WOLF 2000].
- Foucartia ptochoides* (BACI, 1856): **Wt+(-)**: die Art ist im Status zurückzunehmen, da der einzige Beleg vor 1950 gefunden wurde [coll. Mus. STUTTGART, KONZELMANN i.l. 2001].
- Barypeithes tenex* (BOH., 1843): **Ba+(-)**: die Art ist im Status zurückzunehmen, da der einzige neuere Beleg aus der coll. KNAPP fehlbestimmt ist [HORION 1951, KONZELMANN i.l. 2001].
- Barypeithes chevrolati* (BOH., 1843): **By/(+)**: HILT 1992 ist sicher fehlhet. [SPRICK i.l. 2007].
- Barypeithes trichopterus* (GAUT., 1863): **MV+(-)** [RINGEL & MÜLLER-MOTZFELD 2002]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE+** [coll. SPRICK].
- Barypeithes mollicornis* (AIR., 1812): **Ba+** [KNAPP & RHEINHEIMER 2010]. **Hs+(-)** [BRENNER 2006].
- Barypeithes maritimus* FORM., 1904: **Ba+** [SZALLIES & AUSMEIER 2001b].
- Brachyderes lusitanicus* F.: **By!** [SPRICK & SCHMIDL 2005].
- Strophosoma fulvicorne* WALT., 1846: **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005].
- Strophosoma sus* STEPH., 1831: **By?/+)** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **MV+** [ZIEGLER 2006a].
- Strophosoma nebulosum* STEPH., 1831: **WE!** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
- Actagoneus plumbeus* (MARSH., 1802): **MV+** [GÜRLICH Vilm, RINGEL i.l. 2011].
- Barynotus alternans* BOH., 1834: **Th!**: Fehlbestimmung bei KOPETZ & WEIGEL 2000 [SPRICK i.l. 2007, KOPETZ et al. 2004].
- Sitona intermedius* KÜST., 1847: **Pf/(+)**: Falscheintrag in der Datenbank [coll. KÖHLER].
- Sitona cinerascens* (FAHRS., 1840): **Pf+(-)**: Rotsteig/Pfälzer Wald, WINTERHAGEN, 30.III.1998, 1 Ex. (BOHME det., t. KOSTAL) [coll. BOHME].
- Sitona ambiguus* GYLL., 1834: **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Sitona longulus* GYLL., 1834: **Sn+** [SIEBER et al. 2011].
- Sitona lineellus* (BONSD., 1785): **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Sitona waterhousei* WALT., 1846: **MV+** [RINGEL i.l. 2011].
- Chlorophanus graminicola* SCHÖNH., 1832: **MV!**: die ungeprüfte Meldung von ESSER (2002b) ist abzulehnen [SPRICK i.l.]. **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Chlorophanus gibbosus* (PAYK., 1792): **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Tropiphorus cucullatus* FAUV., 1888: **St+** [JUNG 2001].
- Lixus iridis* OL., 1807: **Pf+** [KÖHLER Gund]. **WE+(-)** [BELLMANN 2001]. **Wf+(-)**: Münster, Klosterholz im NSG Davert, KAMMEL, 15.V.2004, 1 Ex. (Fotobeleag, KÖHLER det.) [SPRICK & TERLUTTER 2006, KAMMEL i.l. 2004]. **Wt+** [KOSTENBADER 2009].
- Lixus cylindrus* (F., 1781): **By?** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **Hs/(-)** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **Pf!** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **Th!** [SPRICK & SCHMIDL 2004].
- Lixus albomarginatus* BOH., 1843: **Hs/(-)**: der für Hessen angeführte Beleg von ZEBE (1963) gehört zu *Lixus ochraceus* (KÖHLER det.) [Mus. Mainz]. **MV+** [NILSSON 2005]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn+** [LORENZ 2005]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Lixus ochraceus* BOH., 1843: **By+** [HOFMANN & KÖHLER 2010]. **Hs-(-)**: Niederwald bei Rüdesheim, 1.1956 und Lorch, XII.1953, je 1 Ex., ZEBE (KÖHLER det.) [Mus. Mainz].
- Lixus subtilis* BOH., 1836: **Sn+** [DRILLING & KLASS 2006].
- Lixus myagri* OL., 1807: **MV+** [NILSSON 2005].
- Lixus angustatus* (F., 1775): **No+** [KÖHLER 2006a]. **St+(-)** [DIETZE 2005].
- Lixus rubicundus* ZOUBK., 1833: **Hn-** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [KÖHLER Rüte].
- Lixus vilis* (ROSSI, 1790): **Hst+**: Hanau Umgebung, HEIDENREICH, 1956 [coll. HÖHNER].
- Lixus cibricallos* BOH., 1836: **No+(-)** [coll. KÖHLER].
- Larinus brevis* (HBST., 1795): **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Larinus jaceae* (F., 1775): **Br+** [BARNOT i.l.]. **WE+** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Larinus beckeri* PETRI, 1907: **No+** [KÖHLER 2006a].
- Larinus sturnus* (SCHALL., 1783): **Sn+(-)**: Wildbach, Sportplatz, WEIDLICH, 8.VI.2011, 1 Ex. (KÖHLER det.) [coll. KÖHLER]. **St+** [JUNG 2007].
- Larinus turbinatus* GYLL., 1836: **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
- Rhinocyllus conicus* (FRÖL., 1792): **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Coniroleon hollbergi* (FAHRS., 1842): **Hs+**: Babenhausen, SCHINDLER, 1960 - Viernheimer Heide, HÖHNER, 1995 - Raunheim, HÖHNER, 2001 - Lampertheim Untere Wildbach, HOFMANN, 2007 [coll. HÖHNER, coll. HOFMANN, Brenner 2009].
- Coniroleon nebulosus* (L., 1758): **St+(-)**: der von BÄSE (2007) gemeldete Beleg gehört zu *Cyphocleonus dealbatus* (SPRICK det.) [SPRICK i.l., coll. Mus. Magdeburg]. **Wt+(-)**: der Artstatus ist zu revidieren, da der zugehörige Beleg vor 1950 stammt [coll. Mus. STUTTGART, KONZELMANN i.l. 2001].
- Coniroleon nigrosuturatus* (GOEZE, 1777): **Ba+(-)**: neuere Meldung bei BENSE et al. 2000 erwies sich als Fehlbestimmung [HORION 1951, SPRICK i.l.]. **Sn+(-)**: DIETSCHKE & WOLSCHE 2005, kein Beleg und daher abzulehnen [SPRICK i.l., DIECKMANN 1983].
- Leucosomus pedestris* (PODA, 1761): **WE?** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf/(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].

- Leucosomus occidentalis* DIECKMANN, 1982: **By+(-)** [BUSSLER et al. in Vorber., SPRICK et al. 2003]. **Wf?**: kein Beleg, vermutlich verschleppter *L. occidentalis* [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Chromoderus affinis* (SCHRK., 1781): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **Sd+** [LILLIG 2006].
- Mecaspis striatellus* (F., 1792): **Wf** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Mecaspis caesus* GYLL., 1834: **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Sd+(-)** [EISINGER 2006a].
- Pseudocleonus grammicus* (PANZ., 1789): **Ba+(-)** [coll. HEMMANN, MAUS i.l. 1999].
- Pseudocleonus cinereus* (SCHRK., 1781): **Br+(-)** [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Pachycerus cordiger* (GERM., 1819): **Br+(-)** [ESSER & KIELHORN 2005, WINKELMANN & BAYER 2004]. **Sn+** [KLAUSNITZER et al. 2009].
- Rhabdoryhynchus varius* (Hbst., 1795): **Br/(-)** [WINKELMANN & BAYER 2004]. **Hs-**: Offenbach Umgebung, ZILCH, 1930 [coll. HÖHNER].
- Cyphocleonus dealbatus* (GMEL., 1790): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+**: Ludwigslust, ZIEGLER, 20.8.2000 [ZIEGLER i.l. 2011].
- Cotaster cuneipennis* AUBÉ, 1850: **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Euophryum confine* (BROWN, 1881): **Rh+** [KATSHAK 2008].
- Rhyncolus reflexus* BOH., 1838: **St+(-)** [DIETZE 2005].
- Rhyncolus elongatus* (GYLL., 1827): **Br+(-)** [ESSER & SCHNEIDER 2002, WINKELMANN & BAYER 2004, MÖLLER i.l. 2006].
- Rhyncolus sculpturatus* WALT., 1839: **Br+(-)** [coll. MÖLLER, MÖLLER i.l. 2006]. **MV+(-)** [GÜRLICH CONJ].
- Rhyncolus ater* (L., 1758): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Rhyncolus punctulatus* BOH., 1838: **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Brachytenuis porcatus* (GERM., 1824): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Hexarthrum exiguum* (BOH., 1838): **St+** [GRUSCHWITZ & SCHORNACK 1999]. **Wt+** [FLINDT 2010].
- Hexarthrum capitulum* (WOLL., 1858): **Hs+** [FLECHTNER 2003a, BRENNER 2006]. **SHV** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Ferreria marqueti* (AUBÉ, 1863): **No+**: 2004 und 2007 gefunden, offenbar dauernde Ansiedlung [KOLKEBECK 2010].
- Stenopelmus rufinatus* GYLL., 1836: **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **WE+(-)** [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wt+** [FRANK & KONZELMANN 2002, KONZELMANN 2006a].
- Bagous binodulus* (Hbst., 1795): **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000].
- Bagous nodulosus* GYLL., 1836: **Br+(-)** [BARNDT 2010].
- Bagous argillaceus* GYLL., 1836: **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDT 2004].
- Bagous limosus* (GYLL., 1827): **Br+(-)** [BARNDT 2010].
- Bagous subcarinatus* GYLL., 1836: **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Bagous longitarsis* THOMS., 1868: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000]. **No+** [WENZEL 2003]. **WE+(-)** [KRUMMEN 2008b]. **Wt+(-)** [GLADITSCH 1976, GLADITSCH 1978].
- Bagous collingensis* (Hbst., 1797): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Wf?**: Artzugehörigkeit historischer Meldung unklar [SPRICK & TERLUTTER 2006]. **Wt+(-)** [HOLLNÄCHER & RAHMANN 1990].
- Bagous frit* (Hbst., 1795): **Wf?** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Bagous lutulosus* (GYLL., 1827): **Hn-** [SCHMIDT et al. 2000]. **Hs+(-)**: Hanau Umgebung, HEIDENREICH, 1956 [coll. HÖHNER]. **MV+(-)** [ESSER 2001a]. **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000].
- Bagous diglyptus* BOH., 1845: **St+(-)**: Bebertal, ND Hühnerküche, BÜCHE & BAYER 2.IX.1997, mehrere Ex gesiebt in Bestand von *Saxifraga granulata* auf Felssteppenrasen - Olbetal südl. Hundsburg, V.2000, BÜCHE, 2 Ex, in Barberfallen auf magerer Glatthaferviese - NSG Rüsterberg bei Bebertal, [CIUPA & GRUSCHWITZ 1998, BÜCHE i.l.]. **Wt+** [REIBNITZ 2001].
- Bagous czwalinae* SEIDL., 1891: **SH/(+)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Bagous lutosus* (GYLL., 1813): **Hn+** [SPRICK et al. 2007]. **Pf/(+)**: falscher Datenbankeintrag [SPRICK i.l. 2007].
- Bagous puncticollis* BOH., 1845: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Bagous lutulentus* (GYLL., 1813): **Hs+** [HOFMANN i.l. 2010]. **Rh+** [WAGNER & WAGNER 2009]. **WE+(-)** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
- Bagous glabrioris* (Hbst., 1795): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **Pf+(-)** [SONDERMANN & ERDUNTS 2007]. **Wt-** [REIBNITZ 2001].
- Tanysphyrus ater* BLATCH., 1928: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Dorytomus schoenherri* FAUST, 1882: **Hn+** [SPRICK et al. 2007].
- Dorytomus filiostris* (GYLL., 1836): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Dorytomus tremulae* (F., 1787): **WE+(-)** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Dorytomus salicis* WALT., 1851: **Wf+** [REHAGE & TERLUTTER 2003].
- Dorytomus salicinus* (GYLL., 1827): **St+** [ZIEGLER 2006b].
- Dorytomus majalis* (PAYK., 1792): **Ba+(-)** [REIBNITZ 2001]. **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDT 2004, HERBIG in Vorber.]. **WE+(-)** [KRUMMEN 2008b, coll. BELLMANN].
- Dorytomus puberulus* (BOH., 1843): **Pf+** [KÖHLER 2004b].
- Dorytomus villosulus* (GYLL., 1836): **WE+** [BELLMANN & ESSER 2010].
- Dorytomus dorsalis* (L., 1758): **WE+** [BELLMANN & MAUS 2007].
- Procas armillatus* (F., 1801): **No/(-)**: alle mitteleuropäischen Nachweise gehören zu *Procas picipes*, der bislang als Synonym von *armillatus* galt (THOMPSON 2006) [KOCH 1968 ist *picipes*]. **Rh/(-)** [KOCH 1968 ist *picipes*]. **Sn/(-)** [DIECKMANN 1986 ist *picipes*]. **St/ (+)** [coll. BEHNE ist *picipes*]. **Th/ (+)** [coll. DEI ist *picipes*].
- Procas picipes* (MARSH., 1802): **No-** [KOCH 1968, THOMPSON 2006]. **Rh-** [KOCH 1968, THOMPSON 2006]. **Sn-** [DIECKMANN 1986, THOMPSON 2006]. **St+** [coll. BEHNE, THOMPSON 2006]. **Th+** [coll. DEI, THOMPSON 2006].
- Notaris scirpi* (F., 1792): **Rh+(-)** [KÖHLER 2006b].
- Notaris aethiops* (F., 1792): **Hn-** [SPRICK et al. 2001].
- Thryogenes atrostrius* LOHSE, 1991: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Thryogenes scirrhosus* (GYLL., 1836): **Hn+** [SPRICK et al. 2001]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+(-)** [BELLMANN i.l. 2000].
- Grypus brunnirostris* (F., 1792): **Rh+(-)** [BAUMANN & KÖHLER 2000].
- Pachytichius haematocephalus* (GYLL., 1836): **Pf+** [ARK Bienwald].
- Pseudostyphlus pillumus* (GYLL., 1836): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001].
- Comasinus setiger* (BECK, 1817): **Hs+** [KÖHLER & FLECHTNER 2007].
- Smicronyx reichii* (GYLL., 1836): **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Smicronyx swertiae* Voss, 1953: **Wt+** [coll. BUCK, SPRICK i.l. 2007].
- Smicronyx brevicornis* SOL., 1952: **Wt/ (+)**: Beleg gehörte zu *Smicronyx swertiae* [SPRICK i.l. 2007].
- Acalyptus carpi* (F., 1792): **Hn-** [SPRICK et al. 2001].
- Acalyptus sericeus* GYLL., 1836: **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001].
- Ellescus bipunctatus* (L., 1758): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Ellescus infirmus* (Hbst., 1795): **No+(-)** [JUNKER & KÖHLER 2005, KÖHLER 2006b, HADULLA 2008]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Lignyodes emuleator* (PANZ., 1798): **Br+** [BARNDT et al. 2002, BARNDT 2008]. **Rh+(-)** [RENNER 2008b].
- Tychius schneideri* (Hbst., 1795): **Sn+** [SIEBER et al. 2011].
- Tychius parallelus* (PANZ., 1794): **Th+(-)** [RENNER i.l. 2007].
- Tychius squamulatus* GYLL., 1836: **MV+** [ZIEGLER 2006a].
- Tychius kulzeri* PEN., 1934: **By/** [SPRICK & SCHMIDT 2004].
- Tychius breviscululus* DESBR., 1873: **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Tychius pumilus* BRIS., 1862: **Pf+** [ARK Bienwald].
- Tychius tibialis* BOH., 1843: **Rh+(-)** [MÜLLER & MÜLLER 2001, BÖHME & HÖHNER 2001].
- Tychius lineatulus* STEPH., 1831: **WE+(-)** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006, RENNER 2004].
- Sibinia sodalis* GERM., 1824: **By?(-)** [SPRICK & SCHMIDT 2004]. **No+** [ERNST 2006]. **WE+** [KRUMMEN 2008b].
- Sibinia primita* (Hbst., 1795): **Br+(-)** [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Sibinia unicolor* (FAHRS., 1843): **Sn+** [SOBCZYK & HOFFMANN 2010].
- Sibinia pellucens* (SCOP., 1772): **Hn+** [SPRICK et al. 2007].
- Anthonomus humeralis* (PANZ., 1795): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Anthonomus piri* KOLLAR, 1837: **Ne+(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Anthonomus bituberculatus* THOMS., 1868: **Pf+** [ARK Bienwald]. **St+** [RENNER 1999a].
- Anthonomus spilotus* REDT., 1849: **WE/** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Anthonomus chevrolati* DESBR., 1868: **St+**: Wienrode/Harz, Sonnenberg, BASE, V.2004, 1 Ex. (SCHOLZE det.) [SCHOLZE i.l. 2007]. **Th+** [SPRICK i.l. 2007, KOPETZ et al. 2008].
- Anthonomus rufus* GYLL., 1836: **WE-** [KRUMMEN 2008b].
- Anthonomus sorbi* GERM., 1821: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
- Anthonomus phyllocola* (Hbst., 1795): **WE+** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
- Anthonomus pinivorax* SILFV., 1977: **WE/ (+)** [in der Spalte veruscht, BELLMANN i.l.].
- Anthonomus germanicus* DIECKM., 1968: **Hs+**: Schlüchtern, Hohenzell, BORNHOLDT, 1986 [coll. HÖHNER].
- Bradybatus creutzeri* GERM., 1824: **No+** [coll. KÖHLER].
- Bradybatus kelleri* BACH, 1854: **Hn+(-)** [SCHMIDT et al. 2000, BORCHERTING 1994]. **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **No+** [KOCH 1993].

- Bradybatus fallax* GERST., 1860: **Br**+(+) [ESSER & SCHNEIDER 2002, WINKELMANN & BAYER 2004]. **Hn**+[SCHMIDT et al. 2000]. **MV**+: Marxbagen, BÜCHE 1.VI.2000, 1 Ex. im Garten angefliegen [BÜCHE i.l., GÜRLICH 2005a].
- Circulio elephas* (GYLL., 1836): **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **WE**+ [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Circulio pellitus* (BOH., 1843): **Br**+(+) [ESSER 2005a, BARNDT 2008].
- Circulio betulae* (STEPH., 1831): **Sd**+ [EISINGER 2006b].
- Pissodes piceae* (ILL., 1807): **Wf**/(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Pissodes piniphilus* (HBST., 1795): **Pf**+(+): Bad Dürkheim Umgeb., Forst Weilach, BÜCHE, 17.VI.1997. 1 Ex von umgebrochener Kiefer am Waldrand geklopft [BÜCHE i.l.].
- Magdalis nitidipennis* (BOH., 1843): **Wt**+(+) [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Magdalis barbicornis* (LATR., 1804): **Sd**+(+) [EISINGER 2006a].
- Magdalis flavicornis* (GYLL., 1836): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Magdalis fuscicornis* DESBR., 1870: **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **Hs**+(+) [FLECHTNER 2003b]. **Th**+ [KOPETZ et al. 2008].
- Magdalis caucasica* (TOURN., 1872): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001].
- Magdalis rufa* GERM., 1824: **Sn**+ [LORENZ 2006, SIEBER et al. 2011]. **St**+ [JUNG 2007, SCHOLZE 2007]. **Th**+ [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **WE**+ [BELLMANN & ESSER 2010]. **Wf**+ [DREES 2002b, KÖHLER Holt].
- Magdalis punctulata* (MULS. REY, 1859): **By**+(+) [GERSTMEIER 2000, BUSSLER & FUCHS 2006].
- Hylobius pinastri* (GYLL., 1813): **St**+ [coll. SCHOLZE].
- Liparus glabrirostris* KÜST., 1849: **Hn**+ [SPRICK et al. 2001].
- Plinthus fischeri* GERM., 1824: **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
- Mitophilinus caliginosus* (F., 1775): **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.].
- Adexius scrobipennis* GYLL., 1834: **Hs**+: Hanau Umgebung, NEUMANN, etwa 1920 [coll. HÖHNER]. **St**+ [SCHOLZE 2007].
- Minyops carinatus* (L., 1767): **Sn**+(+) [LORENZ 2005].
- Donus intermedius* (BOH., 1842): **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Donus ovalis* (BOH., 1842): **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Donus tessellatus* (HBST., 1795): **Br**+ [BARNDT 2008].
- Hypera dauci* (OL., 1807): **WE**+(+) [KRUMMEN 2008b].
- Hypera arundinis* (PAYK., 1792): **WE**+(+) [coll. ÜMB, BELLMANN i.l. 2000].
- Hypera striata* (BOH., 1834): **Ba**+: Bötzingen, Kaiserstuhl, KRUMM, V.2009, 1 Ex. e.l. (Fotobeleag, KÖHLER det., t. WINKELMANN) [KÖHLER & KRUMM 2009].
- Hypera contaminata* (HBST., 1795): **St**+: Quedlinburg, V.1993, SCHOLZE, 1 Ex. (JUNG 2001, SCHOLZE 2007).
- Hypera meles* (F., 1792): **Wf**+(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Hypera fuscicornis* (MARSH., 1802): **WE**+(+) [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
- Hypera ononidis* (CHEVR., 1863): **Br**+ [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Gronops lunatus* (F., 1775): **WE**+(+) [KRUMMEN 2002]. **Wf**+(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Gronops inaequalis* BOH., 1842: **WE**+ [KRUMMEN 2008b].
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE, 1777): **Br**+ [ESSER 2005b]. **Sd**+ [REISSMANN i.l. 2007]. **Sn**+ [SIEBER et al. 2011]. **St**+(+) [BÄSE i.l. 2011].
- Sitophilus zeamais* MOTSCH., 1855: **Sn**+ [GOLLKOWSKI 2010]. **St**+ [BÄSE 2007].
- Sitophilus linearis* (HBST., 1795): **Wt**/(+): die bisherige Angabe coll. BENSE beruht vermutlich auf einem Eingabefehler [BENSE & KNAPP i.l. 2010].
- Dryophthorus corticalis* (PAYK., 1792): **Hn**+(+) [SCHMIDT et al. 2005]. **WE**+(+) [BELLMANN & ESSER 2010].
- Gasterocercus depressirostris* (F., 1792): **By**+(+): NWR Elmus bei Röhlein, ISACSSON, VII.2005 [ISACSSON i.l. 2005, BUSSLER 2005, SCHMIDT et al. 2005]. **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **No**+ [coll. KÖHLER]. **Sn**+ [LORENZ 2005].
- Camptorhinus statua* (ROSSI, 1790): **St**+ [NEUMANN & SCHNEIDE 2008].
- Acalles naviesi* BOH., 1837: **Br**+ [STÜBEN 2005]. **By**+ [STÜBEN 2005, coll. BÖHME, SPRICK & SCHMIDL 2005]. **Hn**+ [STÜBEN 2005, SPRICK et al. 2007]. **Hs**+ [SKALE & HOFMANN 2005, STÜBEN 2005, coll. BÖHME]. **MV**+ [STÜBEN 2005]. **Ne**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Pf**+ [coll. BÖHME]. **Rh**+ [STÜBEN 2005]. **SH**+ [GÜRLICH et al. i.V.]. **Sn**+ [coll. BÖHME]. **St**+ [STÜBEN 2005]. **Th**+ [STÜBEN 2005, coll. BÖHME]. **Wf**+ [STÜBEN 2005].
- Acalles pyrenaicus* BOH., 1844: **Th**+ [KOPETZ et al. 2004].
- Acalles parvulus* BOH., 1837: **By**+(+) [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **Pf**+ [KÖHLER 2004b].
- Acalles misellus* BOH., 1844: **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **Ne**/(+) [HERRMANN & MEYBOHM 2001].
- Acalles lemuri* (GERM., 1824): **Hs**+(+) [BRENNER 2003]. **Sd**/(+) [EISINGER 2006a].
- Acalles echinatus* (GERM., 1824): **Hs**+(+) [KÖHLER & FLECHTNER 2007]. **MV**+ [HERRMANN & MEYBOHM 2001]. **Ne**/(+) [HERRMANN & MEYBOHM 2001].
- Acalles commutatus* DIECKM., 1982: **MV**+ [GÜRLICH 2005a]. **WE**/ [BELLMANN et al. 2003].
- Acalles micros* DIECKM., 1982: **Hs**+: Scharbach, Odenwald, SCHIRADER, 3.IX.99, 1 Ex. (BÖHME det.) [coll. BÖHME]. **No**+ [KÖHLER Sieb, STÜBEN 2001]. **Wt**+ [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Acalles ptioides* (MARSH., 1802): **Ba**+: Lauf, Hirschfelsen, 15.X.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.) [MERTENS i.l. 2000, FRANK & KONZELMANN 2002].
- Acalles hypocrita* BOH., 1837: **Br**+ [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **Pf**+(+) [KÖHLER 2004a].
- Baris artemisiae* (HBST., 1795): **SH**/(+) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Baris nesapia* FAUST, 1887: **Br**+(+) [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Baris laticollis* (MARSH., 1802): **Hn**+ [SPRICK et al. 2007].
- Baris coerulea* (SCOP., 1763): **No**+(+) [KÖHLER 2006b]. **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **WE**+ [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Baris cuprirostris* (F., 1787): **Ba**+(+): Mannheim-Rheinau, BÖHME, 3.VI.1984, 1 Ex. (coll. BÖHME).
- Baris picicornis* (MARSH., 1802): **Ne**+ [MEYBOHM 1999b].
- Baris chlorizans* GERM., 1824: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000].
- Baris scolopacea* GERM., 1824: **Hs**+ [SPRICK i.l. 2009]. **Pf**+ [KÖHLER Günd].
- Coryssomerus capucinus* (BECK, 1817): **Wf**+(+) [RENNER 2003a].
- Eubrychius velutus* (BECK., 1817): **By**+(+) [WEICHSELBAUMER 2003b]. **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2000]. **Rh**+(+) [coll. KÖHLER].
- Phytobius leucogaster* (MARSH., 1802): **WE**+(+) [FUHRMANN 2001].
- Pelenomus comati* (HBST., 1795): **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Pelenomus waltoni* (BOH., 1843): **Sd**+ [EISINGER 2006a]. **WE**+(+) [KRUMMEN 2008a].
- Pelenomus canaliculatus* (FAHRS., 1843): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **Sd**+ [coll. KÖHLER]. **WE**+ [KRUMMEN 2008b].
- Pelenomus velaris* (GYLL., 1827): **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **St**+(+): Alte Elbe bei Rogätz-Sandkrug, BÜCHE 15.VI.1998, 2 Ex am Sandufer des Baggersees zwischen Keimlingen von *Bidens* und *Polygonum spec.* - Ohreue bei Rogätz BÜCHE 12.VI.1998, 1 Ex auf trockengefallener Schlammfläche in einem Polster von *Calitriche spec.* [BÜCHE i.l.].
- Pelenomus quadricorniger* (F., 1787): **Pf**+ [ARK Bienwald].
- Pelenomus olsoni* (ISRAELS., 1972): **Hn**+ [SPRICK et al. 2001]. **Hs**+ [BRENNER 2001]. **Pf**+ [ARK Bienwald]. **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Pelenomus quadricorniger* (COLONN., 1986): **Hn**+(+) [SPRICK et al. 2007].
- Neophytobius muricatus* (BRIS., 1867): **Hs**+ [BRENNER 2001]. **WE**+(+) [KRUMMEN 2008b].
- Neophytobius granatus* (GYLL., 1836): **Pf**+(+) [ARK Bienwald].
- Neophytobius quadrinodatus* (GYLL., 1813): **Br**+(+) [Berlin-Johannistal, ehemaliger Grenzstreifen, BÜCHE, 29.VI.1998, 2 Ex. an *Potentilla reptans* [WINKELMANN & BAYER 2004, EICHLER et al. 1999, BÜCHE i.l.].
- Rhinoncus albicornis* GYLL., 1836: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **Pf**+ [KÖHLER 2004b].
- Rhinoncus smreczynskii* WAGNER, 1937: **SH**+ [SUKAT 2000].
- Rhinoncus bosnicus* SCHLTZ., 1900: **Hn**+ [SPRICK et al. 2007]. **MV**+ [NILSSON 2005].
- Marmaropus besseri* GYLL., 1837: **Hn**+ [SCHMIDT et al. 2005]. **WE**+ [SCHMIDT et al. 2005].
- Rutidosoma fallax* (OTTO, 1897): **Wf**+ [SPRICK & TERLUTTER 2006, RENNER 2003a, KÖHLER Arms].
- Scleropterus serratus* (GERM., 1824): **Hn**+(+) [SPRICK et al. 2007].
- Amalus scortillum* (HBST., 1795): **Wt**+ [KONZELMANN & MALZACHER 2006].
- Drupenatus nasturtii* (GERM., 1824): **Wf**+(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Poophagus hopfgarteni* TOURN., 1874: **Br**+(+) [ESSER & SCHNEIDER 2002]. **WE**/ [BELLMANN i.l. 2011].
- Coeliodes nigratarsis* HARTM., 1859: **No**+ [coll. KÖHLER].
- Coeliodes trifasciatus* BACH, 1894: **Br**+(+) [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **Sd**+ [EISINGER 2006a].
- Thamnicolus viduatus* (GYLL., 1813): **Wt**+ [coll. REISSMANN].
- Thamnicolus signatus* (GYLL., 1837): **WE**/ [WIEPKEN 1897, BELLMANN i.l. 2000].

- Thamiochilus sahlbergi* (SAHLB., 1845): **SH/(-)** [GÜRLICH et al. i.V.].
Micrelus ericae (GYLL., 1813): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Phrydiuchus topiarius (GERM., 1824): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b].
- Ceutorhynchus chlorophanus* ROUGET, 1857: **By+(-)** [ELBERT 1994].
Th+(-): kein Beleg im DEI [BEHNE & SPRICK i.l. 2007].
Ceutorhynchus ignitus GERM., 1824: **WE+(-)** [ESSER 1999, FUHRMANN 2001]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Ceutorhynchus perrivax* WEISE, 1883: **St+**: Stark quelliger Erlbruch südl. Haldensleben, BÜCHE & BAYER, 16.VI.1997, mehrere Ex. von *Cardamine amara* gekeschert, dortselbst 2 Ex. gesiebt BÜCHE 1.4.2000 [BÜCHE i.l.].
- Ceutorhynchus coerulescens* GYLL., 1837: **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000].
- Ceutorhynchus sulcicollis* (PAYK., 1800): **WE+(-)** [KRUMMEN 2008b].
Ceutorhynchus pictariss GYLL., 1837: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Ceutorhynchus atomus* BOH., 1845: **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007].
Ceutorhynchus plumbeus BRIS., 1869: **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.].
Ceutorhynchus sophiae (STEPH., 1829): **St+**: Angern, BÜCHE 7. VI.1998, und Tangerhütte BÜCHE 12.VI.1998, von *Descurainia sophia* am Rande von Düngerdeponien gekeschert, jeweils nur 1 Ex. Die Art ist wohl nur versehentlich nicht für St angegeben, da sie in der Roten Liste dieses Landes berücksichtigt ist [BÜCHE i.l.].
- Ceutorhynchus roberti* GYLL., 1837: **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Ceutorhynchus puncticollis* BOH., 1845: **Ne+(-)** [MEYBOHM 2001]. **WE+** [ESSER 1999].
- Ceutorhynchus scrobicollis* NER. WAGN., 1924: **MV+** [KÖHLER Bohn, NILSSON 2003]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+** [KONZELMANN 2010].
- Ceutorhynchus griseus* BRIS., 1869: **St+(-)** [JUNG 2007].
Ceutorhynchus nanus GYLL., 1837: **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf?(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Ceutorhynchus turbatus* SCHLTZ., 1903: **WE+** [BELLMANN et al. 2003].
- Ceutorhynchus parvulus* BRIS., 1869: **Br+**: Berlin-Grünwald, Nähe Teufelsberg, BÜCHE, 10.VI.2001, mehrere Ex. an *Lepidium campestre* [BÜCHE i.l., WINKELMANN & BAYER 2004]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Ceutorhynchus inaeffectus* GYLL., 1837: **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
- Ceutorhynchus gerhardti* SCHLTZ., 1899: **Hn+** [SPRICK et al. 2001].
Ceutorhynchus querceti (GYLL., 1813): **Wt+(-)**: da bei HORION (1951) nicht explizit erwähnt und im Museum Stuttgart nicht aufzufinden, muss die Art vorerst gestrichen werden [KONZELMANN i.l. 2001].
- Ceutorhynchus resedae* (MARSH., 1802): **Hs+** [BRENNER 2001]. **Ne+** [MEYBOHM 1999b]. **WE+** [BELLMANN et al. 2003].
- Ceutorhynchus canaliculatus* BRIS., 1869: **Sn+** [SIEBER et al. 2011]. **St+** [JUNG 2007b].
- Ceutorhynchus posthumus* GERM., 1824: **Sd-** [KÖCH 1968].
Ceutorhynchus pulvinatus GYLL., 1837: **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Ceutorhynchus niyazii* (HOFFM., 1957): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **MV+** [NILSSON 2003, ZIEGLER 2006a]. **St+** [GRUSCHWITZ & SCHORNACK 2005].
- Ramunculiphilus obsoletus* (GERM., 1824): **Pf/**: Beleg im DEI ist *obsoletus* [BEHNE det.]. [BEHNE & SPRICK i.l. 2007].
Ramunculiphilus faeculentus (GYLL., 1837): **Wf+** [RENNER & GRUNDMANN 1984].
- Oprohinus consputus* (GERM., 1824): **WE+** [WESSEL 1878, BELLMANN i.l. 2000].
- Neoglocianus maculaalba* (HBST., 1795): **Hn-** [SPRICK et al. 2001].
Glocianus distinctus (BRIS., 1870): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Glocianus moelleri (THOMS., 1868): **By+(-)** [SCHMIDT et al. 2005]. **No+** [WENZEL 2006]. **Pf+** [ARK Bienwald].
- Datonychus argutus* (HBST., 1795): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **WE+(-)** [coll. BELLMANN, BELLMANN i.l. 2000].
- Datonychus urticae* (BOH., 1845): **St+(-)** [CIUPA & GRUSCHWITZ 1998].
- Microplontus figuratus* (GYLL., 1837): **Sn+** [SIEBER et al. 2011]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Microplontus triangulum* (BOH., 1845): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b]. **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Hs+**: Lorch, HÖHNER, 1991 [coll. HÖHNER].
- Microplontus millefolii* (SCHLTZ., 1897): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Hadroplontus trimaculatus (F., 1775): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b]. **Hs+** [BRENNER 2007]. **WE+** [WIEPKEN 1883, BELLMANN i.l. 2000].
- Hadroplontus litura* (F., 1775): **Sd+** [EISINGER 2006a].
Mogulones euphorbiae (BRIS., 1866): **By+(-)** [SPRICK & SCHMIDT 2004]. **MV+** [NILSSON 2003, ZIEGLER 2006a, RINGEL et al. 2007, NILSSON 2009].
- Mogulones venedicus* (WEISE, 1879): **Br?+(-)** [WINKELMANN & BAYER 2004].
- Mogulones abbreviatus* (F., 1792): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2001].
Mogulones borraginis (F., 1792): **No+(-)** [coll. KÖHLER].
Mogulones pallidicornis (BRIS., 1860): **Hn+(-)** [SPRICK et al. 2007]. **Wf+** [KÖHLER Länd].
- Mogulones albosignatus* (GYLL., 1837): **Wt+(-)**: der Status ist zu korrigieren, da der Beleg vor 1950 gefunden wurde [KONZELMANN i.l. 2001, HORION 1951].
- Mogulones cruciger* (HBST., 1784): **No+** [KÖHLER 2006b].
Mogulones ornatus (GYLL., 1837): **WE/** [WIEPKEN 1886, BELLMANN i.l. 2000]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Mogulones larvatus* (SCHLTZ., 1896): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002, RENNER 2005b]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006, KÖHLER Länd].
- Mogulones raphani* (F., 1792): **By+** [WEICHSELBAUMER 2003b].
Mogulonoides radula (GERM., 1824): **WE/** [WIEPKEN 1886, BELLMANN i.l. 2000].
- Sirocalodes nigrinus* (MARSH., 1802): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000].
Sirocalodes mixtus (MULS. REY, 1858): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **Wf+** [TERLUTTER 2003, REHAGE & TERLUTTER 2003].
- Trichosirocalus barnevillei* (GREN., 1866): **Hn+** [SCHMIDT et al. 2000]. **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Trichosirocalus rufulus* (DUF., 1851): **Wfv+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Trichosirocalus horridus* (PANZ., 1801): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b].
- Stenocarus ruficornis* (STEPH., 1831): **WE-** [KRUMMEN 2008b].
Stenocarus cardui (HBST., 1784): **Hs+(-)** [SPRICK i.l. 2007]. **WE+** [BRÜGGEMANN 1873, BELLMANN i.l. 2000].
- Coeliasites lamii* (F., 1792): **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006, BORCHERING 1994].
- Mecinus heydeni* WENCK., 1866: **Hs+(-)** [BRENNER 2003].
- Gymnetron pirazollii* (STIERL., 1867): **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+**: Alte Elbe bei Bertingen, ESSER & BÜCHE 13.VI.1998., Auf Sandtrockenrasen, zahlreich an den Blütenköpfen von *Plantago arenaria* [BÜCHE i.l.].
- Gymnetron ictericum* GYLL., 1838: **Hs+**: Viernheimer Heide, HÖHNER, 1998 und 1999 [coll. HÖHNER]. **Pf+** [ARK Bienwald]. **Sn+** [SIEBER & KLAUSNITZER 2005]. **St+**: Alte Elbe bei Bertingen, BÜCHE 13.06.1998, Sandtrockenrasen, 1 Ex. an *Plantago arenaria* [BÜCHE i.l.].
- Gymnetron pascuorum* (GYLL., 1813): **No+** [coll. KÖHLER]. **Sn+** [LORENZ 2005, PESCHER i.l. 2007].
- Gymnetron ludyi* REITTER, 1907: **Hs+**: Lorch, HÖHNER, 1986 - Wetzlar Magdalenenhausen, HÖHNER, 2003 [coll. HÖHNER].
- Gymnetron rostellum* (HBST., 1795): **By+(-)** [WEICHSELBAUMER 2003b]. **Hs+** [BRENNER 2001]. **MV+(-)** [RINGEL et al. 2007]. **Sn+(-)** [JAKOBITZ & ZIESCHE in Vorber.]. **St+** [BÄSE 2007, JUNG 2001].
- Gymnetron stimulosum* (GERM., 1821): **Pf+(-)** [ARK Bienwald, RENNER 2011].
- Gymnetron melanarium* (GERM., 1821): **No+(-)** [KÖHLER 2006b]. **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Sn+** [KRAUSE 1978, SIEBER et al. 2011].
- Gymnetron villosulum* GYLL., 1838: **No+(-)** [KÖHLER & SCHARF 2010]. **WE+(-)** [KRUMMEN 2008b, coll. BELLMANN]. **Wf+(-)** [RENNER 2003a, TERLUTTER 2003].
- Gymnetron beccabungae* (L., 1761): **Hn-** [SPRICK et al. 2001]. **MV+** [NILSSON 2005]. **Wf+(-)** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Gymnetron veronicae* (GERM., 1821): **Wf+(-)** [KÖHLER Atns, KÖHLER Länd, TERLUTTER 2003].
- Gymnetron asellus* (GRAY., 1807): **MV+** [ZIEGLER 2006a, MEYBOHM 2006]. **Ne+** [MEYBOHM 2006]. **Sn+** [LORENZ 2001b]. **Th+** [KOPETZ et al. 2004]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Gymnetron hispidum* BRULLÉ, 1832: **Hn+(-)**: falscher Datenbankeintrag [SPRICK i.l. 2010]. **WE+** [WIEPKEN 1886, BELLMANN i.l. 2000].
- Gymnetron melas* BOH., 1838: **Sn+** [DIETZE & WOLSCH 2005].
- Gymnetron thapsicola* (GERM., 1821): **Hn-** [SPRICK et al. 2001]. **Hs+** [BRENNER 2001].

- Gymnetron bipustulatum* (ROSSI, 1792): **By?**(-) [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **St+** [BÄSE 2009a].
- Miarus micros* (GERM., 1821): **By+** [SPRICK & SCHMIDL 2004]. **WE+** [BELLMANN 2001].
- Miarus graminis* (GYLL., 1813): **Hn-** [SPRICK et al. 2001].
- Miarus dulcinatus* (KANGAS, 1976): **Br+** [ESSER 2005b].
- Miarus distinctus* (BOH., 1845): **Ba+** [FRANK & KONZELMANN 2002].
- Miarus ajugae* (HBST., 1795): **Ne**(+) [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH**(+) [GÜRLICH et al. i.V.].
- Miarus campanulae* (L., 1767): **Ne+** [GÜRLICH et al. i.V.]. **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Miarus monticola* PETRI, 1912: **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Cionus longicollis* BRIS., 1863: **HS**(-): Wiesbaden-Dotzheim, MÜLLER, 15.VI.45, 1 Ex. (KOSTAL det.) [coll. BÖHME]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Cionus ganglbaueri* WINGELM., 1914: **Br+** [ESSER 2005a, BARNDT 2008].
- Cionus clairvillei* BOH., 1838: **By+** [SPRICK & SCHMIDL 2004].
- Cionus olivieri* ROSENSCH., 1838: **Wf?**(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Cionus thapsus* (F., 1792): **Wf?**(+) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Cleopus solani* (F., 1792): **Ne+** [MEYBOHM 2006]. **Th+** [KOPETZ & WEIGEL 2000]. **Wf**(-) [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Rhynchaenus rufus* (SCHRK., 1781): **WE+** [KRUMMEN 2008b].
- Rhynchaenus alni* (L., 1758): **WE**(-) [KRUMMEN 2008b].
- Rhynchaenus pilosus* (F., 1781): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Rhynchaenus erythropus* (GERM., 1821): **By+**(-) [GOSSNER et al. 2008]. **Pf**(-) [KÖHLER Bien].
- Rhynchaenus signifer* (CREUTZ., 1799): **Sd+** [EISINGER 2006a]. **Wf**(-): Dortmund-Mengede, STIEBEINER, 18.VI.2000, 1 Ex. (t. KÖHLER) [DREES 2002b, REHAGE & TERLUTTER 2003].
- Rhynchaenus subfasciatus* GYLL., 1836: **MV+** [KÖHLER Rüte].
- Rhynchaenus jota* (F., 1787): **Pf+** [KÖHLER Bien].
- Rhynchaenus loniceriae* (HBST., 1795): **SH+** [GÜRLICH et al. i.V.].
- Rhynchaenus testaceus* (MÜLL., 1776): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Rhynchaenus rusci* (HBST., 1795): **Pf+** [ARK Bienenwald].
- Pseudorchestes pratensis* (GERM., 1821): **WE?** [HOLLMANN 1884, BELLMANN i.l. 2007].
- Tachyerges pseudostigma* (TEMP., 1982): **Pf+**: [KÖHLER 2000d]. **Wf+** [SPRICK & TERLUTTER 2006].
- Tachyerges decoratus* (GERM., 1821): **Hn**(-) [SCHMIDL et al. 2005].
- Tachyerges rufitarsis* (GERM., 1821): **By**(-): Krailling, Kreuzlinger Forst, FUCHS, 26.IV.2000, 1 Ex. (t. DRIES & ROPPEL) auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz auf einem Halbtrockenrasen von jungen Pappeln gekeschert [FUCHS i.l. 2001].
- Isochnus foliorum* (MÜLL., 1764): **MV**(-) [ZIEGLER i.l. 2007]. **WE+** [KRUMMEN 2008b].
- Rhamphus oxyacanthae* (MARSH., 1802): **Sd+** [EISINGER 2006a].
- Rhamphus subaeneus* ILL., 1807: **HS+**: Lorsch Dünen, BÖHME, 1951 - Rodenbach, HÖHNER, 1980 [coll. BÖHME, coll. HÖHNER]. **No**(-) [WENZEL 2006]. **Sn-** [GÜNTHER & PESCHEL 2001].
- Antliarhinus zamiae* (SCHÖNH., 1823): **Byi**: Regensburg in einer Wohnung, II.2007, 1 Ex. (BEHNE det.), Heimat Südafrika, an *Encephalartos*-Arten [HEINZE i.l., BEHNE det. 2007].
- Otiorynchus lugens* GERM., 1824: **Sni** [BEHNE i.l. 2009].*
- ### Literatur
- Weitere Zitate siehe ggf. im Verzeichnis der Käfer Deutschlands und 1. Nachtrag (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2000b) sowie in der Quellen-Datenbank zum Verzeichnis.
- AHRENS, D. & J. KLESS (2001): Eine importierte nordamerikanische *Serica*-Art in Baden-Württemberg (Coleoptera: Scarabaeoidea, Sericini). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 111: 153-155.
- ALFES, C. & H. BILKE (1977): Coleoptera Westfalica: Familia Dytiscidae. – Abhandlungen des westfälischen Landesmuseum für Naturkunde Münster (Münster) 39: 1-109.
- APFEL, W. (2003): 5. Checkliste der Käfer (Coleoptera) vom Nationalpark Hainich. Erfassungsstand: Januar 2003. – Unveröffentlichter Bericht, Nationalpark Hainich, Bad Langensalza.
- ARK Bienenwald (Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen 2006-2010): Exkursionen in den Bienenwald in der Südpfalz 2006 bis 2010. Publikation in Vorbereitung.
- ASSING, V. (2003): On the taxonomy of *Gyrophypnus* LEACH: new synonymies, new species, and a key to the Western Palaearctic and Middle Asian representatives of the genus (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 99: 55-81.
- ASSING, V. (2004): *Cypha suecica* (PALM, 1936) – Erstnachweis für Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae). Entomologische Blätter (Kelttern) 100: 27-28.
- ASSING, V. (2009): On the Western Palaearctic and Middle Asian species of *Ochtheophilum* STEPHENS, with notes on Cryptobium koltzei Eppelsheim (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae: Cryptobiina). – Linzer biologische Beiträge (Linz) 41: 397-426.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Jena) 95: 1-31.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). II. – Entomologische Blätter (Kelttern) 97: 121-176.
- ASSING, V. & P. WUNDERLE (2008): On the *Alevonota* species of the Western Palearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini). – Beiträge zur Entomologie (Kelttern) 58: 145-189.
- BAIL, J. G. (2006): Erstfund von *Dirhagus palmi* OLEXA, 1963 in Deutschland in den niederbayerischen Donau-Auwäldern. – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik (Bamberg) 8: 43-48.
- BARNDT, D. (2004): Beitrag zur Arthropodenfauna des Lausitzer Neißegelbietes zwischen Preschen und Pusack – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 6: 7-46.
- BARNDT, D. (2005): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Schlaubetal und Umgebung – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7: 45-102.
- BARNDT, D. (2007): Beitrag zur Arthropodenfauna der Binnensalzwiesen von Storkow und Philadelphi (Brandenburg/Landkreis Oder-Spree) – Faunenanalyse und Bewertung. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9: 1-54.
- BARNDT, D. (2008): Beitrag zur Arthropodenfauna des Elbe-Elstergebietes (Land Brandenburg) mit besonderer Berücksichtigung des „Naturparks Niederlausitzer Heide Landschaft“ – Faunenanalyse und Bewertung (Col. u. a.) – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 10: 1-97.
- BARNDT, D. (2010): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heidesen (Land Brandenburg) – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 12: 195-298.
- BARNDT, D., H. KORGE & R. PLATEN (2002): Neu- und Wiederfunde von Käfern, Webbspinnen und Weberknechten für Brandenburg (Coleoptera, Araneae, Opiliones). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 4: 3-38.
- BARNER, K. (1949): Die Cicindeliden und Carabiden der Umgebung von Minden und Bielefeld II. – Abhandlungen des westfälischen Landesmuseums für Naturkunde (Münster) 12: 1-28.
- BÄSE, W. (2004): Rote Liste der Schilfkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae: Donaciinae) des Landes Sachsen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: 305-307.
- BÄSE, W. (2005a): Ein Fund von *Oulema tristis* (HERBST, 1786) in Sachsen-Anhalt (Col., Chrysomelidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 48.
- BÄSE, W. (2005b): Nachweise zu *Olibrus baudieri* FLACH, 1888 in Sachsen-Anhalt (Col., Phalacridae). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13: 82.
- BÄSE, W. (2006a): Beitrag zur Borkenkäferfauna Sachsen-Anhalts. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 15: 82-84.
- BÄSE, W. (2006c): Erstnachweis von *Meligethes humerosus* (REITER, 1871) für Deutschland (Col., Nitidulidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 96.
- BÄSE, W. (2007): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsen-Anhalts und Brandenburg (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 49-53.
- BÄSE, W. (2008): Die Käfer des Wittenberger Raumes. – Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau. 20: 1-500.
- BÄSE, W. (2009a): *Rhinusa bipustulata* (ROSSI, 1792) – Erstnachweis für Sachsen-Anhalt. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 17: 149.
- BÄSE, W. (2009b): Checkliste der Blattkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae) Sachsen-Anhalts. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 17: 199-211.
- BÄSE, W. (2010a): Erstnachweis von *Clypastraea reitteri* BOWE-STEAD, 1999 für Deutschland (Coleoptera, Corylophidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 56.

- BÄSE, W. (2010b): Erstnachweis von *Rhopalapion longirostre* (OLIVIER, 1807) für Sachsen-Anhalt (Coleoptera, Apionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 56.
- BÄSE, W. (2010c): Erstnachweis von *Ceryon hungaricus* ENDRÖDY-YOUNGA, 1967 für Deutschland (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeriidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 259.
- BÄSE, W. (2011a): *Aphthona violacea* (KOCH, 1803) in Sachsen-Anhalt (Col., Chrysomelidae). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 19: 6.
- BÄSE, W. (2011b): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsen-Anhalts (Coleoptera), Teil 2. – Entomologische Nachrichten und Berichte 55 (2-3): 93-98.
- BÄSE, W. & W. MALCHAU (2011): Nachweise von *Chlorophorus sator* (MÜLLER, 1766) in Sachsen-Anhalt (Col., Cerambycidae). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 19: 31-33.
- BATHON, H. (1969): Kleine coleopterologische Mitteilungen. – Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde 76: 28-31.
- BATHON, H. (2007): *Coccotrypes dactylipera* (FABRICIUS) (Col., Scolytidae) nach Deutschland importiert. – DGaE-Nachrichten (Darmstadt) 21: 63.
- BALMANN, H. (1997): Die Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae) des nördlichen Rheinlandes. – Decheniana-Beihefte (Bonn) 36: 13-140.
- BALMANN, H. (1999): Die Mosel-Exkursion nach Pommern 1998. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 9: 12-43.
- BAUMANN, H. (2005): Die Blatthornkäfer des Rheinlandes. Teil 3: Scarabaeini und Coprini (Col., Scarabaeidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 59-105.
- BAUMANN, H. (2007): Zur Käferfauna (Col.) der Tevereiner Heide bei Geilenkirchen. Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen 2004 und 2005. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 101-119.
- BAUMANN, H. & F. KÖHLER (2000): Die Westerwaldexkursion der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen 1999 (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 10: 23-50.
- BEIER, W. & C. BRÜGGEMANN (2001): Wiederfund des Laufkäfers *Amara praetermissa* (C. R. SAHLBERG, 1827) (Col., Carabidae) für das Land Mecklenburg-Vorpommern. – Insecta (Bonn) 7: 88-89.
- BEIER, W. & D. HEILMANN (2003): Wiederfund von *Meloe coriaceus* (BRANDT & ERICHSON, 1832) (Coleoptera, Meloidae) für Deutschland sowie Nachweise weiterer bemerkenswerter Käferarten bei Lebus an der Oder (Land Brandenburg). – Märkische Entomologische Nachrichten 5: 69-76.
- BEIER, W. & H. KÖRGE (2001): Biodiversität der Wirbellosenfauna im Gebiet des ehemaligen GUS-Truppenübungsplatzes Döberitz bei Potsdam (Land Brandenburg). Teil I: Käfer (Insecta, Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) Sonderheft 1: 1-150.
- BEIER, W. & A. WELLMANN (2007): Erneuter Fund des Malachitkäfers *Ceraphes terminatus* (MÉNÉTRIÉS, 1832) (Coleoptera, Malachiidae) aus Falkensee bei Berlin (Land Brandenburg). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9: 237-240.
- BELLMANN, A. (2001): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 4). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 45: 175-177.
- BELLMANN, A. (2002): Die Trogidae, Scarabaeidae und Lucanidae des Weser-Ems-Gebietes (Coleoptera). – Drosera (Oldenburg) 2002: 109-128.
- BELLMANN, A. & J. ESSER (2006): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 7). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 46: 61-63.
- BELLMANN, A. & J. ESSER (2010): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 9). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 46: 525-527.
- BELLMANN, A., J. ESSER, W. LAKOMY & A. ROSE (2003): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 5). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 45: 445-448.
- BELLMANN, A., J. ESSER & G. MÖLLER (1995): Dendroentomologische Untersuchungen im NSG Hasbruch unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzplanung. Unpubliziertes Gutachten (Funktionsstelle Waldökologie – FA Hasbruch/Hude).
- BELLMANN, A. & CH. MAUS (2008): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 8). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 46: 357-359.
- BELLMANN, A. & N. MENKE (2005): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 6). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 45: 685-688.
- BELLMANN, A., S. REIMANN & J. ESSER (im Druck): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 10). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, im Druck.
- BELLSTEDT, R. & E. FICHTNER (1985): Wasserkäfer und Wasserwanzen (Coleoptera et Heteroptera) des Plothener Teichgebietes in Ostthüringen. – Herzynia N. F. 22: 250-258.
- BELLSTEDT, R. & A. SKALE (1998): Interessante Wasserkäferfunde in Thüringen und angrenzenden Bundesländern (Coleoptera). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 5: 163-167.
- BENICK, L. (1921): Beiträge zur Käferfauna des Nordelbischen Gebiets. – Archiv für Naturgeschichte A 12: 66-139.
- BENISCH, CH. & K. REISSMANN (2006): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz (Col.). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart), in Vorbereitung.
- BENSE, U. (1998): Ein Beitrag zur Holzkäferfauna von Nordwest-Sachsen. – Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Leipzig (Leipzig) 16: 56-84.
- BENSE, U. (2005): Ein Erstnachweis von *Cyrtolynchus capra* (GERMAR, 1824) (Col., Cerambycidae) für Südwestdeutschland. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 40: 15-16.
- BENSE, U. (2006a): Vergleichende Untersuchungen zur Totholzkäferfauna in buchendominierten Bannwäldern und Wirtschaftswäldern der Schwäbischen Alb. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg (Freiburg) 11: 5-74.
- BENSE, U. (2006b): Zur Totholzkäferfauna von laubholzreichen Sturmwurfflächen in Baden-Württemberg. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg (Freiburg) 11: 75-147.
- BENSE, U. (2009): Ergebnisse der Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 2001 an den Rand des Nordschwarzwalds bei Pforzheim. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 39-57.
- BERNHARD, D. (1999): Erstnachweis von *Opilo pallidus* (OL.) (Cleridae) für Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 46: 19.
- BERNHARD, D. (2003a): Bemerkenswerte Funde xylobionter Käfer aus Nordwest-Sachsen (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 31-37.
- BERNHARD, D. (2003b): Wiederfund von *Dermestoides sanguinicolis* (FABRICIUS) (Col., Cleridae) in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 204-205.
- BOHME, J. & J. HÖHNER (2001): Bemerkenswerte Käfernachweise (Coleoptera) im Nahetal zwischen Monzingen und Langenlonsheim. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 11: 33-41.
- BORCHERDING, R. (1994): Die Käferfauna zweier wärmebegünstigter Buchenwälder Norddeutschlands. Diplomarbeit. – Göttingen.
- BORDONI, A. (1982): Coleoptera Staphylinidae, Generalità – Xantholininae. – Fauna d'Italia 19: 1-434.
- BOWESTEAD, ST. (1999): A Revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palaearctic Region. – Instrumenta Biodiversitatis (Genf) 3: 1-203.
- BRAASCH, D., L. HENDRICH & M. BALKE (2000): Rote Liste und Artenliste der Wasserkäfer des Landes Brandenburg (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea part., Dryopoidea part. und Hydraenidae). – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 9: 1-35.
- BRAUN, A. & W. KUNZ (1991): Zweiter Beitrag zur mittelbadischen Wasserkäfer-Fauna. – Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz N. F. 15: 415-438.
- BRAUNS, M. (2003): Die Wasserinsektenfauna (Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera) der Buckau, einem Flämingbach in Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 5: 59-66.

- BRECHTEL, F. & H. KOSTENBADER (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. Stuttgart.
- BRENNER, U. (1997): Käferfunde des Jahres 1994 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 16: 17-28.
- BRENNER, U. (1998): Käferfunde des Jahres 1995 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 17: 45-59.
- BRENNER, U. (2000): Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 19: 17-27.
- BRENNER, U. (2001): Käferfunde der Jahre 1998 und 1999 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 20: 53-65.
- BRENNER, U. (2003): Käferfunde des Jahres 2000 aus Hessen. 11. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 22: 37-71.
- BRENNER, U. (2005): Käferfunde des Jahres 2001 aus Hessen. 12. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 24: 1-19.
- BRENNER, U. (2006): Käferfunde der Jahre 2002 und 2003 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 24: 41-62.
- BRENNER, U. (2007): Käferfunde der Jahre 2004 und 2005 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 25: 45-74.
- BRENNER, U. (2008): Käferfunde des Jahres 2006 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 26: 57-75.
- BRENNER, U. (2009): Käferfunde des Jahres 2007 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt) 28: 9-29.
- BRETZENDORFER, F. (2001): *Malthodes trifurcatus* KIESENWETTER (Col., Cantharidae) – Sicher in Baden-Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 136.
- BRETZENDORFER, F. (2002a): *Malthodes alpicola* KIESENWETTER, 1852 (Col., Cantharidae) – Neu für Württemberg und Luxemburg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 37: 63.
- BRETZENDORFER, F. (2002b): *Rhagonycha nigriceps* WALTJ., 1834 (Col., Cantharidae) – Nicht in Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 37: 63.
- BRETZENDORFER, F. (2006a): *Cryptophagus subfumatus* KRAATZ (Col., Cryptophagidae) nicht in Baden-Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 164.
- BRETZENDORFER, F. (2006b): Revision der Canthariden-Sammlung von A. v. d. Trappen. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 155-162.
- BRETZENDORFER, F. (2006c): *Malthodes crassicornis* (MAEKLIN) (Col., Cantharidae) – Fehlbestimmung. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 164.
- BRETZENDORFER, F. (2010a): *Phloeosinus aubei* (PERRIS, 1855) – neu für Württemberg (Col., Scolytidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 46: 46.
- BRETZENDORFER, F. (2010b): Fehlbestimmungen von *Rhagonycha atra* L. und *Rhagonycha elongata* FALL. Aus der Sammlung GLADITSCH (Col., Cantharidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 46: 136.
- BRINGMANN, H.-D. (1998): Die Bockkäfer Mecklenburg-Vorpommerns (Coleoptera: Cerambycidae). – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs 36: 201-226.
- BRITZ, R., H. GEBHARDT & Ch. BÜCKLE (2001): Seltene und faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 31-34.
- BRÜGGEMANN, F. (1873): Systematisches Verzeichniß der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten. – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 3: 441-524.
- BRÜGGEMANN, F. (1878): Fundorte von Käfern aus dem Herzogthum Oldenburg. – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 5: 579-596.
- BRUNK, I. (2008): Neue Nachweise von *Harpalus* (s. str.) *caspius* STEVEN, 1806 in Brandenburg (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 65.
- BRUNK, I., M. ELMER & Ch. BOHM (2010): *Polistichus comexus* (GEOFFROY in FOURCROY, 1785) – neu für Brandenburg (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 65-66.
- BÜCHE, B. (2000): A new fungivorous Deathwatch-beetle from Europe (Coleoptera, Anobiidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 96: 229-234.
- BÜCHE, B. (2003): Neumeldungen und Ergänzungen zu „Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000“. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 37-38.
- BÜCHE, B. & J. ESSER (1999): Faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43: 129-135.
- BÜCHS, W., F. KÖHLER & K. KOCI (1996): Zur Käferfauna des Naturraumes „Mittleres Ahrtal“ und ihr Beitrag zur ökologischen Charakterisierung vorhandener Biotoypen. – Beiträge zur Landschaftspflege Rheinland-Pfalz 17, im Druck.
- BURGARTH, K. (2003): Neue Käferfunde für unsere Heimatfauna. – Bombus (Hamburg) 3: 225-226.
- BURGARTH, K. (2005): *Epuraea ocularis* FAIRMAIRE – endlich angekommen. – Bombus (Hamburg) 3: 272.
- BURGARTH, K. (2010): Berichtigung zu „Neufunde von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Thüringen III“. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 262.
- BÜSSLER, H. (1995): Faunistik der Hydradephaga und Hydrophiloidea Westmittelfrankens – Teil II: Col: Halpidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Spercheidae und Hydrophilidae. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 44: 29-39.
- BÜSSLER, H. (2005): Die Holzkäferfauna der Laubwälder des Vorderen Steigerwaldes (Nordbayern) (Coleoptera: Xylobionta). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 7: 9-28.
- BÜSSLER, H. (2006): Der „Fremde“ – eine nicht erkannte sibirisch-nordasiatische Art (Coleoptera, Scolytidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 55: 29.
- BÜSSLER, H. & H. FUCHS (2006): 23. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 55: 11-19.
- CIUPA, W. (2004): Ein seltener Laufkäfer im Landkreis Aschersleben-Staßfurt gefunden: *Ophonus stictus* STEPHENS, 1828 (Col., Carabidae). – Halophila (Staßfurt) Heft 47: 10.
- CIUPA, W. & W. GRUSCHWITZ (1998): Käfer: Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Halophila (Staßfurt) 36: 8.
- CIUPA, W. & S. SCHORNACK (2001): Sechsbbeinige Besucher in der Koleopterologenstube. – Halophila (Staßfurt) 42: 3-4.
- CUCCUDORO, G. & I. LÖBL (1997): Revision of the Palaearctic rove beetles of the genus *Megarthus* CURTIS (Coleoptera: Staphylinidae: Proteinae). – J. Nat. Hist. 31: 1347-1415.
- CUPPEN, J. G. M. (2000): New and interesting water beetles from Hesse (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydraenidae). Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt/M.) 25: 147-155.
- CUPPEN, J. G. M., O. VORST & R. BELLSTEDT (1998): Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae). – Thüringer Faunistische Abhandlungen (Gotha) 5: 169-178.
- DEGEN, B. (1999a): Beiträge zur Käferfauna des Naturparks „Nosentiner/Schwitzer Heide“ – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburg (Rostock) 38: 109-144.
- DEGEN, B. (1999b): Neu- und Wiederfunde von Blattkäfern (Col., Chrysomelidae) Mecklenburg-Vorpommerns mit einer Übersicht bisher verschollener bzw. potentiell zu erwartender Arten. – Virgo (Schwerin) 4: 36-53.
- DEGEN, B. (2000): Daten zur Käferfauna des NSG Warnowseen. – Virgo (Schwerin) 4: 36-53.
- DEGEN, B., W. Ziegler & A. LEBENHAGEN (2002): Untersuchungen zur Käferfauna des Trebser Moores. – Virgo (Schwerin) 6: 21-38.
- DIETNER, K. (1976): Populationsdynamische Untersuchungen an Wasserkäfern zweier Hochmoore des Nordschwarzwaldes. – Archiv für Hydrobiologie 77: 375-402.
- DIETZE, R. (2001a): Wiederfund einer sehr seltenen Endomychide für Deutschland (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 132-133.
- DIETZE, R. (2001b): Zum Vorkommen von *Pelecotoma fennica* (PÄYKÜLL) in Sachsen-Anhalt (Col., Ripiphoridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 133-134.
- DIETZE, R. (2004a): Beiträge zur Käferfauna Sachsen-Anhalts (1): Zum aktuellen Vorkommen der Arten der Gattung *Trox* im Halleser Raum (Col., Trogidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 53-55.
- DIETZE, R. (2004b): Beiträge zur Käferfauna Sachsen-Anhalts (2): Aktuelle Funde halobionter und halophiler aquatiler Käfer im Becken des ehemaligen Salzigen Sees und der umgebenden Habitatstrukturen (Coleoptera). – Halophila (Staßfurt) Heft 47: 10-12.
- DIETZE, R. (2004c): Beiträge zur Käferfauna Sachsen-Anhalts (3): Aktuelle Nachweise von Anthiciden im Süden Sachsen-Anhalts

- (Col., Anthicidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 55-56.
- DIETZE, R. (2005): Beiträge zur Käferfauna Sachsen-Anhalts (5): Weitere Neu- und Wiederfunde (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 231-234.
- DIETZE, R. & S. SCHORNACK (1999): Coleoptera – Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7: 37-40.
- DIETZE, R. & S. SCHORNACK (2000): Aktueller Fund von *Aphodius tomentosus* (MÜLL.) (Col., Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 274.
- DIETZE, R. & Th. WOLSCH (2005): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 235-236.
- DÖBERL, M. (2000): Supplement zum Altinciteil von FREUDE/HARDE/LOISE „Käfer Mitteleuropas“ nach dem aktuellen Stand von Band 9, einschließlich der Nachtragsbände 14, 15 und Katalog (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 35-36.
- DÖBERL, M. & P. SPRICK (2009): *Luperomorpha* WEISE, 1887 in Western Europe (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 105: 51-56.
- DÖRING, W. (2000): Erstnachweis des Wimperbockes *Exocentrus punctipennis* MULSANT & GUILLÉBAU, 1856 (Col., Cerambycidae) bei Galenbeck in Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 100.
- DÖRING, Th. & M. KAISER (2000): *Harpalus luteicornis* (DUFT-SCHMID, 1812) – Wiederfund für Nordrhein-Westfalen (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 110: 220-221.
- DORN, K. (1925): *Elatér hjorti* RYE und *E. ferrugatus* LACORD. – Entomologisches Jahrbuch (Leipzig) 33/34: 128-129.
- DREES, M. (1998): Das Ennepetal als Lebensraum ripicoler Käfer. – Natur und Heimat (Münster) 58: 97-105.
- DREES, M. (2002a): Die Palpenkäfer des Raumes Hagen (Coleoptera, Pselaphidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 98: 137-146.
- DREES, M. (2002b): Westfälische Nachträge zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Coleoptera). – Decheniana (Bonn) 155: 117-118.
- DREES, M. (2003): Ein aktueller Nachweis von *Diachromus germanus* (Coleoptera: Carabidae) in Südwestfalen. – Decheniana (Bonn) 156: 308.
- DREES, M. (2009): Ein aktueller Nachweis des Bockkäfers *Xylotrechus antilope* im Ardey (Coleoptera: Cerambycidae). – Natur und Heimat 69.
- DREGER, F., F. KÖHLER & U. SCHULZ (2009): Weitere Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Brandenburgs im Rahmen von Biodiversitätsuntersuchungen in Kiefernforsten (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53: 50-51.
- DREGER, F., F. KÖHLER, U. SCHULZ & T. TAEGER (2002): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Brandenburgs im Rahmen von Biodiversitätsuntersuchungen in Kiefernwäldern (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 130-132.
- DRILLING, K. & K.-D. KLAAS (2006): *Lixus subtilis* BOHEMAN, 1836 (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae): Neufund für Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 165-166.
- DRILLING, K. & K.-D. KLAAS (2008): *Orsodacne cerasi* (Coleoptera, Orsodacnidae): Neufund für Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 219-220.
- DRUGMANN, D. (1993): A propos d'*Aleochara haematoptera* KRAATZ, 1858 et d'*Aleochara ripicola* MULSANT & REY, 1874 (Coleoptera Staphylinidae Aleocharinae). – Bull. Anns Soc. r. belge Ent. (Brüssel) 129: 145-150.
- EICHLER, R., J. ESSER & A. PUTZ (1999): Über neue und verschollene Käferarten aus Brandenburg (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43: 207-216.
- EICHLER, R., J. ESSER & A. PUTZ (2002): Neue Nachweise bemerkenswerter märkischer Käferarten (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 4: 27-48.
- EICHLER, R., J. ESSER & A. PUTZ (2003): Ergebnisse koleopterologisch-faunistischer Untersuchungen im Oberspreewald (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 5: 15-29.
- EICHLER, R. & A. PUTZ (2000): Ein Beitrag zur Käferfauna des NSG Greifenhainer Fließ und des NSG Kohlenmühlfließ südwestlich von Cottbus (Landkreis Spree-Neiße) (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 2: 23-44.
- EINWALLER, M. (2004): *Neomida haemorrhoidalis* (FABRICIUS) – neu für die Rheinprovinz und Nordrhein Westfalen (Coleoptera, Tenebrionidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 14: 7-8.
- EISINGER, D. (2001): Alte Käfernachweise aus dem Saarland von JEAN SAINTE-CLAIRE DEVILLE. Aus dem Archiv der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 11: 143-155.
- EISINGER, D. (2005): Bemerkenswerte Käferfunde im Saarland (Col., Staphylinidae, Clambidae, Mycetophagidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 13-15.
- EISINGER, D. (2006a): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna des Saarlandes (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 11-20.
- EISINGER, D. (2006b): Käferfunde am Tag der Artenvielfalt 2003 in Reden (Insecta: Coleoptera). – Delattinia (Saarbrücken) 30 (2004): 163-170.
- EISINGER, D. (2007): *Coproporus immigrans* SCHÜLKE, 2007 (Coleoptera, Staphylinidae) – Neu in der Rheinprovinz. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 14.
- ERBELING, L. & W. SCHULZE (1983): Coleoptera Westfalica: Familia Oedemeridae. – Abhandlungen des Westfälischen Museums für Naturkunde in Münster/W. (Münster) 45: 3-19.
- ERNST, W. H. O. (2006): Der Graslenkenrüssler *Sibinia sodalis* GERMAR, 1824 (Col., Curculionidae) auf Schwermetallrasen in Deutschland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 7-10.
- ESSER, J. (1998): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 44: 147-152.
- ESSER, J. (1999): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 2). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 44: 819-824.
- ESSER, J. (1999b): Über die Schimmelkäfer der Sammlung des Übersee-Museums Bremen nebst Bemerkungen zur Schimmelkäferfauna des Weser-Ems-Gebietes. – TenDenZen (Bremen) Supplement 1999: 71-104.
- ESSER, J. (2000): Zum Vorkommen verschiedener Käferarten in einem Berliner Mietshaus. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 2: 45-50.
- ESSER, J. (2001a): Käferfunde von der Insel Rügen – faunistisch bemerkenswerte Arten für Mecklenburg-Vorpommern (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 183-184.
- ESSER, J. (2001b): Weitere Käferfunde aus Berlin und der Mark (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 226-228.
- ESSER, J. (2001c): Bemerkenswerte Käferfunde aus Sachsen-Anhalt. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 228-230.
- ESSER, J. (2001d): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera) (Teil 3). – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 45: 171-173.
- ESSER, J. (2001e): Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 2). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 3: 65-67.
- ESSER, J. (2002a): Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 3). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 4: 45-47.
- ESSER, J. (2002b): Käferfunde von der Insel Rügen und Hiddensee – faunistisch bemerkenswerte Arten für Mecklenburg-Vorpommern (Teil 2) (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 267-269.
- ESSER, J. (2003): *Cryptophagus fuscicornis* STURM, 1845 – Neu für Baden-Württemberg (Col., Cryptophagidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 15.
- ESSER, J. (2005a): Nachträge und Korrekturen zur Käferfauna der Mark Brandenburg und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7: 53-60.
- ESSER, J. (2005b): Bemerkungen zu Käferfunden aus der Mark Brandenburg und Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7: 109-111.
- ESSER, J. (2005c): *Anisodactylus signatus* (PANZER, 1796) (Col., Carabidae) – ein Fund in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 46.

- ESSER, J. (2006a): Nachweise bemerkenswerter Käferarten aus der Mark Brandenburg und Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8: 121-126.
- ESSER, J. (2006b): Ein Fund von *Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946 in Thüringen (Coleoptera, Buprestidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 241.
- ESSER, J. (2006c): Funde von *Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946 und *A. derasofasciatus* LACORDAIRE, 1835 aus Sachsen (Coleoptera, Buprestidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 241.
- ESSER, J. (2007): Einige Nachweise faunistisch interessanter Käferarten aus Berlin und Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9: 61-63.
- ESSER, J. (2008): Bemerkenswerte Käferfunde aus Berlin und Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 10: 219-220.
- ESSER, J. (2010): Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburg und Berlins: Neu- und Wiederfunde, übersehene Arten, Korrekturen und neue Funde wenig gemeldeter Arten. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 12: 299-310.
- ESSER, J. (2011): Ergebnisse der Untersuchungen zur Entomofauna im Berliner Teil des Tegeler Fließtales – Käfer (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 13: 53-102.
- ESSER, J., B. BÜCHE & R. DEICHSEL (2006): Nachweise bemerkenswerter Käferarten aus der Mark Brandenburg und Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8: 223-232.
- ESSER, J. & K. H. KIELHORN (2005): Ergebnisse der Untersuchungen zur Insektenfauna auf der Berliner Bahnbrache Biesenhorster Sand – Käfer (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) Sonderheft 3: 29-76.
- ESSER, J. & I. LANDECK (2010): Drei Käferarten neu für die Brandenburger Käferfauna (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 12: 149-151.
- ESSER, J. & M. SCHNEIDER (2002): Käferfunde aus der Mark Brandenburg – faunistisch bemerkenswerte Arten. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 4: 39-44.
- FALKE, B. & T. ASSMANN (2001): Laufkäferuntersuchungen in nordwestdeutschen Hudewäldern und Hudelandschaften. – Angewandte Carabidologie Supplement II Laufkäfer im Wald: 51-54.
- FELDMANN, B. (2000): Wiederfund von *Thinodromus mannerheimi* KOLENATI (Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 96: 45.
- FELDMANN, B. (2001): Wiederfund von *Stenus stigmula* ER. für Rheinland-Pfalz (Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 97: 235.
- FELDMANN, B. (2006): Nachweis von *Atheta pfaundleri* BENICK in Westfalen (Staphylinidae). – Natur und Heimat (Münster) 66: 63-64.
- FICHTNER, E. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Dytiscidae (Insecta). – Faunistische Abhandlungen des Museums für Tierkunde Dresden (Dresden) 11: 1-48.
- FLECHTNER, G. (2000): 3.10 Coleoptera (Käfer). – In: FLECHTNER, G., W. H. O. DOROW & J.-P. KOPELKE (Hrsg.): Niddahänge östlich Rudingshain. Zoologische Untersuchungen 1990-1992. – Naturwaldreservate in Hessen (Wiesbaden) 5/2.2: 5-349.
- FLECHTNER, G. (2000b): *Orthocis linearis* (SAHLBERG, 1901) bei Lämmerspiel gefunden – Erstnachweis für Hessen (Coleoptera: Cisiidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (Frankfurt/Main) N. F. 21: 90.
- FLECHTNER, G. (2002): Die Rolle der Käfer beim Abbau von Buchen-Totholz in der Sturmwurffläche des Naturwaldreservates Weikerskopf/Vogelsberg – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung (Wiesbaden) 38: 123-145.
- FLECHTNER, G. (2003a): Der alte Dorfkorn von Eschborn-Niederhöchstädt (Hessen) als ein Lebensraum seltener Käferarten (Coleoptera: Meloidae, Curculionidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (Frankfurt N. F. 24: 141-142).
- FLECHTNER, G. (2003b): Neumeldungen und Wiederfunde verschollener Käferarten aus hessischen Naturwaldreservaten (Coleoptera). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (Frankfurt N. F. 24: 167-172).
- FLECHTNER, G. (2004): Die Pilzkäfer *Triplax lepida* (FALDERMANN, 1835) und *T. rufipes* (FABRICIUS, 1775) in Hessen – Indikatoren für geänderte Umweltbedingungen? (Coleoptera: Erotylidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (Frankfurt N. F. 25: 127-129).
- FLECHTNER, G. (2004b): Coleoptera (Käfer). – In: DOROW, W. H. O., FLECHTNER, G. & KOPELKE, J.-P. (2004): Naturwaldreservate in Hessen 6/2.2. Schönbuche. Zoologische Untersuchungen 1990-1992, Teil 2. – FIV Ergebnis- und Forschungsbericht 28/2: 5-126.
- FLECHTNER, G. (2005a): *Olisthaerus substriatus* (PAYKULL, 1790), ein für Deutschland neues Urwaldrelik (Coleoptera, Staphylinidae). – Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (Frankfurt N. F. 26: 147-148).
- FLECHTNER, G. (2005b): Diversität auf höchstem Niveau – Käfer im Naturwaldreservat Stirnberg. – Natur und Museum (Frankfurt M.) 135: 192-194.
- FLINDT, R. (2005): *Rhopalapion longirostre* (OLIV.) – Fund in Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 40: 138.
- FLINDT, R. (2010): Freilandfund von *Hexarthrum exiguum* (BOHEMAN, 1838) in Baden-Württemberg (Col., Curculionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 90.
- FLOSSMANN, S. (2009): Der Gefleckte Ulmenbock *Saperda punctata* (LINNAEUS, 1767), eine neue Bockkäferart für Thüringen (Col., Cerambycidae). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 16 (Gotha) 16: 57-60.
- FLOSSMANN, S. (2006a): Faunistisch interessante Funde von Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae) in Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 170-172.
- FLOSSMANN, S. (2006b): Nachtrag zu „Faunistisch interessante Funde von Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae) in Deutschland“. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 230-232.
- FRANK, J. & E. KONZELMANN (2002): Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000. – Naturschutz-Praxis Artenschutz (Karlsruhe) 6: 1-290.
- FRANK, J. (2009): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1981 nach Neresheim und Grobkuchen. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 23-38.
- FRANZEN, B. (1995): Zur Käferfauna der südlichen Eifel und des Moseltales (Ins., Col.). Bericht zu den Pfingstexkursionen 1992-1994. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 5: 3-74.
- FRENZEL, D. (2006): *Dromius kuntzei* POLENTZ, 1939 (Coleoptera, Carabidae) neu für Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 169-170.
- FRIEDRICH, H. (1993): *Licinus hoffmannseggii* PANZER, 1797 – Bestätigt für die Rheinprovinz (Col., Carabidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 3: 131-134.
- FRITZE, M.-A. & K. HANNIG (2010): Verbreitung und Ökologie von *Leistus montanus* STEPHENS, 1827 in Deutschland (Coleoptera: Carabidae). – Angewandte Carabidologie (Filderstadt) 9: 39-50.
- FRIETZLAR, F. (2001): *Longitarsus languidus* KUTSCH., *Cassida bergae* BORDY und *Cryptcephalus bameuli* DUHALDEBORDE – drei Arten der deutschen Fauna und weitere Nachträge zu Blattkäfern (Col., Chrys.) im Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 9-17.
- FRIETZLAR, F. (2003): Neue und interessante Blattkäfernachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae). Teil 3. – Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 9: 123-138.
- FRIETZLAR, F. (2009): Neue und interessante Blattkäfer-Nachweise aus Thüringen und anderen Bundesländern (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 5. – Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 14: 181-210.
- FUHRMANN, D. (2001): Zur Blatt- und Rüsselkäferfauna der Laub- und Strauchschicht der Stadt Oldenburg i. O. – Drosera (Oldenburg) 2001: 1-34.
- GEBHARD, H. (2002): *Xyleborus alni* (NISIMA) – Funde in Baden-Württemberg (Coleoptera: Scolytidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 37: 55-56.
- GEBHARD, H. (2003a): Wiederfund von *Carphoborus minimus* (F.) (Curculionidae, Scolytinae) für Deutschland. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 40.
- GEBHARDT, H. (2003b): Ausbreitung von *Taphrorychus villifrons* (DUFUR) (Coleoptera, Scolytidae) in Deutschland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 13: 45-46.
- GEILENKEUSER, W. (1896): Nachtrag zu dem „Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft“ von Oberlehrer C.

- Cornelius. – Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Elberfeld (Elberfeld) 8: 25-48.
- GEIS, K.-U. (1998): 67. Familie: Bostrichidae. – In: LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. 4. Supplementband. – Krefeld: 271-273.
- GEIS, K.-U. (2002): Gebietsfremde Splintholz- und Bohrkäfer, nach Mitteleuropa mit Importholz und anderen Gütern eingeschleppt. Eine Bestandsaufnahme (Coleoptera: Lycidae, Bostrichidae). – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt M.) Suppl. 10: 1-100.
- GEISSEN, H.-P. (2000): Streufunde von uferbewohnenden Laufkäfern der Roten Listen am Mittelrhein 1999 und 2000 (Col., Carabidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 10: 7-10.
- GEISSEN, H.-P. (2002): Erste Nachweise von *Dryophilus rugicollis* (Col., Anobiidae) in der Rheinprovinz. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 35-38.
- GEISSEN, H.-P. (2003): *Symbiotes gibberosus* (Col., Endomychidae) auch im Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 13: 43-44.
- GEREND, R. & M. MEYER (2007): *Leioptus femoratus* FAIRMAIRE, 1859 – ein für Mitteleuropa neuer Bockkäfer in Luxemburg und im Saarland (Col., Cerambycidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 3-6.
- GERMANN, CH., BAHR, F., BAYER, CH., BEHNE, L., MÜLLER, G., MÜLLER, U., SPRICK, P., STÜBEN, P. & WINKELMANN, H. (2005): Nachweis von *Pachyrhinus lethierryi* (DESBROCHERS, 1875) und *Otiorynchus crataegi* GERMAR, 1824 am Niederrhein (Deutschland: Rheinland) (Curculionidae: Entiminae: Polydrusini). – Weevil News (Mönchengladbach) 28: 3 S.
- GERSDORF, E. & K. KUNTZE (1957): Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens. – Ber. Naturhist. Gesellsch. Hannover 103: 101-136.
- GERSTMEIER, R. (1999): 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 48: 56-58.
- GERSTMEIER, R. (2000): 20. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 49: 54-58.
- GLADITSCH, S. (1970): *Ontholestes haroldi* EPPH. in Vorarlberg und Funde einiger anderer in Tirol und Vorarlberg seltener Käferarten. – Entomologisches Nachrichtenblatt (Wien) 17: 62-63.
- GLADITSCH, S. (1976): Die Käferfauna des Altrheingebietes Elisabethenwörth bei Karlsruhe (Baden). – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart 10/11: 51ff.
- GLADITSCH, S. (1978): Zur Käferfauna des Rußheimer Altrheingebietes (Elisabethenwörth). In: Landesnat. Natursch. Landschaftspfl. (Hrsg.): Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. – Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg 10: 451-522.
- GOLKOWSKI, V. (2006): Interessante Federflügler-Funde aus Mitteleuropa (Coleoptera, Ptiliidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 168-169.
- GOLKOWSKI, V. (2007): *Agriotes sordidus* (ILLIGER, 1807) (Coleoptera, Elateridae) in Norddeutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 232.
- GOLKOWSKI, V. (2008a): *Cercyon alpinus* VOGT, 1969 (Coleoptera, Hydrophilidae) in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 67.
- GOLKOWSKI, V. (2008b): Interessante Käferfunde aus Sachsen (1972 bis 2007) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 143.
- GOLKOWSKI, V. (2008c): *Acrotichis sanctaehelenae* JOHNSON, 1972 (Coleoptera, Ptiliidae) in Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 220.
- GOLKOWSKI, V. (2010): Interessante Käferfunde aus Sachsen (2) (2002 bis 2009) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 55.
- GOSSNER, M., F. KÖHLER & U. SIMON (2008): Bemerkenswerte Käferfunde aus Mittelschwaben und Oberbayern (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 209-211.
- GOTTWALD, S. & M. HORNBERG (2004): Ein Wiederfund von *Buprestis haemorrhoidalis* HERBST, 1780 sowie weitere bemerkenswerte Prachtkäferfunde in Brandenburg und Berlin (Coleoptera: Buprestidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 6: 47-54.
- GOTTWALD, S. & M. HORNBERG (2005): *Anthaxia podolica* MANNERHEIM, 1837 – neu für Brandenburg, nebst weiteren Bemerkungen zu einigen Prachtkäfern aus unserem Faunengebiet (Coleoptera: Buprestidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7: 103-108.
- GOTTWALD, S. & M. HORNBERG (2007): Neu- und Wiederfunde märkischer Prachtkäfer, sowie Anmerkungen zu weiteren Arten unserer Fauna (Coleoptera, Buprestidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9: 245-256.
- GRÄF, H. (2002): *Phyllodrepa melis* HANSEN, 1940 – neu für die Rheinprovinz (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae). – Coleo (Radevormwald) 3: 9-11.
- GRÄF, H. & K. KOCH (1981): Koleopterologische Untersuchungen zum Nachweis der Schutzwürdigkeit von Biotopten im Raum Nideggen/Nordeifel. – Decheniana (Bonn) 134: 91-148.
- GRÄMER, R. (1968): Die Verbreitung der Buntkäfer (Cleridae) in Sachsen. – Entomologische Berichte 1968: 115-118.
- GRUSCHWITZ, W. (1989): Bemerkenswerte und neue Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Col., Curc.). 2. Beitrag. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 33: 137.
- GRUSCHWITZ, W. (2002): *Anaspis palpalis* – für Sachsen-Anhalt neu und doch nichts Neues (Col., Scraptiidae). – Halophila (Staßfurt) 44: 4-5.
- GRUSCHWITZ, W. (2003): Käfer (Col., Staphylinidae; Chrysomelidae): Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Halophila (Staßfurt) 46: 14.
- GRUSCHWITZ, W. & S. SCHORNACK (1999): Käfer: Weitere Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Halophila (Staßfurt) 37: 8.
- GRUSCHWITZ, W. & S. SCHORNACK (2005): *Orthocerus clavicornis*, *Harmonia axyridis* und *Ceutorhynchus nyazii* – drei Käferneufunde in Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Colydiidae, Coccinellidae, Curculionidae). – Halophila (Staßfurt) 48: 13-14.
- GÜNTHER, I. & R. PESCHLE, R. (2001): 4.14 Sonstige Käfer (Coleoptera – excl. Carabidae), 203-210, 381-393. – In: Natur-Hof Chemnitz (Hrsg.): Pflanzen - Tiere - Lebensräume in Chemnitz. Ein Arten- und Biotopschutzkonzept. – Chemnitz.
- GÜRLICH, S. (2005): Bilanz einer zweijährigen Untersuchung zur Holzkäferfauna (Coleoptera) im Naturwaldreservat Dohlenwald (FA Radelübbe, Revier Lassahn). – Mitt. Forstl. Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin) Heft 6: 21-59.
- GÜRLICH, S. (2005b): Faunistisch bemerkenswerte Funde aus Untersuchungen zur Holzkäferfauna Hamburgs. – Bombus (Hamburg) 3: 269-272.
- GÜRLICH, S. (2006): *Stenichnus poweri* (FOWLER, 1884) neu für Niedersachsen und neu für Schleswig-Holstein (Col. Scydmaenidae). – Bombus (Hamburg) 3: 277-279.
- GÜRLICH, S. (2006b): *Xylostiba bosnica* BERNHAUER, 1902, und *Paraphloeostiba gayndahensis* (MACLEAY, 1871) – zwei für die Fauna Schleswig-Holsteins neue Kurzflügler (Col. Staphylinidae). – Bombus (Hamburg) 3: 279.
- GÜRLICH, S. (2006c): Erstfund von *Leiodes furva* (ERICHSON, 1845) für Schleswig-Holstein und weitere bemerkenswerte Funde von der Nordseeinsel Amrum (Col.). – Bombus (Hamburg) 3: 280-281.
- GÜRLICH, S. (Cono): Die Totholzkäfer des Naturwaldreservates Conower Werder: Bestandsaufnahme und Bewertung der Holzkäferfauna. – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern, in Vorbereitung.
- GÜRLICH, S. (User): Die Totholzkäfer des Naturwaldreservates Useriner Horst im Müritz-Nationalpark: Bestandsaufnahme und Bewertung der Holzkäferfauna. – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern, in Vorbereitung.
- GÜRLICH, S. (Vilm): Naturwaldreservat Insel Vilm: Bestandsaufnahme und Bewertung der Holzkäferfauna. – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern, in Vorbereitung.
- GÜRLICH, S. (Zipp): Naturwaldreservat Zippelower Holz: Bestandsaufnahme und Bewertung der Holzkäferfauna. – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern, in Vorbereitung.
- GUTKNECHT, Th. (2006): Kleine Mitteilungen. *Aspidapion validum* (GERM., 1817) – Erstnachweis in Baden (Col., Apionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 164.
- GUTKNECHT, Th. (2009): Bemerkenswerte Käferfunde aus der Familie Leiodidae im Rotenackeralwald bei Markgröningen. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 64.

- HAASE, P. & K. SCHINDEHÜTTE (2000): Die Ephemeropteren, Plekopteren, aquatische Coleopteren (partim) und Trichopteren des niedersächsischen Harzes: Faunistik und ökologische Anmerkungen. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 6: 85-102.
- HADULLA, K. (2001): *Cryptolestes pusilloloides* (STEV. HOWE) – Erstfund für Baden-Württemberg (Col., Laemophloeidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 74.
- HADULLA, K. (2002): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna der Rheinprovinz (Ins., Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 3-6.
- HADULLA, K. (2003): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna der Rheinprovinz (Ins., Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 13: 40-42.
- HADULLA, K. (2004): *Elmis obscura* (MÜLLER, 1806) – Neu für die Rheinprovinz (Coleoptera, Elmidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 14: 5-6.
- HADULLA, K. (2008a): Weitere bemerkenswerte rheinische Käfernachweise (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 18: 33-36.
- HADULLA, K. (2008b): Zur Käferfauna (Coleoptera) im Mündungsgebiet der Sieg bei Bonn. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 18: 57-80.
- HADULLA, K. (2009): *Monochamus saltuarius* GEBLER, 1830 – Erstfund für Baden-Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 10.
- HAESLOOP, U. (2001): Neue Schwimmkäferfunde (Coleoptera: Dytiscidae) im Großraum Bremen. – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 45 (1): 163-169.
- HAMERS, B. & F. KÖHLER (2005): *Xylotrechus rusticus* (L., 1758) und *Dorcadion fuliginator* (L., 1758) in der Teverener Heide bei Geilenkirchen (Coleoptera, Cerambycidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 17-20.
- HAMPEL, J. (2008): *Agonum viridicupreum* (GOEZE, 1777) und *Amara tricuspidata* DEJEAN, 1831 als Neu- bzw. Wiederfunde für Mecklenburg-Vorpommern (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 64-65.
- HANDEL, J. (2010): Maiswurzelbohrer in Nordrhein-Westfalen gefunden. – DGaE-Nachrichten (Halle) 24: 71-72.
- HANNIG, K. (1999a): *Harpalus flavescens* (PILLER & MITTERPACHER 1783) – wieder in Westfalen (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 109: 448-449.
- HANNIG, K. (1999b): *Elaphropus diabrachys* (KOLENATI 1845) – neu für Sachsen (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 109: 510-511.
- HANNIG, K. (2000a): Zur Verbreitung von *Agonum monachum* (DUFTSCHMID, 1812) in Deutschland (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 110: 186-188.
- HANNIG, K. (2000b): *Calathus cinctus* MOTSCHULSKY 1850 – auch auf den Ostfriesischen Inseln (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 110: 24-25.
- HANNIG, K. (2001): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil IV. – Natur und Heimat (Münster) 61: 97-110.
- HANNIG, K. (2002): *Amara (Curtonotus) gebleri* DEJEAN, 1831 – neu für Westfalen. – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 112: 332.
- HANNIG, K. (2004): Aktualisierte Checkliste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) Westfalens. Angewandte Carabidologie (Filderstadt) 6: 71-86.
- HANNIG, K. (2005a): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil VI. – Natur und Heimat (Münster) 65: 49-60.
- HANNIG, K. (2005b): *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) – neu für Niedersachsen (Col., Hydrophilidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 237.
- HANNIG, K. (2006a): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil VII. – Natur und Heimat (Münster) 66: 23-32.
- HANNIG, K. (2006b): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Nordrhein-Westfalen. – Natur und Heimat (Münster) 66: 105-128.
- HANNIG, K. (2006c): *Harpalus fuscicornis* MÉNÉTRIÉS, 1832 – Erstnachweis für Bayern (Col., Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 50: 94.
- HANNIG, K. (2008a): Verbreitung, Biologie und Bestandsentwicklung von *Agonum nigrum* DEJEAN, 1828 in Deutschland (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 118: 99-105.
- HANNIG, K. (2008b): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Nordrhein-Westfalen II. – Natur und Heimat, 68: 53-64.
- HANNIG, K. (2010): Verbreitung, Biologie und Bestandsentwicklung von *Leistus fulvibarbis* DEJEAN, 1826 in Deutschland (Coleoptera: Carabidae). – Angew. Carabidologie (Filderstadt) 9: 25-37.
- HANNIG, K. & S. BUCHHOLZ (2010): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Nordrhein-Westfalen III. – Natur und Heimat (Münster) 70: 73-86.
- HANNIG, K. & H.-J. GRUNWALD (2000): *Agonum scitulum* DEJEAN, 1828 – Wiederfund für Nordrhein-Westfalen (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 110: 123.
- HANNIG, K. & H.-J. GRUNWALD (2001): *Amara littorea* THOMSON, 1957 – Wiederfund für Nordrhein-Westfalen (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 111: 125.
- HANNIG, K. & M. KAISER (2006): Aktualisierte Checkliste der Laufkäfer Nordrhein-Westfalens mit Angaben zu den in NRW besiedelten Lebensräumen und Landesteilen. – Unpublizierter Bericht, LÖBF NRW (Recklinghausen).
- HANNIG, K. & CH. KERKERING (2001a): *Agabus erichsoni* GEMMINGER & HAROLD, 1868 – Wiederfund für Westfalen (Coleoptera, Dytiscidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 111: 232-233.
- HANNIG, K. & CH. KERKERING (2001b): *Agabus erichsoni* GEMMINGER & HAROLD, 1868 – Neu für die Rheinprovinz (Coleoptera, Dytiscidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 11: 141-142.
- HANNIG, K. & CH. KERKERING (2004): Erstnachweis von *Philorhizus quadrisignatus* DEJEAN, 1825 für Schleswig-Holstein sowie zwei weitere Fundorte von *Dromius meridionalis* DEJEAN, 1825 von Fehmarn (Coleoptera: Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 114: 263-264.
- HANNIG, K., A. PENNEKAMP & TH. ZEGULA (2007): Erstnachweis von *Sitaris muralis* (FOERSTER, 1771) für Westfalen (Coleoptera, Meloidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 3-6.
- HANNIG, K. & K. REISSMANN (2004): *Calodromius bifasciatus* (DEJEAN, 1825) – Neu für Deutschland (Col., Carabidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 14: 3-4.
- HANNIG, K. & K. REISSMANN (2005): *Ampedus elegantulus* (SCHÖNHERR, 1817) – Wiederfund für Nordrhein-Westfalen (Coleoptera, Elateridae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 5-8.
- HANNIG, K., K. REISSMANN & F. J. MEHRING (2002): *Amara strenua* ZIMMERMANN, 1832 (Col., Carabidae) – Ein weiterer Nachweis für das nördliche Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 29-30.
- HANNIG, K. & A. SCHWERK (2000): *Leistus fulvibarbis* DEJEAN, 1826 – neu für Westfalen (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 110: 315-316.
- HANNIG, K. & A. SCHWERK (2001): Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil III. – Natur und Heimat (Münster) 61: 5-16.
- HANNIG, K., W. STARKE & A. SCHWERK (1999): *Dyschirius angustatus* (AHRENS 1830) – wieder in Westfalen (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 109: 389-391.
- HANNIG, K. & E. WENZEL (2003): *Harpalus luteicornis* (DUFTSCHMID, 1812) und *Agonum dolens* (SAHLBERG, 1827) – Wiederfunde für Nordrhein (Insecta, Coleoptera, Carabidae). – Coleo (Radevormwald) 4: 45-49.
- HANSEN, M. (1997): Phylogeny and classification of the staphyliniform beetle families (Coleoptera). – The Royal Danish Academy of Science and Letters, Biologiske Skrifter (Kopenhagen) 48: 1-339.
- HARTMANN, M. (1989): Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes "Apfelstädter Ried" III: Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Lycidae, Cantharidae, Elateridae, Coccinellidae, Curculionidae. – Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt.
- HAUSTEIN, T. & C. VON LAAR (2007): Vorkommen von synanthropen Buntkäfern (Coleoptera, Cleridae) in Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 225-229.
- HECKES, U., M. HESS, G. HOFMANN, H. BUSSLER, A. SKALE, J. SCHMIDL & F. HEBAUER (2006): Regionalisierte und kommentierte Check-

- liste der Wasserkäfer Bayerns (Stand 2005). – Beiträge zur bayesischen Entomofaunistik (Bamberg) 8: 49-87.
- HEINIG, U. & K. HIELSCHER (2009): *Psylliodes attenuatus* (Koch, 1803) im Land Brandenburg (Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 11: 127-128.
- HEIMANN, K. (2007): Der Grüne Wacholder-Prachtkäfer *Palmaria festiva* (Linne, 1767) in der Oberrheinebene (Coleoptera, Buprestidae). – Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz (Freiburg) N. F. 20: 173-179.
- HEIMANN, K. & J. TRAUTNER (2002): *Notiophilus quadripunctatus* Dejéan, 1826 neu in Deutschland. – Angewandte Carabidologie (Filderstadt) 4/5: 117-120.
- HENDRICH, L. (2005): Verschleppung von *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) mit Schnittblumen/Tropfpflanzen (Col., Scarabaeidae) nach Berlin. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 150-151.
- HENDRICH, L. & M. BALKE (in Vorber.): Zum Vorkommen von *Hydroglyphus hamulatus* (Gyllenhal) in Nordostdeutschland (Col. Dytiscidae). – in Vorbereitung.
- HENDRICH, L. & R. MÜLLER (2006): Bemerkenswerte Nachweise der Hakenkäfer *Elmis aenea* (Müller, 1806) und *Elmis maugetii* Latreille, 1798 in Berlin und Brandenburg (Coleoptera, Elmidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8: 217-222.
- HENGSMITH, K. (2001): Erstnachweise von *Oedemera nobilis* (Scopoli) für Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen (Col. Oedemeridae). – Bombus (Hamburg) 3: 208.
- HENNICKE, S. (2004): *Tachyporus pallidus* Sharp, 1871 (Col., Staphylinidae) neu für Baden. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 206.
- HENNICKE, S., T. MARTSCHEI & G. MÜLLER-MOTZFELD (1997): Erste Ergebnisse der Erfassung ausgewählter Arthropodengruppen der Stadt Greifswald (Araneae, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Saltatoria). – Insecta (Bonn) 5: 51-100.
- HERBIG, D. (in Vorber.): Untersuchungen zu Biodiversität und Biotoptradition von urbanen und suburbanen Grünanlagen Bayerns anhand ihrer Insektenfauna in Eichenkronen (*Quercus robur* L.). – Dissertation, Freising.
- HERDER, F. V., M. HIMMELSTOSS & W. MEDICUS (1896). – In: Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen, angestellt in der bayrischen Rheinpfalz im Jahre 1895. Nach der Hoffmann-Ihne'schen Liste. – Mitteilungen der Pollichia (Bad Dürkheim) 54: 22-32.
- HERING, D. (1995): Nahrungsökologische Beziehungen zwischen limnischen und terrestrischen Zoozöosen im Uferbereich nordalpiner Fließgewässer. – Dissertation Marburg.
- HERRMANN, A. (1999): *Otiorynchus fuscipes* (Olivier) fehlbestimmt = *Otiorynchus meridionalis* Gyllenhal – neu für unser Gebiet. – Bombus (Hamburg) 3: 164.
- HERRMANN, A. (2003): *Omalium septentrionis* Thomson – neu für unser Gebiet. – Bombus (Hamburg) 3, 58-60: 240.
- HERRMANN, A. (2006): Zwei Funde von *Ptinus japonicus* Reitter, 1877, in unserem Gebiet (Col. Ptinidae). – Bombus (Hamburg) 3: 281.
- HERRMANN, A. (2007): Fund von *Attagenae brunneus* Faldermann, 1835, in unserem Gebiet (Col. Dermestidae). – Bombus (Hamburg) 3: 311.
- HERRMANN, A. & H. MEYBOHM (2001): Disjunkte Verbreitung von *Acalles echinatus* und *Acalles misellus* in Schleswig-Holstein (Col. Curculionidae). – Bombus (Hamburg) 3: 207-208.
- HERTZEL, G. (1969): Beitrag zur Kenntnis der aquatischen Käfer (Coleoptera) des „Hanfsees“ bei Schlotheim. – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Gotha (Gotha) 1969: 69-76.
- HESS, M., U. HECKES, A. SKALE, W. SONDERMANN & D. SPITZENBERG (1999): Die erste Gemeinschaftsexkursion der AG Wasserkäfer: Sammelergebnisse aus dem Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ bei Aken (Sachsen-Anhalt). – Informationsblatt der Arbeitsgruppe Wasserkäfer 2: 1-4.
- HIEKE, F. (2001): Das *Amara*-Subgenus *Xenocelia* subg. n. (Coleoptera: Carabidae). – Folia Heyrovskyana (Zlín) Supplement 7: 1-153.
- HILLERT, O. (2010): Faunistisch interessante Funde von Blatthornkäfern im Großraum Berlin (Coleoptera, Scarabaeidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 12: 143-147.
- HIMMELSTOSS, M. (1895). – In: Zusammenstellung der phänologischen Beobachtungen, angestellt in der bayrischen Rheinpfalz im Jahre 1894. Nach der Hoffmann-Ihne'schen Liste – Mitteilungen Pollichia (Bad Dürkheim) 53: 346-353.
- HOFMANN, G. (1997): Die Schwimmkäfer (Coleoptera, Hydradephaga) der Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg. – Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums Aschaffenburg 104: 71-107.
- HOFMANN, G. (2001): Das Verbreitungsbild von *Anemadus strigosus* (Kr.), *Thoracophorus corticinus* Motsch. und *Megopsis scabricornis* (Scop.) (Col.) – eine Folge ihrer Sommerthermophilie? – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 91-107.
- HOFMANN, G. & F. KÖHLER (2010): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Bayerns (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 71-75.
- HOLLMANN, M. (1884): Nachtrag zu Brüggemanns Verzeichniß der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten, mit besonderer Berücksichtigung der unter Ameisen gefundenen Käfer. – Abh. Naturw. Ver. zu Bremen 8: 477-497.
- HOLLNACHER, M. & H. RAHMANN (1990): Bioindikation für kleinere Stehgewässer auf der Basis faunistischer Untersuchungen. – Ökologie und Naturschutz (Bonn) 3: 183-204.
- HOLSTE, U. (1997): *Ophonus diffinis* (Coleoptera: Carabidae) im Diemeltal. – Natur und Heimat (Münster) 57: 65-66.
- HOLSTE, U. (1999): Neufunde von *Ophonus cordatus* Duftschmid, 1812 und *Ophonus signaticornis* Duftschmid, 1812 (Col., Carabidae) im Diemeltal und Leinetal. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Ostwestfälisch-lippischen Entomologen (Bielefeld) 15: 16-18.
- HOLTER, U. (2005): Erstnachweis von *Sulcacis bidentatus* für die Rheinprovinz (Coleoptera, Cisidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 21-22.
- HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer I, Adephaga Caraboidea, Krefeld, Düsseldorf.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band 2, Palpicornia-Staphylinioidea (außer Staphylinidae). – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben, 2 Bde., Stuttgart.
- HORION, A. (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macroductylia, Brachymera. München.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. VI: Lamellicornia. Überlingen.
- HORION, A. (1971): Familie Mordellidae. Kurze faunistische Zusammenstellung der mitteleuropäischen Arten. – Entomologische Blätter (Krefeld) 67: 137-146.
- HORNIG, U. (2000a): Beitrag zur Käferfauna im Grenzbereich des Oberlausitzer Berglandes zu Böhmen. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 9: 131-133.
- HORNIG, U. (2000b): *Hypopycna rufula* (Er.) erreicht Sachsen (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 57.
- HORNIG, U. (2000c): Notiz zu einer montanen *Cryptophagus*-Art in der Oberlausitz (Col., Cryptophagidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 203.
- HORNIG, U. (2001): Die *Anommatus*-Arten von Sachsen – *A. reitteri* Ganglb. und *A. dieckii* Rtt. neu für Ostdeutschland (Col., Bothrididae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 63-68.
- HORNIG, U. (2002a): Vorläufiges kommentiertes Verzeichnis der Throscidae (Coleoptera) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 58: 3-4.
- HORNIG, U. (2002b): Kommentiertes Verzeichnis der Rindenkäfer (Coleoptera, Cerylonidae et Colydiidae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida): 8-12.
- HORNIG, U. (2002c): Nachtrag zum Verzeichnis der Schwarzkäfer (Col., Tenebrionidae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida): 12-18.
- HORNIG, U. (2002d): *Trixagus leseigneuri* in Sachsen (Col., Throscidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 197.
- HORNIG, U. (2003): Kommentiertes Verzeichnis der Schwarzkäfer (Coleoptera, Tenebrionidae, einschließlich Alleculinae und Lagriinae) des Freistaates Sachsen – Erweiterte und aktualisierte Fassung. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 64: 3-10.

- HORNIG, U. (2005): Fauna der Throscidae der Oberlausitz (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 123-126.
- HORNIG, U. (2006): Anmerkungen zur sächsischen Fauna der Speckkäfer (Col., Dermestidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 50 (1/2): 89-90.
- HORNIG, U. (2007): Checkliste der sächsischen Cryptophagidae (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 123-127.
- HÖRREN, Th. (2010a): *Adalia conglomerata* (LINNÉ, 1758) – Neu für die Rheinprovinz (Col., Coccinellidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 3-4.
- HÖRREN, Th. (2010b): *Oryzaephilus mercator* (FAUVEL, 1889) in einer vermüllten Kölner Wohnung und aktuelle Freilandnachweise im nördlichen Rheinland (Col., Silvanidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 106-108.
- HÖRREN, Th. (im Druck): *Tychobythinus glabratus* (RYE, 1870) neu für das Rheinland und Nordrhein (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 21, im Druck.
- HÖRREN, Th. (in Vorber.): *Bruchidius imbricornis* (PANZER, 1795) neu für die Rheinprovinz und weitere bemerkenswerte Käferfunde in einer Kölner Kiesgrube (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 21, in Vorbereitung.
- HUBER, Ch., M.-A. FRITZE & Ch. MUSTER (2005): Über das Vorkommen von *Oreonebria picea* (DEJEAN, 1826) in Deutschland, Österreich (Vorarlberg) und Liechtenstein (Coleoptera, Carabidae, Nebrinae). – Entomologische Blätter (Keltner) 101: 107-114.
- HUBER, Ch. & R. MOLEND (2004): *Nebria (Nebriola) praegensis* sp. nov., ein Periglazialrelikt im Süd-Schwarzwald/Deutschland, mit Beschreibung der Larven (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Contributions to Natural History 4: 1-28.
- ICZN (1996): Opiion 1851. Xantholinini Er. 1839 and Quediini Kr., [1857] (Insecta, Coleoptera): given precedence over some senior synonyms; *Quediini* Str., 1829: *Staphylinus levicolis* BRULÉ, 1832 designated as the type species. – Bull. Zool. Nomencl. 53: 215-217.
- JÄKEL, A. & V. GOLLKOWSKI (2003): Nachweise von *Tasgius morsi-tans* (ROSSI, 1790) und *Philonthus ebeninus* (GRAVENHORST, 1802) für Sachsen (Col., Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 208-209.
- JAKOBITZ, J. & T. ZIESCHE (in Vorber.): Biodiversität in Eichenwirtschaftswäldern Nordostdeutschlands. – Forschungsbericht LFE Eberswalde, in Vorbereitung.
- JENDEK, E. (1995): Taxonomical notes on the *Agrilus betuleti* species group with description of two new species (Coleoptera: Buprestidae). – Koleopterologische Rundschau (Wien) 65: 171-178.
- JESSAT, M. (2001): Entomologische Besonderheiten der Bergbaufolgefäule „Phönix Nord“ im Altenburger Land (Odonata, Orthoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Erfurt) 8: 48-57.
- JUNG, M. (2001): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 37-46.
- JUNG, M. (2007): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt II. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 33-43.
- JUNG, M. (2007b): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt III. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 235-237.
- JUNG, M. (2010): Koleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt IV (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 146-149.
- JUNKER, M. (2001): Die Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 11: 73-103.
- JUNKER, M. (2009): Nachweise seltener Käferarten in der weiteren Umgebung von Bonn (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 19: 100-108.
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2005): Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 25-44.
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2010): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 27-38.
- KALIK, V. (1992): 45. Familie: Dermestidae. – In: LOHSE, G. A. & W. LUCHT (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. 2. Supplementband mit Katalogteil, 83-86.
- KATSHAK, G. (2000): *Monotoma bicolor* VILLA & VILLA und *Monotoma quadricollis* AUBE in der Rheinprovinz (Col., Monotomidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 10: 4-6.
- KATSHAK, G. (2008): Ein Freilandfund von *Euophryum confine* (BROUN, 1881) in Rheinland-Pfalz (Col., Curculionidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 18: 41-42.
- KATSHAK, G. (2009): *Atomaria scutellaris* MOTSCHULSKY, 1849 – neu für Deutschland (Col., Cryptophagidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 19: 20-22.
- KEITEL, M. & B. KLAUSNITZER (2002): *Clitostethus arcuatus* (ROSSI, 1794) in der Oberlausitz – neu für Sachsen (Col., Coccinellidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 133-134.
- KERKERING, Ch. & K. REISSMANN (2006): *Hydroporus scalesianus* STEPHENS, 1828 Wiederfund für die Rheinprovinz (Col., Dytiscidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 47-53.
- KIELHORN, K.-H. (2006): Wiederfund von *Dyschirius nitidus* (DEJEAN, 1825) in Brandenburg und *Elaphropus parvulus* (DEJEAN, 1831) in Berlin (Coleoptera, Carabidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8: 113-116.
- KIELHORN, K.-H. (2011): Wiederfund von *Nebria salina* FAIRMAIRE & LABOULBÈNE, 1854 in Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 13: 85-89.
- KIELHORN, K.-H., J. GEBERT & M. TROST (2007): Zur Ausbreitung von *Tachyura diabrachys* (KOLENATI, 1845) in Deutschland (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 207-210.
- KIELHORN, K.-H., D. W. WRASE, B. NICKEL & W. BEIER (2005): Ergänzungen und Korrekturen zur Roten Liste der Laufkäfer Brandenburgs. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7: 81-86.
- KIWIWITER, J. (1999): Ökologische Untersuchungen zur Entomofauna einer Kulturlandschaft (Botanischer Garten an der Universität des Saarlandes). – Saarbrücken, Diplomarbeit unveröff.
- KLAAS, K.-D., O. JÄGER & M. NUSS (2004): *Pinella aptera* GUÉRIN-MÉNÉVILLE, 1839 (Col., Ptiliidae): Wiederfund in Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 57-58.
- KLAUSNITZER, B. (1996): Kommentiertes Verzeichnis der Wassertreter (Haliplidae), Schlammchwimmer (Hygrobiidae), Tauchkäfer (Noteridae), Schwimmkäfer (Dytiscidae), Taumelkäfer (Gyrinidae), Buckelwasserkäfer (Spercheidae), Wasserkäfer im engeren Sinne (Hydrophilidae ohne Sphaeriidae und Helophorinae) des Freistaates Sachsen. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 34: 3-12.
- KLAUSNITZER, B. (2002a): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Deutschland (Col., Coccinellidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46, 3: 177-183.
- KLAUSNITZER, B. (2002b): Bemerkenswerte Coccinellidae (Col.) aus der Umgebung von Marienberg (Erzgebirge). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46, 3: 193-194.
- KLAUSNITZER, B. (2002c): *Phloeostichus denticollis* REDTENBACHER, 1842 – neu für Sachsen (Col., Phloeostichidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46, 3: 195.
- KLAUSNITZER, B. (2002d): Funde bemerkenswerter Carabidae in der Oberlausitz (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte 46, 3: 196.
- KLAUSNITZER, B., BELLSTEDT, R. & WEIGEL, A. (2003): Der aktuelle Stand des Wissens über die Scirtidae Thüringens (Coleoptera). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 9: 99-122.
- KLAUSNITZER, B. (2004): Bemerkungen zur Biologie und Verbreitung einiger Meloidae (Col.) in Mitteleuropa. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 261-267.
- KLAUSNITZER, B. (2005): Zur Biologie von *Bothrideres bipunctatus* (GMELIN, 1790) (Col., Bothrididae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 49, 1: 71-72.

- KLAUSNITZER, B. (2006): Zum zeitlichen und räumlichen Ablauf der Besiedlung des Freistaates Sachsen durch *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae). – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 77: 3-4.
- KLAUSNITZER, B. & KLAUSNITZER, U. (2009): Anmerkungen zur Biologie und zum Vorkommen von *Ipedia binotata* REITTER, 1875 (Coleoptera, Nitidulidae) sowie Beschreibung der Larven. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53: 241-248.
- KLAUSNITZER, B. (2011): Anmerkungen zur Scirtidenfauna von Brandenburg (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 13: 95-96.
- KLAUSNITZER, B., L. BEHNE, R. FRANKE, J. GEBERT, W. HOFFMANN, U. HORNIG, O. JÄGER, W. RICHTER, M. SIEBER & J. VOGEL (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 12: 1-252.
- KLAUSNITZER, U. (2005): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Sachsen (Col., Coccinellidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 49.
- KLEEBERG, A. & J. SCHMIDT (2010): Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen von Kleinhöhlenformen auf deren Arteninventar an Kurzflügelkäfern (Coleoptera, Staphylinidae). – Archiv Freunde Naturgesch. Mecklenburg 49: 105-129.
- KLEEBERG, A. (2001): Erstfund von *Dianous coeruleus* (GYLLENHAL) (Col., Staphylinidae) in Mecklenburg/Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 235.
- KLEEBERG, A. (2002): Aktuelle Verbreitung des Kurzflügelkäfers *Dianous coeruleus* (GYLL.) (Coleoptera, Staphylinidae) in Mecklenburg-Vorpommern. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs (Rostock) 41: 69-76.
- KLEEBERG, A. (2003): Faunistisch bemerkenswerte und für Mecklenburg-Vorpommern neue Arten der Kurzflügelkäfer (Col., Staphylinidae). Teil 1: Micropeplinae bis Tachyporinae. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs (Rostock) 43: 99-102.
- KLEEBERG, A. (2003b): *Phytos spinifer* CURTIS (Col., Staphylinidae) neu für Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 50.
- KLEEBERG, A. (2004): Kurzflügelkäfer *Bisnius parvus* (SHARP, 1874) und *B. pseudoparvus* (BRUNNE, 1976) (Coleoptera, Staphylinidae) in Mecklenburg-Vorpommern. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs (Rostock) 43: 99-102.
- KLEEBERG, A. (2004b): Ein aktueller Nachweis von *Emus hirtus* (LINNAEUS, 1758) und weiteren faunistisch bemerkenswerten Kurzflügelkäfern (Col., Staphylinidae) für Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 183-184.
- KLEEBERG, A. (2009): Faunistisch bemerkenswerte und für Mecklenburg-Vorpommern neue Arten der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) – Teil 2. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs (Rostock) 48: 159-177.
- KLEEBERG, A. & Th. BUSCH (2010): Käfer (Coleoptera) in Nestern von Ameisen (Hymenoptera: Formicidae) in Mecklenburg-Vorpommern unter besonderer Berücksichtigung der Kurzflügelkäfer (Staphylinidae). – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs (Rostock) 49: 5-104.
- KLINGER, R. (2000): Revision des *Otolelus pruinosus* (KIESENWETTER) mit Beschreibung einer neuen Art (Col., Aderidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 275-278.
- KNAPP, H. & J. RHEINHEIMER (2010): Ergebnisse der Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen in die nördliche Oberrheinebene 2006. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 91-132.
- KNAPP, H. (2003): Wenig gemeldete Käferarten aus Baden-Württemberg (Coleoptera). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 27-29.
- KNAPP, H. (2009): *Cypha punctum* MOTSCHULSKY, 1857 – Erstnachweis für Baden-Württemberg (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 58.
- KNOBBE, H. J. (2008): Beitrag zur Käferfauna (Coleoptera) Sachsen-Anhalts – Neu- und Wiederfinden von Arten. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 213-214.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. – Decheniana-Beih. (Bonn) 13, I-VIII: 1-382.
- KOCH, K. & H. GRÄF (1982): Nachtrag zur Koleopterenfauna des Bausenbergs (Eifel). – Decheniana-Beih. (Bonn) 27: 241-254.
- KOCH, M. (2006): Bemerkenswerte Blattkäferfunde aus dem südlichen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und der Pfalz (Coleoptera, Chrysomelidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 164.
- KOCH, M. (2009): Flohkäfer-Funde (Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae) aus der Umgebung von Werbach (Taubertal). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 11-13.
- KÖHLER, F. (1996): Eine neue Schwemmtechnik für faunistisch-ökologische Untersuchungen zu ripicolen Käferfaunen. – Entomologische Blätter (Krefeld) 92: 137-161.
- KÖHLER, F. (1997a): Bisher unbekannte Belege seltener Käferarten aus der Rheinland-Sammlung des Fuhlrott-Museums Wuppertal. Teil II: Lycidae bis Lucanidae (Ins. Col.). – Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal (Wuppertal) 50: 46-58.
- KÖHLER, F. (1997b): Bestandserfassung xylobionter Käfer im Nationalpark Bayerischer Wald (Insecta: Coleoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik (Bamberg) 2: 73-118.
- KÖHLER, F. (1999): Untersuchungen zur Totholz Käferfauna in Naturwaldreservaten und Wirtschaftswald-Vergleichsflächen in der Bayerischen Rhön (Coleoptera). – Beitr. Bay. Entomofaunistik (Bamberg) 3: 151-178.
- KÖHLER, F. (2000a): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 60-84.
- KÖHLER, F. (2000b): Vergleichende Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates „Mummelskopf“ im Pfälzer Wald. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv (Mainz) 38: 175-236.
- KÖHLER, F. (2001): Vergleichende Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates „Stelzenbach“ im Westerwald. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv (Mainz) 39: 193-235.
- KÖHLER, F. (2002): Neue Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) des Waldnaturschutzgebietes Geldenberg bei Kleve. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 71-111.
- KÖHLER, F. (2003): Vergleichende Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) in drei Naturwaldreservaten in Mecklenburg-Vorpommern. – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommerns (Schwerin) 4: 7-64.
- KÖHLER, F. (2004a): Vergleichende Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates „Katzenbacherhang“ im Saar-Nahe-Bergland. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv (Mainz) 42: 99-136.
- KÖHLER, F. (2004b): Die Totholz Käferfauna (Coleoptera) der Naturwaldreservate „Gimpelstein“ und „Holländerschlag“ in der Hordter Rheinaue in der nördlichen Oberrheinebene. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv (Mainz) 42: 137-178.
- KÖHLER, F. (2006a): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XIII (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 27-46.
- KÖHLER, F. (2006b): Käferfunde im rheinischen Frühjahrshochwasser 1995 (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 73-104.
- KÖHLER, F. (2008a): Vergleichende Untersuchungen zur Käferfauna (Coleoptera) von Weinbergsanlagen in Rheinland-Pfalz. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv (Mainz), im Druck.
- KÖHLER, F. (2008b): *Ocyptus pedemontanus* (J. MÜLLER, 1924) in Mitteleuropa (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 18: 43-48.
- KÖHLER, F. (2009): *Stelidota geminata* SAY, 1825 (Col., Nitidulidae) – eine neue Adventivart in Deutschland. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 6-8.
- KÖHLER, F. (2010a): Die Käfer (Coleoptera) des Naturwaldreservats Goldbachs- und Ziebachs (Hessen). Untersuchungszeitraum 1994-1996. – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung 11 (2.2.): 7-98.
- KÖHLER, F. (2010b): *Mycetoporus bosnicus* (LUZE, 1901) in Baden-Württemberg (Coleoptera, Staphylinidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 89.
- KÖHLER, F. (Arns): Effizienzkontrolle von Maßnahmen des Waldnaturschutzes im Wirtschaftswald: Untersuchungen zur Käferfauna (Coleoptera) an abgestorbenen Bäumen im Arnsberger Wald. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Birn): Naturschutzgroßprojekt Bienwald und Viehstrich – Neue Untersuchungen zur Totholz Käferfauna (Coleoptera) an 10 ausgewählten Standorten im Bienwald. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Bohn): Die Totholz Käfer der Naturwaldreservate Barkhorst (Forstamt Güstrow) und Bohnrath (Forstamt Schlemmin)

- sowie der Vergleichsfläche Strietholz. – Mitt. Forstl. Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), im Druck.
- KÖHLER, F. (Drei): Zur Totholzkäferfauna des Naturschutzgebietes „Dreiecksweiher“ im Düsseldorfer Stadtwald bei Düsseldorf-Hassels (Coleoptera). In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Eisc): Vergleichende Bestandserhebungen zur Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates Eischeid (Forstamt Daun). In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Eisc): Die Totholz-Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates Etscheid (Eifel, Forstamt Ahrweiler). – Mainzer Naturwiss. Archiv (Mainz) in Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Gund): Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera) in einem alten Weinberg bei Gundersheim in Rheinhessen. – in Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Hell): Bestandserfassung der Käferfauna der Naturwaldzelle „Hellberg“ bei Scherfede. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Holt): Bestandserfassung der Käferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzelle Nr.71 „Holter Wald“ bei Schloß Holte-Stukenbrock. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Isar): Untersuchungen zur Uferkäferfauna der Isar in München (Coleoptera). In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Länd): Bestandserfassungen zur Käferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzelle 72 „Laendem“ bei Hamm-Heesen. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Litt): Bestandserfassung der Käferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzelle Nr.11 „Littard“ bei Schaephuizen (Forstamt Wesel). In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Loch): Die Käferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates Locheiche bei Edertal-Gellershausen. – In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Naub): Vergleichende Untersuchungen zur Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates „Nauberg“ bei Hachenburg/Westerwald. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (NWZ9): Klimabedingte Veränderung der Totholzkäferfauna des nördlichen Rheinlandes und Wiederholungsuntersuchung in ausgewählten Naturwaldzellen. – In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Obpf): Die Totholzkäferfauna (Coleoptera) der oberpfälzer Naturwaldreservate Gitscher und Schwarzwihlberg, in Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Rüte): Die Totholzkäferfauna (Coleoptera) des Naturwaldreservates Rüterberg (Forstamt Conow). – Mitteilungen aus dem Forstlichen Versuchswesen Mecklenburg-Vorpommern, Heft 9/2008, im Druck.
- KÖHLER, F. (Sieb): Die Totholzkäferfauna (Coleoptera) der Naturwaldzellen „Nonnenstromberg“ und „Petersberg“ im Siebengebirge bei Königswinter. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. (Sieg): Faunistische Bestandserfassungen zur Käferfauna (Coleoptera) des Kreises Siegen-Wittgenstein. In Vorbereitung.
- KÖHLER, F. & G. FLECHTNER (2007): 3.7 Coleoptera (Käfer). – In: DOROW, W. H. O. & J.-P. KOPELKE (2007): Naturwaldreservate in Hessen. Band 7/2.2. Hohenstein. Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 2. – Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung (Wiesbaden) 42: 103-192.
- KÖHLER, F. & H. KINKLER (2010): Die Käferfauna (Coleoptera) des Naturschutzgebietes Gronenborner Teiche in Leverkusen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 39-80.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte Beiheft (Dresden) 4: 1-185.
- KÖHLER, F. & J. KÖHLER (2009): Nächtliche Käfernachtweisse (Coleoptera) an LKW-Tankstellen an der Autobahn 61 – ein Reisebericht. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 19: 23-38.
- KÖHLER, F. & G. KRUMM (2009): *Hypera striata* (BOHEMAN, 1834) am Kaiserstuhl – Wiederfund für Deutschland (Col., Curculionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 3-5.
- KÖHLER, F. & U. LEHMANN (2005): Zum Vorkommen von *Corymbia erythroptera* (HAGENBACH, 1822) in Deutschland (Col., Cerambycidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 151-152.
- KÖHLER, F. & M. NIEHUIS (2006): Käferfunde aus Malaisiefällen am Roßstein bei Dörscheid (Rheinland-Pfalz) – Ein Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna des Mittelrheintales (Insecta: Coleoptera). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau) im Druck.
- KÖHLER, F. & S. SCHARF (2010): Bemerkenswerte Käfernachtweisse im Niederrheinischen Tiefland bei Wesel (Ins., Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 15-26.
- KÖHLER, F. & H. TERLUTTER (2006): Nur zwei *Bythinus*-Arten in Nordrhein-Westfalen (Col., Staphylinidae, Pselaphinae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 23-26.
- KÖHLER, F. & Th. WAGNER (2010): Zur Käferfauna des unteren Moseltals (Coleoptera). Exkursion der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen nach Koblenz-Güls am 15. Mai 2010. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 109-131.
- KÖHLER, J. & F. KÖHLER (2009): *Anthaxia candens* (PANZER, 1789) und *Lathropius sepicola* (MÜLLER, 1821) – Wiederfunde für das nördliche Rheinland auf alten Streuobstwiesen (Col., Bupr., Laem.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 19: 13-19.
- KÖHLER, J. (2010): *Hydrochus megaphallus* VAN BERGE HENEGOUVEN, 1988 – Neu für die Rheinprovinz (Col., Hydrochidae). Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 5-14.
- KÖLKEBECK, T. (2010): Die Käferfauna (Coleoptera) eines Gartens in St. Augustin bei Bonn. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 20: 81-105.
- KÖLKEBECK, T. & H. BATHON (2005): Der erste deutsche Freilandfund des Australischen Marienkäfers *Cryptolaemus montrouzieri* (Coleoptera, Coccinellidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 23-24.
- KÖLKEBECK, T. & Th. WAGNER (2007): Die Käferfauna (Coleoptera) des Botanischen Gartens in Bonn im langjährigen Vergleich. – Decheniana (Bonn) 160: 217-248.
- KONZELMANN, E. (2001): *Epuraea (Haptoncus) ocularis* FAIRMAIRE an faulendem Kernobst in Baden, Württemberg und in der Pfalz (Coleoptera: Nitidulidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 35-43.
- KONZELMANN, E. (2006a): Neu und selten nachgewiesene Käfer aus Baden-Württemberg, *Carpelium gusarovii* GILDENKOV (Coleoptera, Staphylinidae) neu für Deutschland. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 83-92.
- KONZELMANN, E. (2006b): Käfer aus Genisten eines Winter-Hochwassers von der Murg bei Niederbühl (Rastatt) und vom Eberbach bei Haueneberstein (Baden-Baden). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 93-114.
- KONZELMANN, E. (2010): Käferfunde aus den Naturschutzgebieten Pleidelsheimer Wiesental und Altnacker im Kreis Ludwigsburg 1975-2008. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 3-78.
- KONZELMANN, E. & P. MALZACHER (2006): Die Käferfauna im Stadtgebiet von Ludwigsburg unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung von Substraten aus alten Laubbäumen und Bodenproben in deren unmittelbarer Umgebung. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 115-151.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2000): Neue Käferarten (Col.) für die Fauna Thüringens. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 241-251.
- KOPETZ, A. & A. WEIGEL (2003): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 9: 149-168.
- KOPETZ, A., A. WEIGEL & W. APFEL (2004): Neufunde von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Thüringen II. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 99-104.
- KOPETZ, A., A. WEIGEL & W. APFEL (2008): Neue Käferarten (Col.) für die Fauna von Thüringen II. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 231-240.
- KOSTENBADER, H. (2009): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 1997 ins Argental. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 14-22.
- KOSTENBADER, H. (2009): Bericht über die koleopterologische Exkursion 1996 zu den Missen im Nordschwarzwald bei Igelsloch, Kreis Calw. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 19-29.
- KOSTENBADER, H. & J. TRAUTNER (2008): Bericht über die koleopterologische Exkursion 1993 ins Taubertal bei Edelfingen. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 31-40.
- KRAUSE, R. (1978): Untersuchungen zur Biotopbindung bei Rüsselkäfern der Sächsischen Schweiz (Coleoptera, Curculionidae). –

- Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum Tierkunde Dresden 42: 1-201.
- KRÜGER, E. O. (2005): *Stenagostus rhombeus* (OLIVIER, 1790) nach mehr als 50 Jahren wieder im Raum Hannover gefunden. – *Bombus* (Hamburg) 3: 268.
- KRUMH, G. (2009): *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE, 1888) – eine neue Adventivart jetzt auch am Kaiserstuhl (Col., Chrysomelidae). – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 44: 5.
- KRUMMEN, H. (1997): Die phytophage Käferfauna einer Agrarlandschaft im Emsland. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 59: 133-145.
- KRUMMEN, H. (2002): Zoozönotische Veränderungen bei phytophagen Käfern auf jungen Düneninseln der südlichen Nordsee. *Drosera* (Oldenburg) 2002: 159-176.
- KRUMMEN, H. (2008a): Sukzessive Änderungen in phytophagen Käferzönosen nach naturnahem Rückbau einer Agrarlandschaft. – *Drosera* 2008: 43-61.
- KRUMMEN, H. (2008b): Phytophage Käfer der Ostfriesischen Inseln. – in NIEDRINGHAUS, R., V. HAESELER, P. JANIESCH (Hrsg.) (2008): Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln. – Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 11: 1-470.
- KULBE, J. & H. RINGEL (2002): Beitrag zur Bockkäferfauna Mecklenburg-Vorpommerns (Col., Cerambycidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 46: 247-250.
- KUNZE, M. & P. KACHE (1998): Zonationszönosen von Kurzflüglern am Flußufer Nordwestdeutschlands. – *Z. Ökol. Natursch.* 7: 29-43.
- LANGE, F. (2001): Interessante Käferbeobachtungen in Baden-Württemberg und Südhessen. – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 36: 109-112.
- LANGE, F. (2005): Interessante Käferbeobachtungen in Baden-Württemberg und Südhessen (2). – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 40: 17-22.
- LANGE, L. (2003): Bemerkenswerter Fund des Leuchtkäfers *Lamprohiza splendida* (LINNAEUS, 1767) in Mecklenburg-Vorpommern (Col., Lampyridae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 47: 50.
- LESEIGNEUR, L. (2005): Description de *Trixagus meyhohmi* n. sp. et note sur la morphologie des *Trixagus* du groupe carinifrons (Coleoptera, Throscidae). – *Bull. Soc. ent. France* 110: 89-96.
- LESEIGNEUR, L. & J. MERTLIK (2007): *Limontius minutus* (LINNAEUS, 1758) und *Limontius poneli* nov. sp., two twin species confused under one name (Coleoptera, Elateridae). – *Bulletin Mensuel* (Lyon) 76: 225-234.
- LESZINSKI, M. & M. DIECKMANN (2005): Erstnachweis von *Hydraena testacea* (CURTIS, 1830) (Col., Hydraenidae) für Brandenburg. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 49: 221.
- LIEBENOW, K. (2005): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) in Genthin und Brandenburg (Col., Coccinellidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 49: 222.
- LIEBENOW, K. (2007): *Sinoxylon sexdentatum* (OLIVIER, 1790) (Coleoptera, Bostrichidae) neu für Deutschland? – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 51: 53.
- LIEPOLD, K. (2003): Vergleichende Untersuchungen zur faunistischen und genetischen Diversität von Käferzönosen in genutzten und ungenutzten Bergmischwäldern des Bayerischen Waldes. – Dissertation Technische Universität München.
- LILLIG, M. (1999a): Die Schwarzkäfer des Saarlandes. Teil I: Die Unterfamilien Pimeliinae, Tenebrioninae und Diaperinae (Coleoptera: Tenebrionidae). *Delattinia* (Saarbrücken) 25: 33-56.
- LILLIG, M. (1999b): Die Schwarzkäfer (Coleoptera: Tenebrionidae) des Saarlandes. Teil II: Die Unterfamilien Lagriinae und Alleculinae sowie Nachtrag zu Teil I. – *Delattinia* (Saarbrücken) 26: 89-98.
- LILLIG, M. (2006): Die saarländischen Käfer der entomologischen Sammlungen im Zentrum für Biodokumentation (ZfB) in Landsweiler-Reden, Saarland (Insecta: Coleoptera). – *Delattinia* (Saarbrücken) 32: 267-278.
- LILLIG, M. (2010): *Nebrioporus canaliculatus* (LACORDAIRE, 1835) im Saarland. – *Delattinia* (Saarbrücken) 35-36: 393-395.
- LIPP, H. (1938): *Porthmidius austriacus* (SCHRANK), ein für die Mark neuer Schnellkäfer und seine Verbreitung. – *Märkische Tierwelt* 3: 221-228.
- LOBINGER, G., U. SKATULLA & M. BLASCHKE (2005): Borkenkäfer, Schwammspanner und Hallimasch prägten das Waldschutzzjahr 2004. – *LWF aktuell* (Freising) 2005, Heft 49: 3-5.
- LORENZ, J. (2000): Faunistisch interessante Käferfunde aus dem Dresdener Raum (1998/99) (Col.). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 44: 58.
- LORENZ, J. (2001a): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Col.). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 45: 230-234.
- LORENZ, J. (2001b): Die Holz- und Pilzkäferfauna in Dresden (Col.). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 45: 205-220.
- LORENZ, J. (2003): Zwei bemerkenswerte pilzbewohnende Käferarten aus Sachsen (Col., Nitidulidae, Staphylinidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 47: 44.
- LORENZ, J. (2005): Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Col.) für die Fauna Sachsens sowie weitere faunistisch bemerkenswerte Käfer nachweise 2001-2005. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 49: 195-202.
- LORENZ, J. (2006): Holz- und Pilzkäferfauna ausgewählter Schutzgebiete Sachsens. – *NSI-Projektberichte* (Dresden) 1/2006: 1-30.
- LORENZ, J. (2007a): *Leistesia seminigra* (GYLLENHAL, 1808) in Sachsen gefunden (Coleoptera, Endomychidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 51: 48.
- LORENZ, J. (2007b): *Polystichus comexus* (FOURCROY, 1785) in Sachsen gefunden (Coleoptera, Carabidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 51: 127-128.
- LÜCKMANN, J. & U. HOLSTE (2005): *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 – neu für Nordrhein-Westfalen (Coleoptera: Meloidae). – *Entomologische Zeitschrift* (Stuttgart) 115: 219-220.
- LUDEWIG, H.-H. (1998): Für Rheinland-Pfalz bemerkenswerte Laufkäferfunde (Coleoptera: Carabidae). – *Mainzer naturwissenschaftliches Archiv* (Mainz) 36: 209-215.
- MAKRANZCY, G. (2001): Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Ochtheophilus* Mulsant & Rey, 1856 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). – *Entomologische Blätter* (Kelttern) 97: 177-184.
- MALZACHER, P. (2005): Käfer vom Köchersberg bei Großbottwar. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna gehölzdominierter Landschaftsstrukturen im mittleren Neckarraum. – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 40: 57-96.
- MALZACHER, P. & E. KONZELMANN (2001): Die Käferfauna alter Parkbäume im Stadtgebiet von Ludwigsburg. Erstnachweis eines blinden Laufkäfers (Coleoptera: Carabidae, Bembidiinae, Anilinus) für Deutschland. – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 36: 45-61.
- MANDERBACH, R. & G. MÜLLER-MOTZFELD (2004): Eine neue *Bembidion*-Art aus Mitteleuropa: *Bembidion (Bembidionetolitzkyia) pseudascendens* n. sp. (Col., Carabidae, Bembidiini). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 48: 31-35.
- MARGGI, W. & J. MESSUTAT (2002): Erstfund von *Pterostichus (Argutor) leonisi* APPELBECK, 1904 in Deutschland. – *Angewandte Carabidologie* (Filderstadt) 121-122.
- MATERN, H.-D. (2004): *Thoracophorus corticinus* MOTSCH. 1837 und *Berginus tamarisci* WOLL., 1854 – neu für die Rheinprovinz (Col., Staphylinidae, Mycetophagidae). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 14: 14-16.
- MATERN, H.-D. & D. SIEDE (2001): *Cryptocephalus bameuli* DUHALDEBORDE 1999 (Coleoptera, Chrysomelidae) – eine neue mitteleuropäische Blattkäferart auch im Rheinland. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 11: 29-32.
- MAUS, Ch. (1983): Beiträge zur Käferfauna Spiekeroogs/I. – *Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz* (Freiburg) N. F. 13: 245-254.
- MAUS, Ch. (1986): Beiträge zur Käferfauna Spiekeroogs/II. – *Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz* (Freiburg) N. F. 14: 127-145.
- MAUS, Ch. (1998b): Bemerkenswerte *Otiorhynchus*-Funde aus Südwestdeutschland. – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 33: 60-64.
- MENKE, N. (2006): Untersuchungen zur Struktur und Sukzession der saproxylen Käferfauna (Coleoptera) an Eichen- und Buchentotholz. Dissertation Göttingen.
- MEYBOHM, H. (1999): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. 5. Teil. – *Bombus* (Hamburg) 3: 168-170.
- MEYBOHM, H. (2000): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. 6. Teil. – *Bombus* (Hamburg) 3: 181-183.

- MEYBOHM, H. (2001): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. 7. Teil. – *Bombus* (Hamburg) 3: 205-207.
- MEYBOHM, H. (2003): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. – *Bombus* (Hamburg) 3: 227-228.
- MEYBOHM, H. (2004): *Clambus lohsei* n. sp. aus der Umgebung von Hamburg (Coleoptera, Clambidae). – *Entomologische Blätter* (Keltern) 100: 13-18.
- MEYBOHM, H. (2005): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. 9. Teil. – *Bombus* (Hamburg) 3: 274-276.
- MEYBOHM, H. (2006): Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen (Col.). 10. Teil. – *Bombus* (Hamburg) 3: 289-290.
- MOLENDA, R. (2000): *Pterostichus negligens* (STURM, 1824) (Coleoptera, Carabidae) ein neues Glazialrelikt in der Eifel? – *Decheniana* (Bonn) 153: 205-210.
- MÖLLER, G. (2003): Xylobionte Insekten. – In: WINTER, S., H. SCHUMACHER, M. FLADE & G. MÖLLER: Naturschutzstandards für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. – Unver. Ber. Landesanst. Großschutzgeb. (Schwerin), 445 S.
- MÖLLER, G. (2003b): Der Veilchenblaue Wurzelhals-Schnellkäfer *Limonicus violaceus* im Norden des Landes Brandenburg und im Saarland. – *Delatinitia* (Saarbrücken) 29: 29-37.
- MÖLLER, G. (2005): Grunderfassung und Bewertung von Holz bewohnenden Käfern der FFH-Richtlinie in saarländischen FFH-Gebieten. – Saarbrücken, Gutachten LUA.
- MÖLLER, J. (2011): Wiederfund von *Leiposis punctulatus* (PAYKULL, 1800) in Brandenburg sowie weitere bemerkenswerte Nachweise von Bock- und Prachtkäfern (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae). – *Märkische Entomologische Nachrichten* (Potsdam) 13: 91-94.
- MOSBACHER, G. C. (1987): Insekten aus Borkenkäferfallen. II. Coleoptera excl. Scolytidae. – *Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland* (Saarbrücken) 19: 505-542.
- MÜLLER, A. (2006): *Attagenus smirnovi* ZJANTIEV, 1973 (Col., Dermestidae) – Neu für die Rheinprovinz. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 16: 21-22.
- MÜLLER, G. & U. MÜLLER (2001): Zur Käferfauna (Coleoptera) des Nahetales. Bericht über die Pfingstexkursion des Jahres 2000 der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 11: 111-137.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (2004): Die Käfer Mitteleuropas. Band 2. Adepaga 1. Carabidae (Laufkäfer). 2. (erweiterte) Auflage. Heidelberg.
- MUONA, J. (2002): *Trixagus leseigneuri* n. sp. (Coleoptera, Throscidae). – *Bull. Soc. ent. France* 107: 187-190.
- NAUMANN, E. (1989): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. Erste Ergänzungen. – *Mauritiana* 12: 331-355.
- NAUMANN, E. (1993): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. Zweite Ergänzungen. – *Mauritiana* 14: 243-254.
- NEUMANN, V., D. HEIDECHE, A. STUBBE & M. STUBBE (2000): Angaben zur Verbreitung der Fellkäfer (Col., Leptinidae) in Sachsen-Anhalt. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 44: 129-133.
- NEUMANN, V. & K. SCHNEIDER (2008): Faunistisch bemerkenswerte Nachweise aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg (Coleoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 52: 144.
- NEWTON, A. F. & M. K. THAYER (1995): *Protopselaphinae* new subfamily for *Protopselaphus* new genus from Malaysia, with a phylogenetic analysis and review of the Omaliinae Group of Staphylinidae including *Pselaphidae*. In: PAKALUK & SLIPINSKI (1995): 219-320.
- NICOLAI, V. & D. MACIANDER (2000): Kiefernholz als Überwinterungshabitat für Arthropoden nebst Erstmeldung von *Leptusa norvegica* (Col., Staphylinidae) für Brandenburg. – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 44: 171-174.
- NIEDRINGHAUS, R. (2008): Die Wasserkäfer der Ostfriesischen Inseln. – In: NIEDRINGHAUS, R., V. HAESELER & P. JANIESCH (Hrsg.) (2008): Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln. – *Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer* 11: 1-470.
- NIEDRINGHAUS, R. & B. ZANDER (1998): Die Kleingewässer der Ostfriesischen Inseln – Zustandsanalyse und ökologische Bewertung anhand der Flora/Vegetation und der Wirbellosenfauna. – *Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer* 3: 1-270.
- NIEHUIS, M. & G. MÜLLER (2002): *Agrilus derasofasciatus* LACORD. (Col., Buprestidae) neu in Nordrhein-Westfalen. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 12: 64-66.
- NIEHUIS, M. (2001): Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* (Landau) Beiheft 26: 1-604.
- NIEHUIS, M. (2001): Wiederfund von *Agrilus guerini* LAC. nach über 115 Jahren in der Rheinprovinz (Col., Buprestidae). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen* (Bonn) 11: 196-201.
- NIEHUIS, M. (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* (Landau) Beiheft 31: 1-711.
- NIEHUIS, M. & Th. MÜLLER (2005): Nachweise von *Anthaxia semicuprea* KÜSTER, 1851 (sensu Bily 1999) in Deutschland (Coleoptera, Buprestidae). – *Entomologische Blätter* (Keltern) 101: 65-68.
- NIEHUIS, M. & L. SEILER (2004): Erstnachweis des Buntkäfers *Tarsosestus univittatus* (ROSSI, 1792) in Rheinland-Pfalz. – *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* (Landau) 10: 695-698.
- NILSSON, G. (2003): Nachweis einiger nicht häufiger Rüsselkäfer für Mecklenburg-Vorpommern (Col., Curculionidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 47: 213-215.
- NILSSON, G. (2005): Neufunde von Rüsselkäfern in Mecklenburg-Vorpommern (Col., Curculionidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 49: 50.
- NILSSON, G. (2009): Zur Bionomie von *Mogulones euphorbiae* (BRISOUT, 1866) (Coleoptera, Curculionidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 53: 5-9.
- NOLTE, O. & D. KRIEGER (2008): Nachweis von *Saperda candida* FABRICIUS 1787 auf Fehmarn – eine weitere, bereits in Ansidlung befindliche, eingeschleppte Käferart in Mitteleuropa. – *DGaaE-Nachrichten* (Halle) 12: 133-136.
- NORDMANN, M. & M. HIELSCHER (1994): Zum Vorkommen der Laufkäfer auf der ostfriesischen Insel Norderney. – *Drosera* (Oldenburg) 88: 69-82.
- NÜSSLER, H. & E. JANTKE (1984): Zwei für die Fauna der DDR neue Schnellkäferarten (Insecta, Coleoptera, Elateridae). – *Faunistische Abhandlungen des Museums für Tierkunde Dresden* (Dresden) 12: 83-84.
- ORENDT, C. (1996): Biologische Indikation in Kleinfließgewässern der Dübener und Dahlemer Heide. – *Berichte des Umweltforschungszentrums Halle-Leipzig* 2.
- ORENDT, C. (1998): Macroinvertebrates and diatoms as indicators of acidification in forest spring brooks in a region of eastern Germany (Leipzig-Halle-Bitterfeld) highly impacted by industrial activities. – *Archiv für Hydrobiologie* 143: 435-467.
- PAKALUK, J. & S. A. SLIPINSKI (1995) (Hrsg.): *Biology, Phylogeny and Classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson*. – Warschau.
- PANKOW, W. (2010): *Nemosoma caucasicum* MÉNÉTRIÉS, 1832 (Coleoptera, Trogositidae) neu in Deutschland. – *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* (Stuttgart) 45: 87.
- PASNIK, G. (2006): A revision of the world species of the genus *Tachysa* ERICHSON, 1835 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – *Zootaxa* (Auckland) 1146: 1-152.
- PEETZ, F. (1937): Käfer im Hochwassergebiet. – *Decheniana* (Bonn) 95b: 71-82.
- PERSOHN, M. & M. KITT (2002): *Ophonus brevicollis* SERVILLE, 1821 (Coleoptera: Carabidae, Harpalinae) – Neu in Deutschland und erster gesicherter Nachweis in Mitteleuropa? – *Angewandte Carabidologie* (Filderstadt) 4/5: 111-116.
- PERSOHN, M. & H. LUDWIG (2002): Verbreitung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) im Süden von Rheinland-Pfalz nebst Anmerkungen zur Biologie und Ökologie der Arten. Teil 1: Allgemeiner Teil und Sandlaufkäfer (Cicindelidae). – *Mitteilungen der Pollichia* 89: 263-307.
- PERSOHN, M., A. MALTEN & K. WOLF-SCHWENNINGER (2006): Seltenheiten-Ausschuss der GAC – 1. Bericht. – *Angewandte Carabidologie* (Filderstadt) 7: 55-60.
- PESCHEL, R. (1991f): Käferaufsammlungen an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* (Bielefeld) 7: 49-64.
- PESCHEL, R. (1997): Die Coleopterenfauna des Kyffhäusergebietes in Thüringen (Bundesrepublik Deutschland) (Coleoptera, Carabidae). – *Lambillionea* XCVII: 10-26.

- PISCHKE, R. (2010): Weitere bemerkenswerte Käferfunde aus Sachsen – *Meligethes matronalis* AUDISIO & SPORNRAFT, 1990 und *Epiraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (Coleoptera, Nitidulidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 142.
- RIHDAGE, H.-O. & H. TERLUTTER (2003): Die Käfer des Naturschutzgebietes Heiliges Meer – Abhandlungen des Westfälischen Museums für Naturkunde (Münster) 65: 203-246.
- RIHDAGE, H.-O. & H. TERLUTTER (2006): Bemerkenswerte Käferfunde aus der Umgebung von Bad Berleburg (Hochsauerlandkreis). – Protokoll der 45. Arbeitsstagung der Coleopterologischen Arbeitsgemeinschaft im Westfälischen Museum für Naturkunde (Münster) 2006: 18-22.
- REIBNITZ, J. (1992): 1. Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg: Cerophytidae und Eucnemidae. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 27: 26-29.
- REIBNITZ, J. (1999): Verbreitung und Lebensräume der Baum-schwammfresser Südwestdeutschlands (Coleoptera: Cidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 34: 1-76.
- REIBNITZ, J. (2001): Sechzehn neue Arten für das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 137-140.
- REIBNITZ, J. (2005): *Aspidopion validum* (GERM.) sicher in Baden-Württemberg – *Alocentron curvirostre* (GYLL.) neu für Deutschland (Col., Apionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 40: 139.
- REIBNITZ, J. (2008a): *Cucujus cinnaberinus* sicher in Baden-Württemberg (Coleoptera: Cucujidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 16.
- REIBNITZ, J. (2008b): *Malthodes lobatus* neu für Baden-Württemberg (Coleoptera: Cantharidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 16.
- REIBNITZ, J. (2008c): *Migneuxia orientalis* RTT. auch in Baden-Württemberg (Coleoptera: Latridiidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 16.
- REIBNITZ, J. (2009): Neu- und Wiederfunde von Käfern in Baden-Württemberg. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 13.
- REIBNITZ, J. (2010a): *Cis chinensis* LAWRENCE, 1991 – neu für Baden-Württemberg (Col., Ciidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 46: 45.
- REIBNITZ, J. (2010b): *Ptinus dubius* STURM, 1837 – neu für Württemberg (Col., Ptinidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 46: 46.
- REIBNITZ, J. (2010c): *Cryptophagus labilis* ERICHSON, 1846 – weitere Funde aus Württemberg (Col., Cryptophagidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 90.
- REIBNITZ, J. & U. BENSE (2003): *Cicones undatus* GUERIN – neu für Baden-Württemberg (Col., Colydiidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 39.
- REIBNITZ, J. & W. SCHAWALLER (2006): *Cynaesus angustus* (LECONTE, 1851) (Coleoptera: Tenebrionidae), eine neue Adventivart in Mitteleuropa? Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 153-154.
- REIKE, H.-P. (2001): Moderkäfer (Col., Latridiidae) aus Borkenkäferpheromonfallen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 157-163.
- REIKE, H.-P. & D. ENGE, D. (2011): Die Dungkäferzönose (Coleoptera) einer Wasserbüffelweide bei Wendisch Waren (Mecklenburg-Vorpommern. – Naturschutz und Landschaftsplanung, in Vorbereitung.
- REIKE, H.-P., A. JÄKEL & U. M. RATSCHKE (2002): Erstnachweise von vier Käferarten in Sachsen (Col., Latridiidae, Elateridae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 127-128.
- REIKE, H.-P. & E. A. JUNKER (2002): *Dienerella argus* (REITTER, 1884): Erstnachweis für Bayern (Insecta, Coleoptera, Latridiidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 51: 21-25.
- REIKE, H.-P. & K. LIEPOLD (2004): Latridiidae aus dem Bayerischen Wald (Coleoptera, Latridiidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 100: 29-46.
- REIKE, H.-P., U. M. RATSCHKE, V. NICOLAI & A. JÄKEL (2005): Moderkäferzönosen (Col., Latridiidae) in ostdeutschen Kiefernwäldern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 207-214.
- REIKE, H.-P. & T. SOBCZYK (2007): Aktuelle Situation der Borkenkäfer (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Sachsen. – Sächsische Entomologische Zeitschrift (Dresden) 2: 55-76.
- REISSMANN, K. (2002): *Colydium elongatum* FABRICIUS 1787, Neufund für Nordrhein (Insecta, Coleoptera, Colydiidae). – Coleo (Radevormwald) 3: 17-26.
- REISSMANN, K. (2006): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna des nördlichen Rheinlandes und der Rheinprovinz (Insecta, Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 3-6.
- REISSMANN, K. (2008): Einige bemerkenswerte Käferlebensräume am Niederrhein (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 18: 49-56.
- REISSMANN, K., CH. BENISCH & H. KIPPENBERG (2008): *Gonioctena formicata* (BRÜGGEMANN, 1873), Neufund für Deutschland (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 43: 7-11.
- REIZEK, M. & K. HADULLA (2000): Bemerkenswerte Bockkäferfunde in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (Col., Cerambycidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 10: 11-22.
- RENNER, K. (1999a): Für Sachsen-Anhalt, Pfalz und Rheinland neue und bemerkenswerte Arten. – Entomologische Nachrichten und Berichte 43: 216.
- RENNER, K. (1999b): *Monotoma quadricollis* AUBÉ, 1837 aus Westfalen, Rheinland, Niederelbe, Thüringen und Kärnten (Coleoptera, Monotomidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 9: 78.
- RENNER, K. (1999c): Einige Käferfunde aus der Senne und dem Teutoburger Wald als Erst- oder Zweitnachweise für Westfalen (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen (Bielefeld) 15: 34-37.
- RENNER, K. (2000): *Epiraea ocularis* FAIRMAIRE, eine neue Adventivart in Deutschland (Coleoptera, Nitidulidae). – Coleo (Radevormwald) 1: 1-3.
- RENNER, K. (2002): Bemerkenswerte Käferfunde als Ergebnisse einer erfolgreichen Exkursionsaison. – Coleo (Radevormwald) 3: 1-8.
- RENNER, K. (2003a): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna VII (Coleoptera). – Entomologische Blätter (Kelttern) 99: 83-93.
- RENNER, K. (2003b): Drei bemerkenswerte Kurzflüglerfunde aus Baden (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 16.
- RENNER, K. (2004): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna VIII (Coleoptera). – Entomologische Blätter (Kelttern) 100: 145-154.
- RENNER, K. (2005a): Einige bemerkenswerte Funde von Käfern in der Pfalz (Coleoptera). – Coleo (Radevormwald) 6: 50-53.
- RENNER, K. (2005b): Faunistisch bemerkenswerte Käferfunde zwischen Schwarzwald und Rheinaue (Coleoptera). – Coleo (Radevormwald) 6: 61-65.
- RENNER, K. (2007): *Epistemus reitteri* CASEY, 1900, und *Acrotoma pseudotenera* (CAMERON, 1933) aus Brünkendorf im Kreis Lüchow-Dannenberg (Col. Cryptophagidae, Staphylinidae). – Bombus (Hamburg) 3: 298-299.
- RENNER, K. (2009): Einige bemerkenswerte Funde von Käferarten im östlichen Deutschland und westlichen Polen (Coleoptera, Ptiliidae, Staphylinidae, Latridiidae, Scolytidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53: 47-48.
- RENNER, K. (2011): Einige bemerkenswerte Funde von Käferarten in Baden, Rheinland-Pfalz und Westfalen (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55: 71-72.
- RENNER, K. & B. GRUNDMANN (1984): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna III. – Entomologische Blätter 80: 71-84.
- REINHEIMER, J. (2003): *Pachyrhinus lethierryi* DESBROCHERS in Südwestdeutschland (Coleoptera: Curculionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 17-18.
- REINHEIMER, J. (2009): *Trichopterapion holosericeum* GYLLENHAL, 1833 in Südwestdeutschland (Coleoptera, Apionidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 9-10.
- RIEDEL, A. & J. BASTIAN (2005): Der Asiatische Marienkäfer *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) (Col., Coccinellidae) – über den Stand seiner Ausbreitung in Mitteleuropa und Hinweise zu seiner Erkennung. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 40: 117-122.

- RINGEL, H. (2002): *Ceratopion basicorne* (ILLIGER, 1807) (Col., Apionidae) neu für Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 128-129.
- RINGEL, H. & J. HAMPEL (2003): Sonderstruktur Alt- und Totholz, Coleoptera, Bd.2, 1-60. – In: ALBERTI, G. & G. MÜLLER-MOTZFELD (Hrsg.): Bodenbiologische und ökofaunistische Untersuchungen zur Abschätzung von Wirkungen des Waldumbaus im nordostdeutschen Tiefland. – Unveröffentlichter Bericht, Universität Greifswald, 1-806.
- RINGEL, H., J. HAMPEL & G. MÜLLER-MOTZFELD (2007): Brachen und extensiv genutzte Äcker als Lebensraum für Käfer (Coleoptera). – Insecta (Bonn) 10: 113-122.
- RINGEL, H. & J. KULBE (2006): Bemerkenswerte Blattkäferfunde zur Aktualisierung der Check-Liste Mecklenburg-Vorpommerns (Col., Chrysomelidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 119-123.
- RINGEL, H. & G. MÜLLER-MOTZFELD (2002): Zur Käferfauna städtischer Gärten (Coleoptera diversa). – Insecta (Bonn) 8: 70-88.
- RINGEL, H. & M. PECHMANN (2005): Seltene und neue Bockkäfer für Mecklenburg-Vorpommern (Col., Cerambycidae). Archiv Freunde Naturgesch. Mecklenburg 44: 105-110.
- RINK, M. (2002): Käferfunde (Coleoptera) im Pündericher Sternental an der Mosel. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 39-44.
- RÖBEN (1908): Fünftes Nachtrag zum systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. – Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 19: 301-312.
- ROHWEDDER, D. (2006): Erstnachweis von *Rugilus mixtus* (LOHSE, 1956) für die Rheinprovinz und NRW (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 16: 72.
- ROPPEL, J. (2006): Importierte und einheimische Marienkäferarten (Col., Coccinellidae) in Süddeutschland. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 41: 82.
- ROPPEL, J. (2010): *Bothrideres bipunctatus* GMELIN, 1790 (Coleoptera, Bothrideridae) – Neufund im Kaiserstuhl. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 45: 88.
- ROSE, A. (2000): *Acrotoma pseudotenera* (CAM.) im Weser-Ems-Gebiet (Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 96: 23.
- ROSE, A. (2001): Räumliche und zeitliche Verteilungsmuster der Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) auf Nordsee-Düneninseln in unterschiedlicher Sukzessionsstadien. Dissertation. Oldenburg.
- ROSE, A. (2004): Die Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae excl. Scaphidiinae, Dasycterinae et Pselaphinae) der Sammlung „GEORG KERSTENS“, nebst aktualisiertem Verbreitungsstatus aller Arten des Weser-Ems-Gebietes. – Drosera (Oldenburg) 2004: 137-158.
- RÖSSNER, E. (1996a): Checkliste der Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) Thüringens. – In: Thüringer Entomologenverband (Hrsg.): Check-Listen Thüringer Insekten (Erfurt) 4: 47-52.
- RÖSSNER, E. (1996b): Morphologie und Verbreitung der „*Anisoplia villosa*-Gruppe“ in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Scarabaeoidea, Rutelidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 40: 119-123.
- RÖSSNER, E. (1997): Aktuelle Kenntnisse zur Faunistik einiger Blatthornkäfer (Col., Scarabaeoidea) in Thüringen. – Thüringer Faunistische Abhandlungen 4: 117-121.
- RÖSSNER, E. (1999a): Besonderheiten der Blatthornkäferfauna von Sachsen-Anhalt (Coleoptera, Scarabaeoidea). – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7: 3-8.
- RÖSSNER, E. (1999b): Faunistisch interessante Blatthornkäfer des Naturkundlichen Museums Mauritium Altenburg und Berichtigungen sowie Ergänzungen zur „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“ (Col., Scarabaeoidea). – Mauritiana (Altenburg) 17: 315-324.
- RÖSSNER, E. (1999c): Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col.: Scarabaeoidea) in Thüringen. – Thüringer Faunistische Abh. 6: 191-200.
- RÖSSNER, E. (2001): Aktuelle Nachweise gefährdeter und faunistisch interessanter Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Thüringen. – Thüringer Faunistische Abhandlungen 8: 179-183.
- RÖSSNER, E. (2003a): Berichtigung von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Ostdeutschlands (Col., Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 108-109.
- RÖSSNER, E. (2003b): Die Verbreitung von *Aphodius ater* (DE GEER, 1774) und *Aphodius convexus* ERICHSON, 1848, in Ostdeutschland und Mitteilung faunistisch interessanter Funddaten zu den Gesamtarealen beider Arten (Col.). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 113: 170-176.
- RÖSSNER, E. (2005a): Die Verbreitung von *Aphodius (Euorodalus) coenosus* (PANZER, 1798) und *Aphodius (Euorodalus) paracoenosus* BALTHASAR & HRUBANT, 1960 in Deutschland (Coleoptera, Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 115: 59-69.
- RÖSSNER, E. (2005b): Der Rosenkäfer *Tropinota hirta* (PODA, 1761) in Mecklenburg-Vorpommern und Nord-Brandenburg (Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniinae). – Virgo (Schwerin) 8: 34-37.
- RÖSSNER, E. (2006): „Neuheiten“ für die Fauna der Blatthornkäfer Deutschlands (Coleoptera, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 209-211.
- RÖSSNER, E. (2007): Die Arten der Untergattung *Agoliinus* A. SCHMIDT, 1913 in Deutschland bei Beachtung des Gesamtareals der Art (Coleoptera: Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 117: 263-275.
- RÖSSNER, E. (2008a): Berichtigung von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Ostdeutschlands (Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae). Ergänzung. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52: 147-148.
- RÖSSNER, E. (2008b): *Aphodius (Melinopteris) reyi* REITTER, 1882 – Erstfund für die Fauna Deutschlands und Mitteilung von Funddaten aus dem Gesamtareal (Coleoptera: Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 118: 113-116.
- RÖSSNER, E. (2008c): Faunistisch interessante Funde von Blatthornkäfern aus den bayerischen Alpen (Coleoptera: Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 118: 259-262.
- RÖSSNER, E. (2009): *Aphodius (Agoliinus) satyrus* REITTER, 1892 in den Allgäuer Alpen (Coleoptera: Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 119: 199-200.
- RÖSSNER, E. (2010a): Vorkommen und Verbreitung von *Aphodius (Agrilinus) constans* DUFURSCHMID, 1805 in einigen Ländern Mittel- und Westeuropas (Coleoptera, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 95-98.
- RÖSSNER, E. (2010b): Berichtigungen von Fundmeldungen über Blatthornkäfer für das Gebiet Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 145-146.
- RÖSSNER, E. & H. KALZ (2002): Aktuelle Exkursionsergebnisse zur Untersuchung der Blatthornkäfer-Fauna der Hänge des Oderbruchs und an der Unteren Oder. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 4: 49-64.
- RÖSSNER, E. & F.-T. KRELL (2000): *Amphimallon burmeisteri* BRENSKE, 1886: Designation des Lectotypus und Abgrenzung von *A. assimile* (Herbst, 1790) (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 96: 171-198.
- RÖSSNER, E. & F.-T. KRELL (2009): *Amphimallon ochraceum* (KNOCH, 1801) – offenbar kein Bestandteil der Fauna Deutschlands (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53: 31-39.
- RÖSSNER, E., J. SCHÖNFELD & D. AHRENS (2010): *Onthophagus (Palaeonthophagus) medius* (KUGELANN, 1792) – a good western palaearctic species in the *Onthophagus vacca* complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onthophagini). – Zootaxa 2629: 1-28.
- RÖSSNER, E. & J. SCHULZE (1999): Verbreitung der Gattung *Trichius* FABRICIUS, 1775 in Ostdeutschland (Col., Scarabaeidae, Trichinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43: 59-66.
- RÖSSNER, E. & K.-D. STEGEMANN (2005): Faunistisch interessante Funde von Blatthornkäfern in der Uckerländer Heide (Mecklenburg-Vorpommern) (Col., Trogidae, Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 53-54.
- RÖSSNER, E. & J. WEIPERT (2002): *Amphimallon atrum* (HERBST, 1790) in Thüringen (Coleoptera, Scarabaeidae: Melolonthinae). – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Gotha (Gotha) 22: 101-106.
- RÖSSNER, E. & D. WOOG (2006): Die Verbreitung von *Aphodius (Chilothorax) conspurcatus* (LINNAEUS, 1758) in Deutschland bei Beachtung des Gesamtareals der Art (Coleoptera: Scarabaeidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 116: 203-210.
- RÜCKER, W. (2003a): Neu für Deutschland *Corticaria longicornis* (HERBST, 1793). – Latridiidae (Neuwied) 1: 4.

- RÜCKER, W. (2003b): *Corticarina obfuscata* STRAND und *Corticarina lambiana* SHARP und deren Verwandtschaft (Coleoptera: Latridiidae). – Latridiidae (Neuwied) 1: 5-7.
- RÜCKER, W. (2005): *Melanophthalma taurica* (MANNERHEIM, 1844), ein Neufund für die Rheinprovinz (Col. Latridiidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 15: 16.
- RÜCKER, W. & C. JOHNSON (2007): Revision of *Melanophthalma taurica* (MANNERHEIM, 1844) species-group and description of three new species (Coleoptera: Latridiidae). – Latridiidae (Neuwied) 5: 11-24.
- RUSCH, J. (1993-1994): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde in der Niederlausitz. Teil II, Teil III. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz (Cottbus) 14: 57-88 und 15: 62-78.
- SCHAEFFLEIN, H. (1983): Zweiter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen. – Stuttgarter Beitr. Naturk. (Ser. A, Biol.) 361: 1-41.
- SCHÄFER, P. (2002): *Amara (Curtonotus) gebleri* DEJEAN, 1831 – neu für die Weser-Ems-Region (Col., Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 67-68.
- SCHÄFER, P. (2004): *Amara (Zezea) kulti* FASSATI, 1947 (Coleoptera, Carabidae) in Nordwestdeutschland: Ausbreitungsmuster und Phänologie. – Entomologie heute 16: 165-176.
- SCHÄFER, P. (2005): Ein aktueller Nachweis von *Amara pulpani* KULT, 1949 (Col., Carabidae) aus Westfalen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 226-227.
- SCHIAFFRATI, U. (1999): Zur Käferfauna am Edersee (Insecta, Coleoptera). – Philippia (Kassel) 9: 1-94.
- SCHIAFFRATI, U. (2001): Zur Käferfauna des Reinhardswaldes (Coleoptera; resp. Col. Xylobionta). – Philippia (Kassel) 10: 17-32.
- SCHIAFFRATI, U. (2010a): Ergänzungen zur Käferfauna Nord-Hessens und benachbarter Gebiete. – Philippia (Kassel) 14: 325-336.
- SCHIAFFRATI, U. (2010b): Urwaldrelikte im Reinhardswald. – Philippia (Kassel) 14: 337-374.
- SCHIAWALLER, W. (2001): *Sphaericus gibboides* BOELDEAU, 1854 (Col., Ptinidae) nach Württemberg eingeschleppt. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36.
- SCHIESCHIAT, L. (1980): Käferfänge am und im Herensee in Waren im Jahre 1976. – Zoologischer Rundbrief Bezirk Neubrandenburg 1: 45-47.
- SCHIEFERDECKER, H. (1967): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an aquatilen Käfern im NSG Ostufer der Müritz*. – Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 5: 15-30.
- SCHILSKY, J. (1909): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs. XIX + 212 S.
- SCHMAUS, M. (1955): Ein Beitrag zur Käferfauna des Hunsrücks. – Decheniana (Bonn) 108: 69-80.
- SCHMIDL, J. & H. BUSSLER (2004): 21. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 53: 24-30.
- SCHMIDL, J., H. BUSSLER & H. FUCIS (2005): 22. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 54: 21-29.
- SCHMIDT, A. (2002): Zur Käferfauna des ehemaligen Standortübungsplatzes Wetzlar-Magdalenhäuser (Coleoptera). – Hessische Faunistische Briefe (Darmstadt) 21: 53-70.
- SCHMIDT, G. & H.-U. SCHMIDT (1990): Ein ungewöhnlicher „Gast“ aus einem Bonsai-Bäumdchen: *Anoplophora malasiaca* THOMS. (Coleoptera: Cerambycidae). – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt/M.) 15: 69-75.
- SCHMIDT, J. (2004): *Amara pulpani* KULT, 1949 und *Amara nitida* STURM, 1825 (Col., Carabidae) kommen auch an der deutschen Ostseeküste vor. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48: 43-45.
- SCHMIDT, J. & S. BENEDIKT (2010): Zur Verbreitung des *Agonum scitulum* DEJEAN, 1828 (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 64.
- SCHMIDT, J., O. JÄGER, H. RINGEL & B. DEGEN (2007): Die Käfer der Conventer Niederung Ergebnisse einer faunistisch-ökologischen Erfassung in den Jahren 2005 und 2006 (Coleoptera). – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburg 46: 27-78.
- SCHMIDT, J., B. RUSSOW, A. KLEEBERG, O. JÄGER & G. HIRTIE (2004): Die Binnenlandsalzstelle bei Sülten (Mecklenburg-Vorpommern) – Geschichte, naturr. Ausstattung, Vegetation und Käferinventar. – Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburg (Rostock) 43: 103-147.
- SCHMIDT, L. & A. MELBER (2004): Einfluss des Heidemanagements auf die Wirbellosenfauna in Sand- und Moorheiden Nordwestdeutschlands. – NNA-Berichte 2/2004: 145-164.
- SCHMIDT, L., P. SPRICK, H.-H. HAILBOHM, J. WILLERS & Th. FORCKE (2000): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften (Braunschweig) 6: 103-122.
- SCHMIDT, L., P. SPRICK, R. THIEUNERT, H.-H. HAILBOHM & N. MENKE (2005): 4. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, ehemals Region Hannover (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen (Bielefeld) 21:1-24.
- SCHMIDT, R. (1913): Die Salzwasserfauna Westfalens. – Jahresberichte des westfälischen Provinzvereins für Wissenschaft und Kunst (Münster) 41: 29-94.
- SCHNITTER, P. (2007): Zum Vorkommen von *Amara gebleri* DEJEAN, 1831, *Bembidion monticola* STURM, 1825 und *Tachyura diabrychys* (KOLENATI, 1845) in Sachsen-Anhalt (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 234.
- SCHNITTER, P. & M. TROST (2003): *Chlaenius spoliatus* (ROSSI, 1790) wieder in Sachsen-Anhalt (Col., Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47: 205.
- SCHÖDL, S. (1993): Revision der Gattung *Berosus* LEACH. 3. Teil: Die paläarktischen und orientalischen Arten der Untergattung *Berosus* s.str. (Coleoptera: Hydrophilidae). – Koleopterologische Rundschau (Wien) 63: 189-233.
- SCHÖLLER, M. (2003): *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) überwintert in Berlin (Coleoptera, Coccinellidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 5: 30.
- SCHOLZE, P. (2007): Ein Beitrag zur Erfassung der Käferfauna Sachsen-Anhalts (Insecta, Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 51: 131-134.
- SCHOLZE, P. (2010): Neuere Aktivitäten und Ergebnisse bei der Kurzflügelkäfer-Erfassung (Coleoptera, Staphylinidae) im Bundesland Sachsen-Anhalt. – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 105: 73-91.
- SCHÖNE, A. (2004): *Xantholinus dissimilis* COIFFAT, 1956 (Col., Staphylinidae). – Erstnachweis für Sachsen-Anhalt. – Halophila (Staßfurt) 47: 9.
- SCHÖPKE, H. (1999): Aktuelle Nachweise interessanter aquatischer Coleopteren im Süden Sachsen-Anhalts. – Informationsblatt der Arbeitsgruppe Wasserkäfer 2: 5.
- SCHORNACK, S. & W. GRUSCHWITZ (2000): *Mesocoelopus niger*; *Ochina ptnoides* und *Opilo mollis* – neu für die Käferfauna um Staßfurt (Sachsen-Anhalt). – Halophila (Staßfurt) 41: 6.
- SCHORNACK, S. (2000): Aktueller Fund von *Aphodius tomentosus* (MÜLL.) (Col., Scarabaeidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 274.
- SCHUBERT, H. (1998): Untersuchungen zur Arthropodenfauna in Baumkronen. – Ein Vergleich von Natur- und Wirtschaftswäldern (Coleoptera, Araneae, Neuropterodea, Heteroptera). – Berlin.
- SCHÜLE, P. (2002): Erster sicherer Nachweis von *Asaphidion stierlini* (HEYDEN, 1880) (Col., Carabidae) in Deutschland. – Angewandte Carabidologie (Filderstadt) 4/5: 109-110.
- SCHÜLE, P. (2007): Die Laufkäfer (Col., Carabidae) der Teverener Heide bei Geilenkirchen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 81-100.
- SCHÜLKE, M. (1984): Neue und faunistisch bemerkenswerte Staphyliniden aus der DDR (Coleoptera), I. Staphylininae – Tachyporinae. – Entomol. Nachr. Ber. (Dresden) 28: 93-100.
- SCHÜLKE, M. (1998): Zur Identität einiger westpaläarktischer Arten der Gattung *Thinobius* KIESENWETTER, 1844 (Col., Staphylinidae, Oxytelinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 42: 127-146.
- SCHÜLKE, M. (1999a): Über *Sepedophilus nigripennis* (STEPIENS, 1832) (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Jena) 95: 55-60.
- SCHÜLKE, M. (1999b): Bemerkenswerte *Staphyliniden*-Arten aus einem Großseggenried bei Seilershof, Landkreis Oberhavel, Brandenburg (Coleoptera, Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 1: 63-64.
- SCHÜLKE, M. (2000): Untersuchungen zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Lordithon* THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae, Tachyporinae). – Koleopterologische Rundschau (Wien) 70: 87-111.

- SCHÖLKE, M. (2001a): Bemerkenswerte Funde von hygrophilen Staphylinoiden, besonders aus den Bundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Staphylinidae, Histeridae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 3: 43-55.
- SCHÖLKE, M. (2001b): *Ocalea rivularis* MILLER, 1851 in Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 3: 38.
- SCHÖLKE, M. (2001c): *Bryaxis curtisii curtisii* (LEACH, 1817) in Brandenburg wiedergefunden (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 3: 42.
- SCHÖLKE, M. (2002): Zur Taxonomie und Verbreitung von *Mycetoporus montanus* LUZE, 1901, einer holarktisch verbreiteten Art mit boreomontan disjunktem Verbreitungsbild in Europa (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter (Keltern) 98: 199-210.
- SCHÖLKE, M. (2007a): Drei neue Adventivarten der europäischen Staphylinidenfauna mit Bemerkungen zu *Coproporus colchicus* KRAATZ (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 102: 173-201.
- SCHÖLKE, M. (2007b): Aktualisierte Checklist der Staphyliniden Berlins und Brandenburgs mit Bemerkungen zur Bibliographie und Geschichte der Staphylinidenforschung in Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9.
- SCHÖLKE, M. (2008a): Neumeldungen von paläarktischen Tachyporinen und Ergänzungen zum „Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 2“ (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Linzer biologische Beiträge (Linz) 40: 927-942.
- SCHÖLKE, M. (2008b): Revision der *pusillus*-Gruppe der Gattung *Thinobius* KIESENWETTER mit Beschreibung von fünf neuen Arten (Staphylinidae, Oxytelinae, Thinobiini). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 103/104: 11-42.
- SCHÖLKE, M. (2008c): *Liodoria serricornis* (GYLLENHAL, 1813) (Coleoptera: Leiodidae) – ein erster sicherer Nachweis für Berlin/Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 10: 209-211.
- SCHÖLKE, M. (2009a): Über *Mycetoporus monticola* FOWLER und ähnliche mitteleuropäische Arten (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 105: 1-18.
- SCHÖLKE, M. (2009b): Zwei neue Arten der Gattung *Anotylus* THOMSON aus der Verwandtschaft von *A. complanatus* (ERICHSON) (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). – Linzer biologische Beiträge (Linz) 41: 2009-2024.
- SCHÖLKE, M. & M. KOCIAN (2000): Revision der Artgruppe des *Mycetoporus nigricollis* STEPHENS, 1835 (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomologische Blätter (Keltern) 96: 81-126.
- SCHULZ, B. (2002): *Agonum viridicupreum* (GOEZE, 1777); Wiederfund nach 111 Jahren und sein nördlichstes Vorkommen. – Bombus (Hamburg) 3: 214-215.
- SCHULZE, W. (1985): Ein Fund von *Oncomera femorata* (FABRICIUS, 1792) in Westfalen (Col., Oedemeridae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Ostwestfälisch-lippischen Entomologen (Bielefeld) 3: 51-52.
- SCHULZE, W. (1996): Mitteilungen zur Insektenfauna Westfalens VII (Lep., Nymphalidae, Lycaenidae; Col., Eucnemidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Ostwestfälisch-lippischen Entomologen (Bielefeld) 12: 75-84.
- SCHULZE, W. (2009): Entomologische Sammlungszugänge (Lep., Col.) für die Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen und das Naturkunde-Museum (namu) der Stadt Bielefeld mit Hinweisen zur mitteleuropäischen Käferfauna. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Ostwestfälisch-lippischen Entomologen (Bielefeld) 25: 17-24.
- SCHUNGER, I. (2001): Zur Holzkäferfauna des Bannwaldes Faulbach (Gemeinde Oberried) im Südschwarzwald mit Angaben zur Ökologie und Anatomie der Larve von *Prostomis mandibularis* (F.). – Tübingen (Diplomarbeit).
- SCHUNGER, I., R. BRITZ & CH. BÜCKLE (2001): *Eudectus giraudi* REDT., 1858 – Neu für Baden-Württemberg (Col., Staphylinidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36.
- SCHWARZWÄLDER, St. (1999): Habitatbindung von seltenen Laufkäfern in unterschiedlich gepflegten Waldschneisen. – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt) 24: 19-28.
- SIEBER, M. (1999a): *Elaphropus diabrachys* (KOLENATI, 1845) (Col., Carabidae) – neu für Sachsen! – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43: 240.
- SIEBER, M. (1999b): *Cryptalus intermedius* FERRARI (Col., Scolytidae) eine neue Borkenkäferart für Deutschland. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 240.
- SIEBER, M., W. HOFFMANN, W. RICHTER, U. HORNIG & B. KLAUSNITZER (2011): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Sachsens (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55: 63-65.
- SIEBER, M. & U. HORNIG (2009): Elateridae. – In: KLAUSNITZER et al. (2009): Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 12: 1-252.
- SIEBER, M. & B. KLAUSNITZER (2005): Neufunde von Käfern (Col.) für Sachsen und Deutschland aus der Oberlausitz. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 137-144.
- SILFVERBERG, H. (1982): Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. – Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistys, Helsingfors Entomologiska Byförening (Helsinki): 1-94.
- SKALE, A. (1995): Die Wasserkäferfauna (aquatische Coleoptera) des NSG „Tannbach-Klingefelsen“ Saale-Orla-Kreis/Thüringen. – Thüringer Faunistische Abhandlungen 2: 174-179.
- SKALE, A. & A. BELLSTEDT (2001): Interessante Funde aquatischer Käfer in Thüringen und angrenzenden Bundesländern (Coleoptera). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 8: 173-178.
- SKALE, A. & G. HOFMANN (2005): Interessante Käferfunde in der Umgebung von Gernsheim/Südhessen. – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt M.) 30: 29-38.
- SKALE, A. & A. WEIGEL (1997): Die Insektenfauna (Coleoptera, Lepidoptera, Saltatoria, Odonata, Trichoptera et Heteroptera) des NSG „Tannbach-Klingefelsen“ (Saale-Orla-Kreis, Thüringen). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 4: 139-172.
- SKALE, A. & A. WEIGEL (2001): Zur Käferfauna (Insecta: Coleoptera) der „Schlechtsarter Schweiz“ in Südhüringen (Landkreis Hildburghausen). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 8: 103-125.
- SOBCZYK, Th. & M. LEHMANN (2007): Zur Ausbreitung des Zweifarbigigen Thuja-Borkenkäfers *Phloeosinus auber* (PERRIS, 1855) in Ostdeutschland mit Anmerkungen zu *Phloeosinus thujae* und *Phloeosinus rudis* (Col., Curc.). – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 9: 55-60.
- SOBCZYK, Th. & W. HOFFMANN (2010): Der Gipskraut-Nelkenrüssler *Sibinia unicolor* (FAIRBAIRN, 1843), ein interessanter Fund in Sachsen (Coleoptera, Curculionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 53-54.
- SONDERMANN (in Vorber.): *Gerris (Gerris) asper* FIEBER, 1860: Vorkommen im Hessischen Ried. – Hessische faunistische Briefe (Darmstadt), in Vorbereitung.
- SONDERMANN, W. & F. ERDMANN (2002): Aquatische Coleoptera (Dytiscidae, aquat. Hydrophiloidea, Dryopoidea, aquat. Curculionoidea) und Heteroptera (Corixidae, Gerroidea) in der Pfalz (BRD: Rheinland-Pfalz). – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins (Frankfurt M.) 27: 161-180.
- SÖRENSSON, M. (2001): First find of *Acrotichis henrici* (MATTHEWS, 1872) in Germany. – Entomologische Blätter 97: 75-78.
- SÖRENSSON, M. (2007): Reviderad checklist över svenska fjärdingar med atta för landet nya arter. – Entomologisk Tidskrift 128: 185-202.
- SPARMBERG, H. (2008): LIFE-Projekt Binnenlandsaltstellen Nordthüringens – Ergebnisbericht zum Laufkäfer-Monitoring 2005/2007. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Gotha) 15: 106-123.
- SPRICK, P. (2000): Bemerkenswerte Käferfunde in Sachsen-Anhalt (Coleoptera) entlang eines Transektes zwischen Oebisfelde und Schönhäuser Damm (1992-1999). Teil 1: Diverse Käfer (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Ostwestfälisch-lippischen Entomologen (Bielefeld) 16: 1-42.
- SPRICK, P. (2009): Monitoring von Rüsselkäfern in Baumschulen, Staudengärtnereien und Hopfgärten – Ergebnisse des ersten Untersuchungsjahres (2008). – Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (Halle/Saale) 17: 197-205.
- SPRICK, P., H. KIPPENBERG, J. SCHMIDL & L. BEHNE (2003): Rote Liste und Artenbestand der Rüsselkäfer Bayerns. – Naturschutz und Landschaftsplanung 35: 179-191.
- SPRICK, P. & J. SCHMIDL (2004): Nachweise phytophager Käfer in Bayern (Coleoptera: Nitidulidae, Phalacridae, Chrysomelidae, Bruchidae et Curculionoidea), zugleich erster Nachtrag zur Liste

- bayerischer Rüsselkäfer. – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 114: 163-168.
- SPRICK, P. & J. SCHMIDL (2005): Checkliste der Rüsselkäfer Bayerns (Coleoptera: Curculionidae excl. Anthribidae, Platypodidae et Scolytidae). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik (Bamberg) 7: 77-95.
- SPRICK, P., L. SCHMIDT, A. LOMPE, J. ESSER, H.-H. HAHLEBOHM & J. WILLERS (2001): 3. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 6: 309-331.
- SPRICK, P., L. SCHMIDT, R. THEUNERT, H.-H. HAHLEBOHM & M. KOCH (2007): 5. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen („Hn“) (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Westfälischen Entomologen (Bielefeld) 23: 1-21.
- SPRICK, P. & H. TERLUTTER (2006): Funde bemerkenswerter phytophager Käfer in Westfalen und angrenzenden Gebieten (Col., div.) mit Anmerkungen zu aktuellen Ausbreitungsvorgängen und zum Status einiger Rüsselkäfer. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Westfälischen Entomologen (Bielefeld) 22: 33-83.
- STAUBUS, V. & Th. WAGNER (2007): Studien zur Bodenkäferfauna (Col.) des Grenzbachtales im Westerwald. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 17: 63-80.
- STAVEN, K. (2000): Zur Bockkäferfauna und zu bemerkenswerten Laufkäferarten am Elber-Berg bei Salzgitter. – Braunschweiger naturkundliche Schriften 6: 247-252.
- STEGEMANN, K.-D. (2005): Erstnachweis von *Trechus austriacus* DEJEAN, 1831 (Col., Carabidae) in Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 67.
- STOCK, K. (2001): *Chlorophorus annularis* F., 1787 (Col., Cerambycidae) – auch im Rheinland importiert. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 11: 139-140.
- STÖCKEL, G., R. BELLSTEDT & D. BRAASCH (1993): Zur Wasserkäferfauna der Halbinsel Fischland/Darß/Zingst sowie der Boddeninseln Großer Kirt und Oie. – Natur Natursch. Mecklenburg-Vorpommern 30: 53-57.
- STÜBEN, P. E. (1997): Rüsselkäferzönosen in aufgelassenen Ton- und Sandgruben. Anmerkungen zu Mosaik-Sukzessionen bei der Nutzung des geplanten Naturschutzgebietes Holter Heide bei Brüggen (Col., Curculionidae). – Decheniana-Beihefte (Bonn) 36: 185-216.
- STÜBEN, P. E. (2001): Isoliertes Vorkommen einer *Acalles micros*-Population in einem Buchenwald des Niederbergischen Landes (Curculionidae: Cryptorhynchinae). – Coleo (Radevormwald) 2: 1-14.
- STÜBEN, P. E. (2005): Zur Verbreitung von *Kykliacalles naviesi* (BOHEMAN 1837) und *Kykliacalles roboris* (CURTIS 1834) im Rheinland /Germany (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). – Weevil News (Mönchengladbach) 25: 9 S.
- STUCK, W. (2011): Ein aktueller Nachweis von *Cylindera (Cylindera) germanica* (LINNAEUS, 1758) für Brandenburg (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55: 73.
- STUMPF, T. (1990): Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Eifel im Raum Sötenich. – Rundschreiben der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn), 1990: 76-91.
- STUMPF, W. (2001): Interessanter Neufund des Schneiderbockkäfers in Thüringen (Coleoptera, Cerambycidae). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Erfurt) 8: 63.
- STUMPF, W. (2004a): Zur Kenntnis der Prachtkäferfauna Thüringens (Coleoptera, Buprestidae) – 1. Nachtrag. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Erfurt) 11: 32.
- STUMPF, W. (2004b): Beobachtungen und Funddaten von Prachtkäfern und seltenen Blatthornkäfern aus dem Jahr 2004 (Coleoptera: Buprestidae, Scarabaeidae). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Erfurt) 11: 33-35.
- SUIKAT, R. (2000): *Rhinoncus smreczynskii* WAGNER neu für unser Faunengebiet (Col. Curculionidae). – Bombus (Hamburg) 3: 189-190.
- SZALLIES, A. (2001): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg (3). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 128-132.
- SZALLIES, A. & F. AUSMEIER (2001a): *Elaphropus paulinae* n. sp. aus dem süddeutschen Alpenvorland (Coleoptera: Carabidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 65-67.
- SZALLIES, A. & F. AUSMEIER (2001b): Die Käferfauna von Kalkschutthalten – Eiszeit- und Warmzeit-Relikte der Schwäbischen Alb. Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 36: 67-73.
- TERLUTTER, H. (2003): Bemerkenswerte Funde phytophager Käferarten in Westfalen (Coleoptera: Nitidulidae, Chrysomelidae, Curculionidae). – Natur und Heimat (Münster) 63: 29-30.
- TERLUTTER, H., A. ROSE, K. REISSMANN & K. HANNIG (2009): Die Käfer (Insecta, Coleoptera excl. Carabidae) des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge (Kreise Coesfeld und Recklinghausen). – Abhandlungen des Westfälischen Museums für Naturkunde Münster (Münster) 71: 309-334.
- THEUNERT, R. (2001): Pflege- und Entwicklungsplan „Niedersächsischer Drömling“ – Schmetterlinge und Bockkäfer. – Ökologieconsult-Schriften 4: 3-129.
- THOMPSON, R. T. (2006): A revision of the weevil genus *Procas* STEPHENS (Coleoptera: Curculionidae: Erihiniidae). Zootaxa (Auckland) 1234: 1-63.
- TOLASCH, T. (2002): *Harmonia axyridis* (PALLAS) (Col. Coccinellidae) breitet sich in Hamburg aus – Ausgangspunkt für eine Besiedelung Mitteleuropas? – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 46: 185-188.
- TOLASCH, T. (2005): *Trogoxylon aequale* (WOLLASTON, 1867) in Hamburg und erstmals in Deutschland gefunden. Bombus (Hamburg) 3: 273.
- TOLASCH, T. (2007): Nachweis von *Sitaris muralis* (FORSTER, 1771) in Hamburg – Wiederfund nach 140 Jahren (Col. Meloidae). – Bombus (Hamburg) 3: 312.
- TRAUTNER, J. (2005): Laufkäfer. – In: FREY, W. und H. SCHINDLER (Bearb.) 2005: Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Osterentartierung“ Abschlussbericht. – Kaiserslautern, unveröffentlicht.
- VÁZQUEZ, X. A. (1993): Coleoptera. Oedemeridae, Pyrochroidae, Pythidae, Mycteridae. – In: Fauna Iberica 5. – Madrid.
- VOGEL, J. (2003): Eine neue Art der Gattung *Atheta* THOMSON aus Europa (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter (Kelttern) 99: 95-98.
- VOGEL, J. (2007a): *Bellatheta fabrica* (ROUBAL, 1928) – ein Erstnachweis für Deutschland mit Bemerkungen zu Synonymen (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 102: 101-105.
- VOGEL, J. (2007b): Drei neue *Atheta*-Arten für die Fauna von Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter (Schwanfeld) 102: 165-172.
- VOGEL, J. (2009): *Gabronthus thermarum* (AUBÉ, 1850) und *Cilea exilis* (BOHEMAN, 1848) in Sachsen (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53: 253.
- VOGEL, J. (2010): Neue, bemerkenswerte und revidierte Staphylinidae (Coleoptera) aus Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 213-246.
- VOGEL, J. & E. KONZELMANN (2010): *Atheta membranata* G. BENICK, 1974 – eine neue Art für Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 54: 99-101.
- VOGEL, J. & E. KONZELMANN (2011): *Chanoma vorbringeri* (BERNHAEUER, 1907) – Wiederfund für Deutschland seit 1930 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55: 33-36.
- VORST, O. & J. CUPPEN (2003): A third Palaearctic species of *Chaetarthria* STEPHENS (Coleoptera: Hydrophilidae). – Koleopterologische Rundschau (Wien) 73: 161-167.
- VORST, O. (1998): *Stenus annulipes* HEER neu für Deutschland (Staphylinidae). – Entomologische Blätter (Jena) 94: 114.
- VORST, O. (1999): *Monotoma quadricollis* AUBÉ, an overlooked species (Coleoptera: Monotomidae). – Koleopterologische Rundschau (Wien) 69: 153-156.
- WAGNER, Th. (1997): Die Käferfauna (Coleoptera) des Botanischen Gartens in Bonn. – Decheniana-Beihefte (Bonn) 36: 225-254.
- WAGNER, Th. (2002): Zur Käferfauna (Coleoptera) einer Kiesgrube im Neuwieder Becken. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 12: 45-63.
- WAGNER, Th. & H. WAGNER (2009): Studien zur Käferfauna der Wiedtalau bei Altenkirchen (Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) 19: 39-56.

- WEICHELBAUMER, E. (2003a): Käferfunde aus dem Landkreis Neuburg/Schrobenhausen und Umgebung. Teil 1 (Coleoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 52: 24-34.
- WEICHELBAUMER, E. (2003b): Käferfunde aus dem Landkreis Neuburg/Schrobenhausen und Umgebung. Teil 2 (Coleoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen (München) 52: 79-89.
- WEIGEL, A. (1996): Untersuchungen zur Holzkäferfauna (Coleoptera xylobionta) des Mittelwaldes im NSG „Gottesholz“ bei Arnstadt (Thüringen). – Insecta (Berlin) 4: 58-79.
- WEIGEL, A. (2005): Neu- und Wiederfunde sowie weitere bemerkenswerte Nachweise von Käferarten (Coleoptera) für die Fauna von Sachsen. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 49: 161-170.
- WEIGEL, A. & F. WOLF (2001): Bemerkenswerte Käferfunde (Col.) aus Mecklenburg-Vorpommern. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45: 51-58.
- WEIPERT, J. (2003): Bericht über die Sektionssitzung Coleoptera/überrige Insektenordnungen am 30.11.2002 im Rahmen der 80. Tagung Thüringer Entomologen in der Fachhochschule Erfurt. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Erfurt) 10: 27.
- WELCH, C. (1997): The British species of the genus *Aleochara* GRAVENHORST (Staphylinidae). – Coleopterist 6: 1-45.
- WENDT, H. (1980): Erstmalsiges Auftreten des Vorratsschädlings *Bruchidius tonkineus* (Pic, 1904) in der DDR (Col. Bruchidae). – Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 27: 317-318.
- WENZEL, E. (1997): Die Uferkäferfauna (Coleoptera) der Bever-Talsperre bei Hückeswagen im Bergischen Land. – Decheniana-Beihefte (Bonn) 36: 279-350.
- WENZEL, E. (2001): *Aleochara bellonata* KRASA, 1922 – neu für die Bundesrepublik Deutschland (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae). – Coleo (Radevormwald) 2: 32-34.
- WENZEL, E. (2003): Anmerkungen zur Käferfauna des NSG „Alter Rhein bei Bienen-Praest“ – Coleo (Radevormwald) 3: 50-67.
- WENZEL, E. (2005): Koleopterologische Bestandserfassung im Schlosspark Dilsdorf-Bennath mit dem Schwerpunkt der Erfassung xylobionter und xylophiler Käferarten (Ins., Coleoptera). – Coleo (Radevormwald) 6: 41-49.
- WENZEL, E. (2006): Koleopterologische Bestandserfassung im aufgelassenen Steinbruch Hofermühle-Süd bei Heiligenhaus. – Coleo (Radevormwald) 7: 17-90.
- WENZEL, E. & K. HANNIG (2001): Bemerkenswerte Käfernachweise auf dem Heimberg bei Schloßböckelheim an der Mittleren Nahe (Ins., Coleoptera). – Coleo (Radevormwald) 3: 69-114.
- WESSEL, A. (1878): Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands. – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 1: 367-394.
- WESTERMANN, F. (1997): Bemerkenswerte Funde potamobionter Elmidae und Ephemeroptera in Rheinland-Pfalz. – Lauterbornia (Dinkelscherben) 31: 67-72.
- WIEPKEN, C. F. (1886): Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichniß der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. – Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen (Bremen) 9: 339-354.
- WIEPKEN, C. F. (1897): Dritter Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichniß der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. – Abhandl. naturw. Ver. Bremen 14: 235-240.
- WINKELMANN, H. & CH. BAYER (2004): Neufunde, Wiederfunde und bemerkenswerte Arten der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidea) in Berlin und Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 6: 33-54.
- WINTER, K. (1991): Untersuchungen über die xylobionte Käferfauna in Niedersachsen. – NNA-Berichte (Schneverdingen) 4: 157-162.
- WINTERHAGEN, P. (2002): Erstnachweis des Rauchbraunen Nachtläufers – *Cymindis vaporariorum* (L. 1758) – in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau) 9: 1449-1452.
- WOLF, F. (1998): Funde neuer und seltener Wasserkäfer s.l. (Col.) in Mecklenburg-Vorpommern nebst einem Aufruf zur Mitarbeit. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 42: 101-102.
- WOLF, F. (1999): Ergänzungen zur „Entomofauna Germanica“ bezüglich der Gruppe der Wasserkäfer (s.l.) in Mecklenburg-Vorpommern mit ökologischen Angaben zu den Arten (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43: 51-52, 58.
- WOLF-SCHWENNINGER, K. (2003): Zur Verbreitung von *Harpalus subcylindricus* (DEJEAN, 1829) in Baden-Württemberg (Coleoptera: Carabidae). – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 38: 23-26.
- WOLF-SCHWENNINGER, K. & M. UHLIG (2005): *Erichsonius ytenensis* (SHARP, 1913) – Wiederfund in Deutschland und eine Übersicht zur Gesamtverbreitung und Biologie dieser Art (Coleoptera, Staphylinidae, Philonthina). – Entomologische Blätter (Keltern) 101: 1-12.
- WRASE, D., J. TRAUTNER & J. KIECHLE (2003): *Harpalus fuscicornis* MENÉTRÉS, 1832, und *Harpalus fuscipalpis* STURM, 1818: Differenzialmerkmale, Gesamtverbreitung und Vorkommen beider Arten in Deutschland (Coleoptera, Carabidae). – Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 113: 155-158.
- WURST, C. (2009): Bemerkenswerte Käferfunde in Baden-Württemberg. Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart (Stuttgart) 44: 59-63.
- WURST, C. & B. KLAUSNITZER (2003): 4.7 *Limoniscus violaceus* (P. W. J. MÜLLER, 1821). – In: PETERSEN et al.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. – Schr. Lansch.pflege Naturschutz (Bonn) 69 Bd. 1: 397-402.
- ZERCHE, L. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Thiasophila* KRAATZ, 1856 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). – Entomologische Blätter (Krefeld) 83: 91-114.
- ZERCHE, L. (1998): Phylogenetisch-systematische Revision der westpaläarktischen Gattung *Metopsia* WOLLASTON, 1854 (Coleoptera: Staphylinidae, Proteinae). – Beiträge zur Entomologie (Berlin) 48: 3-101.
- ZERCHE, L. (2000): Was ist *Staphylinus nigrophthalmus* BLOCK, 1799? Und andere Überraschungen oder: Ein Vorteil der neuen Nomenklaturregeln (Col., Staphylinidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 51-54.
- ZIEGLER, W. (2004): Sechster Nachtrag zur Käferfauna Schleswig-Holsteins und des Niederelbegebietes. – Bombus (Hamburg) 3: 243-252.
- ZIEGLER, W. (2006a): Neu- und Wiederfunde für die Käferfauna Mecklenburg-Vorpommerns (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 235-238.
- ZIEGLER, W. (2006b): Ergänzungen zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands aus Sachsen-Anhalt (Col.). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 50: 238.
- ZIEGLER, W. (2006c): Siebter Nachtrag zur Käferfauna Schleswig-Holsteins und des Niederelbegebietes (Col.). – Bombus (Hamburg) 3: 285-289.
- ZIEGLER, W. (2006d): *Cryphalus intermedius* FERRARI, 1867 – eine für Deutschland neue Käferart (Col. Scolytidae). – Bombus (Hamburg) 3: 282-283.
- ZIEGLER, W., R. SCHNACKENBECK & H. SIEMERS (2001): Bemerkenswerte Käferfunde aus der Umgebung von Gudow im Kreis Hzt. Lauenburg (Col. div.). – Bombus (Hamburg) 3: 197-199.

Manuskripteingang: 25.8.2011

Anschrift des Verfassers:

Frank Köhler
Strombergstraße 22a
D-53332 Bornheim

VEREINSNACHRICHTEN

Herzliche Einladung zur 19. Tagung Sächsischer Entomologen am 8. Oktober 2011

Gemeinschaftsveranstaltung der
Entomofaunistischen Gesellschaft e. V. und des
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung - UFZ

Veranstaltungsort

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ –
Leipziger Kubus, Leipzig, Permoser Str.

Erreichbarkeit

Mit **Kraftfahrzeug** über die Autobahn A 14, Anschlussstelle
Leipzig-Ost, Bundesstraße B6 in Richtung Zentrum. Das Park-
haus des Leipziger Kubus (Permoser Straße 15) befindet sich
direkt an der Permoserstraße, ca. 100m nach der Bahnunterfüh-
rung.

Achtung: In Leipzig gilt eine großräumige Umweltzone, die
nur mit der „grünen Umweltpaket“ befahren werden darf.
Fahrzeuge ohne diese Plakette können nur bis Paunsdorf-Cen-
ter fahren (kostenlose Parkplätze). Haltestellen der LVB befin-
den sich auf der östlichen Seite des Einkaufszentrums. Von dort
besteht die Möglichkeit mit der Buslinie 90 (Richtung Wahren)
bis zur Haltestelle Leonhard-Frank-Straße (direkt am Kubus)
oder der Straßenbahnlinie 3E (Richtung Knautkleeberg) bis zur
Kreuzung Permoserstraße/Torgauer Straße zu fahren, von dort
zu Fuß ca. 300m stadtauswärts oder mit Buslinie 90 Richtung
Sommerfeld/Paunsdorf-Center 1 Haltestelle. Pro Fahrt wird
eine Fahrkarte der Zone 110 benötigt.

Anreise mit Bahn

Tagungsteilnehmer benutzen vom Hauptbahnhof die Straßen-
bahnlinien Nr. 3 (Richtung Taucha) oder 3E (Richtung Som-
merfeld) bis Haltestelle Permoserstraße/Torgauer Straße, von
dort zu Fuß ca. 300m stadtauswärts oder mit Buslinie 90 Rich-
tung Sommerfeld/Paunsdorf-Center (1 Haltestelle).

Versorgungsmöglichkeit

Es wird im Haus eine kleine Pausenversorgung (Cate-
ring) angeboten.

Vorläufiges Vortragsprogramm

Eröffnung und Begrüßung: 10.00 - 10.20 Uhr

MARTIN WIEMERS, OLIVER SCHWEIGER & JOSEF SETTELE:
Entomologische Forschung zum Klimawandel (vor
allem am Beispiel von Tagfaltern)

JENS KIPPING:

Das ENL-Projekt Pleißeau Altenburger Land, ein Na-
turschutzprojekt nicht nur für den Wiesenknopf-Amei-
senbläuling

BERNHARD KLAUSNITZER:

Die Käferfauna Sachsens – ein Überblick

Mittagspause: 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr

RONALD SCHILLER:

Geschichte der Insekten Sammlungen des Naturkunde-
museums Leipzig

JÖRG GEBERT:

Callisthenes reticulatus eine Art mit hoher Verantwort-
lichkeit Deutschlands

DIETMAR KLAUS, RAIK MORITZ & HOLGER LUEG:

Heuschrecken Sachsens – Probleme und Arbeitsstand
(Arbeitstitel)

Ende: gegen 16.00 Uhr

Die Tagungsgebühr beträgt 5,- €

UMSCHLAGBILDER

Titelbild

Zum Artikel: F. KÖHLER: Nachtrag zum „Verzeichnis
der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER) (Co-
leoptera). S. 109-174.

Der Rüsselkäfer *Otiorhynchus salicicola* HEYDEN, 1908
wurde aus Norditalien importiert und über den Handel
mit Gartenpflanzen in den Niederlanden und Deutsch-
land eingebürgert (HEIJERMAN et al. 2003, KÖHLER 2006,
SPRICK 2009). Foto: F. KÖHLER.

4. Umschlagseite

Bild 1: Der Schwarzkäfer *Cynaëus angustus* (LECONTE,
1851), nach Europa aus den USA eingeschleppt, ist
mittlerweile auch am Oberrhein (Elsass, Baden, Pfalz)
etabliert (REIBNITZ & SCHAWALLER 2006). Foto: F. KÖH-
LER.

Bild 2: Der südeuropäisch verbreitete Stachelkäfer
Mordellochroa milleri (EMERY, 1876) ist nach Bayern
und Baden eingewandert (FUCHS & KÖHLER in Vorberei-
tung). Foto: F. KÖHLER.

Bild 3: Der in Bayern und Hessen seit über 100 Jahren
verschollene südeuropäisch verbreitete Mistkäfer
Aphodius satellitius (HERBST, 1789) wurde in Rheinhes-
sen-Pfalz mehrfach im Rahmen der Bienwald-Exkur-
sionen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopte-
rologen 2006 bis 2010 gefunden. Foto: F. KÖHLER.

Bild 4: Der westeuropäisch verbreitete Kurzflügler
Ocypus pedemontanus (J. MÜLLER, 1924) vertritt links-
rheinisch die östliche Schwesterart *Ocypus tenebrico-
sus* (KÖHLER 2009). Foto: F. KÖHLER.

BAND 55 HEFT 2/3
JAHRGANG 2011
ISSN 0232-5535

Entomologische Nachrichten und Berichte



Herausgeber: Bernhard Klausnitzer in Zusammenarbeit mit Entomofaunistische Gesellschaft e. V.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Köhler Frank

Artikel/Article: [2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" \(Köhler & Klausnitzer 1998\) \(Coleoptera\) Teil 1. 109-174](#)