Entomologische Nachrichten

Herausgegeben vom

Deutschen Kulturbund
Naturwiss. Arbeitskreis Oberlausitz
Fachrichtung Entomologie

Staatlichen Museum für Tierkunde
Dresden A 1, Augustusstraße 2

Redaktion: Werner E. Ebert und Dr. Rolf R. Hertel

Bd. 6 | Ausgegeben am 25. Oktober 1962 | Nr. 10

Inhalt: LINKE, Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nordwestlichen Grenzgebietes S. 105; RICHTER, Über Fanggräben S. 107; MUCHE, Auf Dorcadionfang S. 110; SCHÖNFELDER, Aus der Praxis S. 111.

Dritter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nordwestlichen Grenzgebietes (Fortsetzung)

MAX LINKE, Leipzig

* *Atheta triangulum* KR. Die ersten Ex. fand ich am 2. 5. 24 bei Söllichau an Pilzen. Von dieser Zeit an, jedes Jahr im ganzen Gebiet an Birkensaft, Pilzen, faulenden Pflanzen, Kuhmist und im Genist. Lausitz, Sächs. Schweiz und im Erzgebirge. Jetzt ist diese Art häufig, das Tier ist seit dieser Zeit eingewandert und es ist ausgeschlossen, daß ich es übersehen habe. Auch von anderen Sammlern habe ich kein Ex. aus Sachsen gesehen.

* *Atheta ermischi* BENICK Im Hamsterbau häufig. In den Jahren 1905 bis 1910, als die Hamster hier sehr häufig waren, war diese Art häufig und von BERNHAUER als *A. castanoptera* bestimmt.

Atheta aquatilis THOMS. In der Sächs. Schweiz im Kirnitzschtal und im Erzgebirge; Keilberg Zechgrund, Zinnwald und Natschungtal; unter feuchtem Laub, selten.

* *Atheta hypnorum* KIESW. 3 Ex. 21. 4. 35 Dübener Heide am schwarzen Pfuhl; unter Moos. 1953 im September bei Söllichau (Dübener Heide) an Pilzen 14 Ex.

Atheta pagana ER. 2 Ex. 12. 12. 44 und 2 Ex. 26. 2. 45 Schkeuditz; unter Laub. 1 Ex. 28. 9. 41 bei Karl-Marx-Stadt, ZABEL leg. 1 Ex. 25. 6. 39 in der Lausitz (Gersdorf bei Kamenz), SCHMIDT leg. 1 Ex. 23. 6. 52 Fürstenwalde (Osterzgebirge).

* *Atheta cinnamoptera* THOMS. 2 Ex. 27. 6. 54 Müglitz (Osterzgebirge); in Kuhmist.

* *Atheta cauta* ER. 1 Ex. 12. 2. 47 Borsdorf im Parthengenist, BENICK det.

* *Atheta macrocera* THOMS. 10. 6. 46 und 22. 6. 49 Eilenburg und in der Dübener Heide an Kuh- und Pferdemist häufig. 2 Ex. 23. 6. 49 Sächs. Schweiz (Kirnitzschtal); unter faulendem Heu.

* *Atheta cribrata* KR. Im Mai und Juni 1949 in der Dübener Heide in großer Anzahl an Fellresten geködert. Bei Taucha und in der Sächs. Schweiz; vereinzelt an Fellresten.

* *Atheta dadobera* THOMS. Vereinzelt an Fellresten in der Dübener Heide, BENICK det.

Atheta consanguinea EPP. 1 Ex. bei Mittweida, THALMANN leg. 1 Ex. 14. 4. 36 Meißen, WIESNER leg.

* *Atheta pygmaea* GRAV *(obfuscata* GRAV.) In der Sächs. Schweiz am Ufer der Kirnitzsch und an kleinen Bächen vereinzelt.

Atheta parvula MANNH. *(parva)* var. *muscorum* BRIS. In Gesellschaft der Stammform selten. 10. 8. 13 Kohlenberg bei Brandis; 12 Ex. an toten Schnecken.

* *Atheta parens* MULS. 1 Ex. 26. 9. 34 Zöbigker an Schaufenstern.

* *Atheta subsinata* ER. Dübener Heide (Söllichau); unter Laub. Umgebung von Dresden, Meißen und Sächs. Schweiz (Kirnitzschbach) im Genist.

Aleuonota gracilenta ER. 1 Ex. 20. 9. 49 Taucha; in einem Mäusenest.

Atemeles emarginatus PAYK. *nigricollis* KR. 1 Ex. 29. 8. 43 Zeithain, THALMANN leg.

Atemeles pubicollis BRIS. 1 Ex. 28. 7. 02 Rachlau bei Bautzen, KOKSCH leg.

* *Phloeopora teres* GRAV. Unter Baumrinden bei Leipzig, vereinzelt.

Calodera nigrita MANNH. An sumpfigen Stellen, in den Wäldern und im Überschwemmungsgebiet nördlich von Leipzig, vereinzelt. Am 9. 12. 39 fand ich im Genist an einer durch Grundwasser überschwemmten Wiese über 400 Ex., am 10. 3. 46 an derselben Stelle nur wenige Ex. Im Muldengenist bei Eilenburg und Großbothen nur vereinzelt.

Ityocara rubens ER. Vereinzelt im Hochwassergenist bei Merseburg, Quasnitz und Rötha. Im März 1960 10 Ex. im Leipziger Auenwald an einer sumpfigen Stelle.

Apimela pallens MULS. REY 38 Ex. am 18. 5. 18 im feinen Muldensande bei Wurzen. 3 Ex. 8. 10. 32 bei Eilenburg im Muldengenist.

Amarochara forticornis BOISD. 20. 4. 39 Mittweida THALMANN leg.

* *Amarochara bonnairei* FAUV. 4 Ex. 12. 9. 56 Leipzig-Stötteritzer Wäldchen; in schwarzer Humuserde unter Graswurzeln in Gesellschaft von zahlreichen *Anomatus*arten.

* *Ocalea rivularis* MILL. Im Genist der Kirnitzsch nicht selten. 1 Ex. Keilberg.

Homoeusa acuminata MÄRK. 1 Ex. 27. 7. 19 Stollberg, UHMANN leg. 1 Ex. 21. 5. 13 Keppgrund bei Dresden, KOKSCH leg.

* *Meotica apicalis* BENICK 1 Ex. 2. 7. 07 Eilenburg; im Muldengenist. 1 Ex. 28. 10. 08 Brandis (Kohlenberg); unter Laub, BENICK det.

* *Meotica roubali* BENICK 5 Ex. 6. 9. 08 Eilenburg; unter faulendem Weidenlaub, BENICK det.

Meotica foveolata BENICK 1 Ex. 31. 10. 08 Connewitz, BENICK det.

Meotica marchii DOD. 9 Ex. 26. 9. 34 An Schaufenstern in Zöbigker.

Meotica linkeiana SCHEERP. 7. 10. 61, 31. 10. 61, 12. 10. 61. Wildenhainer Bruch; an Graswurzeln mehrere Ex.

Deubelia picina AUBÉ An moorigen Stellen in der Dübener Heide, vereinzelt. 2 Ex. 6. 4. 28 Leina bei Altenburg. 2 Ex. 14. 2. 46 Eilenburg; im Muldengenist.

Mniusa incrassata MULS. REY. Vereinzelt in der Dübener Heide, Schmielteich bei Polenz, Auenwald bei Schkeuditz, Rochlitzer Berg, Leina bei Altenburg. In der Sächs. Schweiz und im Erzgebirge häufig.

* *Ocyusida rufescens* KR. 2 Ex. 10. 4. 28 Am Schloßberg Döben bei Grimma; aus Laub gesiebt.

* *Oxypoda nigrocincta* MULS. REY. Seit 1933 habe ich in jedem Herbst und Frühjahr mehrmals große Gesiebe aus dem Auenwald bei Schkeuditz (Maslau) geholt und dieses Tier nicht gefunden. Erst seit 1941 finde ich das Tier regelmäßig an denselben Stellen, wo ich früher auch gesiebt habe. Ich fand das Tier am 9. 8. 41 1 Ex., 19. 4. 42, 6. 6. 42 4 Ex., 9. 5. 44 1 Ex., 14. 5. 45 1 Ex.

* *Oxypoda lentula* ER. Im Flußgenist bei Eilenburg, Quasnitz und Rötha. Unter faulenden Pflanzen in einem verlandeten Altwasser bei Schkeuditz im Mai 1942, 17 Ex. gefangen.

* *Oxypoda vicina* KR. Bei Zeithain von COHRS in 6 Ex. gefunden. DORN fand diese Art an Hauswänden und mein Sohn 12 Ex. am 12. 8. 56 in schwarzer Humuserde in Leipzig.

* *Oxypoda doderoi* BH. Im Wildenhainer Bruch, an Hirschkot; bei Großsteinberg, an Schafmist; in Zöbigker an Schaufenstern. Bei Gottesgab im Moor und von UHMANN bei Stollberg im Erzgebirge gefunden.

Oxypoda miranta ROUB. 1 Ex. 14. 2. 05 Schützenhauswiesen, SCHEERP. det. DORN und SCHÜTZE haben zur gleichen Zeit an derselben Stelle je 1 Ex. gefunden. Die Tiere sind aber verloren gegangen.

* *Aleochara puberula* KLUG. 1 Ex. 14. 8. 34 Zöbigker; an Schaufenstern.

Aleochara inconspicua AUBÉ Unter Laub am Bienitz, im Genist der Mulde und in Zöbigker an Schaufenstern, überall selten. 1 Ex. 30. 10. 25 Sächs. Schweiz.

* *Aleochara haemoptera* KR. 1 Ex. 14. 4. 18 Dobritz bei Dresden, KOKSCH leg.

Aleochara ruficornis GRAV. Im Kämmereiforst, PAUL leg. Bei Schkeuditz; unter Laub. Eilenburg; im Genist. 1 Ex. bei Chemnitz, ZABEL leg.

Über Fanggräben

DIETMAR RICHTER, Eberswalde
(Institut f. Forstwissenschaften d. D. Akad. d. Landwirtsch.-Wiss. Berlin)

Immer häufiger wenden auch Liebhaberentomologen sich der ökologischen Erforschung ihrer Sammelobjekte zu. In neueren Faunenverzeichnissen finden sich mehr und reichlicher (freilich nicht selten auch recht oberflächliche oder sehr allgemein gehaltene) Angaben zur Kennzeichnung von Lebens- und Vorkommensbedingungen der angeführten Arten, und auch in systematischen Abhandlungen wird oft auf die mitunter beachtlichen Unterschiede der Lebensweise nahe verwandter, morphologisch nur

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Linke Max

Artikel/Article: Dritter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nordwestlichen Grenzgebietes 105-107