

ander nicht verbundenen Formen aptera, microptera und macroptera vorkommt.²⁾ Über die relative Häufigkeit dieser drei Formen berichtete ich an anderem Orte.³⁾

2) EKBLÖM, Vererbungsbiologische Studien über Hemiptere-Heteroptera, Hereditas, Bd. X, S. 333 ff. (Lund 1927/28)

3) DIETZE, HERMANN, Gerris lateralis SCHUMM. = asper FIEB., Mittlg. d. Ent. Ges. Halle, Heft 18, S. 44–49

ANZEIGEN

Suche

Sonderdrucke über Curculionidae

KRANCHER, Entomologische Jahrbücher

Deutsche Entomologische Zeitschrift

Stettiner Entomologische Zeitung

RENSCH, Die Geschichte des Sundabogens, eine tiergeographische Untersuchung

SARASIN, Über die geologische Geschichte der Insel Celebes auf Grund der Tierverbreitung

SEITZ, alle Bände des indo-australischen Faunengebietes

Treubia (alle Jahrgänge, auch Sonderdrucke daraus)

Angebot bitte mit Preis an Kurt Arnold, Geyer Erzg., Postfach 20

Verkaufe

Sibirische Tagfalter (Ussurigebiet) Ausbeute 1963.

Nur wenige Serien vorhanden (etwa 30 Arten).

Bitte Liste anfordern.

Quarzlampe

O. Pruzina, Rathmannsdorf über Staßfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Anzeigen 22](#)