

Un nuevo *Gondwanocrypticus* (Crypticini) de Venezuela (Col. Tenebr.)

Por

Francisco Español

Gondwanocrypticus venezuelensis (Kaszab i. l.) n. sp.

Long. 4,8–5,2 mm.

En óvalo corto, moderadamente convexo, de un castaño muy oscuro y mate, con las antenas, piezas bucales y patas rojizas, a menudo también el contorno del pronoto y más raramente el de los élitros aparecen ferruginosos. Cabeza semicircular, finamente punteada, siendo la puntuación un poco rugosa; ojos transversos y algo salientes lateralmente; antenas largas alcanzando casi los ángulos posteriores del protórax y sensiblemente ensanchadas hacia la extremidad, con los cuatro primeros artejos alargados y cilíndricos, a partir del 5º tienden a ensancharse hacia el ápice haciéndose triangulares y progresivamente más anchos a medida que se acercan a la extremidad; en el ♂ los cuatro penúltimos artejos diferencian en el ángulo apical-interno una pequeña quilla, fácil de observar; último artejo de los palpos maxilares alargado y débilmente securiforme; mentón con quilla longitudinal media. Protórax transverso, de lados casi paralelos en la mitad basal, redondeados y moderadamente estrechados en la segunda mitad; rebordes anterior y laterales completos, el basal nulo; ángulos anteriores caídos y redondeados, los posteriores rectos o muy ligeramente agudos y algo prolongados hacia atrás; puntuación nula. Élitros tan anchos en la base como el borde posterior protorácico; a partir de los húmeros los lados siguen paralelos o se ensanchan muy débilmente hasta la mitad de su longitud, desde donde se estrechan en curva regular hasta el ápice; reborde lateral completo y visible en toda su longitud cuando se mira el insecto por encima; puntuación finísima y muy espaciada, sólo visible con gran aumento, apareciendo los puntos, siempre menudísimos, dispuestos en series longitudinales. Apéndice del prosternón horizontal, sobrepasando el nivel posterior de las procoxas y más o menos redondeado en el ápice; mesosternón bastante profundamente excavado; patas normales. Órgano copulador ♂ con la parte apical en triángulo mode-

radamente alargado y terminándose en punta poco aguzada y redondeada en el vértice.

En los ejemplares típicos los élitros evidencian una mancha post-mediana junto al borde lateral y otra en el ápice, ambas amarillas; una y otra a veces confusas y poco aparentes, pudiendo incluso desaparecer.

Próximo a *platensis* del que se distingue fácilmente por el cuerpo mate y de un castaño oscuro; por las antenas más ensanchadas hacia la extremidad y con los penúltimos artejos de contorno más triangular; por el protórax de lados más paralelos en la mitad basal y con la puntuación indistinta; por los élitros ordinariamente manchados de amarillo; por el mesosternón más profundamente excavado; y por el órgano copulador ♂ con el contorno muy diferente.

Venezuela: Caracas. (Holo-y Paratypen Museo de Budapest, Paratypen col. Marcuzzi, col. Museo de Barcelona, col. de Museo de Caracas y col. Museo de Frey-Tutzing)

El siguiente cuadro facilita la separación del *venezuelensis* de los otros *Gondwanocrypticus* sudamericanos hasta hoy conocidos:

1. – Antenas moderadamente ensanchadas hacia la extremidad, con los últimos artejos tan anchos como largos o poco transversos; ♂ sin fosita pilífera frontal 2
2. – Cuerpo más o menos oval; puntuación de la parte superior del mismo muy fina, poco sensible y a menudo indistinta o sólo visible con gran aumento; base del pronoto sin fositas aparentes 3
3. – Tamaño mediocre, de 4–5'2 mm. de longitud, cuerpo mate o débilmente brillante, en este caso el brillo nunca es metálico; élitros uniformemente oscuros o sin mancha humeral amarilla 4
4. – Cuerpo poco convexo; protórax de lados paralelos o casi paralelos en su primera mitad, estrechados en curva moderada en la segunda hasta los ángulos anteriores; élitros de lados paralelos o casi paralelos hasta la mitad o los dos tercios de su longitud y poco acuminados en la región apical; por todo lo que el contorno del cuerpo es casi paralelo en una amplia zona media y poco acuminado en ambos extremos 5
5. – Cuerpo uniformemente negro y algo brillante; puntuación del pronoto fina pero bien sensible; mesosternón poco excavado; surco marginal de los élitros proporcionalmente ancho; órgano copulador ♂ con la parte apical en triángulo estrecho y alargado, y diferenciando ventralmente, a cada lado de la base, una profunda escotadura

platensis Fairm.

- 5'. – Cuerpo de un castaño oscuro, mate y con los élitros ordinariamente manchados de amarillo; puntuación del pronoto indistinta; mesosternón más fuertemente excavado; surco marginal de los élitros proporcionalmente estrecho; órgano copulador ♂ con la parte apical en triángulo poco alargado y sin diferenciar ventralmente y a cada lado de la base escotadura alguna *venezuelensis* sp. n.
- 4'. – Cuerpo muy convexo; protórax de lados progresivamente estrechados desde la base hasta el borde anterior; élitros bastante fuertemente acuminados hacia el ápice, por todo lo que el contorno del cuerpo es casi regularmente oval, poco paralelo y bastante fuertemente acuminado en ambos extremos 6
6. – Mitad apical de los élitros manchada de amarillo *apicalis* Geb.
- 6'. – Élitros uniformemente negros *aterrimus* Champ.
- 3'. – Tamaño pequeño, inferior a 4 mm.; cuerpo con débil brillo metálico; élitros con mancha humeral amarilla *pictus* Geb.
- 2'. – Cuerpo alargado, puntuación de la parte superior del mismo fuerte y muy aparente; base del pronoto con dos fositas bien impresas *comptus* Geb.
- 1'. – Antenas con maza terminal de 6 artejos notablemente transversos; ♂ con una fosita frontal de la que nace un mechón de pelos *bothriocephalus* Geb.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1961

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Espanol Francisco

Artikel/Article: [Un nuevo Gondwanocrypticus \(Crypticini\) de Venezuela \(Col. Tenebr.\). 242-244](#)