

Verzeichnis der von Dr. J. Bechyné in Französisch Guinea im Jahre 1951 gesammelten Lamiinae

(Col. Cerambycidae)

Von Dr. Stephan Breuning, Paris

Herr G. Frey war so freundlich mir die Ausbeute Bechyné aus Französisch Guinea zur Bestimmung zu überlassen. Im Nachfolgenden gebe ich eine komplette Liste der aufgefundenen Formen und füge am Schluß die Beschreibungen der neuen Formen an. Alle Typen befinden sich in der Sammlung G. Frey.

Ancylonotus tribulus Ol. Région Kindia, Mt. Gangan, 500 m, 29. V. 1951.

Prosopocera lactator F. Région Kindia, Mt. Gangan, 600 m, 18. V. 1951;
dtto, 800 m, 20. V. 1951.

Sternotomis pulchra Drury m. *obscura* Voet. Conakry, Camayenne, 17.—19. IV. 1951; Kérouané, 17. VII. 1951.

Tragocephala nobilis F. m. *bassamensis* Thoms. Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.

Armatoxena buquetiana White. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 11. VI. 1951.

Murosternum pulchellum Dalm. Kankan, 1. VII. 1951.

Chariesthes bella Dalm. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 11. VI. 1951;
Région Kindia, Damakanga, 2. V. 1951.

Chariesthes analis Jord. m. *Jordani* Breun. Kankan, 2. VII. 1951.

Chariesthes bechynei sp. n. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. bis 22. VI. 1951.

Graciella pulchella Klug. N'Zérékoré, 13.—14. VII. 1951.

Proctocera senegalensis Thoms. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 7. VI. 1951.

Phrynetia aurocincta Guér. Région Kindia, Mt. Gangan, 550 m, 16. V. 1951; Frigniabé, 25. V. 1951.

Pterolophia biarcuatoidea Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 24. VI. 1951.

- Pterolophia leucoloma* Cast. Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Pterolophia Freyi* sp. n. Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Apomecyna binubila* Pasc. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 16. bis 22. VI. 1951.
- Ropica africana* Breun. N'Zérékoré, 6. VII. 1951.
- Sophronica bicoloricornis* Pic m. *major* nov. Région Kindia, Mt. Gangan, 600 m, 18. V. 1951.
- Lagrida rufa* Jord. N'Zérékoré, 8. VII. 1951.
- Hyllisia imitans* Duviv. N'Zérékoré, 8. VII. 1951.
- Hyllisia stenideoides* Pasc. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 8. VI. 1951.
- Hyllisia variegata* Auriv. N'Zérékoré, 8. VII. 1951.
- Anauxesida cuneata* Jord. Fouta Djallon, Dalaba, 13.—14. VI. 1951.
- Anauxesis calabarica* Chvrl. Région Kindia, Damakanya, 2. V. 1951.
- Exocentrus undulatofasciatus* Lep. et Breun. Région Kindia, Damakanya, 26.—27. IV. 1951.
- Glenea* (Sg. s. str.) *leucospila* Jord. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. VI. 1951.
- Glenea* (Sg. s. str.) *giraffa* Thoms. Région Coyah, Cerele de Dubrika, 15. IV. 1951; N'Zérékoré, 7.—9. VII. 1951.
- Glenea* (Sg. s. str.) *vigintiduomaculata* Thoms. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 11. VI. 1951.
- Glenea* (Sg. *I'olumnia*) *apicalis* Chvrl. N'Zérékoré, 7.—9. VII. 1951; Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. VI. 1951.
- Nupserha vitticollis* Kolbe m. *nigroapicalis* Auriv. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 7.—23. VI. 1951; Région Kindia, Mt. Gangan, 900 m, 8. V. 1951; N'Zérékoré, 13. VII. 1951.
- Nupserha sexpunctata* Chvrl. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 9. bis 26. VI. 1951; Région Kindia, Damakanya, 2. V. 1951; Région Kindia, Seguéia, 13. V. 1951; N'Zérékoré, 9.—13. VII. 1951.
- Nupserha sexpunctata* Chvrl. m. *bipuncticollis* Breun. Région Coyah, Cercle de Dubrika, 20.—21. IV. 1951.
- Nupserha bidentata* F. m. *nigrosternalis* Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 9.—22. VI. 1951; Kindia, 9. V. 1951; Région Kindia, Damakanya, 29.—30. IV. 1951; Mt. Gangan, 600 m, 20. V. 1951.
- Nupserha bidentata* F. m. *quadripunctata* Lep. et Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 15. VI. 1951; N'Zérékoré, 5. VII. 1951.
- Nupserha bidentula* Dalm. N'Zérékoré, 7. VII. 1951.
- Nupserha deusta* Dalm. Région Kindia, Mt. Gangan, 900 m, 8. V. 1951; N'Zérékoré, 7. VII. 1951.

- Nupserha fasciata* Auriv. m. *spinosa* Hintz. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 8.—14. VI. 1951.
- Nitocris Lucasi* Thoms. m. *comes* Jord. Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Nitocris pseudolucasii* Breun. Région Kindia, Mt. Gangan, 500 m, 3. VI. 1951.
- Nitocris sutureaurea* Breun. Région Kindia, Damakanya, 12. V. 1951.
- Nitocris occidentalis* Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 8. VI. 1951; Région Kindia, Mt. Gangan, 600 m, 18. V. 1951; idem, 800 m, 20. VI. 1951.
- Nitocris argenteovittata* Auriv. m. *fuscicornis* Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 13.—14. VI. 1951.
- Nitocris tibialis* Kolbe, Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Nitocris tibialis* Kolbe, m. *transeuns* Breun. Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Neonitocris princeps* Jord. Région Kindia, Mt. Gangan, 550 m, 16. V. 1951.
- Obereopsis variipes* Chvrl. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 22. VI. 1951; Région Kindia, Damakanya, 2. V. 1951; Kankan, 1. VII. 1951; N'Zérékoré, 6. VII. 1951.
- Obereopsis guineensis* sp. n. Région Kindia, Damakanya, 29 bis 30. IV. 1951.
- Obereopsis insignis* Auriv. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. bis 24. VI. 1951.
- Obereopsis insignis* Auriv. m. *Lepesmei* Breun. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 16.—23. VI. 1951.
- Obereopsis insignis* Auriv. m. *nigripennis* nov. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 16. VI. 1951.
- Obereopsis Bedhynei* sp. n. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 9. bis 14. VI. 1951.
- Obereopsis Freyi* sp. nov. Kankan, 1. VII. 1951.
- Obereopsis Freyi* Breun. m. *rufoabdominalis* nov. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. VI. 1951.
- Obereopsis Freyi* Breun. m. *nigrolateralis* nov. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 12. VI. 1951; Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.
- Phytoecia* (Sg. *Blepisanis*) *Freyi* sp. nov. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 22. VI. 1951; Région Kindia, Mt. Gangan, 500 m, 3. VI. 1951.
- Phytoecia* (Sg. *Pseudoblepisanis*) *analisis* F. Région Kindia, Mt. Gangan, 550 m, 1. VI. 1951; N'Zérékoré, 9. VII. 1951.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) *analis* F. m. *guineensis* Kolbe, Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 16.—18. VI. 1951; N'Zérékoré, 7. VII. 1951.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) *Kolbei* Breun. m. *nigroscutellata* Breun. N'Zérékoré, 9. VII. 1951.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) *Kolbei* Breun. m. *flavoabdominalis* Breun. N'Zérékoré, 9. VII. 1951.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) *Kolbei* Breun. m. *rufoampliata* nov. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 6. VI. 1951.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) *nigriventris* Kolbe, Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 15. VI. 1951.

Hecephora testator Ol. Région Kindia, Pastoria, 22. V. 1951.

Hecephora latefasciata Jord. ssp. *analis* Jord. Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 18. VI. 1951.

Chariesthes (Sg. s. str.) **Bechynei** sp. n.

Langgestreckt. Fühler mehr als um die Hälfte (♂) oder weniger als um die Hälfte länger (♀) als der Körper. Untere Augenloben etwas länger (♂) oder etwas kürzer (♀) als die Wangen. Flügeldecken fein und wenig dicht punktiert. Letztes Abdominalsegment mit ziemlich kleiner Apikalgrube.

Rot, rotbraun tomentiert. Stirn in der oberen Hälfte mit zwei gelben Längsbinden, die seitlich gelegen sind und sich nach rückwärts auf den Scheitel fortsetzen. Eine weiße Querbinde auf jeder Wange. Halsschild mit vier ziemlich breiten, gelben Längsbinden: je eine auf der Scheibe und eine in der oberen Hälfte der umgeschlagenen Seitenteile, sowie mit vier breiten, dunkelbraunen Längsbinden: je eine auf den Seiten der Scheibe und eine in der unteren Hälfte der umgeschlagenen Seitenteile. Flügeldecken ockergelb tomentiert; jede mit drei gelben Längslinien: zwei auf der Scheibe, deren innere verkürzt ist und eine neben dem Seitenrand. Das apikale Fünftel der Decken schwarz und schwarzbraun tomentiert. Die Epipleuren sowie der Randteil des basalen Drittels der Flügeldecke dunkelbraun tomentiert. Unterseite und Beine schwarz, fein silbrig tomentiert; der basale Teil der Vorder- und Mittelschenkel, zuweilen auch der der Hinterschenkel, rot. Fühler schwarz, schwarzbraun tomentiert, die apikale Hälfte des dritten Gliedes sowie die zwei basalen Drittel des vierten gelbrot.

Länge: 8—10 mm. Breite: $2\frac{1}{3}$ —3 mm.

Type: 1 ♂ von Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba,

1200 m, 22. VI. 1951. — Allotype (♀) dtto, 18. VI. 1951; 2 Paratypen dtto, 8. VI. 1951.

Diese Art steht dem *aureovitticollis* Lep. et Breun. nahe, unterscheidet sich aber durch etwas weniger dichte Flügeldeckenpunktionierung sowie durch abweichende Färbung des Halsschildes und der Fühler.

Pterolophia (Sg. s. str.) **Freyi** sp. n.

Langoval. Fühler relativ stark, unterseits nicht gefranst, merklich kürzer als der Körper; das erste Glied wenig dicht und fein punktiert, das dritte merklich länger als das vierte, viel länger als das erste. Fühlerhöcker wenig erhaben. Die unteren Augenloben so lang wie die Wangen. Kopf und Halsschild fein und sehr dicht punktiert. Halsschild stark quer, gewölbt, seitlich regelmäßig verrundet, mit zwei sehr kleinen prémédianen Scheibenhöckern bewehrt. Schildchen breit dreieckig. Flügeldecken langgestreckt, gewölbt, vor der Mitte leicht eingezogen und leicht deprimiert, apikal verrundet, dicht und ziemlich grob punktiert. Jede Decke mit einer kurzen postbasalen mäßig hohen Scheibencrista und einer feinen Längscrista in Verlängerung der ersten, die etwas vor der Mitte beginnt und am Beginn des apikalen Drittels endet.

Dunkelbraun, strohgelb, braun untermischt tomentiert. Die Halsschildhöcker dunkelbraun. Die Decken besonders in der Humeralgegend, entlang dem Seitenrand, entlang der Naht in der vorderen Hälfte und auf der postbasalen Crista dunkelbraun tomentiert und mit einer postmedianen dunkelbraunen, gemeinsamen Nahtmakel geziert, die jederseits bis über die Scheibenmitte hinaus reicht. Tibien apikal dunkelbraun. Fühler rotbraun tomentiert; der apikale Teil des ersten Gliedes, das zweite Glied, der basale Teil des dritten und der apikale Teil der Glieder drei bis elf strohgelb tomentiert.

Länge: $5\frac{1}{2}$ mm. Breite: 2 mm.

Type von Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951.

Sophronica bicoloricornis Pic m. **major** nov.

Wie die Stammform, aber merklich größer und das fünfte und sechste Fühlerglied basal ebenfalls rot.

Länge: 8 mm. Breite: $3\frac{2}{3}$ mm.

Type von Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan, 600 m, 18. V. 1951.

Obereopsis guineensis sp. n.

Sehr langgestreckt und schmal. Fühler fein, um ein Viertel länger als der Körper, das dritte Glied so lang wie das vierte, viel länger als das erste. Untere Augenloben dreimal so lang wie die Wangen. Stirn etwas breiter als einer dieser Augenloben (♀), Kopf und Halsschild sehr dicht und sehr fein punktiert. Halsschild so lang wie breit, seitlich kaum gerundet, mit zwei schwach ausgebildeten Querdepressionen, eine nahe dem Vorderrand, die andere nahe dem Hinterrand. Flügeldecken sehr langgestreckt, apikal schwach ausgeschnitten (der Nahtwinkel spitzig, der Randwinkel in einen kurzen, spitz dreieckigen Lappen ausgezogen), dicht und fein punktiert, die Punkte gereiht. Die Hinterschenkel erreichen die Mitte des dritten Abdominalsegmentes.

Gelbrot, fein gelblich tomentiert. Die rückwärtigen drei Viertel der Flügeldecken dunkelbraun. Die drei ersten Abdominalsegmente ziemlich dunkel braun, aber fein goldig tomentiert. Hinterschienen und Hintertarsen dunkelbraun. Fühler schwarz.

Länge: 9 mm. Breite: $1\frac{3}{4}$ mm.

Type, ein ♀ von Französisch Guinea: Région Kindia, Damakanya, 29.—30. IV. 1951.

Obereopsis insignis Auriv. m. **nigripennis** nov.

Wie die Stammform, aber die Flügeldecken außer an der äußersten Basis schwarz; die beiden ersten Abdominalsegmente und der größte Teil des dritten Segmentes ebenfalls schwarz.

Type ein ♂ von Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 16. VI. 1951.

Obereopsis Bechynei sp. n.

Sehr langgestreckt und schmal. Fühler fein, mehr als um die Hälfte länger als der Körper, das dritte Glied merklich kürzer als das vierte, merklich länger als das erste. Untere Augenloben viermal so lang wie die Wangen. Stirn schmal, ein Viertel so breit (♂) oder merklich schmaler (♀) als einer dieser Loben. Kopf und Halsschild sehr dicht und sehr fein punktiert. Halsschild so lang wie breit, seitlich kaum gerundet, mit zwei breiten aber schwach ausgebildeten Querdepressionen: die eine vor, die andere hinter der Mitte. Flügeldecken mehr als dreimal so lang wie Kopf und Halsschild zusammen, apikal schwach abgestutzt, dicht und ziemlich fein punktiert, die Punkte gereiht. Hinterschenkel die Mitte des dritten Abdominalsegmentes erreichend.

Gelbrot, fein gelblich tomentiert. Das apikale Fünftel der Flügeldecken schwarz, seitlich die schwarze Färbung noch etwas weiter nach vorne reichend. Fühler schwarz, die äußerste Basis der Glieder fünf bis sieben rötlich.

Länge: 8—9 mm. Breite: $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Type, ein ♀, von Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 9. VI. 1951. — Eine Allotype (♂) dtto, 13.—14. VI. 1951.

***Obereopsis Freyi* sp. n.**

Sehr langgestreckt und schmal. Fühler fein, um ein Viertel länger als der Körper, das erste Glied sehr dicht und sehr fein punktiert, das dritte so lang wie das vierte, merklich länger als das erste. Untere Augenloben fast viermal so lang wie die Wangen. Stirn merklich schmaler (♂) oder so breit (♀) wie einer dieser Loben. Kopf und Halsschild sehr dicht und sehr fein punktiert. Halsschild so lang wie breit, seitlich kaum verrundet, mit zwei ziemlich tiefen Querdepressionen: die eine vor der Mitte, die andere hinter der Mitte. Flügeldecken sehr langgestreckt, im apikalen Sechstel eingezogen, apikal schmal schief abgestutzt (die Randede spitzig vortretend), sehr dicht und ziemlich grob punktiert, die Punkte in den vorderen zwei Dritteln gereiht. Hintersehenkel die Mitte des dritten Abdominalsegmentes erreichend.

Gelbrot, fein gelblich tomentiert. Schläfen schwarz. Auf jeder umgeschlagenen Seite des Halsschildes eine breite, schwarze Längsbinde. Das apikale Viertel der Flügeldecken, die apikale Hälfte des Metasternums und des fünften Abdominalsegmentes, die Schienen, die Tarsen, mit Ausnahme der Klauen, und die Fühler schwarz. Die drei basalen Viertel des sechsten Fühlergliedes rot.

Länge: 9— $11\frac{1}{2}$ mm. Breite: $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mm.

Type, ein ♀, von Französisch Guinea: Kankan, 1. VII. 1951.

***Obereopsis Freyi* Breun. m. *rufoabdominalis* nov.**

Wie die Stammform, aber die Metepisternen schwarz. Auf dem Metasternum ist die schwarze Färbung auf zwei große rückwärtige Seitenmakeln reduziert. Letztes Abdominalsegment ganz gelbrot. Die Fühlerglieder vier bis acht und die basale Hälfte des neunten rot.

Type, ein ♂, von Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m. 18. VI. 1951.

Obereopsis Freyi Breun. m. nigrolateralis nov.

Wie *m. rufoabdominalis* Breun., aber das ganze apikale Drittel der Flügeldecken sowie das seitliche Drittel des mittleren Drittels schwarz. Metepisternen gelbrot. Fühler zuweilen ganz schwarz.

Type, ein ♀, von Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan, 800 m, 20. V. 1951. — Eine Paratype von Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 12. VI. 1951.

Phytoecia (Sg. *Blepisanis*) Freyi sp. n.

Langgestreckt. Fühler um ein Viertel länger als der Körper; das erste Glied kurz und wenig dick, das dritte so lang wie das vierte, merklich länger als das erste. Untere Augenloben fast dreimal so lang wie die Wangen. Stirn merklich breiter (♂) oder mehr als um die Hälfte breiter (♀) als einer dieser Loben. Kopf und Halsschild sehr dicht und sehr fein punktiert. Halsschild schwach quer. Schildchen halbrund. Flügeldecken langgestreckt, mäßig gewölbt, apikal verrundet, dicht und ziemlich grob punktiert, apikal feiner werdend, in den ersten zwei Dritteln gereiht.

Schwarz, fein braunschwarz tomentiert. Die vorderen zwei Drittel der Flügeldecken gelb und fein gelblich tomentiert. Die Fühlerglieder fünf bis sieben und die apikale Hälfte des vierten rot.

Länge: $6\frac{1}{2}$ —7 mm. Breite: $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Type, ein ♂, von Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 22. VI. 1951. — Eine Allotype (♀) Région Kindia, Mt. Gangan, 500 m, 3. VI. 1951.

Diese Art steht der *Phytoecia orientis* Auriv. nahe, unterscheidet sich durch den Mangel von kahlen Stellen auf der Halsschildscheibe, im apikalen Drittel gröber punktierte Flügeldecken, ganz schwarze Beine und teilweise rote Fühler.

In meiner Bestimmungstabelle der Gattung *Phytoecia* Unter-gattung *Blepisanis* (1951, Ent. Arb. Mus. Frey II, p. 30) schiebt sich diese Art bei der Nummer 68 ein und unterscheidet sich von *orientis* Auriv. durch die oben angeführten Merkmale.

Phytoecia (Sg. *Pseudoblepisanis*) Kolbei Breun. m. rufoampliata nov.

Wie *m. nigroscutellata* Lep. et Breun. (1952, Mém. Inst. Franc. d'Afr. noire, no. 19, fasc. 1, p. 64; 1951, Ent. Arb. Mus. Frey, II, p. 445), aber die Abdominalsegmente vier und fünf, das dritte Segment außer basal, und die Seitenteile der beiden ersten Segmente gelbrot. Fühlerglieder vier bis neun, außer apikal, hellrot.

Type, ein ♂, von Französisch Guinée: Fouta Djallon, Dalaba, 1200 m, 6. VI. 1951.

In meiner Bestimmungstabelle der Gattung *Phytoecia* Sg. *Pseudoblepisanis* (1951, Ent. Arb. Mus. Frey, II, p. 35) schiebt sich diese Varietät bei no. 34 ein und unterscheidet sich von *Kolbei* m. *nigroscutellata* Breun. durch die oben angeführten Merkmale.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Breuning Stephan von

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Dr. J. Bechyne in Französisch
Ginea im Jahre 1951 gesammelten Lamiinae \(Col. Cerambycidae\) 1-
9](#)