download unter www.biologiezentrum.at

Liste der von Herrn G. Frey in Indien und Ceylon gesammelten Alticiden

(Col. Phytophaga)

Von Dr. J. Bechyné, Mus. G. Frey

Während seiner Reise im März 1953 hatte Herr G. Frey folgende Arten gesammelt:

Aphthona octogona n. sp.

Ceylon: Kandy. 1 ♂.

Schwarzbraun, 4 erste Antennite gelb, Oberseite samt Hintertarsen und -tibien rotbraun, Hinterschenkel und Flügeldeckenspitze schwarz. Oberseite glänzend, Elytren wegen der feinen Retikulierung (Vergrößerung 30—50 x) matter erscheinend. Makroptere Form von länglicher Gestalt.

Kopf ohne Punktierung, Augen groß, Stirn nur so breit als ein Augendurchmesser. Antennalcalli sehr klein, hinten von einer abgekürzten, seichten Querlinie begrenzt. Clypealcarina breit, dorsal abgeflacht, an den Seiten kantig. Antennen sehr grazil, die Flügeldeckenmitte weit überragend, Glieder 3—6 gleichlang, das 4. gebogen, das 2. verdickt.

Thorax nur sehr schwach transversal, Seiten gerade, parallel, alle Winkel verdickt und schräg abgestutzt, so daß das Halsschild achteckig erscheint. Oberfläche undeutlich (unter 20 facher Vergrößerung) punktiert, Basalrand vor dem glatten Scutellum breit ausgezogen.

Flügeldecken breiter als das Halsschild, subparallel, ohne Eindrücke, Humeralcallus deutlich, Punktierung stark (unter 5 facher Vergrößerung gut sichtbar), spärlich, undeutlich gereiht. Spitze gerade abgestutzt. Intercoxalplatte des Prosternums fast quadratisch, flach, hinten gradlinig. Das 1. Glied der Vordertarsen schwach erweitert. Hintertibien dorsal abgeflacht, zur Spitze stark verdickt (claviform) mit einem kräftigen Enddorn versehen. Das 1. Glied der Hintertarsen dick, so lang als die 3 folgenden zusammengenommen. Das letzte Bauchsegment in der Mitte abgeflacht und nach hinten halbkreisförmig ausgezogen.

download unter www.biologiezentrum.at

Unter den orientalischen *Aphthona* ist die vorliegende Art an der Färbung der Elytren und an der eckigen Form des Thorax ohne weiteres erkennbar.

Elytropachys suturanigra Motschoulsky

Motschoulsky 1866, Bull. Soc. Nat. Moc. 39, II, p. 416.
Ogloblin 1930, Eos 6, p. 87, t. 1, f. 4.
Ceylon: Nuwara Eliya.

Altica cyanea Weber

Weber 1801, Observ. Ent. I, p. 57.
Maulik 1926, Fn. Ind. Col. Chrysom. Haltic., p. 422.
Bombay.

Altica coerulea Olivier

Olivier 1791, Encycl. méth. VI, p. 590.
Maulik 1926, l. c., p. 421.
Ceylon: Kanpy et Nuwara Eliya.

Altica brevicosta Weise

Weise 1921, Tijdschr. Ent. 65, p. 110.
Ceylon: Kandy.

Phygasia indica Jacoby

Jacoby 1898, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 187.
Maulik 1926, l. c., p, 415.
Ceylon: Umgb. Anuradhapura.

Sinocrepis micans Chen

Chen 1933, Sinensia 3, p. 233.
Chen 1939, Sinensia 10, p. 23 et 35.
Ceylon: Umgb. Anutadhapura; ibid. (coll. Heikertinger, Mus. G. Frey).

Diese Art ist sehr ähnlich der ebenfalls von Ceylon stammenden *Ogloblinia nigripennis* Motsch., welche aber die Basalquerfurche des Thorax jederseits von einem Längsstrichelchen begrenzt hat.

Nisotra badia Harold

Harold 1876, Col. Hefte 16, p. 230.
Maulik 1926, l. c., p. 275.
Ceylon: Kandy.

download unter www.biologiezentrum.at

Sebaethe ceylonensis Jacoby

Jacoby 1887, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 91.
Maulik 1926, l. c., p. 397.
Ceylon: Nuwara Eliya.
Diese Art ist im Junk-Schenkling-Katalog nicht registriert.

Amphimela mouhoti Chapuis

Chapuis 1875, Lac. Gen. Ins. XI, p. 36.
Maulik 1926, l. c., p. 250, fig. 91.
Ceylon: Nuwara Eliya.

Lanka brunnea Maulik

Maulik 1926, l. c., p. 304, fig. 113.
Ceylon: Kandy.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Arbeiten Museum G. Frey

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Bechyne Jan

Artikel/Article: Liste der von Herrn G. Frey in Indien und Ceylon gesammelten Alticiden (Col. Phytophaga). 686-688