ZUR INSEKTENFAUNA VON RIGI-KULM, 1600-1797 M, KANTON SCHWYZ (*)

II. LEPIDOPTERA 1: "MACROLEPIDOPTERA" ("GROSSSCHMETTERLINGE")

von L. R E Z B A N Y A I R E S E R

Inhalt: 1. Einleitung - A/ DIURNA: 2. Die Tagfalter von Rigi-Kulm
B/ MACROHETEROCERA: 3. Anzahl Arten - 4. Anzahl Individuen 5. Statistische Daten
6. Bestimmung der Ausbeute - 7. Die häufigsten Arten in der Lichtfallenausbeute
8. Nachtgrossfalter-Aspekte - 9. Oekologische Betrachtungen 10. Bemerkenswerte
seltenerer bodenständige Arten - 11. Wanderfalter 12. Bemerkenswerte Formen
13. Tagsüber aktive Macroheterocera-Arten - 14. Vergleich mit der Nachtgrossfalter-
fauna dreier weiterer alpiner Lichtfallenstandorte - 16. Tabelle 12: Liste der auf
Rigi-Kulm nachgewiesenen Macrolepidopteren-Arten mit verschiedenen Angaben aus
dem Lichtfallenfang sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten
16. Zusammenfassung - 17. Literatur.

1. EINLEITUNG

Rigi-Kulm ist in der Reihenfolge der Untersuchungen der neunte Standort in der Schweiz, an welchem die Nachtgrossfalterfauna durch den Verfasser eingehend erforscht wurde, und der vierte Standort, wo auch die Tagfalter berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse von den ersten acht Plätzen sind schon publiziert worden (siehe Karte 1, Seite 3 dieses Heftes). Die Darstellung der Auswertung der Fangergebnisse von Rigi-Kulm entspricht der in den früheren Publikationen angewandten Methode (REZBANYAI 1981a, 1981b, 1982a, 1982c, 1983a, 1983b, 1983c). Dies soll den Ueberblick und die Vergleiche erleichtern.

Sowohl die Lepidopterenfauna von Rigi-Kulm als auch die von Pilatus-Kulm (REZBANYAI 1982c) wurde bis jetzt noch kaum untersucht. Als bekanntes Ausflugsziel wurde auch die Rigi sicher von zahlreichen Schmetterlings sammlern besucht. Sie haben hier jedoch entweder gar nicht gesammelt oder höchstens nur am Tage. Meines Wissens ist hier niemals regelmässig Lichtfang betrieben worden, und die Schmetterlingsfauna wurde nie in einer Publikation besprochen.

Eine ausführliche Besprechung der Sammelmethode und der gegenwärtigen ökologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet ist in REZBANYAI 1983d (Seite 1-16 dieses Heftes) zu finden.

A/ DIURNA2. DIE TAGFALTER VON RIGI-KULM (Tabelle 1, 12, Kreisdiagramm 1, 2, Foto 1)

Wenn wir die gegenwärtigen ökologischen Verhältnisse von Rigi-Kulm genauer anschauen so ist es in Anbetracht der starken Belastung des Gebietes durch Weidetrieb und Tourismus nicht verwunderlich, wenn die Tagfalterfauna ziemlich arm ist. An den Südhängen fehlen blumenreiche, während des ganzen Sommers ungestörte Lebensräume fast völlig. Sie sind hier lediglich am unteren südwestlichen Rande des Untersuchungsgebietes und westlich der Kapelle auf den steilsten Plätzen zu finden. Die ebenfalls ungestörten steilen Nordhänge sind wegen der schwachen Besonnung als Lebensraum bzw. Flugbiotop für Tagfalter nicht geeignet. Schliesslich fehlt hier auch das "Hinterland", nämlich die höheren Lagen der Alpen, die nicht so intensiv genutzt werden und deshalb für subalpine-alpine Tagfalterarten ein Zufluchtgebiet bedeuten, aus dem sie immer wieder neu in das Alpweidgebiet eindringen können. In den eigentlichen Zentralschweizer Alpen ist die Tagfalterfauna in diesen Höhenlagen an den Südhängen überall deutlich reicher als auf Rigi-Kulm (siehe z.B. in REZBANYAI 1981b).

Drei wichtige Tatsachen charakterisieren die gegenwärtige Tagfalterfauna von Rigi-Kulm:

a/ Wanderfalter sind meist viel häufiger zu sehen als bodenständige Arten.

Vor allem *Aglais urticae* wurde häufig, gelegentlich sogar massenhaft (9.VI.1982, 24.VI.1983, 29.VII.1981) beobachtet. Von den frühesten (3.VI.) bis zu den spätesten (12.X.) Fangdaten des Jahres war sie im Gebiet als Imago stets vorhanden (anscheinend jedoch stationär). Vereinzelt aber wiederholt wurde VI-VIII *Vanessa cardui* (vor allem 1982) sowie *Vanessa atalanta* (VI und IX) registriert. Auch einige Expl. von den hier kaum bodenständigen Arten *Pieris brassicae*, *Pieris (Artogeia) rapae*, *Inachis io* und *Polygonia c-album* konnten nachgewiesen werden.

b/ Das relativ geringe Vorkommen von Mohrenfalter- (Erebia-) Arten und -Individuen fällt ganz besonders auf. Lediglich fünf Arten konnten nachgewiesen werden, nur zwei davon einigermaßen häufig:

- *Erebia ligea carthusianorum* FRHST.: Weitverbreiteter und meist häufiger Bewohner des Fichtengürtels. Im Juli-August mit wenigen Individuen am Südwestrand des Untersuchungsgebietes (Seite 11, Karte 5: Nr.6,8).

- *Erebia euryale isarica* RUEHL: Weitverbreiteter und meist häufiger Bewohner des Fichtengürtels. Im Juli-August selten bis mässig häufig am Südwestrand und an den Osthängen (Seite 11, Karte 5: Nr.1,2,9). Das Taxon *isarica* RUEHL, das von *adyte* HBN. anscheinend nicht artverschieden ist, bewohnt nur den nördlichen Teil der Zentralschweizer Alpen. Dagegen wird die Art im Urner Reusstal-Gebiet und im Gadmental BE durch *adyte* vertreten (GEIGER & REZBANYAI 1982, REZBANYAI 1979b).

- *Erebia aethiops* ESP. f. alt. *altivaga* FRHST.: Die Höhenform der auch kollin-montan vorkommenden, weit verbreiteten und meist häufigen Art kommt in den Zentralschweizer Alpen an grasigen Südhängen ziemlich überall häufig vor. Auf Rigi-Kulm konnte nur ein einziges Exemplar gefunden werden (12.VIII.1982), und zwar unterhalb der Bahnstation (Seite 11, Karte 5: Nr.3). Diese traurige Tatsache zeigt deutlich, wie weitgehend unbewohnbar die Rigi-Weiden für Tagfalter geworden sind.

- *Erebia medusa brigobanna* FRHST.: Ebenfalls eine auch kollin-montan verbreitete, ziemlich früh fliegende Art, die in der Zentralschweiz nur lokal häufig vorkommt. Auf Rigi-Kulm wurde sie an den steilen, grasigen Südwesthängen (Seite 11, Karte 5: Nr.9) am 24.VI.1983 (mehrere Expl.) und am 8.VII.1982 (1 Expl.) gefunden.

- *Erebia neclans stygne* OSTH.: Die mit Abstand häufigste Mohrenfalterart des Gebietes ist ein montan-subalpiner Bewohner von steilen, mit gras durchwachsenen Felsen- und Geröllhängen. An solchen Stellen kommt sie in der Zentralschweiz (Alpen und Napf) oft häufig vor. Dieser Umstand zeigt uns deutlich, welche Lebensräume von Rigi-Kulm für Tagfalter gegenwärtig noch bewohnbar sind. Diese Art wurde ab A VII bis M VIII mehrmals ziemlich häufig beobachtet, und zwar vor allem im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Seite 11, Karte 5: Nr.3,4,7,9; Foto 4,7) Nach *A.urticae* war sie die zweithäufigste Tagfalterart auf Rigi-Kulm.

Ent. Ber. Luzern 10, 1983

Weitere Mohrenfalterarten, die in dieser Höhenlage und Vegetation hier noch reichlich vorkommen sollten, wie z.B. *manto*, *melampus*, *tyndarus*, *pronoe vergy* oder *oeme*, konnten nicht nachgewiesen werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie früher hier vorkamen. Wenn wir die Tagfalterfauna des Brisen-Haldigrates (REZBANYAI 1981b) mit derjenigen von Rigi-Kulm vergleichen, werden diese Mängel augenfällig.

Tabelle 1: Familienzugehörigkeit der auf Rigi-Kulm festgestellten Diurna Arten.

Familie	Anzahl Arten
PIERIDAE	6
NYMPHALIDAE	9
SATYRIDAE	12
LYCAENIDAE	6
HESPERIIDAE	3
Diurna insgesamt	36

c/ Als dritte wichtige Tatsache kann ich ein Positivum mitteilen. Mit grosser Ueberraschung habe ich am 9.VI.1982 eine relativ individuenreiche Population des Gletscherfalters, *Oeneis glacialis* MOLL. (Foto 1) auf Rigi-Kulm entdeckt, und zwar um 1750 m Höhe an den steilsten Westhängen, westlich der Kapelle (Seite 11, Karte 5: Nr.4; Foto 2,4,7). Auch am 8.VII.1982 war hier noch ein abgeflogenes Exemplar zu sehen. Da Rigi-Kulm während der letzten Eiszeit als Nunatakker aus dem Eismeer herausragte, kann *glacialis* hier als Glazialrelikt angesehen werden. Obwohl sie in den Zentralschweizer Nordalpen einmal auch in 1200 m Höhe gefunden wurde (REZBANYAI 1981b), ihre Lebensräume befinden sich in den subalpinen und alpinen Regionen.

Die dritthäufigste Tagfalterart des Gebietes ist der recht anspruchslose Wiesenbewohner *Coenonympha pamphilus* L. Die Art war ab A VI bis E IX selten bis mässig häufig überall zu sehen.

Zwei weitere charakteristische subalpine-alpine Arten wurden noch gelegentlich, vor allem am Süd- und Südwestrand (Seite 11, Karte 5: Nr.6,8,9), etwas häufiger beobachtet, und zwar *Colias phicomne* ESP. und *Clossiana titania cypris* MEIGEN. Auffällig ist das Fehlen der Vertreter der Papilionidae sowie das seltene Vorkommen der Lycaenidae und der Hesperidae. Sogar die gewöhnlichsten Bläulingarten wurden nur selten bis sehr selten registriert. Als charakteristische, jedoch ebenfalls relativ seltene Arten können noch *Pieris napi bryoniae* HBN., *Boloria pales* D.S., *Coenonympha gartetta* PRUN. und *Lasiommata petropolitana* F. erwähnt werden.

Es ist hier wichtig zu bemerken, dass das einzige erbeutete Exemplar von *Melliota athalia* ROTT. noch zum Nominatformenkreis gehört, wie die gesamte Population des ganzen Rigi-Gebietes, während südlich des Vierwaldstättersees bereits *athalia-celadussa*-Unterartmischpopulationen leben. Die diesbezüglichen Untersuchungen sind durch den Verfasser schon seit Jahren im Gange.

Kreisdiagramm 1: Die Anteile der Diurna- und der Macroheterocera-Arten an der Macrolepidopterenfauna von Rigi-Kulm (Tabelle 2).

Kreisdiagramm 2: Familienzugehörigkeit der Diurna Arten von Rigi-Kulm (Tabelle 1)

Kreisdiagramm 3: Familienzugehörigkeit der auf Rigi-Kulm mit einer Lichtfalle erbeuteten *Macroheterocera* - Arten (Tabelle 2).

Foto 1: Aus der Variationsbreite des Gletscherfalters (*Oeneis glacialis* MOLL.), der beachtenswertesten Tagfalterart von Rigi-Kulm (Männchen, leg.: 9.VI.1982).

B/ "MACROHETEROCERA"

(Nachtgrossfalter sowie tagaktive andere Macroheteroceren)

3. ANZAHL ARTEN (Lichtfallenfang) (Tabelle 2, Kreisdiagramm 3)

Die Anzahl der nachgewiesenen Arten ist bedingt durch die geringere Höhe. Es sind 35 Arten mehr als auf dem Pilatus-Kulm (2060 m) und 14 Arten weniger als auf dem Brisen-Haldigrat (Lichtfallenfangergebnisse bei 1920 m) bzw. 50 Arten weniger als auf dem Haldigrat um 1900 m (216 nachtaktive Arten). Als Grund kann nur die weniger abwechslungsreiche Vegetation (kein Kalkgebiet) sowie die anthropogene Belastung des Gebietes genannt werden. Auf Mt. Generoso-Vetta ist die Anzahl Arten erwartungsgemäss deutlich höher, und zwar um mehr als 100 Arten (geringere Höhe: 1600 m; abwechslungsreichere südalpine Vegetation, nahe der Laubwaldstufe, geringere anthropogene Belastung siehe Kapitel 14.3.).

Die Schwankungen in den jährlichen Artenzahlen auf Rigi-Kulm waren eindeutig witterungsbedingt. Dabei ist noch zu beachten, dass in allen vier Betriebsjahren die Wetterlage überdurchschnittlich ungünstig war (siehe Seite 8 dieses Heftes).

Der Anteil der Noctuidae liegt etwas höher und die der Geometridae tiefer als auf Pilatus-Kulm und auf dem Haldigrat. Da die nähere Umgebung des Lichtfallenstandortes eine stark genutzte Weidlandschaft ist, wurden hier relativ mehr gut fliegende, aus der Rasen-Vegetation stammende Nachtfalter erbeutet, die am ehesten unter den Eulenfalter zu finden sind.

4. ANZAHL INDIVIDUEN (Tabelle 2, Kreisdiagramm 4,5)

Die Gesamtanzahl der erbeuteten Individuen wird nicht nur durch die ökologischen Gegebenheiten und durch die Witterung beeinflusst, sondern auch durch die schwankende und unberechenbare Häufigkeit der Wanderfalter (vor allem Noctuidae). Das Jahr 1977 war auf Rigi-Kulm wie auch auf Pilatus-Kulm ziemlich reich an Wanderfaltern. Dagegen blieben die Massenwanderungen der häufigsten Arten 1978 auch auf Rigi-Kulm weitgehend aus. Die Sommer 1979 und 1980 waren in dieser Hinsicht nur wenig besser, ähnlich wie auf dem Pilatus.

Bedingt durch die höhere Anzahl Wanderfalter auf Rigi-Kulm liegt die Beteiligung der Noctuidae hier durchschnittlich noch etwas höher als auf Pilatus-Kulm und auf dem Haldigrat. In einzelnen Jahren wurden jedoch auch an diesen Plätzen ähnlich hohe Prozentsätze von Noctuidae festgestellt. Allerdings wurde auf Rigi-Kulm 1977 mit 97,0% eine "Rekordbeteiligung" erreicht.

Die Schwankung der jährlichen Prozentsätze war auf Pilatus-Kulm 1977-80 charakteristischerweise der von Rigi-Kulm 1977-80 recht ähnlich.

Die Beteiligung der Geometridae erreichte infolgedessen im Jahre 1977 einen "Rekordtiefstand" mit nur 2,9%. Hier ist besonders beachtenswert wie auf Rigi und Pilatus die jährlichen Individuenzahlen ähnlich schwanken:
1977: 547 bzw. 440 - 1978: 220 bzw. 214 1979: 266 bzw. 261 1980: 374 bzw. 353.
Diese Ähnlichkeiten halte ich für ganz spektakulär, da es sich um an Ort und Stelle aufgewachsene Tiere handelt, und nicht um Wanderfalter.

Auch diesmal habe ich die Anteile der Familien nach Ausschluss der hier nicht bodenständigen Wanderfalterarten berechnet (Kreisdiagramm 5). Dadurch sinkt der Anteil der Familie Noctuidae (Fehlen der Wandernoctuiden), doch ist er trotzdem in allen Jahren deutlich höher als auf Pilatus-Kulm und auf dem Haldigrat. Der Grund dafür ist vor allem die erhöhte Häufigkeit von *Hada nana* und *Chersotis cuprea* auf Rigi-Kulm. Die hauptsächlichsten Ursachen wurden am Schluss des Kapitels 3 erörtert.

Tabelle 2: Familienzugehörigkeit der auf Rigi-Kulm, 1760 m, mit einer Lichtfalle erbeuteten
Macroheterocera-Arten und -Individuen in den einzelnen Jahren und insgesamt.

FAMILIEN	1977-80		160 W MLL				125 W HQL				1977-80		160 W MLL				125 W HQL			
			1977		1978		1979		1980				1977		1978		1979		1980	
	Art	%	Art	%	Art	%	Art	%	Art	%	Expl.	%	Expl.	%	Expl.	%	Expl.	%	Expl.	%
ARCTIIDAE *	4	2,4	2	1,6	2	2,3	4	3,8	1	1,2	18	>0,1	5	>0,1	4	0,2	7	0,1	2	>0,1
NOTODONTIDAE	5	3,0	3	2,5	2	2,3	1	0,9	2	2,4	9	>0,1	3	>0,1	2	>0,1	2	>0,1	2	>0,1
SPHINGIDAE *	2	1,2	2	1,6	-	-	1	0,9	1	1,2	12	>0,1	2	>0,1	-	-	9	0,1	1	>0,1
LASIOCAMPIDAE	3	1,8	-	-	1	1,2	2	1,9	-	-	3	>0,1	-	-	1	>0,1	2	>0,1	-	-
NOCTUIDAE *	93	56,0	68	55,3	49	56,3	64	59,8	50	59,5	30317	95,4	18142	97,0	1988	89,8	6211	95,6	3976	91,3
GEOMETRIDAE	58	35,0	47	38,2	33	37,9	35	32,7	29	34,5	1407	4,4	547	2,9	220	9,9	266	4,1	374	8,6
PSYCHIDAE *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPIALIDAE	1	0,6	1	0,8	-	-	-	-	1	1,2	6	>0,1	4	>0,1	-	-	-	-	2	>0,1
Macroheterocera (Lichtfalle)	166	100,0	123	100,0	87	100,0	107	100,0	84	100,0	31772	100,0	18703	100,0	2215	100,0	6497	100,0	4357	100,0
Lichtfalle + Tagfang	170																			
Diurna	36																			
Macrolepidoptera insgesamt	206																			

* = + 1 Art nur beim Tagfang (siehe Kapitel 13 sowie Tabelle 12)

1977-80 (31772 Ex.)

Kreisdiagramm 4:
 Familienzugehörigkeit der auf
 Rigi-Kulm, 1760 m, mit einer
 Lichtfalle erbeuteten
Macroheterocera
 Individuen
 (Wanderfalter inbegriffen)
 insgesamt und in den einzelnen
 Jahren gesondert (Tabelle 2).

weitere 4 Familien 0,2
 Geometridae 4,4%

Noctuidae 95,4%

1977 (18703 Ex.) MLL

weitere 4 Familien 0,1%

Geometridae 2,9%

Noctuidae
97,0%

1978 (2215 Ex.)

weitere 3 Familien 0,3%

Geometridae 9,9%

Noctuidae
89,8%

1979 (6497 Ex.) HQL

weitere 4 Familien 0,3%

Geometridae 4,1%

Noctuidae
95,6%

1980 (4357 Ex.)

weitere 4 Familien 0,1%

Geometridae 8,6%

Noctuidae
91,3%

1977-80 (8844 Ex.)

weitere 5 Familien 0,4%
Geometridae 15,9%

Kreisdiagramm 5:

Familienzugehörigkeit der auf Rigi-Kulm, 1760 m, mit einer Lichtfalle erbeuteten Macroheterocera Individuen insgesamt und in den einzelnen Jahren gesondert,

ohne Wanderfalter.

1977 (3218 Ex.)

weitere 4 Familien 0,4%
Geometridae 17,0%

MLL

1978 (1707 Ex.)

weitere 3 Familien 0,4%
Geometridae 12,9%

1979 (1828 Ex.)

weitere 3 Familien 0,6%
Geometridae 14,6%

HQL

1980 (2091 Ex.)

weitere 3 Familien 0,3%
Geometridae 17,9%

STATISTISCHE DATEN (Lichtfallenfang)

5.1. Artenzahl 1977 (MLL)	123	74,1%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
1978 (MLL)	87	52,4%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
1979 (HQL)	107	64,5%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
1980 (HQL)	84	50,6%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten

Der Anteil der bereits im ersten Betriebsjahr erbeuteten Arten ist noch etwas höher als auf Pilatus-Kulm. Die jährlichen Artenzahlen gingen anschliessend, wie auf Pilatus-Kulm, ziemlich deutlich zurück. Wie schon gesagt, kann diese Abnahme bzw. Schwankung auf ungünstige Witterungsverhältnisse zurückgeführt werden.

5.2. Artenzahl 1977 (MLL)	123	74,1%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
neue Arten 1978 (MLL)	17	10,3%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
neue Arten 1979 (HQL)	18	10,8%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten
neue Arten 1980 (HQL)	8	4,3%	aller mit der Lichtfalle erbeuteten Arten

Die Anzahl der neuen Arten nahm, wie dies zu erwarten ist, allmählich ab. Im Gegensatz zu Pilatus-Kulm kamen also auf Rigi-Kulm im letzten Betriebsjahr nur noch sehr wenige neue Arten hinzu.

5.3. a/ In allen 4 Jahren erbeutet	49 Arten	29,5%
b/ In 2 bis 3 Jahren erbeutet	59 Arten	35,6%
c/ Nur in einem Jahr erbeutet	58 Arten	34,9%
davon nur 1977 (MLL)	25 Arten	} 35 Arten (21,1%)
1978 (MLL):	10 Arten	
1979 (HQL):	15 Arten	
1980 (HQL)	8 Arten	

Sowohl die Zahlen, als auch die Anteile sind denjenigen von Pilatus-Kulm ziemlich ähnlich. Allerdings sind die Prozentsätze a/ und c/ erwartungsgemäss etwas niedriger.

5.4. a/ Wenigstens an einem Tag über 10 Expl.		
in der Ausbeute der Lichtfalle (siehe Tab.12)	bei 25 Arten	16,1%
b/ Davon wenigstens an einem Tag über 100 Expl.		
(<i>S.ipsilon</i> , <i>N.pronuba</i> , <i>H.nana</i> , <i>A.gamma</i>)	bei 4 Arten	2,4%

a/ Bedingt durch die ökologischen Gegebenheiten von Rigi-Kulm sind Anzahl und Beteiligung höher als auf Pilatus-Kulm, niedriger als auf dem Haldigrat und viel niedriger als auf Mt.Generoso-Vetta.

b/ Die gleichen vier Arten wie auf dem Haldigrat (auf Pilatus-Kulm: *ipsilon*, *pronuba* und *gamma*; auf Mt.Generoso-Vetta davon nur *ipsilon*).

5.5. a/ Jahresdurchschnitt über 100 Expl. (Tab.2,12)	bei 5 Arten	3,0%
b/ Wenigstens in einem Jahr mit über 100 Expl. (Tab.2,12)	bei 12 Arten	7,2%
c/ In 4 Jahren nur 1 Expl. erbeutet (siehe Tab.12)	bei 44 Arten	26,5%

a/ Aehnlich wie Haldigrat, gleich wie Pilatus-Kulm, viel niedriger als Mt.Generoso.

b/ Aehnlich wie Pilatus-Kulm, höher als Haldigrat, viel niedriger als Mt.Generoso.

c/ Etwas mehr als auf dem Haldigrat, weniger als auf Pilatus-Kulm, viel weniger als auf Mt.Generoso-Vetta (dort allerdings nur Dreijahresbetrieb!)

6. BESTIMMUNG DER AUSBEUTE

Bei problematischen Fällen wurden entweder immer oder nur stichprobenweise Genitaluntersuchungen durchgeführt, und zwar entweder an den noch weichen Tieren oder nach vorgängiger Abdomenmazeration bei Belegstücken. Die folgenden Arten wurden aufgrund der Genitaluntersuchungen determiniert:

Chersotis ocellina, *Kadena caesia*, *Amphipyra pyramidea*, *A.berbera*, *Oligia strigilis*, *Amphipoea oculus niatitans*, *Sacculia lucifuga*, *Nycteaola revayana*, *Sporinia christyi*, *O.autumnata*, *Coenotephria incultraria*, *Eupithecia satyrata*, *E.lariciata*, *Thera varjata* ♀ und *Th.albonigrata* ♀.

Die Männchen von *Thera varjata* und *Th.albonigrata* wurden nach der Form der Fühlerglieder identifiziert.

7. DIE HÄUFIGSTEN ARTEN IN DER LICHTFALLENAUSBEUTE (Tab.1, Diagramm 1, Foto 2)

- 7.1. *Noctua promeba* L. (Noctuidae), Foto 2/1a: Wanderfalter. Wie auf dem Haldigrat und auf Pilatus-Kulm, die überwiegend häufigste Art, mit beinahe so hoher Beteiligung wie auf Pilatus. Sie war auch auf Mt.Generoso-Vetta an erster Stelle, jedoch mit viel niedriger Individuenzahl und Massenanteil. In den einzelnen Jahren entweder erste oder dritte in der Reihenfolge. Wie auf Pilatus-Kulm auch hier vor allem 1977 massenhaft, aber auch 1979 mit einer Beteiligung von 37%. In Aspekten (siehe Kapitel 8) zwischen A VI und M VIII oft dominant oder subdominant (im weiteren Sinne, weil nicht bodenständig). Ausführlicher über ihr Auftreten in der Schweiz 1977-80 siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Hier finden sich auch Anflugdiagramme von Rigi-Kulm.
- 7.2. *Autographa gamma* L. (Noctuidae), Foto 2/1b: Wanderfalter. Auf dem Haldigrat und auf Pilatus-Kulm ebenfalls an 2. Stelle, allerdings dort mit etwas höherer Beteiligung. Auf Mt.Generoso-Vetta ebenfalls zweite, jedoch mit viel niedriger Individuenzahl und Massenanteil. Im Jahre 1980 auch auf Rigi-Kulm an 1. Stelle, und zwar mit hoher Beteiligung (39,5%). Allerdings war sie im gleichen Jahr auf Pilatus-Kulm mit 59,5% an der Jahresausbeute an Nachtgrossofaltern beteiligt, dagegen auf Mt.Generoso-Vetta, trotz erster Stelle, nur mit 13,4%. Auf Rigi-Kulm war sie in Aspekten vor allem ab E VII oft dominant oder subdominant (im weiteren Sinne, weil nicht bodenständig), 1980 sogar bis A X. Ausführlicher über ihr Auftreten in der Schweiz 1977-80 siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Hier finden sich auch Anflugdiagramme von Rigi-Kulm.
- 7.3. *Hada nana* HUFN. (Noctuidae), Foto 2/1c, Anflugdiagramm 1: Die häufigste bodenständige Nachtgrossofalterart hat hier mit *S.ipsilon* (siehe unten) den Platz getauscht. Sie wurde sowohl zahlenmässig als auch prozentual viel häufiger erbeutet als auf dem Haldigrat oder auf Pilatus-Kulm, wo sie an 4. Stelle stand. Obwohl sie auf Mt.Generoso-Vetta 1979-81 durchschnittlich nur an 9. Stelle stand, war sie dort 1981 mit einer Beteiligung von 8,5% sogar die häufigste Art. Wie auf Pilatus-Kulm auch auf Rigi-Kulm vor allem 1977 sehr zahlreich. Ihre Beteiligung liegt 1978-80 jedoch deutlich höher (weniger Wanderfalter). Im Jahre 1978 auch hier sogar an 1. Stelle (in diesem Jahr blieben die Massenflüge der häufigsten Wanderfalterarten weitgehend aus). Ab A oder E VI in 5 bis 6 nacheinanderfolgenden Dekaden alljährlich dominant, allerdings manchmal nur im engeren Sinne (hinter den häufigsten Wanderfalterarten). Sie scheint in den Zentralschweizer Nordalpen oberhalb der Waldgrenze die häufigste bodenständige Nachtgrossofalterart zu sein. Ihre Häufigkeit ist jedoch nicht nur für die höheren Lagen der Alpen charakteristisch, sondern interessanterweise auch für die von anderen eurasiatischen Hochgebirgen wie z.B. Kaukasus (POLTAWSKI 1982) oder Altai (mündliche Mitteilung von Herrn KAURI MIKKOLA, Helsinki).
- 7.4. *Scotia ipsilon* HUFN. (Noctuidae), Foto 2/2a: Wanderfalter. Diese sowohl auf dem Haldigrat als auch auf Pilatus-Kulm und auf Mt.Generoso-Vetta dritthäufigste Art steht hier an 4. Stelle. Durchschnittsbeteiligung (6,1%) ähnlich Pilatus und Mt.Generoso. Allerdings 1979 auch auf Rigi-Kulm an 3. Stelle, mit deutlich höherer Beteiligung (14,5%), gleichzeitig auf Pilatus-Kulm an 2. und auf Mt.Generoso-Vetta sogar an 1. Stelle. In den Jahren 1977 und 1979 in mehreren Dekaden sensu lato dominant, am frühesten E VIII. Ausführlicher über ihr Auftreten in der Schweiz 1977-80 siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Hier finden sich auch Anflugdiagramme von Rigi-Kulm.
- 7.5. *Chersotis cuprea* D.S. (Noctuidae), Foto 2/2b, Anflugdiagramm 3: Die zweithäufigste bodenständige Art von Rigi-Kulm ist eine charakteristische montan-subalpine Faunenkomponente (in den tieferen Lagen nur sehr selten oder als Glazialrelikt). Typisch für feuchte bis mässig feuchte (mesophile) Wiesenlandschaften, Alpmatten. Damit ist sie eine wichtige Charakterart von Rigi-Kulm. Aus den oben erwähnten ökologischen Gründen stand sie auf Pilatus-Kulm nur an 48. Stelle. Dagegen wurde sie auf dem Haldigrat (an 9. Stelle) häufig erbeutet, und noch etwas zahlreicher auf Mt.Generoso-Vetta, obwohl sie dort nur an 19. Stelle stand. Auf Rigi-Kulm vor allem 1978 häufig (an 2. Stelle!), mit hoher Beteiligung in diesem Jahr (14,3%). In so hoher jährlichen Anzahl (317 Expl.) wurde sie weder auf dem Haldigrat noch auf Mt.Generoso-Vetta nachgewiesen. Im Jahre 1978 in vier, 1979-80 in je einer Dekade sogar neben den

1977 (MLL)

N. pronuba 60,4%*A. gamma* 14,3%*H. nana* 7,8%*S. epsilon* 4,7%*A. monoglypha* 1,0%*Ch. cuprea* 1,0%

weitere 117 Arten 10,8%

insgesamt 18.703 Expl.

1978 (MLL)

H. nana 23,8%*Ch. cuprea* 14,3%*N. pronuba* 10,0%*A. gamma* 7,4%*C. rubricosa* 6,6%*O. gothica* 4,6%

weitere 81 Arten 33,3%

insgesamt 2.215 Expl.

1979 (MLL)

N. pronuba 37,0%*A. gamma* 17,5%*S. epsilon* 14,5%*H. nana* 12,1%*A. monoglypha* 1,6%*Ch. cuprea* 1,6%

weitere 101 Arten 15,7%

insgesamt 6.497 Expl.

1980 (MLL)

A. gamma 39,5%*H. nana* 19,5%*N. pronuba* 9,6%*B. adusta* 2,8%*C. rubricosa* 2,6%*O. gothica* 2,6%

weitere 78 Arten 23,4%

insgesamt 4.357 Expl.

Diagramm 1: Anteile der sechs häufigsten Nachtgrossfalterarten in der Macrolepidopterenausbeute der Lichtfalle auf Rigi-Kulm, in den einzelnen Jahren gesondert (zur Tabelle 3)

Tabelle 3: Die häufigsten Arten in der Ausbeute der Lichtfalle auf Rigi-Kulm mit Individuenzahlen, Massenanteilen und Häufigkeits-Rangnummern in den einzelnen Jahren und insgesamt.

Schrifttypen:

Noctuidae

Geometridae

No.	Artname	1977-80		1 6 0 W M L L						1 2 5 W			H Q L		
				1977			1978			1979			1980		
		Expl.	%	Expl.	%	No.	Expl.	%	No.	Expl.	%	No.	Expl.	%	No.
1.	<i>N.pronuba</i>	14335	45,1	11292	60,4	1.	221	10,0	3.	2404	37,0	1.	418	9,6	3.
2.	<i>A.gamma</i>	5926	18,7	2902	15,5	2.	165	7,4	4.	1136	17,5	2.	1723	39,5	1.
3.	<i>H.nana</i>	3633	11,4	1466	7,8	3.	527	23,8	1.	789	12,1	4.	851	19,5	2.
4.	<i>S.ipsilon</i>	1936	6,1	881	4,7	4.	49	2,2	10.	941	14,5	3.	65	1,5	11.
5.	<i>Ch.cuprea</i>	709	2,2	189	1,0	6.	317	14,3	2.	103	1,6	6.	100	2,3	7.
6.	<i>B.adusta</i>	398	1,3	119	0,6	9.	68	3,1	7.	88	1,4	7.	123	2,8	4.
7.	<i>M.pisi</i>	391	1,2	170	0,9	7.	63	2,8	8.	72	1,1	9.	86	2,0	9.
8.	<i>A.monoglypha</i>	342	1,1	190	1,0	5.	21	0,9	16.	106	1,6	5.	25	0,6	19.
9.	<i>C.rubricosa</i>	331	1,0	25	0,1	23.	147	6,6	5.	45	0,7	13.	114	2,6	5.
10.	<i>X.montanata</i>	305		123	0,7	8.	31	1,4	12.	52	0,8	10.	99	2,3	8.
11.	<i>M.glauca</i>	262	0,8	97	0,5	11.	16	0,7	20.	85	1,3	8.	64	1,5	12.
12.	<i>O.gothica</i>	251		11	0,1	35.	102	4,6	6.	26	0,4	17.	112	2,6	6.
13.	<i>C.verberata</i>	224	0,7	88	0,5	13.	56	2,5	9.	9	0,1	32.	71	1,6	10.
14.	<i>M.andereggi</i>	180	0,6	89	0,5	12.	20	0,9	17.	48	0,7	11.	23	0,5	21.
15.	<i>D.marmorosa</i>	163	0,5	64	0,3	16.	28	1,3	14.	29	0,4	15.	42	1,0	13.
16.	<i>Th.albonigrata</i>	161		66	0,4	15.	22	1,0	15.	43	0,7	14.	30	0,7	18.
17.	<i>C.graminis</i>	156		83	0,4	14.	38	1,7	11.	16	0,2	24.	19	0,4	22.
18.	<i>A.c-nigrum</i>	132	0,4	112	0,6	10.	11	0,5	24.	6	0,1	43.	3	0,1	39.
19.	<i>Ph.meticulosa</i>	121		58	0,3	18.	12	0,5	22.	27	0,4	16.	24	0,6	20.
20.	<i>D.templi</i>	106	0,3	20	0,1	26.	31	1,4	12.	18	0,3	21.	37	0,9	14.
21.	<i>A.crenata</i>	95		19	0,1	28.	20	0,9	17.	47	0,7	12.	9	0,2	29.
22.	<i>O.strigilis</i>	92		61	0,3	17.	14	0,6	21.	2	0,1	65.	15	0,3	26.
23.	<i>Th.variata</i>	86		34	0,2	21.	12	0,5	22.	5	0,1	46.	35	0,8	15.
24.	<i>S.simplonia</i>	82		51	0,3	19.	9	0,4	27.	18	0,3	21.	4	0,1	37.
	<i>D.citrata</i>	82		30	0,2	22.	9	0,4	27.	11	0,2	30.	32	0,7	16.
26.	<i>Th.cognata</i>	64	0,2	21	0,1	25.	11	0,5	24.	14	0,2	25.	18	0,4	24.
27.	<i>E.grisescens</i>	59		37	0,2	20.	9	0,4	27.	12	0,2	28.	1	0,1	59.
28.	<i>A.aemula</i>	55		8	0,1	39.	9	0,4	27.	19	0,3	20.	19	0,4	22.
29.	<i>C.salicata</i>	49		17	0,1	30.	9	0,4	27.	9	0,1	32.	14	0,3	27.
30.	<i>L.populata</i>	46	0,1	20	0,1	26.	7	0,3	32.	11	0,2	30.	8	0,2	31.
	<i>D.truncata</i>	46		8	0,1	39.	3	0,1	45.	22	0,3	19.	13	0,3	28.
32.	<i>A.circellaris</i>	43		1	0,1	90.	5	0,2	38.	6	0,1	43.	31	0,7	17.
33.	<i>A.prasina</i>	39		9	0,1	38.	3	0,1	45.	25	0,4	18.	2	0,1	47.
	<i>A.macilenta</i>	39		-	-	-	10	0,5	26.	13	0,2	26.	16	0,4	25.
35.	<i>M.secalis</i>	32		17	0,1	30.	3	0,1	45.	12	0,2	28.	-	-	-
	<i>L.suffumata</i>	32		4	0,1	57.	6	0,3	34.	17	0,3	23.	5	0,1	34.
37.	<i>A.bractea</i>	30		6	0,1	48.	3	0,1	45.	13	0,2	26.	8	0,2	31.
38.	<i>E.caesiata</i>	28		23	0,1	24.	2	0,1	53.	2	0,1	65.	1	0,1	59.
39.	<i>D.mendica</i>	27		10	0,1	36.	6	0,3	34.	9	0,1	32.	2	0,1	47.
40.	<i>N.fimbriata</i>	26		16	0,1	32.	-	-	-	8	0,1	38.	2	0,1	47.
	<i>Ch.siterata</i>	26		7	0,1	43.	7	0,3	32.	3	0,1	55.	9	0,2	29.
42.	<i>E.recussa</i>	21		14	0,1	33.	2	0,1	53.	5	0,1	46.	-	-	-
	<i>S.exclamationis</i>	21		18	0,1	29.	1	0,1	64.	1	0,1	75.	1	0,1	57.
	<i>G.bidentata</i>	21		6	0,1	48.	6	0,3	34.	3	0,1	55.	6	0,1	33.
45.	<i>M.unipuncta</i>	20		-	-	-	20	0,9	17.	-	-	-	-	-	-
	<i>A.praeformata</i>	20		12	0,1	34.	2	0,1	53.	1	0,1	75.	5	0,1	34.
47.	<i>E.variabilis</i>	18		10	0,1	36.	4	0,2	40.	3	0,1	55.	1	0,1	57.
48.	<i>E.decora</i>	17		8	0,1	39.	6	0,3	34.	3	0,1	55.	-	-	-
	<i>T.dubitata</i>	17		5	0,1	54.	4	0,2	40.	4	0,1	50.	4	0,1	37.
	<i>Ch.miata</i>	17		2	0,1	72.	1	0,1	64.	9	0,1	32.	5	0,1	34.

Wanderfaltern dominant. Wenn wir die nicht bodenständigen Arten ausser acht lassen, können jährlich 20 bis 50 Tage dauernde "cuprea-Aspekte" erkannt werden, und zwar meist ab M VIII bis A IX A X.

7.6. *Blepharita adusta* ESP. (Noctuidae), Foto 2/2c: Eine auf Rigi-Kulm ebenfalls bodenständige montan-subalpine, eher vaccinietale Art, die nicht nur an offenen Plätzen sondern auch in Fichtenwäldern meist häufig ist. Auch auf dem Haldigrat (10.), auf Pilatus-Kulm (9.) und auf Mt.Generoso-Vetta (nur an 29. Stelle aber zahlenmässig nicht seltener als auf Pilatus-Kulm) wurde sie häufig erbeutet, allerdings nicht so zahlreich, wie auf Rigi-Kulm. Vor allem 1980 häufig (an 4. Stelle in diesem Jahr). Im "nana-Aspekt" für einzelne Dekaden gelegentlich subdominant, mit einer Ausnahme (A VIII 1980) allerdings nur im engeren Sinne (hinter *pronuba* oder *gamma* und *nana*).

7.7. *Mamestra pisi* L. (Noctuidae), Foto 2/3a: Kollin bis subalpin verbreitet, jedoch meist nur montan-subalpin häufig. Pilatus-Kulm ist für sie offensichtlich viel zu hoch und ökologisch ungeeignet (an 34. Stelle). In einem Jahr war sie jedoch auch dort etwas häufiger (an 22. Stelle) Ueberraschenderweise 1972-75 auch auf dem Haldigrat recht selten (an 37. Stelle). Dies kann eventuell populationsdynamische Ursachen haben. Dagegen wurde sie auf Mt.Generoso-Vetta meist viel häufiger erbeutet (an 6. Stelle), als auf Rigi-Kulm. Im "nana-Aspekt" für einzelne Dekaden alljährlich subdominant, allerdings wie auch *adusta*, mit einer einzigen Ausnahme (E VII 1978) stets nur im engeren Sinne (hinter *gamma* oder *nana* und *pronuba*).

7.8. *Apamea monoglypha* HUFN. (Noctuidae), Foto 2/3b: Sie ist in den tieferen Lagen der Schweiz bestimmt bodenständig, wenn auch nicht sehr häufig, kommt jedoch in den höheren Lagen offensichtlich als Wanderfalter manchmal in grosser Anzahl ans Licht. Auf Pilatus-Kulm und auf dem Haldigrat nur an 19. Stelle (auf dem Haldigrat 1975 allerdings an 6.), dagegen auf Mt.Generoso-Vetta 1979-81 die vierthäufigste Nachtgrosffalterart (vor allem 1979 sehr häufig, aber auch 1981 zahlreich) Auf Rigi-Kulm ebenfalls 1979 (an 5. Stelle) sowie auch im Jahre 1977 (5.) zahlreich erbeutet. Da sie in hoher Anzahl meist gleichzeitig mit anderen Massenwanderern ans Licht kommt, wurde sie in den Aspekten weder dominant noch subdominant. Ausführlicher über ihr Auftreten in der Schweiz 1977-80 siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Hier finden sich auch Anflugdiagramme von Rigi-Kulm.

7.9. *Cerastis mbricosa* D.S. (Noctuidae), Foto 2/3c: Neben *Orthosia gothica* die zweite charakteristische Art der Frühjahrsaspekte in den montanen bis alpinen Regionen; meist auch kollin häufig. Auf dem Haldigrat in der Lichtfalle nur selten, dagegen bei persönlichem Lichtfang auch dort zahlreich. Auf Pilatus-Kulm sogar an 7. Stelle und jedes Jahr ca. gleich häufig. Auf Mt.Generoso-Vetta nur an 70. Stelle, doch war dort die Lichtfalle während der Hauptflugzeit der Art meist nicht in Betrieb. Auf Rigi-Kulm E V - A VI meist aspektdominant (in den tieferen Lagen nördlich der Alpen ist in der Regel *O.gothica* die häufigere Art)

7.10. *Xanthorhœ montarata* D.S. (Geometridae), Foto 2/4a: Die häufigste Spannerart von Rigi-Kulm ist eine weitverbreitete montan-subalpine, auf Wiesen charakteristische Art. Sie war auf Pilatus-Kulm (15.), auf dem Haldigrat (23.) und auf Mt.Generoso-Vetta (27.) ebenfalls recht häufig, wenn auch weniger als auf Rigi-Kulm. Hier vor allem 1977 (8.) und 1980 (8.) zahlreich. Im engeren Sinne in einer Dekade dominant (E VII 1979) und in zwei Dekaden subdominant (M VII 1977 und A VIII 1979).

7.11. *Mamestra glauca* HBN. (= *birens* GZE) (Noctuidae), Foto 2/4b: Ebenfalls ein montan-subalpiner Wiesenbewohner, der sowohl auf dem Haldigrat als auch auf Pilatus-Kulm etwas seltener erbeutet wurde (an 16. Stelle). Allerdings waren die jährlichen Individuenzahlen beim HQL-Betrieb auch auf dem Haldigrat den Fangergebnissen von Rigi-Kulm ähnlich. Die Art wurde auf Mt.Generoso-Vetta genau so häufig wie auf Pilatus-Kulm erbeutet (88 Expl.), trotzdem steht sie damit dort nur an 42. Stelle (grosse Anzahl häufiger Arten) Auf Rigi-Kulm, ausgenommen 1978, jedes Jahr ca. gleich häufig. Im "nana-Aspekt" s.str. einmal auch subdominant (A VI 1977)

Foto 2: Die häufigsten Nachtgrossfalter-Arten in der Ausbeute der Lichtfalle auf Rigi-Kulm, 1760 m, 1977-1980, in der Reihenfolge ihrer durchschnittlichen Häufigkeit (siehe Tabelle 3).

1a: *Noctua pronuba* L., 1b: *Autographa gamma* L., 1c: *Hada nana* HUFN., 2a: *Scotia ipsilon* HUFN., 2b: *Chersotis cuprea* D.S.,
2c: *Blepharita adusta* ESP., 3a: *Mamestra pisi* L., 3b: *Apamea monoglypha* HUFN., 3c: *Cerastis rubricosa* D.S.,
4a: *Xanthorhoë montanata* D.S., 4b: *Mamestra glauca* HBN., 4c: *Orthosia gothica* L., 5a: *Coenotephria verberata* SCOP.,
5b: *Mythimna andereggi* B., 5c: *Discestra marmorosa microndon* GN.

Anflugdiagramm 1: *Hada nana* HUFN.

1 mm = 1-5 Expl.

(Anflugdiagramme der Arten *A. convolvuli*, *S. ipsilon*, *N. pronuba*, *A. c-nigrum*, *M. unipuncta*, *Ph. meticulosa*, *A. monoglypha* und *A. gamma* siehe in REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?)

Anflugdiagramm 2: *Scotia simplonia* HBN.

Anflugdiagramm 3: *Chersotis cuprea* D.S.

Anflugdiagramm 4: *Epipsilia grisescens* F.

Anflugdiagramm 5: *Mythimna andereggi* B.

Anflugdiagramm 6: *Dasypolia templi alpina* RGHER.

1 mm = 1 Expl.

Anflugdiagramm 7: *Autographa aemula* D.S.

1 mm = 1 Expl.

Anflugdiagramm 8: *Thera variata* D.S.

Anflugdiagramm 9: *Thera albonigrata* GORN. (*britannica* TURN.)

7.12. *Orthosia gothica* L. (Noctuidae), Foto 2/4c: Neben *C. rubricosa* (siehe oben) die zweite euryöke Charakterart der Frühjahrsaspekte in den kollinen (nördl. Alpenvorland) und in den montan-subalpinen Regionen. Auf Rigi-Kulm je nach Frühlingsbeginn aspektsubdominant bis A - M VI.

7.13. *Coenotepteria verberata* SCOP. (Geometridae), Foto 2/5a: Die zweithäufigste Spannerart von Rigi-Kulm ist zugleich die häufigste subalpin-alpine Faunenkomponente des Untersuchungsgebietes. Charakteristisch für Alpwiesen und Almatten. Sie wurde sowohl auf dem Haldigrat (21.) als auch auf Pilatus-Kulm (21.) deutlich seltener erbeutet und überraschenderweise gar nicht auf Mt.Generoso-Vetta (evtl. zu trocken?). Auf Rigi-Kulm nur 1979 selten, sonst jedes Jahr ca. gleich häufig. Auch während der Tagfänge wurde sie gelegentlich zahlreich beobachtet. Jedes Jahr in einzelnen Dekaden s.str. aspektdominant (A VIII 1977, M VIII 1978) oder -subdominant (E VIII 1977, E VIII 1978, M VIII 1979, E VIII 1980).

7.14. *Mythimna andereggi* B. (Noctuidae), Foto 2/5b, Anflugdiagramm 5: Obwohl dieser ebenfalls subalpin-alpine Wiesenbewohner in den Alpen meist sehr häufig ist, habe ich auf dem von den Alpen deutlich isolierten Rigi-Kulm nicht mit einer solchen Häufigkeit dieser Art gerechnet. Sie wurde hier vor allem 1977 recht zahlreich erbeutet (mit 89 Exemplaren an 12. Stelle). Auf Mt.Generoso-Vetta stand sie mit viel höherer Gesamtindividuenzahl an 10. Stelle (ebenfalls von den Alpen isolierte Berggruppe), auf Pilatus-Kulm mit nur etwas höherer Individuenzahl sogar an 6. Stelle. Auch auf Pilatus-Kulm vor allem 1977 häufig (mit 136 Exemplaren an 5. Stelle). Auf dem Haldigrat 1972-75 nur an 20. Stelle, aber in den Jahren mit HQL-Betrieb (1974-75) wurde sie viel häufiger (mit 57 Exemplaren pro Jahr an 19. Stelle), ähnlich Rigi- und Pilatus-Kulm, nachgewiesen. In den "nana-Aspekten" für einzelne Dekaden zwischen E VI und M VII in drei Jahren subdominant, allerdings meist nur s.str. (unter den bodenständigen Arten).

7.15. *Discestra marmocosa microndon* GN. (Noctuidae), Foto 2/5c: Die montan-subalpine Form der Art kommt in den Alpen verbreitet und meist häufig vor. Auf dem Haldigrat stand sie sogar an 7. Stelle, auf Pilatus-Kulm "nur" an 11. Stelle (hier Anzahl ähnlich der von Rigi-Kulm). Dagegen wurde sie auf Mt.Generoso-Vetta deutlich seltener erbeutet (an 65. Stelle), ausgenommen 1979 (mit 35 Exemplaren an 52. Stelle)

7.16. *Thera albomigrata* GORNIK (Geometridae), Anflugdiagramm 9: Die Art soll richtig den Namen "*britannica* TURNER 1925" (AGASSIZ & SKINNER 1980, LERAUT 1980, REZBANYAI 1981b) tragen. Die beiden naheverwandten Arten, *albomigrata* und *variata* D.S. (Anflugdiagramm 8) wurden auf Rigi-Kulm erwartungsgemäss viel zahlreicher erbeutet als auf Pilatus-Kulm. Auf dem Haldigrat flogen sie im Durchschnitt etwas seltener an, in den Jahren mit HQL-Betrieb (1974-75) jedoch ähnlich häufig. Auf Mt.Generoso-Vetta waren beide Arten, durch die ökologischen Verhältnisse bedingt (Fichtenbestände nur klein und weiter entfernt), sehr selten.

Auf Rigi-Kulm wie auch auf Pilatus-Kulm und Mt.Generoso-Vetta, aber auch in den meisten meiner bisherigen Schweizer Untersuchungsgebieten, wo beide Arten nebeneinander fliegen, war *albomigrata* die häufigere Art. *Th.variata* stand auf Rigi-Kulm an 23. Stelle, aber sie wurde nur halb so häufig erbeutet. Da die Lichtfall mit ca. 300 bis 500 m noch in Sichtweite von den Fichtenbeständen entfernt stand, können die Individuenzahlen weder als zu hoch noch als zu niedrig betrachtet werden.

Ein Vergleich der Phänologie der beiden Arten (Anflugdiagramme 8 und 9) ist sehr aufschlussreich. *Th.albomigrata* neigt zu Schwärmen: die Anflugdiagramme sind denen eines Wanderfalters ähnlich, obwohl diese Art vermutlich nicht wandert. Die Hauptflugzeit liegt bereits in der ersten Hälfte Juni und nur witterungsbedingt kann eine Verschiebung oder eine zweite Hauptflugzeit zustande kommen, was z.B. 1977 (A-M VII) und 1980 (E VII) der Fall war. Die zweite Generation ist in dieser Höhenlage trotz günstiger Sonneneinstrahlung sehr unvollständig (A VIII - M IX), aber wenigstens immer noch vorhanden.

Die Flugzeit von *Th.variata* war jedes Jahr kürzer, ausgeglichener und deutlich später liegend (E VI - M VII), nur im Jahre 1980 (witterungsbedingt wie auch bei *albomigrata*

deutlich nach E VII - A VIII verschoben. Bei *variata* kam anscheinend nicht einmal eine unvollständige zweite Generation zustande.

7.17. *Cerapteryx graminis* L. (Noctuidae): ist ein montan-subalpiner Wiesenbewohner und gesellt sich als wichtige Charakterart von Rigi-Kulm zu den Arten *Ch. supra*, *X. montanata*, *M. glauca*, *C. verberata* und *M. andereggti*. Sie wurde sowohl auf dem Haldigrat (an 31. Stelle) als auch auf Mt. Generoso-Vetta (43.) etwas weniger häufig erbeutet, und auf Pilatus-Kulm, ökologisch bedingt, sehr selten (3 Expl.). Auf Rigi-Kulm vor allem 1977 (14.) und, zahlenmässig etwas weniger, auch 1978 (11.) häufig. Im engeren Sinne (unter den bodenständigen Arten) dominant A VIII 1979 und subdominant A-M VIII 1977 sowie E VIII 1979.

7.18.-19. *Amathes c-nigrum* L. und *Phlogophora meticulosa* L. (Noctuidae): In der Reihe folgen diese beiden Wanderfalterarten. Ausführlicher siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Hier finden sich auch Anflugdiagramme von Rigi-Kulm. Besonders erwähnenswert ist vor allem der "Wandertaq" von *c-nigrum* am 3.IX.1977 (86qq in der Ausbeute der Lichtfalle).

7.20. *Dasypolia templi alpina* RGHFR. (Noctuidae), Anflugdiagramm 6: Obwohl die Häufigkeit der alpinen Form von *templi* in den Zentralschweizer Alpen während meiner Untersuchungen vielerorts erwiesen wurde, ist eine so hohe Anzahl auf dem von den Alpen abgetrennten Rigi-Kulm doch ein wenig überraschend. Sie war jedes Jahr relativ häufig, und zwar ziemlich gleichmässig ab E VIII - A IX bis E IX - A X (ein Fang auch noch am 31.X.1977). Aspekt dominant E IX und E X 1977 sowie M IX 1980, im engeren Sinne auch E IX 1979. Mehrmals auch dekad-subdominant. Die überwinterten Weibchen flogen offensichtlich jedes Jahr noch vor der Inbetriebnahme der Lichtfalle (vor E V). Auf Pilatus-Kulm stand die Art an 5. Stelle und war viel häufiger als auf Rigi-Kulm. Auf Mt. Generoso-Vetta wurde sie dagegen überraschenderweise gar nicht nachgewiesen. Auf dem Haldigrat nur 4 Expl. erbeutet (es ist jedoch höchstwahrscheinlich, dass die Regelmässigkeit des Lichtfallenfanges hier im Herbst nicht gewährleistet war).

Unter den nachfolgenden häufigeren Arten finden wir noch weitere sehr charakteristische Faunenelemente, wie z.B. *Apamea crenata* HUFN., *Scotia simplonia* HBN., *Dystroma citrata* L., *Epipsilia grisescens* F., *Autographa aemula* D.S., *Calostigia salicata* HBN., *Lygris populata* L., usw. (zum Teil siehe Kapitel 10).

8. NACHTGROSSFALTER-ASPEKTE

In den Tabellen 5-6 finden wir die dominanten und subdominanten Arten der einzelnen Dekaden, in der Tabelle 4 ausser diesen noch weitere Arten mit bedeutenderer Beteiligung. Die Tabelle 5 enthält auch die häufigsten Wanderfalterarten, die in den einzelnen Dekaden nur im weiteren Sinne (sensu lato) charakteristisch sein können, da sie im Untersuchungsgebiet nicht bodenständig sind. Diese Tabelle wurde auch diesmal in einer anderen Darstellungsform noch einmal angefertigt, und zwar ohne Wanderfalter (Tab.6). Bodenständige Arten, die deshalb dominant oder subdominant geworden sind, werden als im engeren Sinne (sensu stricto) dominant bzw. subdominant bezeichnet. Bemerkungen dazu siehe in REZBANYAI 1981b, Seite 35.

Unter den Wanderfalterarten trat *N. pronuba* in 14 Dekaden "s.l." dominant und in 7 Dekaden "s.l." subdominant auf. Dies ergibt 36% aller Dekaden aus dem Zeitraum des vierjährigen Lichtfallenfangbetriebes (auf dem Haldigrat 32%, auf Pilatus-Kulm 40%). Am frühesten schon A VI, am spätesten M VIII dekad dominant. Vor allem 1977 (A-E VI, M VII - M VIII) und 1979 (E VI E VII) wurden länger andauernde "pronuba-Aspekte s.l." verzeichnet.

A. gamma wurde in je 12 Dekaden "s.l." dominant bzw. subdominant. Dies ergibt sogar 41% aller Dekaden (Haldigrat 30%, Pilatus-Kulm 48%). Am frühesten M VI, am spätesten A X dekad dominant, jedoch eher in der zweiten Hälfte des Sommers (wie Haldigrat und Pilatus-Kulm). Die "gamma-Aspekte s.l." liegen relativ zerstreut in der Beobachtungsperiode und gingen nie über mehr als zwei Dekaden hinaus.

Tabelle 4: Die Nachtgrossfalter-Aspekte mit ihren häufigsten Charakterarten, aufgrund der Lichtfallenausbeute auf Rigi-Kulm, in den vier Jahren gesondert.

Legende: A = Anfang, M Mitte, E Ende der Monate (die drei Dekaden)
 "s.l." siehe Tabelle 5

Dekad	1977 (MLL)	1978 (MLL)	1979 (HQL)	1980 (HQL)	Dekad
V. E		<u>rubricosa-Aspekt</u> <i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>B. adusta</i>	<u>rubricosa-Aspekt</u> <i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>L. suffumata</i> <i>C. salicata</i>	<u>rubricosa-Aspekt</u> <i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>B. adusta</i> <i>Ch. siterata</i> <i>Ch. miata</i>	E V.
VI. A	<u>pronuba-Aspekt s.l.</u> <i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>H. nana</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>M. glauca</i>	<i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>Th. albonigrata</i> <i>B. adusta</i> <i>L. suffumata</i> <i>C. salicata</i>	<u>nana-Aspekt</u> <i>H. nana</i> <i>C. rubricosa</i> <i>N. pronuba</i> <i>M. glauca</i> <i>Th. albonigrata</i> <i>O. gothica</i> <i>B. adusta</i> <i>S. ipsilon</i>	<i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>B. adusta</i> <i>N. pronuba</i> <i>L. suffumata</i>	A VI.
M	<i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>A. gamma</i> <i>B. adusta</i> <i>M. glauca</i> <i>S. ipsilon</i> <i>M. pisi</i> <i>M. andereggi</i>	<u>gamma-Aspekt s.l.</u> <i>A. gamma</i> <i>C. rubricosa</i> <i>N. pronuba</i> <i>O. gothica</i> <i>H. nana</i> <i>M. glauca</i>	<i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>S. ipsilon</i> <i>M. pisi</i> <i>M. glauca</i> <i>M. andereggi</i> <i>B. adusta</i>	<u>pronuba-Aspekt s.l.</u> <i>N. pronuba</i> <i>C. rubricosa</i> <i>O. gothica</i> <i>Th. albonigrata</i> <i>H. nana</i> <i>B. adusta</i> <i>M. glauca</i>	M
E	<i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>S. ipsilon</i> <i>A. gamma</i> <i>M. andereggi</i> <i>M. pisi</i> <i>Th. variata</i>	<u>nana-Aspekt</u> <i>H. nana</i> <i>M. andereggi</i> <i>M. glauca</i> <i>B. adusta</i> <i>O. gothica</i>	<u>pronuba-Aspekt s.l.</u> <i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>S. ipsilon</i> <i>M. pisi</i> <i>M. glauca</i> <i>B. adusta</i> <i>M. andereggi</i>	<i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i>	E
VII. A	<u>nana-Aspekt</u> <i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>M. pisi</i> <i>M. glauca</i> <i>A. monoglypha</i> <i>M. andereggi</i> <i>S. simplonia</i>	<i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i>	<i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>A. monoglypha</i> <i>B. adusta</i>	<u>nana-Aspekt</u> <i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>M. andereggi</i> <i>B. adusta</i>	E VII.
M	<u>pronuba-Aspekt s.l.</u> <i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>A. gamma</i> <i>A. monoglypha</i> <i>X. montanata</i> <i>S. ipsilon</i> <i>M. pisi</i>	<i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>M. pisi</i> <i>A. gamma</i> <i>B. adusta</i> <i>Th. variata</i> <i>D. marmorosa</i> <i>M. andereggi</i>	<i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>A. monoglypha</i> <i>A. gamma</i> <i>A. crenata</i> <i>B. adusta</i> <i>D. marmorosa</i> <i>M. glauca</i>	<u>pronuba-Aspekt s.l.</u> <i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i> <i>M. andereggi</i> <i>B. adusta</i>	M
E	<i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>A. monoglypha</i> <i>S. ipsilon</i> <i>B. adusta</i> <i>M. secalis</i> <i>H. nana</i>	<i>H. nana</i> <i>M. pisi</i> <i>B. adusta</i> <i>D. marmorosa</i>	<i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>X. montanata</i> <i>H. nana</i> <i>D. marmorosa</i> <i>A. aemula</i>	<u>gamma-Aspekt s.l.</u> <i>A. gamma</i> <i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>M. pisi</i> <i>X. montanata</i> <i>D. citrata</i>	E

Dekad	1977 (MLL)	1978 (MLL)	1979 (HQL)	1980 (HQL)	Dekad
VIII. A	<i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>C. verberata</i> <i>C. graminis</i> <i>X. montanata</i> <i>A. monoglypha</i>	<i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>X. montanata</i> <i>D. marmorosa</i> <i>M. pisi</i>	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>C. graminis</i> <i>S. ipsilon</i> <i>N. pronuba</i> <i>H. nana</i>	<u>nana-Aspekt</u> <i>H. nana</i> <i>B. adusta</i> <i>S. montanata</i> <i>M. pisi</i> <i>M. glauca</i> <i>D. marmorosa</i>	A VIII.
M	<i>N. pronuba</i> <i>A. gamma</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>C. graminis</i> <i>C. verberata</i> <i>E. griseescens</i>	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>N. pronuba</i> <i>C. verberata</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>C. graminis</i>	<i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>N. pronuba</i> <i>A. convolvuli</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>C. verberata</i>	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>H. nana</i> <i>N. pronuba</i> <i>B. adusta</i> <i>Th. variata</i> <i>X. montanata</i> <i>A. monoglypha</i>	M
E	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>N. pronuba</i> <i>C. verberata</i> <i>C. graminis</i>	<u>cuprea-Aspekt</u> <i>Ch. cuprea</i> <i>A. gamma</i> <i>C. verberata</i> <i>C. graminis</i> <i>D. templi</i> <i>N. pronuba</i>	<u>ipsilon-Aspekt</u> s.l. <i>S. ipsilon</i> <i>A. gamma</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>N. pronuba</i> <i>C. graminis</i> <i>D. templi</i>	<i>A. gamma</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>C. verberata</i> <i>N. pronuba</i> <i>D. templi</i> <i>Th. cognata</i> <i>C. graminis</i>	E
IX. A	<i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>N. pronuba</i> <i>A. c-nigrum</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>D. templi</i>	<i>Ch. cuprea</i> <i>A. gamma</i> <i>Th. cognata</i> <i>D. templi</i> <i>C. verberata</i>	<u>cuprea-Aspekt</u> <i>Ch. cuprea</i> <i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>D. citrata</i> <i>Th. albonigrata</i> <i>D. templi</i>	<u>cuprea-Aspekt</u> <i>Ch. cuprea</i> <i>E. templi</i> <i>N. pronuba</i> <i>B. adusta</i> <i>A. gamma</i>	A IX.
M	<u>ipsilon-Aspekt</u> s.l. <i>S. ipsilon</i> <i>A. gamma</i> <i>N. pronuba</i> <i>E. recussa</i> <i>L. populata</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>D. citrata</i>	<i>Ch. cuprea</i> <i>D. templi</i> <i>C. graminis</i> <i>L. populata</i> <i>Th. albonigrata</i>	<u>ipsilon-Aspekt</u> s.l. <i>S. ipsilon</i> <i>A. gamma</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>D. templi</i> <i>L. populata</i>	<u>templi-Aspekt</u> <i>D. templi</i> <i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>L. populata</i> <i>Th. albonigrata</i>	M
E	<u>templi-Aspekt</u> <i>D. templi</i> <i>A. circellaris</i>	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>S. ipsilon</i> <i>N. pronuba</i> <i>A. c-nigrum</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>D. templi</i>	<i>S. ipsilon</i> <i>A. gamma</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>D. templi</i>	<u>gamma-Aspekt</u> s.l. <i>A. gamma</i> <i>A. circellaris</i> <i>S. ipsilon</i> <i>Ch. cuprea</i> <i>A. macilenta</i> <i>Ch. siterata</i>	E
X. A	keine	<u>cuprea-Aspekt</u> <i>Ch. cuprea</i> <i>M. unipuncta</i> <i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>A. macilenta</i> <i>A. circellaris</i>	<u>macilenta-Aspekt</u> <i>A. macilenta</i> <i>A. circellaris</i> <i>Ch. miata</i> <i>D. templi</i> <i>A. gamma</i>	<i>A. gamma</i> <i>S. ipsilon</i> <i>A. circellaris</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>A. macilenta</i>	A X.
M	<u>ipsilon-Aspekt</u> s.l. <i>S. ipsilon</i>	<u>unipuncta-Aspekt</u> s.l. <i>M. unipuncta</i> <i>A. macilenta</i> <i>A. circellaris</i> <i>Ch. siterata</i>	<u>ipsilon-Aspekt</u> s.l. <i>S. ipsilon</i> <i>Ph. meticulosa</i> <i>A. gamma</i> <i>N. pronuba</i> <i>Poec. populi</i> <i>E. transversa</i>	↑	M
E	<u>ipsilon-templi-Aspekt</u> <i>S. ipsilon</i> <i>D. templi</i>	keine	keine		E

Tabelle 5: Nachtgrossfalter-Aspekte (Wanderfalter inbegriffen) auf Rigi-Kulm, aufgrund des Lichtfallenfanges.
(Ausführlicher siehe Tabelle 4)

Legende: ".l." (sensu lato) Die Art ist nur im weiteren Sinne dominant oder subdominant, weil sie auf Rigi-Kulm nicht oder kaum bodenständig ist (Wanderfalter)

		1977 (MLL)			1978 (MLL)			1979 (HQL)			1980 (HQL)				
Monat	Dominant	Subdominant		Dominant	Subdominant		Dominant	Subdominant		Dominant	Subdominant	Monat			
Dekad	S	A	(Aspekt)	(Subaspekt)	S	A	(Aspekt)	(Subaspekt)	S	A	(Aspekt)	(Subaspekt)	S	A	Dekad
V	E														E V
VI	A														A VI
	M		<i>N. pronuba</i> s.l.	<i>A. gamma</i> s.l.			<i>C. rubricosa</i>	<i>O. gothica</i>			<i>C. rubricosa</i>		<i>C. rubricosa</i>	<i>O. gothica</i>	M
	E			<i>H. nana</i>			<i>A. gamma</i> s.l.	<i>C. rubricosa</i>			<i>H. nana</i>		<i>N. pronuba</i> s.l.	<i>C. rubricosa</i>	E
VII	A		<i>H. nana</i>	<i>N. pronuba</i> s.l.									<i>H. nana</i>	<i>N. pronuba</i> s.l.	A VII
	M			<i>H. nana</i>				<i>N. pronuba</i> s.l.			<i>N. pronuba</i> s.l.		<i>H. nana</i>	<i>H. nana</i>	M
	E						<i>H. nana</i>			<i>N. pronuba</i> s.l.			<i>A. gamma</i> s.l.	<i>H. nana</i>	E
VIII	A		<i>N. pronuba</i> s.l.	<i>A. gamma</i> s.l.									<i>H. nana</i>	<i>B. adusta</i>	A VIII
	M						<i>A. gamma</i> s.l.	<i>N. pronuba</i> s.l.			<i>A. gamma</i> s.l.		<i>S. ipsilon</i> s.l.	<i>H. nana</i>	M
	E										<i>S. ipsilon</i> s.l.		<i>A. gamma</i> s.l.	<i>Ch. cuprea</i>	E
IX	A		<i>A. gamma</i> s.l.	<i>S. ipsilon</i> s.l.			<i>Ch. cuprea</i>	<i>A. gamma</i> s.l.			<i>Ch. cuprea</i>		<i>A. gamma</i> s.l.	<i>Ch. cuprea</i>	A IX
	M		<i>S. ipsilon</i> s.l.	<i>A. gamma</i> s.l.									<i>D. templi</i>	<i>A. gamma</i> s.l.	M
	E		<i>D. templi</i>	<i>A. circellaris</i>			<i>A. gamma</i> s.l.	<i>Ch. cuprea</i>			<i>S. ipsilon</i> s.l.		<i>A. gamma</i> s.l.	<i>A. circellaris</i>	E
X	A						<i>Ch. cuprea</i>	<i>M. unipuncta</i> s.l.			<i>A. macilenta</i>		<i>A. circellaris</i> <i>Ch. miata</i>	<i>S. ipsilon</i> s.l.	A X
	M		<i>S. ipsilon</i> s.l.								<i>S. ipsilon</i> s.l.		<i>Ph. meticulosa</i> s.l.		M
	E		<i>S. ipsilon</i> s.l.	<i>D. templi</i>											E

Legende: "s.str." oder "s.s." (sensu stricto) = Die Art ist nur im engeren Sinne (unter den bodenständigen Arten) dominant oder subdominant, weil im gleichen Zeitraum eine nicht bodenständige Wanderfalterart häufiger erbeutet wurde.

1977		(MLL)		1978		(MLL)		1979		(HQL)		1980		(HQL)		Monat		
Dekad		S	A	Dominant (Aspekt)		Subdominant (Subaspekt)		Dominant (Aspekt)		Subdominant (Subaspekt)		Dominant (Aspekt)		Subdominant (Subaspekt)		Dekad		
V	E																E	V
VI	A	9															A	VI
	M			H.nana s.str.	M.glauca s.str.												M	
	E				B.adusta s.str.													
VII	A	P		H.nana	M.andereggi s.str.												A	VII
	M			H.nana s.str.	M.pisi s.str.												M	
	E				X.montanata s.str.													
VIII	A	+	+	C.verberata s.str.	C.graminis s.str.												A	VIII
	M				C.graminis s.str.													
	E			Ch.cuprea s.str.	C.verberata s.str.													
IX	A				D.templi s.str.												A	IX
	M			E.recussa s.str.	L.populata s.str.													
	E			D.templi	A.circellaris													
X	A				Ch.cuprea s.str.												A	X
	M				A.macilenta s.str.													
	E			D.templi														

epsilon steht hier auch diesmal an 3. Stelle. Sie war in 7 Dekaden s.l. dominant und in 4 Dekaden s.l. subdominant. Dies ergibt nur 19% aller Dekaden (Haldigrat 20%, Pilatus-Kulm 21% bemerkenswerte Analogien). Am frühesten E VIII, am spätesten E X dekaddominant.

Unter den bodenständigen Arten fällt die häufige Dominanz von *H.nana* auf. Sogar in der Tabelle 5 ist sie in 10 Dekaden dominant und in weiteren 10 Dekaden subdominant; dies ergibt 34% aller Dekaden (Haldigrat 24%, Pilatus-Kulm 21%). Wenn wir die Wanderfalter beiseite lassen (Tabelle 6), ist sie sogar in 21 Dekaden dominant und in 3 Dekaden subdominant, womit sich der Prozentsatz auf 41% erhöht (wie *gamma* s.l.) (Haldigrat 29%, Pilatus-Kulm 31%). Am frühesten schon A VI, am spätesten A VIII dekaddominant, s.str. einmal sogar auch noch M VIII.

Unter den dekaddominanten Arten finden wir noch eine weitere Wanderfalterart und zwar *Mythimna unipuncta* in ihrem berühmten "Wanderjahr" 1978 (siehe in REZBANYAI 1980c und 1982b), sowie 4 weitere bodenständige Arten: *Cerastis rubricosa*, *Chersotis cuprea*, *Dasypolia templi alpina* und *Agrochola macilentata*.

Bei den "sensu stricto"-Aspekten (bodenständige Arten) gesellen sich noch 8 weitere zu den oben erwähnten bodenständigen Arten, und zwar *Blepharita adusta*, *Euxoa recussa*, *Cerapteryx graminis*, *Agrochola circumcellaris*, *Coenoteperia verberata* und *Xanthorhōe montanata* sowie in falterarmen Aspekten noch *Poecilocampa populi* und *Eupsilia transversa*.

Bodenständige, s.str. aspektdominante Arten auf Rigi-Kulm:
gemeinsam mit Pilatus-Kulm: *C.rubricosa*, *H.nana*, *C.verberata*, *D.templi alpina*,
A.macilentata

- gemeinsam mit dem Brisen-Haldigrat: *H.nana*, *Ch.cuprea*, *B.adusta*, *C.graminis*

- gemeinsam mit Mt.Generoso-Vetta: *H.nana*, *Ch.cuprea*, *A.circellaris*
nur auf Rigi-Kulm: *E.recussa*, (*E.transversa*, *Poec.populi*)

Besonders aufschlussreich ist ein Vergleich zwischen den Aspekten von Rigi- und denen von Pilatus-Kulm, da das Sammeln gleichzeitig erfolgte und deshalb populationsdynamische Schwankungen den Vergleich nicht stören.

- "sensu lato"-Aspekte (Wanderfalter inbegriffen)

1977: Hier fällt der beinahe parallele Verlauf der Aspekte ab M VI bis M IX auf (*pronuba* → *nana* → *pronuba* → *gamma* → *epsilon*).

1978: Ab E V bis M VIII ziemlich ähnlich an beiden Standorten (*rubricosa* → *gamma* → *nana* → *gamma*), auf Pilatus-Kulm ist jedoch auch *pronuba* zweimal dekaddominant. Charakteristisch ist die vikariierende* Dominanz der beiden *Chersotis*-Arten E VIII - A IX (Pilatus: *ocellina*, Rigi: *cuprea*).

1979: Verlauf ab E V bis E IX ziemlich parallel (*rubricosa* → *nana* → *pronuba* → *gamma* → *epsilon*). *Ch.cuprea* auf Rigi-Kulm auch diesmal dekaddominant (A IX), dagegen *ocellina* auf Pilatus-Kulm nur subdominant (E VIII).

1980: Verlauf E V - A VI sowie M VII - A X ziemlich parallel (*rubricosa/pronuba* → *gamma* → *nana* → *gamma* → *ocellina/cuprea* und *templi* → *gamma*), nur der "pronuba-Aspekt" des Frühsommers zeigte sich auf Rigi-Kulm etwas früher (M VI) als auf Pilatus-Kulm (A VII).

- "sensu stricto"-Aspekte (nur bodenständige Arten):

Hier sind die Analogien in den Aspekten von *rubricosa*, *nana* und *templi alpina* sowie bei den mit vikariierender Häufigkeit auftretenden Arten *ocellina/cuprea* noch stärker ausgeprägt. Charakteristisch ist an beiden Standorten die führende Rolle von *rubricosa* in den Frühjahrsaspekten (vor *O.gothica*). Dagegen war im Herbst auf Rigi-Kulm *circellaris* nur 1980 aspektdominant, auf Pilatus-Kulm jedoch in allen vier Jahren. *C.verberata* wurde 1977 auf Rigi-Kulm deutlich früher (A VIII) dekaddominant als auf Pilatus-Kulm (E VIII). Nur auf Rigi-Kulm registrierte s.str.-Aspekte: *B.adusta*, *E.recussa*, *Ch.cuprea*, *X.montanata*, *C.graminis* (eher subalpine oder montan-subalpine Arten) sowie mit mässiger Aussagekraft *Poec.populi* und *E.transversa* (eher in den tieferen Lagen verbreitete Arten). Nur auf Pilatus-Kulm registrierte s.str.-Aspekte: *Ch.ocellina*, *A.zeta*, *E.operaria* (ausschliesslich alpine Arten!).

* vikariierende (allopatrische) Arten= eine Art vertritt in einem bestimmten Gebiet eine andere, nahe verwandte Art (hier nur die unterschiedliche Häufigkeit gemeint)

9. ÖKOLOGISCHE BETRACHTUNGEN (Tabelle 7, Kreisdiagramme 6,7)

Tabelle 7: Einige Angaben zu den ökologischen Betrachtungen. Lichtfallenfangergebnisse		Artenzahl	% aller Arten (166)	% aller Arten ohne Wanderfalter (145)	Individuenzahl	% aller Individuen (31772)	% aller Individuen ohne Wanderfalter (8844)
1a	In den Nordalpen eng an die alpinen Regionen gebundene Arten	13	7,8	9,3	596	1,9	6,7
1b	Sekundär an die alpinen Regionen gebundene Arten (auch in der Nadelwaldstufe sowie vereinzelt auch in den tieferen Lagen, dort vor allem in Relikt-Hochmooren)	33	19,9	22,8	2252	7,1	25,5
2a	Wanderfalter s.str. (Gruppe I-III)	12	7,2	-	22853	71,9	
2b	Wanderfalter s.l., die hier kaum bodenständigen Arten aus der Gruppe IV	9	5,4		75	0,2	
3	Auf Fichten (<i>Picea abies</i>) lebende Arten	10	6,0	6,9	276	0,9	3,1
4	Vor allem auf Laubbäumen lebende Arten (hier entweder auf den wenigen Weiden oder eher aus den tieferen Lagen zugeflogen)	17	10,2	11,7	51	0,1	0,5
1a+b	Charakteristische bodenständige Arten der höheren Lagen	46	27,7	31,8	2848	9,0	32,2
2a+b	Wanderfalter insgesamt	21	12,6	-	22928	72,1	
3+4	Arten aus der Kronenschicht	17	10,2	18,6	327	1,0	3,6
5	Uebrige Arten (vor allem Bewohner der mittleren oder tieferen Lagen, mehr oder weniger ubiquitär, die meisten aus der Krautschicht)	72	43,5	49,3	5669	17,9	64,2

Zu Punkt 1a (Tabelle 7): *S.simplonia* (32), *S.lucernea catalaeca* (8), *Rh.helvetina* (1), *Ch.ocellina* (1), *H.caesia* (8), *M.andereggi* (180), *A.aemula* (55), *C.lineolata* (15), *E.nobiliaria* (6), *C.verberata* (224), *C.nebulata* (2), *C.incultraria* (?), *C.obsoletaria* (?)

Da die Kulminationshöhe von Rigi-Kulm die alpine Region nicht erreicht und der Höhenzug von den Nordalpen markant abgetrennt ist, liegt die Anzahl subalpin-alpiner Arten ziemlich niedrig. Noch bescheidener ist ihr Anteil an den Individuenzahlen. Lediglich vier auch subalpin weit verbreitete Arten traten häufig auf (*S.simplonia*, *M.andereggi*, *A.aemula*, *C.verberata*). Allerdings finden wir in dieser Liste auch einige charakteristische Arten der höchsten Lagen (vor allem *S.lucernea catalaeca*, *Rh.helvetina*, *Ch.ocellina*, *C.lineolata*, *C.nebulata*) die hier ohne weiteres als Glazialrelikte angesehen werden können (Nunatak-Theory)

Vergleich mit Pilatus-Kulm: Anteil an den bodenständigen Arten ca. zweimal, an den Individuenzahlen ca. viermal höher. Alle 13 oben aufgeführten Arten nachgewiesen, ferner *A.maillardii*, *A.zeta*, *C.puengeleri sauteri*, *C.aqueata*, *G.myrtillata canaria*, *E.caelibaria senilarta*, *E.operaria* und eine vermutlich noch nicht benannte *Dahlia* sp.

1977-80

(31.772 Ex.)

27,3%

72,1%

Kreisdiagramm 6:

Angaben zu den ökologischen Betrachtungen aufgrund der vierjährigen Lichtfallenfangergebnisse auf Rigi-Kulm, 1760 m (siehe Tabelle 7), und nach Jahren gesondert.

Wanderfalter

In der weiteren Umgebung bodenständige Arten

1977 (18.703 Ex.)

MLL

1978 (2.215 Ex.)

17,2%

82,8%

77,1%

22,9%

1979 (6.497 Ex.)

HQL

1980 (4.357 Ex.)

28,1%

71,9%

48,0%

52,0%

1977-80 (8844 Ex.)

Kreisdiagramm 7:

Angaben zu den ökologischen Betrachtungen aufgrund der vierjährigen Lichtfallenfangergebnisse auf Rigi-Kulm, 1760 m (siehe Tabelle 7), und nach Jahren gesondert,

ohne Wanderfalter.

- vor allem auf Laubbäumen lebende Arten
- eng an die alpinen Regionen gebundene Arten
- sekundär an die alpinen Regionen gebundene Arten
- auf Nadelholz lebende Arten
- übrige bodenständige Arten

1977 (3218 Ex.)

MLL

1978 (1707 Ex.)

1979 (1828 Ex.)

HQL

1980 (2091 Ex.)

Vergleich mit dem Haldigrät: Anteil an den bodenständigen Arten um die Hälfte, an den Individuenzahlen ca. dreimal höher. Alle 13 oben aufgeführten Arten nachgewiesen, ferner *A. maillardi*, *A. zeta*, *C. rochenwarthi*, *C. kollariaria*, *C. puengeleri sauteri*, *C. aqueata*, *J. myrtillata canaria*, *H. ganna* und *H. fuscocnebulosa*.

Vergleich mit Mt. Generoso-Vetta: Anteil an den bodenständigen Arten weniger als die Hälfte (allerdings bedeutet dies wegen der Artenvielfalt nur drei Arten weniger als auf Rigi-Kulm), bei den Individuenzahlen nur 10% weniger (zahlenmässig aber ca. doppelt so viel als auf Rigi-Kulm) Auf Mt. Generoso auch *A. zeta pernix*, *A. maillardi* und *Nyssia alpina*, dagegen keine *S. simpliciata*, *S. lucerneae catalaunica*, *Rh. helvetica*, *A. aemula*, *C. lineolata* und *C. verberata*.

In der Reihe Pilatus-Kulm - Haldigrät Rigi-Kulm - Mt. Generoso-Vetta kann man also die allmähliche Abnahme der zöologischen Bedeutung (Anteile) dieser Gruppe eindeutig erkennen, da in diesem Falle nicht die absoluten Zahlen massgebend sind. Beachtenswert ist auf Rigi-Kulm auch die relativ geringe Schwankung der Massenanteile in den einzelnen Jahren (5,7-8,4%) (Kreisdiagramm 7), was darauf hinweist, dass die Tiere aus der näheren Umgebung der Lichtfalle stammen.

Zu Punkt 1b (Tabelle 7): *P. plantaginis* (Tagfang), *E. decora simulatrix* (17), *E. recussa* (21), *E. griseocens* (53), *Rh. lucipeta* (2), *Ch. cuprea* (79), *L. porphyrea* (1), *D. mendica* (27), *A. ashworthii candelarum* (1), *A. prasina* (39), *A. marmorosa microndon* (163), *M. glauca* (262), *H. proxima* (1), *C. graminis* (156), *A. rubrivena* (7), *C. lucifuga* (7), *D. templi alpina* (106), *B. adusta* (399), *A. bractea* (30), *E. variabilis* (16), *H. obesalis* (2), *L. populata* (46), *X. munitata* (10), *Th. cognata genata* (64), *C. aptata* (1), *C. salicata* (49), *E. caesia* (28), *E. flavicinctata* (3), *E. infidaria* (2), *E. cyanata* (4), *P. minorata* (3), *H. ruberata* (5), *G. glaucinaria* (5), *C. dilucidaria* (6).

Die montane und untere subalpine Stufe sind hier dem Lichtfallenstandort relativ nahe. Die Gesamtindividuenzahl ist in dieser Gruppe deshalb relativ hoch, doch ist die Artenzahl wegen der geologischen Verhältnisse (kein Kalkgebiet) und vermutlich auch wegen anthropogener Einflüsse niedriger, als dies zu erwarten wäre. Da die Tiere zum Teil aus der weiteren Umgebung des Lichtfallenstandortes stammen, können etwas grössere Schwankungen in den jährlichen Massenanteilen zustandekommen (21,4-33,5%) (Kreisdiagramm 7).

Vergleich mit Pilatus-Kulm: Mit gleicher Artenzahl etwas höhere Beteiligung, dagegen mit halb so vielen Individuen ähnliche Beteiligung. Auch *Ph. irrorella*, *A. speciosa* und *C. sordaria mendicaria* (*P. plantaginis* wurde auf Rigi-Kulm beim Tagfang nachgewiesen), dagegen auf Pilatus-Kulm keine *E. recussa*, *H. proxima*, *C. aptata* und *E. infidaria*.

Vergleich mit dem Haldigrät: Artenzahl und deren Anteil höher; Individuenzahl etwas, ihr Anteil deutlich höher (weniger gestörte Vegetation). Auch *D. fascelina alpina*, *Ph. irrorella*, *P. sobrina*, *A. speciosa*, *E. occulta*, *Ph. captiuncula*, *S. interrogacionis*, *P. moneta*, *C. tophaceata*, *P. hydrata*, *P. capreolaria*, dagegen keine *E. recussa* (*P. plantaginis* und *E. infidaria* wurden bei persönlichen Licht- bzw. Tagfängen auch am Haldigrät erbeutet, dagegen nur dort *O. atrata*, *P. secundaria*, *D. rubeata* und *C. sordaria mendicaria*).

Vergleich mit Mt. Generoso-Vetta: Mit mehr Arten weniger Beteiligung (höherer Artenvielfalt); um ein Viertel weniger Individuen mit deutlich niedriger Beteiligung. Nur auf Mt. Generoso: *S. clavis*, *O. musiva*, *E. latens*, *Rh. similans*, *A. collina*, *E. gilva*, *C. gemmea*, *P. cnata*, *S. sin.*, *T. sabaudiata*, *C. tophaceata*; dagegen nur auf dem Rigi-Kulm: *C. lucifuga*, *D. templi alpina*, *X. munitata*, *C. aptata* und *E. infidaria*.

Zu Punkt 2a (Tabelle 7): *A. convolvuli* (11), *S. ipsilon* (1936), *N. promuba* (14335), *N. fimbriata* (26), *A. s-nigrum* (132), *P. sawia* (2), *Ph. meticulousa* (121), *M. vitellina* (1), *M. unipuncta* (20), *A. monoglypha* (342), *H. peltigera* (1), *A. gamma* (5926).

Vergleich mit Pilatus-Kulm: Nur *P. sawia* fehlt hier aus der oben aufgeführten Liste. Beteiligung der Arten und der Individuen etwas höher als auf Rigi-Kulm (Hochgebirgscharakter).

Vergleich mit dem Haldigrat: Keine *M.unipuncta*, dagegen *A.atropos*, *H.galii* und *C.pupillararia*. Beteiligung der Arten und der Individuen etwas höher als auf Rigi-Kulm (Hochgebirgscharakter)

Vergleich mit Mt.Generoso-Vetta: Keine *M.unipuncta*, dagegen *H.armigera*. Der Massenanteil der Arten ist deutlich, der der Individuen auffällig niedriger (weniger als die Hälfte) als auf Rigi-Kulm.

Ausführlicher über die Wanderfalter von Rigi-Kulm siehe Kapitel 11.

Zu Punkt 2b (Tabelle 7): *S.segetum* (5), *S.exclamationis* (21), *N.comes* (12), *N.janthina* (12), *N.interjecta* (1), *M.brassicae* (15), *M.ferrago* (2), *M.albipuncta* (2), *P.clavipalpis* (5). (Die Arten *Rh.lucipeta*, *A.pyramidea*, *A.bertera* und *A.bractea* wurden hier nicht berücksichtigt.)

Vergleich mit Pilatus-Kulm: Keine *N.janthina* und *N.interjecta*, sonst die gleichen Arten. Beteiligungen nur geringfügig niedriger.

Vergleich mit dem Haldigrat: Keine *N.interjecta* und *M.ferrago*, sonst die gleichen Arten. Beteiligungen ziemlich ähnlich.

Vergleich mit Mt.Generoso-Vetta: Die gleichen Arten, jedoch mit deutlich höherem Prozentsatz der Gesamtindividuenzahl als auf Rigi-Kulm.

Zu Punkt 3 (Tabelle 7): *C.lunigera burmanni* (1), *D.pini* (1), *Th.variata* (86), *Th.albonigrata* (161), *Th.stragulata* (10), *E.lariciata* (11), *E.tantillaria* (1), *E.lanceata* (1), *P.capreolaria* (4), *E.prasinaria* (1).

Da sich der Lichtfallenstandort von den Fichtenbeständen wohl einige Hundert Meter entfernt, aber in Sichtweite befindet, wurden relativ viele Arten erbeutet, die meisten jedoch nur in wenigen Exemplaren. Der Anteil der Gesamtindividuenzahl ist deutlich höher als auf Pilatus-Kulm und auf Mt.Generoso-Vetta, dagegen etwas niedriger als auf dem Haldigrat. Bedingt durch die relativ niedrigen Individuenzahlen schwanken die jährlichen Massenanteile nur geringfügig (2,6-3,4%) (Kreisdiagramm 7).

Zu Punkt 4 (Tabelle 7): *H.furcula alpina* (1), *Ph.gnoma* (1), *E.ziczac* (3), *O.carmelita* (1), *C.pigra* (3), *L.populi* (1), *Poec.populi* (1), *C.trapezina* (3), *A.berbera* (3), *C.viminalis* (13), *L.socia* (6), *E.transversa* (4), *C.aurago* (1), *S.prasinana* (1), *S.libatrix* (4), *N.sertata* (1), *L.marginata* (1), *C.margaritata* (3).

Auf Rigi-Kulm sind *Salix* und *Alnus* nur äusserst selten anzutreffen, man findet sie eher nur unterhalb 1600 m, vom Lichtfallenstandort ziemlich weit entfernt. Deshalb wurden die oben aufgeführten Arten nur sehr selten erbeutet (Beteiligung niedriger als auf Pilatus-Kulm und dem Haldigrat, viel niedriger als auf Mt.Generoso-Vetta). Allerdings ist, bedingt durch die geringere Höhe, die Artenanzahl doch etwas höher als auf Pilatus-Kulm und dem Haldigrat. Auf Mt.Generoso-Vetta wurden dagegen erwartungsgemäss viel mehr Laubbaumfresser nachgewiesen.

In Abhängigkeit von den Vegetationsverhältnissen überwiegen auf Rigi-Kulm die aus der Krautschicht stammenden Arten und Individuen, und zwar nicht nur wegen der Wanderfalterarten, sondern auch unter den bodenständigen. Die Beteiligung der Kronschicht ist zwar erwartungsgemäss etwas höher als auf Pilatus-Kulm, aber niedriger als auf dem Haldigrat und viel niedriger als auf Mt.Generoso-Vetta.

Bedingt durch die Höhe von Rigi-Kulm wurden schliesslich viel mehr Individuen allgemein verbreiteter Arten erbeutet als auf Pilatus-Kulm und auf dem Haldigrat, jedoch viel weniger als auf dem tiefergelegenen Mt.Generoso-Vetta.

10. BEMERKENSWERTERE SELTENERE BODENSTÄNDIGE ARTEN

Euxoa recussa HBN. (Noctuidae), 21 Expl.: Ein Bewohner der subalpinen-alpinen Wiesen. Auf Rigi-Kulm regelmässig aber nur ziemlich vereinzelt. Sie wurde überraschenderweise weder auf Pilatus-Kulm noch auf dem Haldigrat erbeutet und auch auf Mt.Generoso-Vetta nur sehr selten (7 Ex.).

Scotia simplonia HBN. (Noctuidae), 82 Expl., Anflugdiagramm 2: Subalpin-alpiner Wiesenbewohner, vor allem im Jahre 1977 (an 19. Stelle) eine beachtenswerte Charakterart von Rigi-Kulm. Auf dem Haldigrat ca. gleich häufig, dagegen selten auf Pilatus-Kulm. Auf Mt.Generoso-Vetta überraschenderweise nicht nachgewiesen.

Standfussiana lucerneae catalaeca B. (Noctuidae), 8 Expl.: 2., 6., 15.VIII., 2.IX.1977; 3., 5.VIII.1978; 26.VII.1979; 9.VIII.1980. Die alpine Unterart von *lucernea*, die vor allem auf Pilatus-Kulm (81 Expl.), aber auch auf dem Haldigrat (42 Expl.) häufig erbeutet wurde, ist auf Rigi-Kulm erwartungsgemäss ziemlich selten. Auf Mt.Generoso-Vetta wurde sie überhaupt nicht nachgewiesen.

Epipsilia griseascens F. (Noctuidae), 59 Expl., Anflugdiagramm 4: Eine subalpine Art, die vereinzelt auch in den tieferen Lagen ans Licht fliegt. In den Zentralschweizer Nordalpen wurde sie bisher am häufigsten auf Rigi-Kulm erbeutet (Pilatus-Kulm: 2 Expl.; Haldigrat: 15 Expl.). Auch auf Mt.Generoso-Vetta deutlich seltener (21 Expl. in 3 Jahren).

Rhyacia helvetina B. (Noctuidae); 1 Expl. am 25.VIII.1978. Das Erscheinen dieser alpinen Art auf Rigi-Kulm ist sehr beachtenswert (Glazialrelikt?). Auf dem Haldigrat, der direkte Verbindung zur alpinen Region hat (Brisen 2404 m), war sie erwartungsgemäss etwas häufiger (15 Expl.) und charakteristischerweise recht häufig auf Pilatus-Kulm (53 Expl., an 26. Stelle). Kein Nachweis auf Mt.Generoso.

Chersotis ocellina D.S. (Noctuidae): 1 Expl. am 2.VIII.1978. Diese für das Untersuchungsgbiet ebenfalls wichtige alpine Art hat, wie auch die anderen alpinen Arten von Rigi-Kulm, bestimmtes Relikt-Charakter. Ihr seltenes Vorkommen ist ein Beweis für die Isolation dieser subalpinen Region von den Alpen. Das gleiche gilt für Mt.Generoso-Vetta, der genau so von den Alpen isoliert ist und wo *ocellina* ähnlich selten vorkommt. Dagegen ist diese Art nicht nur auf Pilatus-Kulm, sondern auch in der subalpin-alpinen Region vom Rigi-Kulm bis zum Haldigrat sehr häufig. Interessanterweise scheint die andere, sehr ähnliche Art *Chersotis alpina* in den Zentralschweizer Nordalpen entweder zu fehlen oder äusserst selten zu sein, obwohl sie auch in den höheren Lagen des Jura (z.B. Chasseral) relativ häufig ist.

Hada proxima HBN. (*Lasionycta*) (Noctuidae): 1 Expl. am 24.VIII.1977. Diese in den Südalpen weit verbreitete und gelegentlich sehr häufige Art wurde in den nördlichen Kalkalpen früher angeblich nicht, in den letzten Jahrzehnten jedoch immer häufiger gefunden (FORSTER-WOHLFAHRT 1971). Sie war auf dem Haldigrat tatsächlich etwas häufiger (20 Expl.), aber auf Pilatus-Kulm nicht nachgewiesen. Auch auf Mt.Generoso-Vetta nur 5 Expl. erbeutet.

Hadena caesia D.S. (Noctuidae), 8 Expl.: 11. (3), 12. (2), 14.VII.1977; 10., 27.VII.1979. Eine weitere wichtige alpine Art von Rigi-Kulm. Sie wurde interessanterweise weder auf dem Haldigrat (6 Expl.) noch auf Pilatus-Kulm (3 Expl.) häufiger erbeutet. Dagegen recht häufig auf Mt.Generoso-Vetta (82 Expl., an 44. Stelle), dort jedoch die südliche Unterart (*maritima* TRT. & VRTY.).

Amphipyra berbera svenssoni FLETCHER (Noctuidae): 3 Expl., 30.VIII., 1., 3.IX.1977. Diese wanderverdächtige, von vielen bestimmt übersehene bzw. mit *pyramidea* verwechselte Art konnte ich bisher meistens in den höheren Lagen nachweisen. Auch die drei einander naheliegenden Daten auf Rigi-Kulm deuten auf eine etwaige Wanderung hin. Sie war auch auf dem Haldigrat und auf Pilatus-Kulm sehr selten. Interessanterweise liegen bisher überhaupt keine Nachweise aus dem Tessin vor.

Calostigia lineolata F. (Geometridae), 15 Expl.: 4., 6. (2), 12. (4) VII. 1977; 20., 28. (3), 29. (2) VI., 3., 27. VII. 1979. Eine weitere typische Art der höchsten Lagen (vor allem alpin), die meist bald nach der Schneeschmelze fliegt (die späten Fangdaten und das Fehlen der Art in den Ausbeuten 1978 und 1980 deuten auf schlechte Witterung hin). Es sind eher die Weibchen, die ans Licht kommen. Auf dem Haldigrat und Pilatus-Kulm recht häufig, dagegen kein Nachweis auf Mt. Generoso, obwohl die Art auch im Schweizer Jura (Chasseral, 1500-1600 m) vorkommt (REZBANYAI-RESER 1984b).

Entephria nobiliaria H. SCH. (Geometridae), 6 Expl.: 17. VI. 1977; 26. (2), 27. VII., 22. VIII., 6. IX. 1979. Eine ebenfalls alpine Art, die jedoch vereinzelt bis die montane Stufe der Alpentäler und des Alpenvorlandes herankommen kann (z. B. Gersau SZ, 550 m). Sehr selten auf Mt. Generoso-Vetta (1); recht häufig auf Pilatus-Kulm (52). Auf dem Haldigrat wurde sie um 1900 m nur relativ selten (13), dagegen um 2200 m einmal bei einem persönlichen Lichtfang sehr häufig angetroffen.

11. WANDERFALTER

Die ausführliche Besprechung der auf Rigi-Kulm erbeuteten Wanderfalter siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten (REZBANYAI 1978, 1980c, 1981c und 1984a?). Einzelheiten über die Arten *N. promuba*, *A. gamma*, *S. epsilon* und *A. monoglypha* finden sich in Kapitel 7 der hier vorliegenden Publikation, weitere Angaben in den Kapiteln 8 und 9.

Zusammenfassend einige allgemeine Feststellungen (wie auch für Pilatus-Kulm)

a/ Es wurden relativ wenig Wanderfalterarten nachgewiesen. Darunter befanden sich jedoch einige recht bemerkenswerte Arten sowie Massenwanderer, die gelegentlich in hoher Anzahl erbeutet wurden (fast 3/4 aller erbeuteten Individuen an Nachtgrossfaltern gehören zu den Wanderfaltern!).

b/ Die massenhaft auftretenden Arten erscheinen oft unvermittelt nur für wenige Tage mit Tages-Spitzenwerten ("Wandertage").

c/ Unter den häufigsten Wanderfalterarten ist in der ersten Hälfte des Sommers meist *N. promuba*, in der zweiten Hälfte dagegen *S. epsilon* und *A. gamma* anzutreffen.

d/ Das Jahr 1977 war ein recht gutes Jahr für die Wanderfalter, 1978 dagegen katastrophal (witterungsbedingt?). In den Jahren 1979 und 1980 wurden wieder deutlich mehr Wanderfalter registriert, jedoch bei weitem nicht so viele wie 1977.

Einige bemerkenswerte seltenere Wanderfalterarten:

Agrius convolvuli L. (Sphingidae), 11 Expl.: 26. VIII. 1977; 24., 30. VI., 11., 17. (3), 18., 19. (2) VIII. 1979; 27. VIII. 1980. Aus beiden Generationen wurden also Durchwanderer registriert, wie auch auf Pilatus-Kulm. Ausführlicher siehe in den Schweizer Wanderfalterjahresberichten.

Peridroma saucia HBN. (Noctuidae), 2 Expl.: Beide wurden an einem Wandertag, am 2. X. 1980 erbeutet, gleichzeitig mit sieben weiteren Wanderfalterarten. Ausführlicher siehe in REZBANYAI 1984a(?).

Noctua interjeota HBN. (Noctuidae): 1 Expl. am 27. VII. 1979. Diese in NW-Deutschland durch ihre Arealerweiterung berühmt gewordene südwestliche Art (LOBENSTEIN 1982) wurde in den letzten Jahrzehnten auch in der Nordschweiz vereinzelt, aber regelmässiger als früher nachgewiesen. Ich habe darüber schon mehrmals berichtet (REZBANYAI 1981a, 1981c, 1982a, 1983a, 1983c und 1984a?). Auch wenn wir annehmen, dass sie in den tieferen Lagen nördlich der Alpen heute schon bodenständig ist, kann man dies für Rigi-Kulm kaum behaupten. Auch auf Mt. Generoso-Vetta (1600 m) wurden je ein Expl. 1979 bzw. 1981 erbeutet (REZBANYAI 1983c).

Mythimna vitellina L. (Noctuidae): 6. VII. 1977, 1 Expl. aus der ersten Generation, die nördlich der Alpen bzw. in den höheren Lagen der Alpen nur selten erscheint.

Mythimna unipuncta HAW. (Noctuidae), 20 Expl.: Ausschliesslich im Oktober in ihrem "Wanderjahr" 1978. Ausführlicher (mit Anflugdiagramm von Rigi-Kulm) siehe in REZBANYAI 1980c und vor allem in REZBANYAI 1982b.

Heliothis peltigera D. & SCH. (Noctuidae): 1 Expl. am 15. VII. 1979.

12. BEMERKENSWERTE FORMEN

Mehr oder weniger stark variable Arten waren auf Rigi-Kulm vor allem die folgenden (Variabilität entweder in der Zeichnung oder/und in der Färbung): *Spilosoma menthastri*, *Aretia caja*, *Euxoa recussa*, *Scotia clavis*, *S.exclamationis*, *S.ipsilon*, *Noctua pronuba*, *N.comes*, *N.fimbriata*, *Diarzia mendica*, *Amathes c-nigrum*, *Cerastis rubricosa*, *Mamestra pisi*, *Hada nana*, *Orthosia gothica*, *Mythimna andereggi*, *Apamea monoglypha*, *Oligia strigilis*, *Mesapamea secalis*, *Dasypolia templi alpina*, *Thera variata*, *Th.albonigrata*, *Dystroma truncata*, *D.citrata*, *Xanthorhoë montanata*, *Lygris populata* und *Alcis repandata*.

Einige mit Namen erwähnenswerte Formen:

Hada nana HUFN. f. *laterai* PIER.: Mit schwarzbraun verdunkelten Vfln. (KOCH 1958, p.93). Nur einige wenige Expl. (unter 0,1%).

Apamea crenata HUFN. f. *alopecurus* ESP.: Vfl. rötlichbraun verdunkelt, Makeln mehr oder weniger gelblich gesäumt (SEITZ 1914, p.165; KOCH 1958, p.165).

Verhältniszahlen:

	Nominatformenkreis		<i>alopecurus</i> -Formenkreis
1977	12	7	36,9%
1978	11	9	45,0%
1979	27	20	42,6%
1980	5	4	44,4%
1977-80	55	40	42,1%

Anteil der Form fast gleich wie auf Pilatus-Kulm (41,2%); ähnlich auch auf Mt.Generoso-Vetta (47,2%).

Eupsilia transversa HUFN. f. *albipuncta* STRAND.: Mit weissen Makeln (KOCH 1958, p.143) Unter 4 Exemplaren nur 1 f. *albipuncta* (25%) und zwar am 24.IX.1980.

Dystroma truncata HUFN. f. *rufescens* STROEM: Mit rostgelbem Vfl-Mittelfeld (SEITZ 1915, p.221; KOCH 1976, p.115). Nur 1 Expl. (2,2%) am 11.VIII.1980 erbeutet: sie fehlt also auch nicht auf Rigi-Kulm.

Dystroma citrata L. f. *strigulata* F. (= *f.immanata* HAW.): Mit schwarzem Vfl-Mittelfeld (SEITZ 1915, p.222; KOCH 1976, p.115). Häufig, mit zahlreichen Uebergangsformen.

Beachtenswert: Auf Rigi-Kulm wurden keine extrem verdunkelten Formen z.B. bei den Arten *Lygris populata*, *Entephria caesiata*, *Dystroma truncata*, *Thera variata*, *Th.albonigrata* und *Alcis repandata* nachgewiesen sowie keine *f.cinis* FRR. (= *f.engadinensis* MILL.) von *Mythimna andereggi*, die in den Zentralschweizer Alpen sonst an vielen Plätzen mehr oder weniger häufig auftreten können.

13. TAGSUEBER AKTIVE MACROHETEROCEREN-ARTEN

So wie Tagfalter, wurden bei den Tagfängen auch relativ selten Macroheteroceren beobachtet, und zwar lediglich 10 Arten (Tabelle 12). Von diesen Arten wurden vier niemals mit der Lichtfalle erbeutet: *Parasemia plantaginis* L., *Macroglossum stellatarum* L., *Phytometra viridaria* CL. und *Epichnopteryx alpina* HEYL. (der Sack von *E.alpina* wurde sogar in der Bodenfallenausbeute gefunden).

Ganz besonders fällt das völlige Fehlen der Widderchen (Zygaenidae) auf und diese Tatsache weist auf die suboptimalen Zustände in der heutigen Oekologie der Wiesen von Rigi-Kulm hin.

Als tagsüber relativ häufige Macroheteroceren wurden nur *A.gamma* (Wanderfalter) und *Coenotephria verberata* (subalpin-alpine Art, siehe Seite 36) beobachtet. Beachtenswert war das auf über 1600 m Höhe häufige Erscheinen des Wanderfalters *M.stellatarum* (einzelne Exemplare wurden vor allem im Juni regelmässig registriert, im Jahre 1983 zum ersten Mal schon am 3.VI.).

14. VERGLEICHE MIT DER NACHTGROSSFALTERFAUNA VON DREI WEITEREN ALPINEN

LICHTFALLENSTANDORTEN

14.1. Brisen-Haldigrat NW, 1920 m (vgl. REZBANYAI 1981b)

Unter den drei weiteren alpinen Standorten, die vom Verfasser schon früher in ähnlicher Weise erforscht wurden, steht der Haldigrat Rigi-Kulm ökologisch gesehen am nächsten.

Die wichtigsten Analogien:

- 1/ beide Standorte befinden sich im mittleren Abschnitt der Zentralschweizer Nordalpen (siehe Karte 2 in REZBANYAI-RESER 1983d, Seite 3 dieses Heftes),
- 2/ beide weisen deutlich nach Süden und nach Norden gerichtete Hänge auf,
- 3/ an beiden Orten überwiegt die krautartige, grasige Vegetation, auch Felsenvegetation befindet sich in der Nähe der Lichtfalle und in Sichtweite verläuft die Fichtenwaldgrenze,
- 4/ beide Standorte befinden sich in der subalpinen Region.

Die wichtigsten Unterschiede:

- 1/ Der Haldigrat ist ein Kalkgebiet; Rigi-Kulm besteht aus granitischer Nagelfluh.
 - 2/ Der Haldigrat befindet sich im engeren Sinne in den Nordalpen; Rigi-Kulm gehört zu einem von den Nordalpen deutlich abgetrennten Voralpengebiet.
 - 3/ Der Lichtfallenstandort auf Rigi-Kulm liegt ca. 160 m tiefer als der auf dem Haldigrat.
 - 4/ Auf dem Haldigrat steht im Hintergrund der 2404 m hohe Brisen mit seiner alpinen Region, während der höchste Punkt von Rigi-Kulm bei 1797 m liegt.
 - 5/ Die anthropogene Belastung des Biotops auf dem Haldigrat ist bedeutend geringer als auf Rigi-Kulm (weniger Touristen, weidende Kühe erst im Spätsommer).
- Ferner wurden zum Teil nicht die gleichen Sammelmethode (Lichtquelle) angewendet und die Untersuchungen wurden nicht in den gleichen Jahren durchgeführt.

Vergleiche über zahlreiche Einzelheiten siehe in den Kapiteln 3,4,5,7,8,9,10 und 11.

Tabelle 8: Vergleichsangaben zur durchschnittlichen Häufigkeit der gemeinsamen Nachtgrossfalterarten von Rigi-Kulm und vom Brisen-Haldigrat.

	Artenzahl	%	% der Arten von Rigi-Kulm 1760 m (166 + 4Tf)	% der Arten vom Haldigrat 1900 m (216 + 4Tf)
Auf dem Haldigrat viel häufiger	6	4,2	3,6	2,8
etwas häufiger	37	26,1	21,8	16,8
ca. gleich viel	75	52,8	43,9	34,0
etwas seltener	17	12,0	10,0	7,7
viel seltener	7*	4,9	4,2	3,2
Gemeinsame Arten insgesamt	142	100,0	83,5	64,5
Nur auf dem Haldigrat	78			35,5
Nur auf Rigi-Kulm	28		16,5	

Legende: Tf nur beim Tagfang

= davon drei fraglich (*C. rubricosa*, *D. gothica*, *D. templi alpina*), weitere drei auch auf dem Haldigrat nur relativ viel seltener (*Ch. cuprea*, *H. nana*, *X. montanata*)

(Für die Angabe der Häufigkeit der Arten auf dem Haldigrat wurden vor allem die Fangergebnisse der HQL-Falle, 1974-75 in Betracht gezogen.)

Zu Tabelle 8:

a/ Nur auf Rigi-Kulm: Meist Arten der tieferen Lagen, die in der subalpinen Region nur als zugeflogene Einzeltiere erscheinen und gelegentlich auch auf dem Haldigrat anfliegen dürften. Beachtenswert sind dagegen zwei montan bis alpine Arten (*Euxoa recussa* und *Scotia clavis*), beide auf Rigi-Kulm nicht gerade selten. Es verwundert, dass sie auf dem Haldigrat nicht registriert werden konnten.

b/ Nur auf dem Haldigrat: Bedingt durch die grössere ökologische Vielfalt auf dem Haldigrat (siehe oben), aber zum Teil auch durch die wenigen persönlichen Lichtfänge ist diese Zahl relativ hoch. In dieser Liste finden sich mehrere subalpin-alpine Arten, die auf Rigi-Kulm mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen, wie *Apamea maillardi*, *A.zeta*, *Calostigia puengeleri sauteri* und *Gnaphos myrtilata canaria* (alle auf dem Haldigrat häufig), bzw. *Caboplusia hochenwarthi* und *Calostigia kollariaria* (auf dem Haldigrat selten). Auch zwei weitere, auf dem Haldigrat relativ häufige Arten konnten auf Rigi-Kulm nicht nachgewiesen werden: *Dasychira fascelina alpina* und *Philea irrorella*. Zahlreiche, auf dem Haldigrat seltenere charakteristische Arten könnten eventuell gelegentlich auch auf Rigi-Kulm auftauchen, wie z.B. *Paradiarsia sobrina*, *Anomogyna speciosa*, *Eriopygodes imbecilla*, *Photodes captivuncula*, *Cucullia campanulae*, *Syngrapha interrogaticnis*, *Polychrysis moneta*, *Xanthorhø incursata* oder *Calostigia aqueata*. Sie wurden jedoch 1977-80 auf Rigi-Kulm mit der Lichtfalle nicht erbeutet.

c/ Die gemeinsamen Arten: Anzahl relativ hoch, 83,5% der Arten von Rigi-Kulm, jedoch nur 64,5% derjenigen vom Haldigrat. Rigi-Kulm weist also eine verhältnismässig artenarme Macroheteroceren-Fauna auf, wo zahlreiche Arten der tieferen Lagen nicht mehr vorkommen, zahlreiche Arten der höheren Lagen dagegen noch nicht vorkommen können.

Beachtenswert: mehr als die Hälfte der gemeinsamen Arten wurde an beiden Orten sogar ca. gleich häufig nachgewiesen. Darunter befinden sich nicht nur seltene sondern auch einige an beiden Orten häufigere Arten, die damit sehr charakteristische Analogien darstellen. Auch ökologisch sind diese Analogien gut begründet: *Scotia simplonia*, *Mamestra glauca* und *Blepharita adusta* sind charakteristische montan-subalpine Krautschichtbewohner, *Thera variata*, *Th.albonigrata* und *Th.cognata* dagegen Nadelholzfresser (Fichte bzw. Wachholder).

Relativ viele der gemeinsamen Arten wurden auf dem Haldigrat etwas häufiger erbeutet, 6 Arten sogar viel häufiger: *Chersotis ocellina*, *Xanthorhø munitata* (alpin); *Diarsia mendica*, *Lycophotia porphyrea*, *Entephria caesiata* (vaccinietale Arten); *Catascia dilucidaria* (eher Bewohner von Kalkfelsengebiete).

Auf Rigi-Kulm war nur *Mamestra pisi* eindeutig viel häufiger (eventuell nur wegen ihrer Populationsdynamik?). Die weiteren 6 hier einzuordnenden Arten waren entweder auch auf dem Haldigrat recht häufig und nur relativ viel seltener als auf Rigi-Kulm (*Chersotis cuprea*, *Heda nana*, *Xanthorhø montanata*), oder wurden dort vermutlich nur wegen Lücken im Lichtfallenbetrieb (Frühsummer und Herbst) seltener erbeutet (*C.rubricosa*, *O.gothica*, *D.templi alpina*).

14. Pilatus-Kulm NW, 2060 m (vgl. REZBANYAI 1982c)

Hier wird ein Vergleich sehr aufschlussreich, da die Untersuchungen über die Nacht-grossfalterfauna an beiden Orten zur gleichen Zeit und mit den gleichen Sammelmethode (Lichtquellen) durchgeführt wurden.

Die wichtigsten ökologischen Analogien:

- 1/ beide Standorte befinden sich in den Zentralschweizer Nordalpen,
- 2/ beide weisen deutlich nach Süden und nach Norden gerichtete Hänge auf,
- 3/ an beiden Orten überwiegt die krautartige, grasige Vegetation,
- 4/ beide Standorte befinden sich in den höheren Lagen, oberhalb der Nadelwaldgrenze.

Die wichtigsten Unterschiede:

- 1/ Der Pilatus ist ein Kalkgebiet; die Rigi besteht aus granitischer Nagelfluh.
- 2/ Der Pilatus befindet sich im engeren Sinne in den Nordalpen; die Rigi ist ein von den Nordalpen deutlich abgetrenntes Voralpengebiet.

- 3/ Der Pilatus liegt im westlichen, die Rigi im mittleren bzw. nördlichen Teilgebiet der Zentralschweizer Nordalpen.
 - 4/ Pilatus-Kulm liegt ca. 300 m höher als Rigi-Kulm und damit schon in der alpinen Region (Rigi-Kulm nur subalpin)
 - 5/ Auf Pilatus-Kulm spielen die Felsen- und Geröllvegetation, auf Rigi-Kulm dagegen die Alpweiden (Weiden) die wichtigste Rolle.
 - 6/ Auf Pilatus-Kulm befinden sich die höchstgelegenen Fichtenbestände vom Fallensstandort viel weiter entfernt als auf Rigi-Kulm.
 - 7/ Die anthropogene Belastung auf Pilatus-Kulm ist durch die vielen Touristen fast so stark wie auf Rigi-Kulm, doch gibt es am Pilatus ausgedehntere unbetretbare steile Hänge und es fehlt das weidende Vieh.
- Vergleiche über zahlreiche Einzelheiten siehe in den Kapiteln 3,4,5,7,8,9,10 und 11.

Tabelle 9: Vergleiche der Häufigkeits-Rangnummern der 10 häufigsten Arten von Rigi- und von Pilatus-Kulm in den einzelnen Jahren und insgesamt.

		1977-80		1977		1978		1979		1980	
		R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
<i>N.pronuba</i>	***	1.	1.	1.	1.	3.	2.	1.	1.	3.	2.
<i>A.gamma</i>	***	2.	2.	2.	2.	4.	1.	2.	3.	1.	1.
<i>H.nana</i>	***	3.	4.	3.	3.	1.	3.	4.	4.	2.	3.
<i>S.ipsilon</i>	**	4.	3.	4.	4.	10.	9.	3.	2.	11.	5.
<i>Ch.cuprea</i>	o	5.	48.	6.	42.	2.	54.	6.	37.	7.	53.
<i>B.adusta</i>	**	6.	9.	9.	10.	7.	17.	7.	9.	4.	4.
<i>M.pisi</i>	o	7.	34.	7.	22.	8.	54.	9.	37.	9.	50.
<i>A.monoglypha</i>	*	8.	19.	5.	20.	16.	20.	5.	18.	19.	16.
<i>C.rubicosa</i>	*	9.	7.	23.	12.	5.	5.	13.	8.	5.	10.
<i>X.montanata</i>	*	10.	15.	8.	21.	12.	12.	10.	28.	8.	13.
<i>D.templi</i>		20.	5.	26.	6.	12.	4.	21.	5.	14.	7.
<i>M.andereggi</i>	*	14.	6.	12.	5.	17.	9.	11.	6.	21.	14.
<i>Ch.ocellina</i>	oo	122.	8.	-	17.	64.	7.	7.	-	-	6.
<i>Ph.meticulosa</i>		19.	10.	18.	9.	22.	11.	16.	12.	20.	9.

Legende: R = Rigi-Kulm P Pilatus-Kulm

- *** weitgehende Ähnlichkeit in allen Betriebsjahren
- ** weitgehende Ähnlichkeit in den meisten Jahren
- * Ähnlichkeit weniger deutlich aber vorhanden
- o deutliche Unterschiede
- oo sehr deutliche Unterschiede

Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, welche wichtige Rolle die häufigsten Arten an beiden Orten in der Zusammensetzung der Fauna in den einzelnen Jahren spielen. Die auffälligsten Analogien finden wir erwartungsgemäss bei den Wanderfaltern: die jährlichen Schwankungen laufen an beiden Standorten häufig parallel. So steht z.B. *N.pronuba* 1977 und 1979 an beiden Plätzen an 1. Stelle, dagegen sowohl 1978 als auch 1980 an 3. (Rigi) bzw. an 2. Stelle (Pilatus). Bei *A.gamma* ist die Analogie nur 1978 ein wenig gestört, bei *S.ipsilon* dagegen im Jahre 1980. *A.monoglypha* ist auf Rigi-Kulm etwas besser plaziert, trotzdem sind die Rangnummern in den Jahren 1978 und 1980 auch bei dieser Art an beiden Orten einander recht ähnlich. Auch bei *Ph.meticulosa* verlaufen die jährlichen Schwankungen ziemlich parallel. Variationen gibt es eher bei den häufigsten bodenständigen Arten. Vor allem die in den Nordalpen weitverbreitete und meist häufige bodenständige Art, *H.nana* zeigt in der Reihenfolge an den beiden Standorten trotzdem deutliche Ähnlichkeiten. Bei der ebenfalls meist häufigen *B.adusta* ist dies ebenfalls nicht verwunderlich, desto mehr bei *Mythimna andereggi*. Diese subalpin-alpine Art dürfte auf Rigi-Kulm theoretisch viel weniger

optimale Lebensbedingungen haben als in den nördlichen Kalkalpen der Zentralschweiz, trotzdem zeigt sie auch hier eine ähnliche Populationsdynamik bzw. jährliche Rangnummer-Schwankung.

Die wenigen deutlichen Unterschiede sind ebenfalls sehr charakteristisch und zwar vor allem bei den quantitativ vikariierenden *Chersotis*-Arten (die montan-subalpine *cuprea* auf Rigi-Kulm - die alpine *ocellina* auf Pilatus-Kulm), wie dies bereits im Kapitel 8 besprochen wurde.

Tabelle 10: Vergleichsangaben zur durchschnittlichen Häufigkeit der gemeinsamen Nachtgrossfalterarten von Rigi-Kulm und von Pilatus-Kulm.

	Arten- zahl	%	% der Arten von Rigi-Kulm 1760 m (166 + 1Tf)	% der Arten von Pilatus-Kulm 2060 m (145)
Auf Pilatus-Kulm viel häufiger	8	6,3	4,8	5,5
etwas häufiger	16	13,7	9,6	11,1
ca. gleich viel	46	39,3	27,5	31,7
etwas seltener	30	25,7	18,0	20,7
viel seltener	17	14,5	10,2	11,7
Gemeinsame Arten insgesamt	117	100,0	70,1	80,7
Nur auf Pilatus-Kulm	28			19,3
Nur auf Rigi-Kulm	50		29,9	

Tf nur beim Tagfang

Zu Tabelle 10:

a/ Nur auf Rigi-Kulm: Meist Arten der tieferen Lagen, die in der alpinen Region nur selten auftauchen und auf Rigi-Kulm ebenfalls nicht zu den häufigeren Arten gehören. Wie beim Vergleich mit dem Haldigrat, fällt jedoch auch auf Pilatus-Kulm das Fehlen von *Euxoa recussa* und *Scotia clavis* auf, beide auf Rigi-Kulm nicht gerade selten.

b/ Nur auf Pilatus-Kulm: Viel weniger Arten, aber diese sind in der Mehrzahl sehr beachtenswert. Mehrere davon typisch für die höheren Lagen, diese Arten erscheinen in der subalpinen Stufe nur selten. Einige von ihnen kommen im von den Alpen deutlich getrennten Rigi-Gebiet höchstwahrscheinlich überhaupt nicht vor, wie *Apamea zeta*, *Calostigia puengeleri sauteri*, *Gnophos myrtillata canaria*, *Elophos caelbbaria*, *operaria* (auf Pilatus-Kulm alle häufig), bzw. *Trichiura crataegi ariae*, *Apamea maillardi* und die noch nicht benannte *Dahlia* sp. (auf Pilatus-Kulm nur selten).

c/ Die gemeinsamen Arten: Anzahl um 25 Arten weniger als im Vergleich mit dem Haldigrat. Dies zeigt deutlich, dass Pilatus-Kulm sich in einer anderen Höhenstufe befindet. Allerdings wurden rund 80% der Arten von Pilatus-Kulm auch auf Rigi-Kulm nachgewiesen: euryöke, wandernde oder montan bis subalpine Arten, die auch in der alpinen Stufe gelegentlich oder regelmässig erscheinen. Jedoch wurde charakteristischerweise ein viel niedriger Prozentsatz der gemeinsamen Arten an beiden Orten ca. gleich häufig registriert (39,3%), als dies im Vergleich Haldigrat-Rigi festgestellt wurde (52,8%). Die meisten dieser 46 Arten sind an den beiden Orten recht selten erbeutet worden. Als charakteristische Analogien bleiben nur die häufigeren *Diascestra marmorosa micrdon* und *Autographa bractea*. Acht der gemeinsamen Arten wurden auf Pilatus-Kulm viel häufiger erbeutet, die meisten davon sind sehr charakteristisch für die alpine Stufe, und zwar *S.lucerneae catalaueca*, *Rh.helvetina*, *Ch.ocellina*, *D.templi alpina* (letztere auch auf Rigi-Kulm sehr häufig, auf Pilatus-Kulm jedoch noch häufiger), *C.lineolata* und *E.nobiliaria*.

doppelt so viele Arten wurden auf Rigi-Kulm viel häufiger erbeutet. Die meisten davon sind charakteristisch für die montan bis subalpine Höhenlage oder für mesophile Wiesen. Für diese Arten liegt Pilatus-Kulm entweder zu hoch oder es ist zu trocken (steile Kalkhänge). Unter den bemerkenswertesten waren einige trotzdem auch auf Pilatus-Kulm häufig und nur relativ viel seltener als auf Rigi-Kulm, wo sie noch viel häufiger registriert wurden: *M. glauca*, *H. nana*, *E. adusta*, *Th. albonigrata* und *C. verberata*. Andere bemerkenswerte Arten dagegen wurden nur auf Rigi-Kulm zahlreich erbeutet, sie kamen auf Pilatus-Kulm anscheinend nur selten ans Licht: *S. simplonia*, *E. griseescens*, *Ch. cuprea*, *C. graminis*, *A. crenata* und *A. aemula*.

Schliesslich noch ein interessanter Vergleich:

<u>Gemeinsame Arten der drei Standorte</u>		Haldigrat,	Pilatus- und Rigi-Kulm (siehe Tab.12)	% aller Nachtgrosffalterarten von Haldigrat/Pilatus-Kulm/Rigi-Kulm
1	2 Arten (relativ viel)	50,9	77,2	65,9
	davon an allen drei Orten ca. gleich häufig jedoch nur			
2	6 Arten, die noch dazu ausnahmslos nur selten bis sehr selten nachgewiesen werden konnten: <i>H. furcula alpina</i> , <i>E. ziczac</i> , <i>S. segetum</i> , <i>P. plantaginis</i> , <i>M. vitellina</i> , <i>A. berbera</i> , <i>C. trapezina</i> , <i>A. rubritrera</i> , <i>P. clavipalpis</i> , <i>C. lucifuga</i> , <i>E. transversa</i> , <i>Ph. auricoma</i> , <i>Ph. euphorbiae</i> , <i>H. peltigera</i> , <i>H. obesalis</i> , <i>Sc. incanata</i> , <i>S. chenopodiata</i> , <i>O. autumnata</i> , <i>E. flavicincta</i> , <i>E. cyanata</i> , <i>H. furcata</i> , <i>H. ruberata</i> , <i>E. satyrata</i> , <i>E. tantillaria</i> , <i>H. aemulata</i> , <i>G. glaucinaria</i> .	11,8	17,9	15,3

14.3. Mt. Generoso-Vetta TI, 1600 m (vgl. REZBANYAI 1983c)

Ein Vergleich ist auch hier sehr aufschlussreich, da es sich um zwei von den eigentlichen Alpenkämmen abgetrennte Voralpengebiete handelt, das eine jedoch nördlich, das andere südlich der Alpen.

Die wichtigsten Analogien:

- 1/ Beide Standorte befinden sich in den höheren Lagen eines Voralpengebietes,
- 2/ beide in der subalpinen Region,
- 3/ an beiden Orten überwiegt die krautartige, grasige Vegetation (Weiden) aber auch Fichtenbestände und Felsenvegetation finden sich in Sichtweite,
- 4/ beide Standorte weisen vor allem deutlich nach Süden und nach Norden gerichtete steile Hänge auf,
- 5/ die Aufsammlungen wurden zum Teil mit der gleichen Methode (Lichtfalle mit 160 W Mischlichtlampe) und zum Teil auch zur gleichen Zeit (1979-80) durchgeführt.

Die wichtigsten Unterschiede:

- 1/ Die Rigi befindet sich in den Nordalpen; der Mt. Generoso in den Südalpen.
- 2/ Rigi-Kulm ist aus granitischem Nagelfluh aufgebaut, der Mt. Generoso besteht aus Kalkgestein.
- 3/ Der Standort auf Rigi-Kulm liegt ca. 160 m höher und am oberen Rand der subalpinen Region, Mt. Generoso-Vetta dagegen am unteren Rand dieser Region.
- 4/ Die Laubwälder befinden sich auf dem Mt. Generoso viel näher am Lichtfallenstandort, dagegen ist der Fichtenbestand dort viel kleiner und nicht ursprünglich.
- 5/ Die Vegetation ist auf Mt. Generoso-Vetta reich an südlichen, südalpinen und xerophilen Arten, die alle auf Rigi-Kulm fehlen.
- 6/ Die anthropogene Belastung von Mt. Generoso-Vetta ist deutlich geringer als die von Rigi-Kulm. Auch hier gibt es Massentourismus. Da das Gebiet aber weniger beweidet wird, bleibt die Vegetation der Südhänge besser erhalten.

Vergleiche über zahlreiche Einzelheiten siehe in den Kapiteln 3,4,5,7,8,9,10 und 11.

Tabelle 11: Vergleichsangaben zur durchschnittlichen Häufigkeit der gemeinsamen Nachtgrossfalterarten von Rigi-Kulm und von Monte Generoso Vetta (TI).

		Arten- zahl	%	% der Arten von Rigi-Kulm 1760m (166 + 1 Tf)	% der Arten von Mt. Generoso-Vetta 1600, (277 + 1 Tf)
Auf	Mt. Generoso-Vetta				
	viel häufiger	34	26,6	20,4	12,2
	etwas häufiger	30	23,4	18,0	10,8
	ca. gleich viel	43	33,6	25,7	15,5
	etwas seltener	14	10,9	8,4	5,0
	viel seltener	7*	5,5	4,2	2,5
Gemeinsame Arten insgesamt		128	100,0	76,7	46,0
Nur auf	Mt. Generoso-Vetta	150			54,0
Nur auf	Rigi-Kulm	39		23,3	

Legende: Tf nur beim Tagfang

= davon eine fraglich (*O. gothica*), drei auch auf Mt. Generoso-Vetta nur relativ viel seltener (*N. pronuba*, *H. nana*, *A. gamma*), drei Nadelholzfresser, die im kleinen Fichtenwald eventuell auch dort häufiger sind (*Thera variata*, *Th. albonigrata*, *Th. cognata*).

Zu Tabelle 11:

a/ Nur auf Rigi-Kulm: Relativ viele, beinahe ein Viertel der Arten von Rigi-Kulm konnte auf Mt. Generoso-Vetta nicht nachgewiesen werden. Darunter befinden sich einige auf Fichten lebende Arten (sie könnten eventuell im kleinen Fichtenwald von Mt. Generoso-Vetta als adventive Faunenelemente doch nachgewiesen werden): *C. lunigera*, *E. tantillaria*, *E. lanceata*, *E. prasinaria*, *P. capreolaria*, *Th. stragulata*.

Beachtenswert auf Mt. Generoso-Vetta ist das Fehlen von auf Rigi-Kulm vorkommenden zahlreichen subalpin-alpinen Elementen wie *S. simplonia*, *A. aemula*, *D. templi alpina*, *C. lineolata*, *C. verberata* (alle häufig auf Rigi-Kulm), sowie *S. lucernea catalaueca*, *Rh. helvetina*, *C. lucifuga*, *X. munitata*, *C. aptata*, *E. infidaria* (diese auch auf Rigi-Kulm recht selten).

Was *Amphipyra berbera* betrifft, so habe ich diese Art im Tessin bisher noch nirgendwo nachweisen können, ebenfalls nicht auf Mt. Generoso-Vetta, obwohl sie in den höheren Lagen der Zentralschweizer Nordalpen (eventuell nur als Wanderer) vereinzelt, aber regelmässig auftaucht.

b/ Nur auf Mt. Generoso-Vetta: Die hohe Anzahl dieser Arten ist nicht verwunderlich da auf dem Mt. Generoso insgesamt viel mehr Arten nachgewiesen wurden als auf Rigi-Kulm. Mehr als die Hälfte der Arten von Mt. Generoso-Vetta ist auf Rigi-Kulm unbekannt. Darunter befinden sich zahlreiche Arten der tieferen Lagen (kollin-montan), sowie charakteristische südliche (zum Teil südalpine) Arten.

Das Fehlen der folgenden Arten auf Rigi-Kulm scheint mir davon bemerkenswert bzw. nicht selbstverständlich zu sein: *Scotia cinerea*, *Rhyatia simulans*, *Pachetra sagittigera*, *Eriopygodes imbecilla*, *Leucania comma* (alle häufig auf Mt. Generoso-Vetta),

ferner die auf Mt. Generoso-Vetta eher seltene *Chersotis multangula*, *Hadena confusa*, *Crypsedra gemma*, *Polychrysa moneta*, *Abrostola trigemina*, *Eupithecia veratraria* und *Biston betularia*.

Sehr beachtenswert ist, dass die alpinen Arten *Apamea zeta*, *A. maillardi* und *Nyssia alpina* auf Mt. Generoso-Vetta vorkommen, auf Rigi-Kulm jedoch anscheinend fehlen, obwohl sie nicht an Kalk gebundene Tiere sind, in den höheren Lagen der Alpen meist zahlreich ans Licht fliegen, und in den Alpentälern vereinzelt bis 1500-1200 m herunterkommen.

c/ Die gemeinsamen Arten: Anzahl relativ hoch, höher als im Vergleich zu Pilatus-Kulm, aber etwas tiefer als im Vergleich zum Haldigrat. Die meisten dieser Arten sind entweder Wanderfalter oder euryöke Arten oder weitverbreitete montane, eventuell montan-subalpine Arten. Die Prozentsätze zeigen deutlich, wie gross die relative Artenarmut in der Fauna von Rigi-Kulm ist: die 128 gemeinsamen Arten bedeuten mehr als drei Viertel für Rigi-Kulm, dagegen weniger als die Hälfte für Vetta.

Besonders niedrig ist die Anzahl ungefähr gleich häufiger Arten. Sie erreichen jedoch ein Drittel der gemeinsamen Arten. Beachtenswert sind dabei vor allem die an beiden Orten recht häufigen bodenständigen Arten *D. citrata*, *X. montanata* und *C. salicata*, aber auch eine Reihe seltener Arten, wie z.B. *N. interjecta* (!), *Rh. lucipeta*, *Ch. ocellina*, *H. proxima*, *A. rubrivena*, *A. illyria*, *P. xanthomista*, *E. flavicinctata*, *E. nobiliaria*, *C. incultraria*, *C. obsoletaria*, *P. affinitata*, *P. minorata* und *H. ruberata*.

Charakteristisch wurde genau die Hälfte der gemeinsamen Arten auf Mt. Generoso-Vetta geringfügig oder aber in viel höherer Individuenzahl erbeutet. Darunter sind vor allem die Arten *H. caesia* und *C. dilucidaria* beachtenswert, aber auch *Mythimna andereggi*, die allerdings auch auf Rigi-Kulm häufig war, zahlenmässig jedoch viel seltener erbeutet wurde als auf Mt. Generoso-Vetta.

Recht wenige Arten wurden auf Rigi-Kulm häufiger nachgewiesen, darunter nur 7 viel häufiger. *O. gothica* flog vielleicht vor dem jeweiligen Anfang des Fangbetriebes auch auf Mt. Generoso-Vetta zahlreicher. *N. pronuba*, *H. nana* und *A. gamma* waren zwar auf Rigi viel häufiger, jedoch wurden sie auch auf Mt. Generoso-Vetta recht häufig erbeutet. Schliesslich sind die drei übrigen Arten Nadelholzfresser (*Thera variata*, *albonigrata*, *cognata*), die auf Mt. Generoso-Vetta sowieso nur die eingeschleppten, adventiven Faunenelemente vertreten.

Schliesslich wiederum ein weiterer interessanter Vergleich:

Gemeinsame Arten der vier Standorte Haldigrat, Pilatus-Kulm, Rigi-Kulm und Mt. Generoso-Vetta (siehe Tabelle 12)

% aller Nachtgrossfalterarten von

Haldigrat/Pilatus-Kulm/Rigi-Kulm/Mt. Generoso-Vetta

9 3	Arten (überraschend viel)	42,3	64,1	54,7	33,6
	davon an allen vier Orten				
	ungefähr gleich häufig				
	jedoch nur				
8	Arten, an allen vier Orten	3,6	5,5	4,7	2,9
	alle selten bis sehr selten:				
	<i>E. ziczac</i> , <i>H. peltigera</i> ,* <i>Ph. euphorbiae</i> , <i>H. obesalis</i>				
	<i>S. chenopodiata</i> , <i>E. flavicinctata</i> , <i>H. ruberata</i> , <i>E. satyrata</i>				

* (hier nur als Zuwanderer)

15. Tabelle 12:

LISTE DER AUF RIGI-KULM NACHGEWIESENEN MACROLEPIDOPTEREN-ARTEN
MIT VERSCHIEDENEN ANGABEN AUS DEM TAG- UND DEM LICHTFALLENFANG SOWIE
SEITENNACHWEISEN DER IM TEXT ERWÄHNTEN ARTEN

Nomenklatur: Diurna nach HIGGINS 1975
 Heterocera nach FORSTER-WOHLFAHRT (mit wenigen Änderungen)

A, M, E Anfang, Mitte bzw. Ende der Monate (die drei Dekaden)
 W Wanderfalter Tf = Tagfang

Aspekte (siehe Seite 37-42): wenigstens in einem Aspekt dominant
 = wenigstens in einem Aspekt subdominant
 = wenigstens in einem Aspekt
 mit bedeutender Beteiligung

Zu den Flugzeiten: Die Flugzeiten und Hauptflugzeiten wurden vor allem in der ersten Hälfte des Sommers 1980 wegen der häufig schlechten Witterung um Wochen verschoben! (* = Verschiebung in diesen Fällen besonders gross)

Generationen: 1. erste Generation
 (1.) erste Generation, jedoch nur als Einwanderer
 (2.) zweite Generation, jedoch nur als Einwanderer
 (3.) vermutliche dritte Generation, jedoch nur als Einwanderer
 2? eventuell auch eine sehr unvollständige zweite Generation
 (bei *Inopros glaucinaria* eventuell nur eine Generation)

Vergleiche mit der Fauna drei weiterer alpiner Lichtfallenstandorte:

Brisen-Haldigrat NW, 1900-1920 m (REZBANYAI 1981b) siehe Seite 51-52

Pilatus-Kulm NW, 2060 m (REZBANYAI 1982c) siehe Seite 52-55

Monte Generoso - Vetta TI, 1600 m (REZBANYAI 1983c) siehe Seite 55-57

viel häufiger als auf Rigi-Kulm
 etwas häufiger als auf Rigi-Kulm
 ungefähr gleich häufig wie auf Rigi-Kulm
 etwas seltener als auf Rigi-Kulm
 viel seltener als auf Rigi-Kulm
 keine am Vergleichsstandort, dagegen auf Rigi-Kulm nachgewiesen

T beim Tagfang
 ? Vergleichsangabe wegen Betriebsausfall fraglich

Die registrierte grösste Häufigkeit bei den Diurna-Arten:

- viele Exemplare (sehr häufig)
- mehrere Exemplare (häufig)
- x einige Exemplare (selten)
- 1 höchstens 1 Expl. pro Exkursion beobachtet (sehr selten)

Tabelle 12/1

FAMILIE Art	Monate					Seitennachweise
	VI	VII	VIII	IX	X	Bemerkungen
<u>PIERIDAE</u>						
<i>Pieris brassicae</i> L.						W, 18
<i>P. (Artogetia) rapae</i> L.						W, 18
<i>P. (Artogetia) napi bryoniae</i> HBN.	x					19
<i>Colias phicomone</i> ESP.	1					19
<i>C. australis calida</i> VRTY.	1			1		
<i>Gonepteryx rhamni</i> L.			1			W
<u>NYMPHALIDAE</u>						
<i>Inachis io</i> L.						W, 18
<i>Vanessa atalanta</i> L.	1					W, 18
<i>V. cardui</i> L.	x					W, 18
<i>Aglais urticae</i> L.	•					W, 18
<i>Polygonia c-album</i> L.						W, 18
<i>Boloria pales</i> D.S.		1				19
<i>Clossiana euphrosyne</i> L.	1	1				
<i>C. titania cypris</i> MEIG.		x				19
<i>Meliccta athalia athalia</i> ROTT.		1				<u>19</u>
<u>SATYRIDAE</u>						
<i>Melanargia galathea</i> L.		1				
<i>Oeneis glacialis</i> MOLL.	o	1				19
<i>Erebia ligea carthusianorum</i> FRHST.		x	x			<u>18</u>
<i>E. euryale isarica</i> RUEHL		o	1			<u>18</u>
<i>E. aethiops</i> ESP. f. <i>altivaga</i> FRHST.			1			<u>18</u>
<i>E. medusa brigobanna</i> FRHST.	x	1				<u>18</u>
<i>E. meolans stygne</i> OETH.		o	o			<u>18</u>
<i>Coenonympha pamphilus</i> L.	x	o	x		1	<u>19</u>
<i>C. gardetta</i> PRUN.		x	1			
<i>Pararge aegeria egerides</i> BTLR.	1					
<i>Lasiommata maera</i> L.	x					
<i>L. petropolitana</i> F.	1					
<u>LYCAENIDAE</u>						
<i>Cupido minimus</i> FSSL.	x					
<i>Aricia artaxerxes allous</i> GEYER		1				
<i>Cyaniris semiargus</i> ROTT.		1				
<i>Lysandra coridon</i> PODA						
<i>L. bellargus</i> ROTT.				1		
<i>Polyommatus icarus</i> ROTT.			1			
<u>HESPERIIDAE</u>						
<i>Pyrgus malvae</i> L.	1					
<i>P. serratulae</i> RBR.						gen. untersucht
<i>Erynnis tages</i> L.	x					

Tabelle 12/2

FAMILIE	Exemplare					Daten				Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten
	1977-1980	160 W MLL		125 W HQL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.			Haldigrat	Piliatus-K.	Generoso-V.	
		1977	1978	1979	1980										
ARCTIIDAE															
Phragmatobia fuliginosa L.	1	-	-	1	-	1	26. 7.			1.		=	+	o	
Spilosoma menthastri ESP.	7	4	2	1	-	1	13. 6.-14. 7.			1.		=	o	o	50
Parasemia plantaginis L.	-	-	-	-	-	-	8. 7.-29. 7.			1.		≠	≠	o	Tf: 8.7.82(3), 29.7.81; 46,50,55
Diacrisia sannio L.	2	-	-	2	-	1	15. 7.-18. 7.			1.		+	=	+	
Arctia caja L.	8	1	2	3	2	1	27. 7.-27. 8.			1.		=	o	=	50
NOTODONTIDAE															
Horminea furcula CL.	1	-	-	-	1	1	26. 7.			1.		o	=	o	ssp.alpina BART.,47,55
Pheosia gnoma F.	1	-	1	-	-	1	5. 8.			1.		+	+	++	f.alt.leonis STICH, 47
Eligmodontia ziczac L.	3	1	1	-	1	1	7. 6.- 4. 8.			1.		=	=	=	47,55,57
Odontosia carmelita ESP.	1	1	-	-	-	1	11. 6.			1.		o	o	o	47
Clostera pigra HUFN.	3	1	-	2	-	1	5. 6.-18. 7.			1.		o	o	o	47
SPHINGIDAE															
Agrius convolvuli L.	11	1	-	9	1	2	24. 6.-30. 6. 11. 8.-27. 8.			(1.) (2.)	x	+	-	++	W,39,46,49
Laothöe populi L.	1	1	-	-	-	1	10. 6.			1.		=	o	=	47
Macroglossum stellatarum L.	-	-	-	-	-	-	3. 6.- 8. 7.			1.		≠	o	≠	W, Tf (mehrere Ex.), 50
LASIOCAMPIDAE															
Poecilocampa populi L.	1	-	-	1	-	1	18.10.			1.	x	o	o	o	39,41,42,47
Cosmotriche lunigera ESP.	1	-	1	-	-	1	5. 8.			1.		+	=	o	ssp.burmanni DAN.,47,56
Dendrolimus pini L.	1	-	-	1	-	1	24. 6.			1.		o	o	o	f.alt.montana STGR.,47
NOCTUIDAE															
Euxoa decora HBN.	17	8	6	3	-	2	25. 7.-16. 9.	A-M9	1.	1.		-	-	-	ssp.simulatrix HBN.,29A6
recussa HBN.	21	14	2	5	-	5	23. 8.-15. 9.	A-M9	1.	1.	x	o	o	o	2939A1424648505254
Scotia simpsonia HBN.	82	51	9	18	4	6	11. 6.- 1. 8.	E6-M7	1.	1.	x	=	--	o	29333738434648525556
segetum D.S.	5	1	-	3	1	2	22. 8.- 2.10.		(2.)			=	=	++	W,47,55
clavis HUFN.	13	8	3	2	-	2	10. 7.-21. 8.	M7	1.	1.		o	o	+	50,52,54
exclamationis L.	21	18	1	1	1	6	28. 6.-28. 7.	A-M7	1.	1.		-	-	++	W,29,47,50
ippsilon HUFN.	1936	881	49	941	65	238	5. 6.-31.10.	M6-E6 M8-M9 A-M10	(1.) (2.) (3.?)	(1.) (2.) (3.?)	xxx	+	-	=	W,26,27,28,29,31,38,39, 40,42,46,49,50,53

Tabelle 12/3

FAMILIE	Exemplare						Daten			Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten
	1977-1980	160 W MLL		125 W HQL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.			Haldigrat	Pilatus-K.	Generoso-V.	
		1977	1978	1979	1980										
Art															
Ochropleura plecta L.	6	2	-	4	-	2	4. 6.-7. 7.			1.		=	=		
Standfussiana lucernea L.	8	4	2	1	1	1	26. 7.-2. 9.			1.		+	++	ssp. <u>cataleuca</u> B., 43,46,48,54,56	
Epipsilia grisescens F.	59	37	9	12	1	5	6. 7.-3. 9.	E7-M8		1.	x	-	-	29,34,37,39,46,48,55	
Rhyacia lucipeta D.S.	2	1	-	1	-	1	28. 6.-11. 7.			1.		o	+	W?,46,47,57	
helvetina B.	1	-	1	-	-	1	25. 8.			1.		+	++	43,46,48,54,56	
Chersotis ocellina D.S.	1	-	1	-	-	1	2. 8.			1.		++	++	26,42,43,48,52,54,57	
cuprea D.S.	709	189	317	103	100	27	2. 8.-10.10.	M8-M9		1.	xxx	--	--	22,27,28,29,31,33,39,40, 41,42,46,51,52,55	
Noctua pronuba L.	14335	11292	221	2404	418	2886	2. 6.-18.10.	M6-A8	(1.2.)	xxx	-	-	--	W,26,27,28,29,30,31,37, 38,39,40,42,46,49,50,53,56,57	
comes HBN.	12	3	1	8	-	3	10. 7.-15. 8.	M7	(1.)			+	=	W,47,50	
fimbriata SCHREB.	26	16	-	8	2	4	28. 6.-21. 8.	M7-A8	(1.)			+	=	W,29,46,50	
janthina D.S.	12	2	1	9	-	4	11. 7.-13. 8.	E7	(1.)			+	o	W,47	
interjecta HBN.	1	-	-	1	-	1	27. 7.		(1.)			o	o	W,47,49,57	
Lycophotia porphyrea D.S.	1	-	-	1	-	1	15. 7.		1.			++	+	46,52	
Peridroma saucia HBN.	2	-	-	-	2	2	2.10.		(3.?)			=	o	W,46,49	
Diarsia mendica F.	27	10	6	9	2	3	2. 7.-12. 8.	M7	1.			++	+	29,46,50,52	
brunnea D.S.	15	3	4	8	-	6	24. 6.-15. 8.	M7	1.			=	-	++	
Amathes c-nigrum L.	132	112	11	6	3	86	10. 6.-17. 6.	M6	(1.)	x	+	-	++	W,29,37,39,46,50	
ditrapezium D.S.	4	1	-	3	-	1	24. 6.-26. 7.		1.			o	=	++	
ashworthii DBLD.	1	1	-	-	-	1	6. 7.		1.			+	+	++	
baja D.S.	2	-	-	1	1	1	26. 7.-9. 8.		1.			o	o	++	
xanthographa D.S.	2	2	-	-	-	1	3. 9.-5. 9.	A9	1.			=	o	+	
Anaplectoides prasina D.S.	39	9	3	25	2	11	24. 6.-11. 8.	E6-M7	1.			+	-	+	
Cerastis rubricosa D.S.	331	25	147	45	114	36	26. 5.-22. 6.	E5-M6	1.	xxx	--?	-?	-?	28,29,30,31,36,38,40,41,42,50,51,52	
leucographa D.S.	1	-	-	-	1	1	4. 6.		1.			o	o	-	
Discestra marmorosa BKH.	163	64	28	29	42	15	5. 6.-12. 8.	A7-A8*	1.	x	+	=	o	ssp. <u>microdon</u> GN., 29,31, 36,38,39,46,54	
Polia bombycina HUFN.	1	-	1	-	-	1	3. 8.		1.			=	o	+	

Tabelle 12/4

FAMILIE Art	Exemplare					Daten		Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten		
	1977-1980	160 W MLL		125 W HÖL		Tages- maximum	frühester Fang			spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.	Haldigrat		Pilatus-K.	Generoso-V.
		1977	1978	1979	1980										
Mamestra brassicae L.	15	5	2	8	-	3	18. 6.-17. 7.	7.	E6	(1.)	-	=	=	W,47	
persicariae L.	1	-	1	-	-	1	4. 8.-26. 8.	8.	E8	(2.)	=	o	o		
conflicta D.S.	1	-	1	-	-	1	15. 7.	7.	E8	(1.)	=	o	o		
thalassina HUFN.	8	7	-	1	-	3	9. 6.-1. 7.	7.	E6-A8*	(1.)	=	-	+		
pisi L.	391	170	63	72	86	30	4. 6.-9. 8.	8.	E6-A8*	(1.)	xx	--	++	293021393940A15052	
glauca HBN.	262	97	16	85	64	18	28. 5.-11. 8.	8.	M6-A8*	(1.)	x	=	--	=bi-ten GZE., 29,30,31, 38,39,46,52,55	
Hadena caesia D.S.	8	6	-	2	-	3	10. 7.-27. 7.	7.	M6-M8*	(1.)	=	-	++	26,43,48,57	
Hada nana HUFN.	3633	1466	527	789	851	272	31. 5.-25. 8.	8.	M6-M8*	(1,2,?)	xxx	--	--	2226272829303132383940, 41425051525355657	
proxima HBN.	1	1	-	-	-	1	24. 8.	8.		(1.)	+	o	=	46,48,57	
Cerapteryx graminis L.	156	83	38	16	19	19	25. 7.-19. 9.	9.	A-E8	(1.)	xx	--	++	29,37,39,40,41,42,46,55	
Orthosia gothica L.	251	11	102	26	112	38	25. 5.-22. 6.	6.	E5-M6	(1.)	xx	--?	--?	28,29,30,31,36,38,40,41, 42,50,51,52,56,57	
Myrthimna conigera D.S.	6	4	-	2	-	2	10. 7.-26. 7.	7.		(1.)	o	o	++	W,47	
ferrago F.	2	-	1	1	-	1	26. 6.-15. 7.	7.		(2.)	o	=	++	W,47	
albipuncta D.S.	2	2	-	-	-	1	3. 9.-12. 9.	9.		(1.)	+	=	++	W,46,49,55	
viteallina HBN.	1	1	-	-	-	1	6. 7.	7.		(1.)	=	=	++	W,293940A2a647A9	
unipuncta HAW.	20	-	20	-	-	8	7.10.-14.10.	10.	A10	(2,?)	xxx	o	o	29,31,34,36,38,40,41, 43,50,53,57	
andereggi B.	180	89	20	48	23	14	1. 6.-11. 8.	8.	M6-E7*	(1.)	xx	-	++	43,50,53,57	
Amphipyra pyramidea L.	1	1	-	-	-	1	3. 9.	9.		(1.)	o	o	=	W2,26,47	
berbera RUMS.	3	3	-	-	-	1	30. 8.-3. 9.	9.		(1.)	o	o	o	ssp. svennsoni FLETCR., W2,26,47,48,55,56	
tragopogonis CL.	1	-	-	1	-	1	28. 7.	7.		(1.)	o	o	++	W,29,37,38,39,40,	
Phlogophora meticulosa L.	121	58	12	27	24	19	9. 6.-16. 7.	7.	M6	(1.)	xx	+	++	28,29,30,31,36,38,40,41, 46,53	
Cosmia trapezina L.	3	-	-	-	3	3	26. 8.-18.10.	10.	A9-A10	(2.)	=	=	++	47,55	

Tabelle 12/5

FAMILIE	Exemplare					Daten			Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten	
	1977-1980	160 W MLL		125 W HQL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang			Haupt- flugzeit ca.	Haidigrat	Pilatus-K.		Generoso-V.
		1977	1978	1979	1980										
Art															
<i>Apamea monoglypha</i> HUFN.	342	190	21	106	25	66	10. 6.- 2.10.	A7-A8	1.(2.?)	x	-	-	++	W,28,29,30,31,38,39,46,49,50,53	
<i>lithoxylea</i> D.S.	3	3	-	-	-	1	10. 7.-12. 7.		1.		-	-	=		
<i>crenata</i> HUFN.	95	19	20	47	9	18	9. 6.-22. 8.	M7-A8	1.	x	-	-	++	29,37,38,41,50,55	
<i>rubrirena</i> TR.	7	-	3	1	3	1	17. 7.-18. 8.		1.		=	=	=	46,55,57	
<i>illyria</i> FRR.	3	-	-	2	1	2	20. 6.- 6. 8.		1.		-	o	=	57	
<i>Oligia strigilis</i> L.	92	61	14	2	15	14	5. 6.-22. 8.	A7-E7*	1.		-	-	-	26,29,50	
<i>Mesapamea secalis</i> L.	32	17	3	12	-	9	3. 7.- 3. 8.	M7	1.	x	=	-	++	29,38,50 (W?)	
<i>Amphipoea oculea</i> L.	1	-	-	-	1	1	26. 7.		1.		o	o	o	ssp. <i>nictitans</i> BKH.,26	
<i>Meristis trigrammica</i> HUFN.	1	-	-	1	-	1	26. 6.		1.		o	o	=		
<i>Hoplodrina alsines</i> BRAHM.	5	3	-	-	2	2	4. 8.-11. 8.		1.		=	o	o	++	
<i>blanda</i> D.S.	1	1	-	-	-	1	16. 8.		1.		o	o	=		
<i>Paradrina clavipalpis</i> SCOP.	5	1	3	-	1	1	26. 7.-25. 8.		1.?		=	=	=	W?,47,55	
<i>Cucullia lucifuga</i> D.S.	7	2	2	3	-	1	1. 6.- 6. 7.	A6	1.		=	=	o	26,46,55,56	
<i>umbratica</i> L.	2	1	-	1	-	1	6. 7.-15. 7.		1.		o	o	=		
<i>Dasytoplia templi</i> THNBG.	106	20	31	18	37	6	21. 8.-31.10.	E8-A9	1.	xxx	--?	++	o	ssp. <i>alpina</i> RGHFR., o + überwintert, 29,34, 37,39,40,41,42,46,50, 51,52,54,56	
<i>Cleoceris viminalis</i> F.	13	6	-	4	3	3	27. 7.- 2.10.		1.		-	-	++	47	
<i>Lithophane socia</i> HUFN.	6	1	-	1	4	3	27. 8.-30. 8.		1.		=	-	+	Imago überwintert, 47	
<i>Blepharita adusta</i> ESP.	398	119	68	88	123	24	29. 5.-28. 9.	M6-A8*	1.	xx	=	--	-	28,29,30,31,38,39,40, 41,42,46,52,53,55	
<i>Polymixis xanthomista</i> HBN.	1	1	-	-	-	1	5. 9.		1.		o	+	=	57	
<i>Eupsilia transversa</i> HUFN.	4	-	-	1	3	2	24. 9.-18.10.		1.	x	=	=	+	Imago überwintert, 39,41,42,47,50,55	
<i>Cirrhus aurago</i> D.S.	1	-	-	-	1	1	28. 9.		1.		o	o	++	47	
<i>Agrochola circellaris</i> HUFN.	43	1	5	6	31	26	22. 9.-14.10.	A10	1.	xx	-?	++	++	29,39,40,41,42	
<i>macilenta</i> HBN.	39	-	10	13	16	13	28. 9.-14.10.	A10	1.	xxx	-?	+	-?	29,39,40,41,42	
<i>Heliothis peltigera</i> D.S.	1	-	-	1	-	1	15. 7.		(1.)		=	=	=	W,46,49,55,57	
<i>Colocasia coryli</i> L.	2	-	-	-	2	1	4. 6.-11. 6.		1.		o	=	o		

Tabelle 12/6

FAMILIE	Exemplare						Daten			Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten
	1977-1980	160 W MLL		125 W HQL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.			Halbigrat	Pilatus-K.	Generoso-V.	
		1977	1978	1979	1980										
Phaenocarpa auricomma D.S.	5	3	-	1	1	1	4. 6.-28. 7.	M6	1.	=	=	o	f.alt. <u>pepli</u> HBN., 55		
euphorbiae D.S.	5	2	-	-	3	2	17. 6.-28. 7.		1.	=	=	=	f.alt. <u>montivaga</u> Gn., 55,57		
Nyctea revayana SCOP.	1	1	-	-	-	1	6. 7.		1.	o	o	o	26		
Bena prasinana L.	1	1	-	-	-	1	2. 7.		1.	=	o	o	47		
Autographa gamma L.	5926	2902	165	1136	1723	732	1. 6.-18.10.	M6 M7-E7 M8-A10	(1.) (2.)	xxx	+	-	Tf: 12.8.82 (sehr häufig) W,22,27,28,29,30,31, 37,38,39,40,42,46,49, 50,53,56,57		
pulchrina HAW.	3	1	1	-	1	1	14. 6.- 6. 8.		1.	+	=	+			
bractea D.S.	30	6	3	13	8	5	6. 7.- 2. 9.	M7-M8	1.	+	=	+	W?,29,46,47,54		
aemula D.S.	55	8	9	19	19	9	6. 7.-23. 8.	M7-A8	1.	x	-	o	29,35,37,38,43,46, 55,56		
Plusia chrysis L.	1	-	-	1	-	1	26. 7.		1.	=	o	+	+Pheromonfalle 1983		
Euchalcia variabilis PILL.	18	10	4	3	1	3	18. 7.- 3. 9.		1.	+	-	+	29,46		
Abrostola triplasia L.	1	-	-	1	-	1	26. 7.		2.?	=	o	+			
Scoliopteryx libatrix L.	4	2	-	1	1	1	3. 8.-11. 6.		1.	+	o	++	Imago überwintert, 47		
Phytometra viridaria CL.	-	-	-	-	-	-	24. 6.		1.	oT	+	?	tagsüber mehrere Ex.,50		
Hypena obesalis TR.	2	2	-	-	-	2	3. 9.		1.	=	=	=	46,55,57		
GEOMETRIDAE															
Scopula incanata L.	1	1	-	-	-	1	2. 9.		1.	=	=	+	55		
Scotopteryx chenopodiata L.	2	2	-	-	-	1	6. 8.-15. 8.		1.	=	=	=	55,57		
Anaitis praeformata HBN.	20	12	2	1	5	5	17. 6.- 6. 8.	M-E7	1.	=	-	++	29		
Notocasis sertata HBN.	1	-	-	1	-	1	31. 8.		1.	o	o	o	47		
Oporinia christyi PROUT.	1	-	-	1	-	1	4.10.		1.	o	o	o	26		
autumnata BKH.	5	2	-	1	2	1	11. 9.- 2.10.	M9	1.	=	=	+	f.alt. <u>altivaga</u> HRTG., 26,55		
Triphosa dubitata L.	17	5	4	4	4	1	11. 7.- 5. 9.	A-M8	1.	=	+	+	Imago überwintert, 29		
Lygris populata L.	46	20	7	11	8	5	25. 8.-16. 9.	E8-M9	1.	x	=	-	29,37,39,41,50		
Cidaria fulvata FORST.	2	1	-	-	1	1	6. 7.-26. 8.		1.	=	o	=			

Tabelle 12/7

FAMILIE Art	Exemplare					Daten			Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seltennachweise der im Text erwähnten Arten	
	160 W MLL		125 W HÖL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.			Haldigrat	Pilatus-K.	Generoso-V.		
	1977	1978	1979	1980											
Thera variata D.S.	86	34	12	5	35	13	20. 6.-11. 8.	6.-11. 8.	E6-M7	1.	x	=	-	--	262933638394750525657
albonigrata GORNIK	161	66	22	43	30	14	1. 6.- 3. 8*	3. 8.-15. 9.	E7-A8* A6-E7*	1.	x	=	--	--	=Britannica TURNER, 2629, 3536383941475052555657
stragulata HBN.	10	3	-	5	2	2	11. 7.- 9. 8.	7.- 9. 8.	E8-A9	2.		+	-	0	47, 56
cognata THNBG.	64	21	11	14	18	4	26. 7.-22. 9.	7.-22. 9.	A-M9	1.	x	=	-	--	ssp. geneata FEISTH., 29, 39, 46, 52, 56, 57
Chloroclysta siterata HUFN.	26	7	7	3	9	4	30. 8.-11. 6.	8.-11. 6.	M-E9	1.		=	-	-?	♀ überwinterf., 293839
miata L.	17	2	1	9	5	3	27. 8.-12. 6.	8.-12. 6.	A10	1.		+	+	+	" 2948394041
Xanthorhoe munitata HBN.	10	2	1	4	3	2	25. 7.-25. 8.	7.-25. 8.	1.	1.		++	=	0	46, 52, 56
fluctuata L.	16	7	1	6	2	2	30. 5.-12. 8.	5.-12. 8.	1.	1.		=	--	++	2930331839414250515257
montanata D.S.	305	123	31	52	99	58	28. 6.-22. 8.	6.-22. 8.	M7-A8	1.	x	--	--	=	Tf.: 12. 6., 24. 6., 12. 8.
spadicearia D.S.	3	-	1	1	1	1	18. 7.-22. 8.	7.-22. 8.	1.	1.		=	0	+	46, 56
Calostigia aptata HBN.	1	1	-	-	-	1	5. 9.	9.	1.	1.		=	0	0	43, 46, 49, 54, 56
lineolata F.	15	7	-	8	14	4	20. 6.-26. 7.	6.-26. 7.	E6	1.		+	++	0	43, 46, 49, 54, 56
salicata HBN.	49	17	9	9	17	30	5.-11. 8.	5.-11. 8.	A-E7	1.	x	=	++	=	29, 37, 38, 46, 57
Iampoproxyra sulfimata D.S.	32	4	6	17	1	7	30. 5.-28. 6.	5.-28. 6.	E5-A6	1.		=	--	-?	29, 46, 50, 52
Entephria caesiata D.S.	28	23	2	2	1	8	6. 7.-11. 9.	7.-11. 9.	M7	1.		++	+	+	29, 46, 50, 52
flaviclinctata HBN.	3	3	-	-	-	1	17. 6.-11. 7.	6.-11. 7.	1.	1.		=	+	=	46, 55, 57
infidaria LAH.	2	2	-	-	-	1	6. 8.-11. 9.	8.-11. 9.	1.	1.		=	0	+	46, 56
cyanata HBN.	4	2	1	1	-	1	17. 6.-27. 7.	6.-27. 7.	E7	1.		=	++	=	46, 56
nobiliaria H. SCH.	6	1	-	5	-	2	17. 6.- 6. 9.	6.- 6. 9.	1.	1.		+	++	=	43, 49, 54, 57
Coenotephria verberata SCOP.	224	88	56	9	71	15	3. 8.-22. 9.	8.-22. 9.	A-E8	1.	x	-	--	0	Tf.: 29. 7., 12. 8. (häufig); 2931363941424346450556
nebulata TR.	2	-	1	-	1	1	3. 8.-11. 8.	8.-11. 8.	1.	1.		+	=	+	43
incultraria H. SCH.	7	3	3	4	-	2	3. 6.- 7. 7.	6.- 7. 7.	1.	1.		+	+	=	26, 43, 57
obsoletraria H. SCH.	7	6	1	1	-	2	6. 7.-21. 8.	7.-21. 8.	1.	1.		+	+	=	26, 43, 57
derivata D.S.	9	2	5	2	-	4	3. 6.-17. 6.	6.-17. 6.	A6	1.		-	0	0	43, 57
Euphyia molluginata HBN.	1	-	-	1	-	1	26. 7.	7.	1.	1.		+	+	++	
Diactinia silaceata D.S.	3	-	-	2	-	1	31. 5.-12. 7.	5.-12. 7.	1.	1.		=	+	++	

Tabelle 12/8

FAMILIE	Exemplare						Daten			Generationen	Aspektdominanz	Vergleiche			Bemerkungen sowie Seitennachweise der im Text erwähnten Arten
	1977-1980	160 W MLL		125 W HQL		Tages- maximum	frühester Fang	spätester Fang	Haupt- flugzeit ca.			Halbgrat	Pilatus-K.	Generoso-V.	
		1977	1978	1979	1980										
<i>Perizoma affinitata</i> STEPH.	5	1	4	-	-	3	6. 7.- 3. 8.		1.		o	o	=	Tf: 12.6.81 (2), 24.6.83 (1); 57	
<i>alchemillata</i> L.	1	1	-	-	-	1	12. 7.		1.			o	=		
<i>minorata</i> TR.	3	-	2	1	-	1	10. 7.-22. 8.		1.		+	=	=	46,57	
<i>Hydriomena furcata</i> THNBG.	2	1	-	-	1	1	3. 9.- 8. 9.		1.			=	=	55	
<i>coerulata</i> F.	1	-	-	-	1	1	11. 6.		1.		o	=	=		
<i>ruberata</i> FRR.	5	2	-	3	-	1	4. 6.-12. 7.		1.			=	=	46,55,57	
<i>Eupithecia satyrata</i> HBN.	4	4	-	-	-	2	17. 6.- 4. 7.		1.		=	=	=	26,55,57	
<i>sobrinata</i> HBN.	1	-	-	1	-	1	28. 7.		1.			o	=		
<i>lariciata</i> FRR.	11	7	4	-	-	5	5. 6.- 3. 8.		1.		+	-	+	26,47	
<i>tantillaria</i> B.	1	-	1	-	-	1	5. 6.		1.		=	=	c	47,55,56	
<i>lanceata</i> HBN.	1	-	1	-	-	1	5. 6.		1.		=	o	o	47,56	
<i>Horisme aemulata</i> HBN.	1	1	-	-	-	1	12. 7.		1.		=	=	o	55	
<i>Lomaspilis marginata</i> L.	1	1	-	-	-	1	6. 7.		1.		+	+	=	47	
<i>Puengeleria capreolaria</i> D.S.	4	-	3	-	1	2	21. 8.-26. 8.		1.		+	o	o	47,56	
<i>Ellopija prasinaria</i> HBN.	1	1	-	-	-	1	7. 7.		1.		o	o	o	47,56	
<i>Campaea margaritata</i> L.	3	2	-	-	1	1	12. 7.-27. 7.		1.		+	=	+	47	
<i>Selenia bilunaria</i> ESP.	5	2	2	-	1	1	5. 6.-13. 6.		1		o	o	o		
<i>Gonodontis bidentata</i> CL.	21	6	6	3	6	1	31. 5.- 6. 8.		1.		-	-	+	29	
<i>Alcis repandata</i> L.	11	6	2	3	-	4	12. 7.-27. 7.		1.		+	-	+	50	
<i>Gnophos glaucinaria</i> HBN.	5	1	1	1	2	1	31. 5. 30. 7.-26. 8.		1. 2.?		=	=	+	46,55	
<i>Catascia dilucidaria</i> D.S.	6	5	1	-	-	3	4. 8.-18. 8.		1.		++	+	++	46,52,57	
<u>PSYCHIDAE</u>															
<i>Epichnopteryx alpina</i> HEYL.	-	-	-	-	-	-	24. 6.		1.		=T	o	o	det. P. HAETTENSCHWILER; Tf: 24.6.83 (2 Ex.); Bodenfalle: Sack; 50	
<u>HEPIALIDAE</u>															
<i>Hepialus humuli</i> L.	6	4	-	-	2	3	12. 7.- 9. 8.		1.			o	o		

Die Macrolepidopterenfauna von Rigi-Kulm 1600-1797 m wurde vom Verfasser 1977-83 mit Hilfe von Lichtfallen und durch Tagfänge untersucht. Die Fangergebnisse werden qualitativ und quantitativ ausgewertet, wobei auch zahlreiche ökologische und zöologische Zusammenhänge besprochen werden.

Die Tagfalterfauna erwies sich als auffallend arten- und individuenarm, wofür nur anthropogene Einflüsse verantwortlich gemacht werden können (Störungen durch Massentourismus und vor allem Weidbetrieb). Es konnten nur 36 Arten nachgewiesen werden, davon einzig *Aglais urticae* oft häufig. Wichtige Charakterarten sind vor allem *Oeneis glacialis* und *Colonia pales* (Glazialrelikte), sowie *Erebia melanos stygna* und *Colias phicomone*.

Die Nachtgrossfalterfauna ist ebenfalls nicht besonders arten- und individuenreich, obwohl die derzeitigen Zustände noch nicht so unglücklich sind wie für die Tagfalter. In der Ausbeute überwiegen, vor allem was die Individuenzahlen betrifft, die Noctuiden. Die häufigsten Arten gehören entweder zu den Wanderfaltern (*N. prorsa*, *A. gamma*, *S. ipsilon*, *A. monoglypha*) oder zu den montan-subalpinen Faunenkomponenten (*H. nana*, *Ch. cuprea*, *B. adusta*, *M. pisi*). Beachtenswert ist die Häufigkeit der subalpin-alpinen Art *Mythimna andereggi*.

Oekologisch betrachtet überwiegen erwartungsgemäss die Arten und Individuen aus der Krautschicht bzw. die Wanderfalter. Ungefähr ein Drittel der bodenständigen Arten und Individuen ist primär oder sekundär an die alpinen Regionen (subalpin und alpin) gebunden.

Unter den selteneren bodenständigen Arten sind einige subalpin-alpine Faunenkomponenten besonders beachtenswert, wie z.B. *E. recussa*, *S. simplonia*, *S. lucerna catalaunica*, *E. grisescens*, *Rh. helvetica*, *Ch. ocellina*, *H. caesia*, *A. aemula*, *C. lineolata* und *E. nobiliaria*, ferner die in der Schweiz noch ungenügend erforschte *Ampityra berbera*.

Die quantitativen Angaben ermöglichen aufschlussreiche Vergleiche mit früher publizierten Angaben von drei weiteren Lichtfallenstandorten in den Schweizer Nord- bzw. Südalpen.

17. LITERATUR

- AGASSIZ, D. & B. SKINNER (1980): The Apparent Absence from Britain of *Thera variata* (Denis (Schiffermüller) and Related Changes in the Nomenclature. Ent.Rec.J.Var., 92: 162-166.
- FORSTER, W. & TH.A.WOHLFAHRT (1960-1980): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd.2-5. - Franckh'sche Verlagshandl., Stuttgart.
- GEIGER H.J. & L.REZBANYAI (1982): Enzymelektrophoretische Untersuchungen über die Verwandtschaftsbeziehungen bei *Erebia*, mit besonderer Berücksichtigung der Taxa euryale *isarica* Rühl und *adyte* Hübner. Ent.Zeitschr.Frankfurt, 92: 49-63. Stuttgart.
- HIGGINS, L.G. (1975): The Classification of European Butterflies. - Collins, London.
- HIGGINS, L.G. & N.D. RILEY (1971): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. Verl.P.Parey, Hamburg und Berlin, pp.375 + Tafeln.
- KOCH, M. (1958, 1976): Wir bestimmen Schmetterlinge, Bd.3 (1.Ausgabe) und Bd.4 (2.Ausgabe). Neumann Verlag, Radebeul und Berlin.
- LERAUT, P. (1980): Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas. Alexanor, Suppl., pp.334.
- LOBENSTEIN, U. (1982): Die Neuansiedler der Schmetterlingsfauna Nordwestdeutschlands unter Berücksichtigung des nördlichen Mitteleuropas, Teil 1. - Atalanta, 13: 179-200.
- POLTAWSKI, A.N. (1982): Wanderungen von Noctuiden im Nordkaukasus und in Kalmykien 1979. - Atalanta, 13: 37-40.
- REZBANYAI, L. (1974): Quantitative faunistische, ökologische und zöologische Forschungsmethode und deren Ergebnisse bei den Grossschmetterlingen. Folia Ent. Hung., 27, Suppl.: 183-190.
- REZBANYAI, L. (1977): Insektensammeln mit Lichtfallen. Mitt.Naturf.Ges.Luzern, 25: 161-176.
- REZBANYAI, L. (1978) Wanderfalter in der Schweiz 1977. - Atalanta, 9: 305-337.

- REZBANYAI, L. (1979a): Nachtaktive Wanderfalter (Macroheterocera) in den Zentral-schweizer Alpen 1972-1975: Fangergebnisse einer Lichtfalle am Brisen-Haldigrat 1920 m ü.M. *Atalanta*, 10: 245-279.
- REZBANYAI, L. (1979b): Bemerkenswerte Verbreitungsgrenzen in der Zentralschweiz I.: *Erebia euryale isarica* Rühl (ssp.?sp.) adyte Hübner. - *Mitt.Schweiz. Ent.Ges.*, 52: 440-441.
- REZBANYAI, L. (1980a): Die Insektenfauna des Hochmoores Balmos bei Hasle, Kanton Luzern. II. Macrolepidoptera. *Ent.Ber.Luzern*, Nr.3: 15-76.
- REZBANYAI, L. (1980b): Die häufigsten Nachtfalterarten der einzelnen Monate vom 1979 an 17 Lichtfangplätzen in der Schweiz. Macroheterocera. *Ent.Ber.Luzern*, Nr.4: 28-55.
- REZBANYAI, L. (1980c): Wanderfalter in der Schweiz 1978. Fangergebnisse aus sieben Lichtfallen sowie weitere Meldungen. - *Atalanta*, 11: 81-119.
- REZBANYAI, L. (1981a): Zur Insektenfauna des Siedereichtes bei Hochdorf, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: "Macroheterocera". *Ent.Ber.Luzern*, Nr.5: 17-61.
- REZBANYAI, L. (1981b): Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400 m, Kanton Nidwalden. II. Lepidoptera 1: "Macrolepidoptera". *Ent.Ber.Luzern*, Nr.6: 13-63.
- REZBANYAI, L. (1981c): Wanderfalter in der Schweiz 1979. Fangergebnisse aus 18 Lichtfallen sowie weitere Meldungen.-*Atalanta*, 12: 161-259.
- REZBANYAI, L. (1982a): Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: Macrolepidoptera. *Ent.Ber.Luzern*, Nr.7: 15-61.
- REZBANYAI, L. (1982b): *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809) in der Schweiz sowie ein Rückblick auf die Beobachtungen in Mittel-, Nord- und Westeuropa bis 1980. - *Atalanta*, 13: 96-122.
- REZBANYAI, L. (1982c): Zur Insektenfauna vom Pilatus-Kulm, 2060 m, Kanton Nidwalden. II. Lepidoptera 1: "Macroheterocera". *Ent.Ber.Luzern*, Nr.8: 12-47.
- REZBANYAI, L. (1982d): Die häufigsten Nachtgrossfalterarten der einzelnen Monate von 1980 an 18 Lichtfangplätzen in der Schweiz.- *Ent.Ber.Luzern*, Nr.8: 87-107.
- REZBANYAI, L. (1983a): Zur Insektenfauna der Umgebung von Baldegg, Kanton Luzern. Baldegg-Institut. II. Lepidoptera 1: Macroheterocera (mit Anhang). *Ent.Ber.Luzern*, Nr.9: 11-25 + 47-81.
- REZBANYAI, L. (1983b): Zur Insektenfauna der Umgebung von Ettiswil, Kanton Luzern. Ettiswil-Grundmatt. II. Lepidoptera 1: Macroheterocera (mit Anhang). *Ent.Ber.Luzern*, Nr.9: 34-45 + 47-81.
- REZBANYAI, L. (1983c) La fauna dei Macrolepidotteri del Monte Generoso, Cantone Ticino. I. Monte Generoso - Vetta, 1600 m (Macroheterocera) - *Bollettino della Societa' Ticinese di Science Naturali*, 70 (1982) 91-174, Lugano.
- REZBANYAI, L. (1983d): Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797 m, Kanton Schwyz. I. Allgemeines. - *Ent.Ber.Luzern*, 10: 1-16.
- REZBANYAI, L. (1983e): Die Insektenfauna des Hochmoores Balmos bei Hasle, Kanton Luzern. XX. Lepidoptera 3: Macrolepidoptera 2. Nachtrag zu den Nachtgross-falter-Aspekten. - *Ent.Ber.Luzern*, Nr.9: 109-115.
- REZBANYAI, L. (1984a?): Wanderfalter in der Schweiz 1980. - *Atalanta* (im Druck).
- REZBANYAI-RESER, L. (1984b): Das Vorkommen von *Calostigia lineolata* L. als Glazialrel im Schweizer Jura bestätigt. - *Mitt.Ent.Ges.Basel*, 34 (im Druck)
- REZBANYAI, L. & S. WHITEBREAD (1979): *Thera albonigrata* Gornik 1942 (variata sensu auct.) eine neuerkannte Spannerart für die Fauna der Schweiz. *Mitt.Ent.Ges.Basel*, 29: 109-116.
- SEITZ, A. (1914, 1915): Die Grossschmetterlinge der Erde, Bd. 3-4. Stuttgart.
- VORBRODT, C. (1911, 1914): Die Schmetterlinge der Schweiz. Macrolepidoptera. Bd. 1-2. Bern.

Adresse des Verfassers:

Dr. LADISLAUS RESER (=REZBANYAI)
Natur-Museum Luzern
Kasernenplatz 6
CH-6003 LUZERN

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Berichte Luzern](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Rezbanyai-Reser (auch Rezbanyai) Ladislaus

Artikel/Article: [Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797 M, Kanton Schwyz. II. Lepidoptera 1: "Macrolepidoptera" \("Grossschmetterlinge"\). 17-68](#)