

Weitere Angaben zum Vorkommen von *Idaea (Sterrha) obsoletaria* RMBR. in der Südschweiz (Lep., Geometridae)

von L. REZBANYAI-RESER


Ursprünglich waren nur unsichere oder fragwürdige Angaben über das Vorkommen von *I. obsoletaria* in der Schweiz bekannt (VORBRODT 1914). In REZBANYAI-RESER 1985 ist das Vorkommen dieser kleinen mediterranen Art in der Südschweiz (Tessin: Gandria 380 m, 1982 und Bellavista 1220 m, 1984 - siehe auch REZBANYAI-RESER 1986) aufgrund von 3 Exemplaren bestätigt worden. Seitdem liegen dem Verfasser weitere Fundangaben vor, die eindeutig darauf hinweisen, dass *obsoletaria* in der Gegend um den Luganersee vermutlich weiter verbreitet als bisher angenommen und örtlich sogar häufig ist. In Anbetracht der ökologischen Verhältnisse und der Faunengeschichte dieses Gebietes ist dies auch nicht verwunderlich.

Die folgenden neuen Fundangaben sind hier mitzuteilen (Legende: Lf = gelegentliche persönliche Lichtfänge; LF = kontinuierliche Lichtfallenfänge):

- 1) Monte Brè bei Lugano, Südseite, 875 m, Lf 1985 (5 Expl.):
2., 3., 21.(3) VIII.1985
- 2) Monte Brè bei Lugano, Ostseite, 835 m, LF 1984-86 (1 Expl.):
25.VII.1985
- 3) Monte Bré bei Lugano, Vetta, 910 m, LF 1983 (5 Expl.):
20., 29., 30., 31.VII., 8.VIII.1983
(in REZBANYAI-RESER 1985 irrtümlich als bei Vetta nicht vorkommend gemeldet - seitdem unter den Belegexemplaren aufgefunden)
- 4) Monte Generoso, Somazzo, Torretta-Ostseite, 590 m, LF 1985-87 (6 Expl.):
27., 29.VII.1985; 21.VII., 7., 9.VIII.1986; 15.VIII.1987
- 5) Monte Caslano, Südostfuss, 280 m, Lf 1987 (35 Expl.):
23.VII.(11), 7.VIII.(24) 1987

Nördlich des Monte Ceneri (Magadino-Ebene, Leventina-Tal, Isola Brissago, Maggia-Gebiet) konnte *obsoletaria* nach wie vor nicht gefunden werden, obwohl in den letzten Jahren an mehreren warmtrockenen Plätzen Lichtfang oder Lichtfallenfang betrieben wurde. Obwohl mehrere Arten bekannt sind, die in der Schweiz nur in der Umgebung des Luganersees vorkommen, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass *obsoletaria* auch an den Süd- und Südosthängen in der Umgebung von Locarno und Brissago lebt.

Zur Beachtung: zur sicheren Bestimmung, vor allem dann, wenn es sich um einzelne Exemplare handelt, ist eine Genitalüberprüfung zu empfehlen. Genitalabbildungen siehe u.a. in REZBANYAI-RESER 1987.



Karte 1: Die bisher bekannten Fundorte von *Idaea obsoletaria* RMBR. in der Schweiz, Südtesin.

LITERATUR

- REZBANYAI-RESER, L. (1985): Bestätigung des Vorkommens von *Idaea (Sterrha) obsoletaria* RMBR. und *I. politata* HBN. in der Südschweiz (Lep., Geometridae). - Mitt. Ent. Ges. Basel, **35**: 92-95.
- REZBANYAI-RESER, L. (1986): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 2. Bellavista, 1220 m (Lepidoptera, Macroheterocera). - Ent. Ber. Luzern, Nr.16: 41-144.
- REZBANYAI-RESER, L. (1987): *Idaea griseanova* sp.n., eine bisher verkannte Zwillingssart von *ruficostata* ZELLER, 1849, aus dem Westmediterraneum (Lepidoptera, Geometridae). - Mitt. Ent. Ges. Basel, **37**: 141-182.
- VORBRODT, C. (1914): Die Schmetterlinge der Schweiz, Bd.2. - Verl. WYSS, Bern.

Adresse des Verfassers:

Dr. Ladislaus RESER (REZBANYAI)
Natur-Museum Luzern
Kasernenplatz 6
CH-6003 LUZERN

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Berichte Luzern](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Rezbanyai-Reser (auch Rezbanyai) Ladislaus

Artikel/Article: [Weitere Angaben zum Vorkommen von *Idaea \(Sterrha\) obsoletaria* Rmbr. in der Südschweiz \(Lep., Geometridae\). 131-132](#)