 © Entomologische Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at

Zur Insektenfauna von Airolo, Lüvina, 1200 m, Kanton Tessin. V. Coleoptera 2: Nitidulidae und Chrysomelidae.

von P. HERGER

Zusammenfassung

Mit Hilfe einer halbautomatischen Lichtfalle wurden in Airolo im Kanton Tessin in den Jahren 1981-84 Insekten gefangen. Die in der Ausbeute nachgewiesenen 5 Arten aus den erst nachträglich bearbeiteten Käferfamilien der Nitidulidae und Chrysomelidae werden aufgelistet.

1. EINLEITUNG

Im Rahmen von entomofaunistischen Untersuchungen des Natur-Museums Luzern wurden in Airolo TI, Lüvina 1200 m ü.M. mit Hilfe einer halbautomatischen Lichtfalle in den Jahren 1981-84 Insekten gefangen (REZBANYAI-RESER, 1990). Eine allgemeine Übersicht über die Käferausbeute und eine Liste der nachgewiesenen Arten wurde bereits früher publiziert (HERGER, 1993), wobei die damals noch nicht bearbeiteten Vertreter der Familien Nitidulidae und Chrysomelidae in der Liste fehlten.
Nachdem nun auch dieses Material dank der freundlichen Hilfe von auswärtigen Spezialisten determiniert ist, kann mit der vorliegenden Publikation die Liste entsprechend ergänzt werden.

2. DANK

Den beiden Spezialisten MANFRED DÖBERL, D-Abensberg, und JEAN-CLAUDE BOURDONNÉ, F-Alès, danke ich ganz herzlich für die Bestimmung der *Longitarsus*- bzw. *Luperus*-Arten. Herrn Dr. JOSEF JELINEK, Prag, danke ich für die Determination der Nitiduliden.

3. ARTENLISTE

In der untenstehenden Tabelle sind die in der Lichtfalle von Airolo / Lüvina gefangenen Nitidulidae und Chrysomelidae aufgelistet.

©Natur-Museum Luzern; download unter www.biologiezentrum.at

Tabelle: Artenliste der Nitidulidae und Chrysomelidae aus der Lichtfalle von Airolo TI, Lüvina 1200 m.

FHL-Nr.	Familie, Gattung + Art	Anz.	Funddaten	Bemerkungen
	Nitidulidae			
50-.009-.018-.	Epuraea binotata Rtt.,1872	1	e.VII.1981	det. Jelinek
50-.009-.020-.	Epuraea terminalis (Mannh.,1843)	1	m.VI.1984	det. Jelinek
	Chrysomelidae			
88-.045-.009-.	Luperus flavipes (L.,1767)	137	e.V.-e.VIII / 1981-84	det. Herger / rev.Bourdonné
88-.051-.005-.	Longitarsus succineus (Foudr.,1860)	1	a.VIII.1984	det. Döberl
88-.051-.039-.	Longitarsus luridus (Scop.,1763)	5	m.IX.1982, e.IX.1983	det. Döberl

Unter den Chrysomeliden und Nitiduliden aus der Lichtfalle von Airolo TI befinden sich keine Besonderheiten. *Luperus flavipes* ist eine der am häufigsten gefangenen Käferarten der ganzen Lichtfallenausbeute von Airolo.

4. LITERATUR

HERGER, P. (1993): Zur Insektenfauna von Airolo, Lüvina, 1200 m, Kanton Tessin. IV Coleoptera 1 (ohne Nitidulidae, Cryptophagidae, Chrysomelidae). - Ent. Ber. Luzern, Nr. 30: 13-30.

HERGER, P. (1995): 20 Jahre Käferfaunistik am Natur-Museum Luzern 1975-1995. Ein Überblick mit einer ausführlichen Bibliographie. - Ent. Ber. Luzern, Nr. 34: 1-12.

REZBANYAI-RESER, L. (1990): Zur Insektenfauna von Airolo, Lüvina, 1200 m, Kanton Tessin. I. Allgemeines. - Ent. Ber. Luzern, Nr. 19: 1-15.

Adresse des Verfassers:

Dr. Peter HERGER
Natur-Museum Luzern
Kasernenplatz 6
CH-6003Luzern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Berichte Luzern

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: 37

Autor(en)/Author(s): Herger Peter

Artikel/Article: Zur Insektenfauna von Airolo, Lüvina, 1200 m, Kanton Tessin. V. Coleoptera 2: Nitidulidae und Chrysomelidae. 107-108