

Korrektur zu SCHÜLKE, M. (2012): Unterfamilie Oxytelinae (exklusive *Ochtheophilus* und *Thinobius*). – In: ASSING, V. & SCHÜLKE, M. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage

MICHAEL SCHÜLKE, Blankenfelder Straße 99, D-13127 Berlin, Deutschland, E-Mail: mschuelke.berlin@t-online.de

Abstract
Correction to SCHÜLKE, M. (2012): Unterfamilie Oxytelinae (exklusive *Ochtheophilus* und *Thinobius*) in: Assing, V. & Schülke, M. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. A correction to the key to the species of the genus *Anotylus* Thomson, 1859 is given.

Key words
Insecta, Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, *Anotylus*, key to species, correction.

Einleitung

Leider wurden während der Korrektur des Entwurfs der *Anotylus*-Tabelle in SCHÜLKE (2012) einige Leitzahlen verwechselt. Nachfolgend deshalb eine Neufassung des Anfangs der *Anotylus*-Tabelle mit korrigierten Leitzahlen:

- 1 Seitenrand des Pronotums deutlich gekerbt. Zwischenraum zwischen Naht der Elytren und Nahtstreifen glatt. Fühlerglied IV gestreckt, deutlich länger als breit. Größere Arten (3,6–5,3 mm; RL: 1,9–2,9 mm). ♂: Sternit VI am Hinterrand in der Mitte mit kleinem Dorn (Ausnahme: *insecatus*); Sternit VII am Hinterrand ohne deutliche Auszeichnungen, etwas aufgewölbt, mit sehr kleinem Mittelfortsatz oder winzigen Höckern; Sternit VIII am Hinterrand doppelbuchtig (Abb. 104a–d); Aedoeagus mit auf der Ventralseite des Aedoeagus befindlichen, parallelen Parameren (Abb. 104e–h), Medianlobus mit 2 ausstülpbaren Apikalstrukturen (*rugosus*-Gruppe). 5
- Seitenrand des Pronotums nicht deutlich gekerbt. Nahtstreifen der Elytren von der Naht durch eine parallele Furche getrennt, verdoppelt erscheinend (Ausnahme: *maritimus*). Fühlerglied IV klein und rundlich. ♂: Auszeichnungen der Sternite VI–VIII und Aedoeagus anders. 2
- 2 Arten mit überwiegend glänzendem Vorderkörper (Ausnahme: *intricatus*). Pronotum und Elytren mit deutlicher Punktur und ohne feine längsrissige Mikroskulptur. 2,1–4,5 mm (RL: 1,2–2,3 mm). 3
- Überwiegend matte Arten. Zumindest die Elytren mit feiner längsrissiger Mikroskulptur. Pronotum und Elytren mit undeutlicher Punktur oder unpunktiert. 1,6–3,9 mm (RL: 0,9–2,2 mm). 4
- 3 Größere Arten, Körperlänge meist deutlich über 3 mm, nur *maritimus* manchmal kleiner. Oberfläche des Vorderkörpers glänzend. ♂: Sternit VIII mit geradrandiger Basis (Abb. 105f–j), Aedoeagus mit relativ breiten, manchmal etwas asymmetrischen Parameren (Abb. 105k–o) (*sculpturatus*-Gruppe). . 8
- Kleinere Arten, Körperlänge höchstens 3,0 mm. Oberfläche des Vorderkörpers glänzend oder matt. ♂: Sternit VIII an der Basis tief ausgerandet (Abb. 106c–d), Aedoeagus mit schlanken, parallelen Parameren (Abb. 106e–f) (*nitidulus*-Gruppe). 13
- 4 Größere Arten, Körperlänge 2,3–3,9 mm (RL: 1,4–2,2 mm). ♂: Sternit VII am Hinterrand mit zwei kleinen Höckern oder einer 2-spitzigen Lamelle (Abb. 104i, l); Sternit VIII kaum modifiziert (Abb. 104j, m); Aedoeagus mit schlanken parallelen Parameren (Abb. 104k) (*complanatus*-Gruppe). 12
- Kleinere Arten, Körperlänge 1,6–2,8 mm (RL: 0,9–1,6 mm). ♂: Sternite VII und VIII meist mit deutlichen Auszeichnungen; Aedoeagus mit kräftigeren, zumeist gebogenen, oft asymmetrischen Parameren (Abb. 106k–n, 107m–q) (*tetracarinatus*-Gruppe). 15

Danksagung

Für die Mitteilung der fehlerhaften Leitzahlen danke ich B. FELDMANN (Münster) und K. RENNER (Bielefeld).

Literatur

SCHÜLKE, M. (2012): Unterfamilie Oxytelinae (exklusive Ochthephilus und Thinobius) in: ASSING, V. & SCHÜLKE, M. (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. – Heidelberg und Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, I-XII, 1-560.

received: 03.04.2012 ---- accepted: 18.07.2012

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [108](#)

Autor(en)/Author(s): Schülke Michael

Artikel/Article: [Korrektur zu Schülke, M. \(2012\): Unterfamilie Oxytelinae \(exklusive Ochthephilus und Thinobius\). - In Assing, V. & Schülke M. \(Hrsg.\): Die Käfer Mitteleuropas Band 4 Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage 131-132](#)