

## Die Verbreitung des *Bembidion tricolor* F.

Von

Prof. Dr. F. Netolitzky (Czernowitz) und J. Sainte-Claire Deville (Paris).

Österreich: Linz (Duftschmid), \*Steyr, \*Grünburg, \*Weyer (Petz); \*Waidhofen (Ybbs. Netolitzky), \*Scheibbs (Netolitzky), \*Traisental (Mandl), Lunz (Meixner), Rosenburg im \*Kamptal und \*Wachau (Minarz), \*Maria-Zell, \*Kapellen im Mürztal und \*Pretulalpe (Netolitzky), \*Selztal (Moosbrugger), \*Admont (Strobl), \*Gesäuse (Mandl), \*Oppenberg (Moosbrugger), \*Zeltweg (Zoufal), Mödling und Aspang (Bach), \*Graz, \*Goisern und \*Steinbrück (Netolitzky), Mixnitz (Meixner), \*Poßbruck (Payer), \*Wolfsberg im Lavanttal (Christen), \*Cilli (Strupi), Sachsenburg, Mettnitztal, \*Klagenfurt und Feldkirchen (Klimsch), \*Ferlach (Holdhaus), \*Eisenkappel und die ganzen \*Steineralpen (Netolitzky, Gobanz); Čatež bei Rann, Krainburg und Zwischenwässern (v. Gspann), Lichtenwald (Wradatsch); \*Tolmein (Natterer, \*Wochem (Penecke), \*Moistrana und \*Flitsch-Kerfreit (Netolitzky), \*Tarvis (Ganglbauer), Raibl (Diener), \*Heidenschaft (Bianchi), \*Pontafel (Holdhaus, Brand), \*Ober-Drauburg. \*Kirchbach und \*St. Lorenzen (Gailtal, Klimsch); Mauthen (Christen, Col. Rundsch.. 1912, p. 175). Dr. Müller (Triest) gibt folgende Fundorte seines Gebietes: Unter-Tribuša, Görz, Loke und \*Vreme a. d. Reka, Bresovica (Norddistrikt), \*Dinaraplanina (Dalmatien, Obenberger), \*Salzburg (Handerek), \*Mariapfarr (Lungau, Trieb); \*Lienz (Ganglbauer), \*Bozen, \*Brixen, \*Sterzing und Reutte, fehlt im Ötztal; Knabl, brieflich. \*Meran (v. Varendorff), \*Innsbruck (Wörndle), Vorarlberg: \*Bregenz, Bezegg, Feldkirch, \*Andelsbuch, \*Vorkloster, \*Kennelbach (Dr. Jul. Müller), \*Seis (Schuster), \*Cima Tombea und \*Storo in Judicarien (Ganglbauer), \*Predazzo (Gabert). Nach Gredler (mitgeteilt von Wörndle): Kitzbühel, Antholzertal, Niederdorf, Staben a. d. Etsch (bei Naturis), Gerlos Leno und Condino (Bertolini), S. Giacomo am M. Baldo (Halbherr). — Böhm. Schweiz (Lokaj, Kf. Böhm. 1869); Čelakovitz, Nimburg. Touseu = Tauschim (Roubal, brieflich). — Teschen\* (v. Wanka), Bielitz (v. Varendorff), Troppau (Mus. Dresden), Altvater (Letzner-Gerhardt), Mähr. Ostrau (Zoufal); \*Paskan (Graf), Weißkirchen (Weber), \*Prerau (Netolitzky). Zakopane. Lawoczne (Lomnicki). \*Przemysl (Coll. Breit), \*Delatyn (Netolitzky); Bukowina: \*Radautz, \*Wižnitz, \*Gurahumora, \*Kimpolung, \*Putna (Netolitzky), Krasnova kl. Sereth (Hormuzaki, Ent. Nachr. 1888).

Ungarn: \*Marmaros (Mihók), \*Fericse im Bihar (Bokor), \*Szurduk, \*Bucsecs, \*Ober-Tömös, \*Vajda-Hunyad und \*Alsó-Rákos (Deubel). Rodnaergeb. (Holdhaus-Deubel, Zoogeogr. Karp. 188), \*Czornahora (Obenberger), Güns und Preßburg (Weber, brieflich); Savski-Marof (bei Agram, v. Gspann); Sissek (v. Wanka!), Vinkovce (Koča, Kfr.). Petri (Siebenbürg. Kf. 1912, p. 15): Hászeg, Gurariu, Zood, Kerzergeb., Arpásgeb., Kronstadt, Törzburg, Marosgeb., Borgócspaß, Rotenturm, Kákova, Nagyenyed, Sebeshely, Gyergyó-Tölzyes, Balánbánya. Ilvamika.

Herr Kustos E. Csiki gibt außer diesen noch folgende Fundorte für Ungarn: Trencsén, Kis-Kriván, Arva; Bárta, Mezőlaborcz: Köremzö, Bogdán, Fajna-völgy, Rada-Borberek, Kis-Ilva, Borgó, Segesvár (Schäßburg), Lotrioratal, Guraro, Vulkán, Remete, Belényes; Meszes-Geb., Élesd, Nagybarod; Mehádia. Stájerlak, Gerebencz (Grebenácz); Papuk-Geb., Ludbreg b. Varasdin.

\* Die mit \* bezeichneten Fundorte sind in meiner Sammlung vertreten.



30

40

50

40

Verbreitung des  
*Bembidion tricolor* F.  
in Mitteleuropa

Blatt.



Bosnien: \*Sarajevo (Apflb., Bernhauer), Pazarić, Džile bei Vlasenica (Apflb., Käf. Balk. I, p. 87), Travnik (Leonhard). Zavidovic (Csiki, brieflich).

Herzegowina: Konjica a. d. Narenta (Apflb. l. c.); \*Igbartal (Wanka, Entom. Bl. IV, p. 169; Zoufal).

Montenegro: Maglic (Obenberger).

Serbien (Schaum); Majdan Kučaina (Apflb. l. c.).

Bulgarien: Lompalanka (Apflb. l. c.); \*Sofia, Vitoša-Knjaževo; ferner Kalofer-Balkan (Joakimoff); und Rhila-Pl., \*Schipkabalkan-Raduneci (Netolitzky, Col. Rundsch. 1912).

Albanien: (Apflb. l. c.).

Rumänien: Brosteni (Montandon, F. J. N. 1880), Sinaia (Fleck, Bull. Soc. S. Buc. XIII—XV), Azuga (Dodero).

Deutschland: Im Deutschen Entomol. Museum Berlin-Dahlem sah ich Stücke von: \*Ratibor (Coll. Kraatz), Schweidnitz, \*Mariental a. d. Erlitz, und \*Glatz (Coll. Letzner). In Letzner-Gerhardt (II. u. III. Aufl.): Bischofskoppe (bei Ziegenhals), Schlesiertal (im Eulengeb.), Kamenz, Neiße, Waldenburgergeb. (Kolbe, brieflich). \*Bayrische Alpen, Valeppbach (Daniel, Münch. Kol. Zeit. I, p. 17), \*Garmisch (Waegner), \*Burghausen a. d. Salzach (Stöcklein), \*Ziegelhaus bei Lindau (Dr. Jul. Müller), \*Ulm (Forner), München (Gemminger), Immenstadt (E. Scriba, brieflich), Püttlachtal (Fränkische Schweiz, Krauß, Entom. Jahrb. 1905). (Kyffhäuser und Arnstadt wegen großer Bedenken ausgelassen.) Straßburg i. E., Maxau b. Karlsruhe und Speyer (E. Scriba, selbst am Rhein gefangen, briefliche Mitteilung; Scherding hat es nie im Elsaß gesehen.)

Schweiz: St. Gallen a. d. Sitter (Täschler, Nachtrag Käf. St. Gallen), Basel (Stöcklin-Müller, brieflich), Carfiun bei Klosters (Dr. Jul. Müller, brieflich), \*Zürich (Dietrich, Käf. Zürich, Bänninger), \*Signau und \*Biel (Herrmann), \*Capolago (Luganersee, Bernhauer), \*Gruyères (Mathey), \*Engadin und Vevey (Mus. Berlin-Dahlem), Dietikon (Bänninger!). Im Wallis: Aigle, Ormont, Sitten (Sion), Clarens (Favre-Bugnion, Fn. Col. Valais 1890), Poschiavo (E. Scriba, brieflich), Heer (Fn. Col. Helv. 1841, p. 128): Matt am Sernf, Pilatus, Lac de Bret, Genf, Locarno, Echallens.

Italien: \*Macugnaga (Favre-Bugnion l. c., Bänninger), \*Monte Viso, Crissolo, Ormea, Tenda a. d. Roja (C. Fischer, Dodero), \*Terme di Valdieri und \*Val Pesio (Ganglbauer), \*Entraque (Herm. Müller), Ceresole Reale (Dodero), Viareggio und Graglia (Mus. civ. Genova), Pisa und Bagni di Lucca (Piccioli, Col. Toscana), Sopra la croce und Borzenasca im ligurischen Appenin (Flach, brieflich), Limentra (Dodero), \*Montepagano (Paganetti). Fiori (Col. Faun. Modenese, p. 162): Pievepelago, Fiumalbo, Civago.

Frankreich: Albertville, Chamébry und St. Jean de Maurienne (Fauvel), Briançon (Ht.-Alpes, Agnus!), Digne (de Peyerimhoff!), St.-Martin-Vésubie und zahlreiche andere Orte aller Wildbäche der Alpes maritimes! Nizza (Kgl. Zool. Mus. Berlin) (die Fundortsangaben aus den Pyrenäen beziehen sich anscheinend alle auf *B. conforme!*).

Kaukasus: Zwei Stücke in der Sammlung des Kgl. Zool. Mus Berlin gesehen: „*Peryphus semiflavus* Motsch. Kaukas.-Type“ und „Armenia“. (Vgl. Käf. Rußl., p. 10, „*Fluv. Uravel*“, den ich nicht finden kann.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz, Sainte-Claire Deville Jean

Artikel/Article: [Die Verbreitung des Bembidion tricolor F. 319-320](#)