

Zahlreiche *intricati* besitze ich aus ganz Frankreich, doch ist keine auffallende Lokalrasse darunter erkennbar, einzig scheinen die südlichen Exemplare, besonders aus den *Alpes maritimes*, breiter und flacher als die nördlicheren.

Von deutschen *intricati* erscheint mir nur der märkische *laticollis* Roeschke, der einigermaßen an *gigas* Heer erinnert, bemerkenswert, d. h. aus der Hauptmasse hervorragend.

In der Schweiz ist *intricatus* fast überall verbreitet, aber fast überall mehr oder weniger selten. Auffallend ist außer dem prächtigen *gigas* und seiner mehr blaugrünlichen Nebenrasse *Siegwarti* im Tessin etwa noch die ebenfalls sehr große, aber im Gegensatz zu *gigas* schlanke und gewölbte Form der Gegend von Schaffhausen. Ziemlich klein sind naturgemäß die Exemplare aus den Alpen, wo die Art, namentlich im Wallis, bis gegen 2000 m emporsteigt. Im Jura ist *intricatus* besonders selten.

Saperda populnea L. ab. Bickhardti nov.

Von Wilh. Sattler (Frankfurt a. M.).

Saperda populnea L. besitzt normal auf jeder Flügeldecke fünf in einer unregelmäßigen Längsreihe stehende gelbe Tomentflecken. Zetterstedt beschrieb eine im Norden vorkommende Aberration, bei der diese Flecken weißlich sind, als var. *salicis* Zett. Im übrigen ist über Aberrationen nichts bekannt.

Von Herrn Prof. O. Böttger, Frankfurt a. M., erhielt ich vor Jahren zwei Exemplare, die er in dem südlich von Frankfurt a. M. gelegenen großherzoglich hessischen Waldgebiet „Mitteldick“ am 30. Mai 1906 gefunden hatte. Diesen beiden Tieren fehlen die Tomentflecken auf den Flügeldecken zum Teil völlig, zum Teil sind sie nur durch einige dichter gestellte Härchen eben angedeutet, und zwar ist bei dem einen Exemplar nur der 3. u. 4. und bei dem anderen Exemplar nur der 4. und 5. Fleck bei Lupenvergrößerung erkennbar. Bei Betrachtung mit bloßem Auge erscheinen die Tiere völlig ungefleckt und deshalb kleinen Exemplaren der *Agapanthia lineatocollis* Don. sehr ähnlich. Im übrigen ist die gelbe Tomentierung auf dem Kopf, Halschild und Schildchen genau so wie bei der Normalform.

Meinem hochgeehrten Freunde Herrn H. Bickhardt zu Ehren sei diese sehr auffällige Aberration: *Bickhardti* genannt.

Saperda populnea* L. ab. *Bickhardti*: *Maculis flavis elytrorum deficientibus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Sattler Wilhelm

Artikel/Article: [Saperda populnea L. ab. Bickhardti nov. 200](#)