

Eine neue Prostomisart aus dem Elbursgebirge.

Von Obersanitätsrat Dr. Anton Fleischer in Brünn.

Prostomis elburica n.

Der *Prostomis mandibularis* F. sehr ähnlich, aber viel größer, breiter und robuster gebaut und mehr dunkelbraun gefärbt; die Mandibeln sind länger und innen stärker gezähnt; an der Spitze sind dieselben fast im rechten Winkel, bei *mandibularis* gerundet nach innen umgebogen; der Seitenrand der linken Mandibel ist nur wenig gerundet, fast geradlinig, der der rechten hingegen ist stark gerundet, hinter der Mitte am breitesten und von hier zu den Hinterecken stärker verengt; von den gekrümmten, langen Fortsätzen der Vorderecken der Wangen unterhalb der Maxillen ist der rechte an der Basis breiter als der linke, mit tiefer äußerer Konkavität gekrümmt und in eine häkchenförmig nach innen gedrehte Spitze auslaufend; die Fühler sind länger als bei *mandibularis*, die zwei vorletzten Glieder sind breiter, das letzte ist viel schmaler als die zwei vorhergehenden; der Kopf und Halsschild ist namentlich an den Seiten stärker punktiert als bei *mandibularis*; der Seitenrand des Halsschildes ist etwas gerundet, hinter der Mitte am breitesten, nach vorne sehr schwach, nach rückwärts deutlicher verengt, mit tiefer Mittelfurche und wenig deutlich vortretenden Hinterwinkeln; der Bauch ist glatt, wodurch der Käfer von den beiden Arten mit punktiertem Bauch, nämlich *latoris* Reitt. und *mordax* Reitt. leicht zu unterscheiden ist. L. 8 mm. — Elbursgebirge (Elburus), Nordpersien, von Herrn Bodemeyer ein ♂ des höchst auffallenden Käfers gefunden.

Eine neue, Necydalis ähnliche Callichrominen-Gattung.

Beschrieben von Dr. K. M. Heller, Dresden.

(Mit 2 Textfiguren.)

Locustipes n. g.

Callichrominorum prope Dictator J. Thoms.

Caput lateribus antrorsum convergentibus, oculi planiusculi. Mandibulae longitudine latiores, dorso convexiusculae. Mentum palpique gula obtecti, hi articulis apicalibus brevioribus aequilatis, latitudine fere sesqui longioribus. Prothorax suturis episternalibus deorsum partim visibilibus. Elytra abbreviata, singula attenuata, latitudine basali vix triplo longiore, alae maxima parte apertae. Coxae anticae ut in *Dictator*, apertae, sed processus intercoxale deplanatum, mesosterno aliquid incumbens, margine postico subanguloso-emarginato. Mesosternum inter coxas multo latius, quam in genere *Dictator*, subquadratum, coxarum latitudine fere aequante. Femora postica linearia, abdomen apicem valde superantia, tibiae posticae femoribus aequilongae, compressiusculae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Fleischer Anton

Artikel/Article: [Eine neue Prostomisart aus dem Eibursgebirge. 211](#)