

Die Verbreitung des *Bembidion pygmaeum* Fabr.

Von Prof. Dr. Fritz Netolitzky.

J. St. Deville sah die Rasse *bilunulatum* nie von Frankreich, ich nie aus dem Alpen- und Voralpengebiete. In Mitteldeutschland findet sich die Rasse unter der Nominatform um so häufiger, je östlicher der Fundort liegt (z. B. Berlin, Ent. Mitteil. 1918, 131). Im Quellengebiet der Oder und Weichsel und in den Karpathen ist die Nominatform nur ausnahmsweise zu treffen; dagegen sah ich von Moskau und Twer nur die letztere. Die Fundorte aus Norddeutschland, Niederlande und Belgien sind nicht gesichert, „Lübeck“ ist nach Benick falsch.

Westeuropa (z. T. nach Barthe, Cat. Col. Gall.): Pyren. orient.; Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Béziers; Durance, Nizza, Verdon, Lantosque, Roquestéron, Estéron, Avignon, Montélimar; Grenoble, *Guiers, Lac grand Doménon, Vienne, Ain, Saône-et-Loire (hier angeblich auch die Rasse); *Pau (Nicolas), ?Chalons (Mus. Genova), Grde Chartreuse und Col di Tenda (Coll. Fischer). — Die Fundorte Amsterdam und Calmpthout bei Antwerpen sind nicht ganz gesichert. — Genf; Bex (Mus. Dahlem); Sitten, Siders, Souste u. Aigle (Favre-Bugnion); *Martigny, *Chable, *Innertkirchen, *Lugano und *Misox (Bänninger); *Utzensdorf (Herrmann), Schaffhausen (Stierlin), Saas-Fee (Mus. Berlin), Zürich (Dietrich), Airolo (Sekera), Ragaz (Berl. E. Z. 1859, 340).

Apennin: Emilia (Mus. Berlin), Arno-Mündung (Flach), Firenze (Coll. Genova), Bazzano (Sekera), Bagni di Lucca (Piccioli).

Ostalpen: Cortina u. Gardasse (Wingelmüller), Valdiriva (Halbherr), *Trient (Net.), Pinzolo; Vicentina i. Prov. Vicenza (Disconti); *Bozen (Waegner, Knabl), *Lienz (Ganglb.), *Umhausen, Reutte u. Jungholz (Knabl, Ent. Bl. 1922), Innsbruck (Wörndle), *Feldkirch (Handerek); Piemonte (Baudi), Chisone (Solari), Torino und Valle Formazza (Mus. Genova), Strà (Veneto, Mus. Berlin); Grödner- u. Pustertal (Coll. Schuster), Pontebba u. Pontafel (Handerek), Tolmein u. Podgora (Dr. J. Müller), Triest (Mus. Berlin), Fiume (Padenrieth), Görz (Coll. Koltze u. Hensch); Gastein (Mus. Dahlem), Sand-Taufers (Hänel), Sachsenburg (Coll. Prag), Kleblach (Coll. Künemann), Mölltal (Coll. Hille), Villach (Meschnigg), *Gailtal (Klimsch), *Eisenappel (Gobanz), *Sittesdorf (Penecke), Lavanttal (Wradatsch), *Graz (Net.), *Marburg (Lang), *Ehrenhausen (Haberdtz); *Pettau u. Judenburg (Scheibel), Feistritz (Steiermark, Diener); Preßburg (Weber), Varasdin (Hensch); Admont (Pinker), Eisenerz (Petz); *Wien (Mader), *Steyr, Christkindl u. Grünberg (Petz); Pitten (Ganglb.), Lunz u. Krems (Coll. Schuster), Wördern (Haberdtz), Traismauer (Pinker), Gars a. Kamp (Minarz), Linz (Jungananast).

Deutschland: Obertsdorf (Buchka), *Ulm (Former), München (Gemmingen u. a.), Regensburg (Waegner), Unter-Inntal (Pfaundler), untere Isar (Mus. Dahlem), Augsburg (Weidenbach-Petry), Passau (Jungermann u. Walth); Staßburg u. Achenheim i. E.

* In meiner Sammlung vorhanden.

(Scherdlin, Bodemeyer), Hildesheim (Mus. Dahlem), Celle u. Rhön (Schneiders), Seeheim i. Hessen (Scriba), Nassau (Coll. Waegner), Mainz (Coll. Waegner, angeblich die Rasse), Cassel (Riehl, angeblich beide), Harz (Hillecke, angeblich beide), Cleve (nach Everts brieflich, die Rasse, ? Oldenburg (Wiepken), Crefeld (Förster), ? Holstein (Coll. Hänel leg. Dr. Knauth), ? Mecklenburg (Clasen), Zellin (Mus. Berlin); beide Rassen in der Mark: Herzfelde, Sperenberg, Velten u. Birkenwerder (Ent. Mitt. 1915, 307; 1918, 131); Freienwalde (D. Ent. Z. 1915, 107; Micke), Weichselmünde (Maaß), Glatz (Coll. Fischer); in Ostpreußen bisher nur die Rasse: Allmoyen, Crantz, Rauschen (Schs. phys. ökon. Ges. Königsberg 57, 1916, 63); beide Rassen: Ratibor u. Ohlau (Gerhardt) u. Posen a. d. Warthe (Gabriel).

Sudeten und Karpathen: Eger (Mus. Prag), Prag (Lokaj); beide Rassen: Brünn (Fleischer), *Paskau, Mähr. Ostrau, Friedland, *Ustron, Teschen, Mähr. Weißkirchen (Reitter, Wanka, Zoufal u. a.); bisher nur die Rasse gefunden: Bezko u. Trentschin (Branczik), Tatra (Diener), Lipotvar (Waegner), Zakopane, Czernahora u. Stanislau (Mus. Lemberg), *Bolechow, *Delatin, *Czernowitz, *Radautz (Net.), Marmarosch (Reitter), *Bogorya u. *Staszow bei Kielce (Net.), Podolia (Mus. Wien).


Die zahlreichen Fundorte von Siebenbürgen (Petri, Käferfauna p. 14) zähle ich aus Platzmangel nicht auf; die Nominatform tritt gegenüber der Rasse weit zurück; Dasselbe gilt von *Predeal u. *Orsova (Obenberger), *Campolung (Montandon), Sinaia (Fleck), Focsani (Liebmann, Ent. Bl. 1920, III). Von Zentral-Ungarn sah ich die Nominatform von Kalocza (Pinzger).

Balkan; bisher nur die Rasse: Sarajevo (Bernhauer), Jablanica (Apflb.), Ilidže (Hensch), Konjica (Meschnigg), Igbar (Wanka), *Požarevac (Hilf.).

Rußland: Jacobson zählt im Katalog die Fundorte ohne Rassentrennung auf. Von Kiew u. Kasan (Rev. russ. Ent. 1911, 338) sah ich die Rasse, von *Moskau u. *Twer (Lgocki) nur die Nominatform. — Von Finnland ist nur die Rasse bekannt (Poppius, Kare lens Col. p. 11: Gorki).



* *Bembidion pygmaeum* Fabr.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: [Die Verbreitung des Bembidion pygmaeum Fabr. 1-2](#)