© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Die Verbreitung des *Bembidion* (Ocys) *quinquestriatum* Gyll. und seiner Rassen.

Von Prof. Dr. Fritz Netolitzky.

a) Die Nominatform. (Rote Punkte der Karte.)

Schweden: *Goeteborg (Sandin), Stockholm (Grill).

Großbritannien: Cowley (Oxford), *Brighton (Sussex); London, Liverpool, Glasgow. (Die übrigen Fundorte ungesehen nach Fowler) [vgl. auch Entom. Monthly Mag. 1916, p. 16, 64, 90].

Irland: Die Eintragungen nach Johnson und Halbert (Belege nicht gesehen).

Dänemark: Sorö (Jakobsen, nicht gesehen) [vgl. Rye 1908].

Osteuropa: St. Petersburg (Catal. Jakobson), Warschau (Lgocki) [beide Belege nicht gesehen]; Lemberg (Lomnicki!).

Böhmisch-Mährisches Gesenke: *Außig (Gabert), Schluckenau (Coll. Hille), *Prag (Rambousek), Brandeis a. Elbe (Coll. John), *Paskau (Graf), Fritschowitz (Reitter), *Olmütz (Patkiewicz), Braunsberg (Janáček), Mähr.-Weißkirchen (Weber), Brünn (Fleischer), Ungar.-Brod (Wanka) [vgl. auch Gerhardt, Schlesische Fundorte 1910].

Karpathen: *Tavarnok (Com. Nyitra, Kelescenyi), Bartfeld a. Topla (Mihalow, Mus. Budapest).

Deutschland: Hamburg (Koltze), *Lübeck (Benick), Holstein (Appel); Schleswig, Langeoog und *Stettin (v. Warendorff); Allmoyen, Gilgenburg, Eydtkuhnen [vgl. Phys. ökon. Ges. Königsberg 1916, 70); Schlawe (Coll. Greve, Berlin, Zossen, Friedrichsfelde (Coll. Dormeyer); Moosburg (Wiener Hofmus.); Breslau, Liegnitz, Schweidnitz u. Lomnitz (Letzner, Mus. Dahlem); *Schmiedeberg (Schwarzer); *Dresden (Mus. München), *Leipzig (Linke), Eilenburg (Langenhan), Halle (Mus. Dresden; Thüringen: Rudolstadt, Oberhof, Lehenstein, Bufleben (Hubenthal); Gerarode (Kolbe), Braunschweig (leg.?), Detmold (Schultze, München), Hessen u. Bonn (Dormeyer), Cassel (Weber), *Crefeld (Fischer), Barmen (Mus Dahlem), Neuenahr, Frankfurt a. M., Griesheim; Grünstadt u. Heidelberg (v. Heyden), Deidesheim (Mus. Wien), *Hanau (Lamy), Heilbronn (Scriba), Fahrnau i. Schwarzwald (Hartmann), München u. Günzburg (Daniel), Erlangen (Coll. Everts), Rennertshofen (Quile). Nicht selbst gesehen: Harburg (Preller), Helgoland (D-Torre), Paruschowitz (v. Scheidt [Ent. Mitt. 1919, 163]), Augustfehn i. Oldenburg (Künnemann), Zülzefitz u. Labes (Hopp, brieflich), Köslin (Lüllwitz), Sperenberg (Ent. Mitt. 1918. 132), Nimp'sch (Gabriel), Witten (Fügner), Magdeburg (Hahn), Aschaffenburg (Fröhlich), Augsburg (Weidenbach), Straßburg u. Kolmar (Kampmann; Scherdlin [Bull. soc. d'hist. nat. Colmar XV, 1918/19]).

Tirol: *Bregenz u *Klausberg (Dr. Julius Müller), Reutte (Knabl); Bozen (Coll John), *Süd-Tirol (Gradl).

---

* In meiner Sammlung vorhanden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at



Beilage zu den Entomologischen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

* *Bembidion (Ocys) quinque steriatum* Gyllk.



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Schweiz: Schaffhausen u. Aarau (Coll. Leonhard), *Genf u. Vevey (Coll. v. Heyden), Thuner-See (v. Varendorff); nicht gesehen: Zürich (Dietrich), Bern (Stierlin), Chur (Killias).

Luxemburg: (Ferrant, brieflich).

Niederlande: Haag, Leijden, Giesendam, Zierikzee, Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Knijk, Sneek (Coll. Everts).

Belgien: Heide (Coll. Kolbe, Liegnitz). — Lüttich, Jemeppe, Froidmont, Louvain, Etterbeek, Ixelles, La Cambre, *Groenendael, Postel, Arlon, Grammont (Coll. Brüssel).

Frankreich: Paris (Mus. Wien), Manche (Coll. Neumann), *Périgueux u. *Valognes (Nicolas), Mâcon (Coll. Leonhard), Nyons (Coll. Daniel), Landes (Coll. Zoppa), Alet-Aude u. Pamiers-Arriège (Coll. Dodero), Biarritz (Coll. Everts), *Vienne (Falcoz), Marseille (Caillol), *Lyon (Robert), *Pont-St. Esprit u. *St. Martin-Vésubie (Magdelaine), Carcassonne u. Belcaire (Gavoy); Digoin, Boulogne-sur-mer, Versailles, Evreux, Sens, Le Havre, Fontainebleau (mitgeteilt von Deville). Die übrigen Fundorte im Catalog Barthe nicht selbst gesehen.

Italien: Bagni di Lucca (Dodero).

Spanien: *Centellas (Barcelona, Mas de Xaxars).

b) subsp. *reticulatum* Net. (Rote Kreise der Karte)

Ostalpen: *Wien (Net), Stoder (Mus. Wien, Ganglb.), *Losenstein-Reichramming (Petz), Neusiedler-See (Mus. Budapest), Graz (Penecke), Marburg a. Drau (Krauss), Klagenfurt (Penecke), *Villach (legit.?), *Pettau (Scheibel), *Heidenschaft (Bianchi).

Kroatisches Küstengebiet: Plase bei Fiume (Mus. Wien), Monte Santo im Wellebit, Plisevica Svrilaja u. Samograd pečina (Dr. J. Müller); Velež- u. Prenj-Planina, Jablanica, Cortnica (Coll. Leonhard), Mostar, Tisovica, *Igbar (Coll. Zoufal); *Mosor (Blühweiß); Uvac (Dr. Hensch).

Siebenbürgen: Schulergeb. (Mus. Wien, Ganglb.).

Dobrudscha: Mangalia (Fleck); nicht gesehen.

Italien: Foletino (Coll. Dodero), *Castel di Sangro u. Montepagano (Paganetti), Ficuzza (Sizilien, Coll. Leonhard); Fontanigorda (Dodero). [Grenze beider Rassen östlich von Genua.]

c) subsp. *subtile* Schaum. (Rotes Dreieck der Karte.)

Griechenland: Parnes bei Athen (Mus. München).

d) subsp. *berytense* Net. (Rotes Viereck der Karte.)

Syrien: *Beirut (Appel, Mus. Wien), *Amanus-Gebirge (Coll. Reitter).

e) subsp. *trechoides* Reitter.

Kaukasus: Ordubat am Araxes (Coll. Reitter).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: Die Verbreitung des Bembidion (Ocys) quinquestriatum Gyll. und seiner Rassen. 97-98