Mitteilungen über die Käfer Ostfalens.

Von Dr. Walter Borchert, Schönebeck a. d. Elbe.

(Fortsetzung und Schluß.)

L. brunnea Str. ist als *pallens* Str., *picea* Ill. und *rubiginosa* Schmidt in SW. Braunschweig nach H, siehe A B.

L. pallens Str. in SW ist *badia* Str. und *brunnea* Str.

L. rotundata Er. in SW ist *Triepkei* Schmidt.

L. scita Er. in SW ist *calcarata* Er. und *ovalis* Schmidt.

L. rugosa Steph. in SW ist richtig. Siehe A B.

Agaricophagus cephalotes Schmidt. 2 Stck. als *Hydnobius punctatus* Str., 1 Stck. als *strigosus* Schmidt in SW.

Cyrtusa latipes Er. in SW ist *minuta* Ahr.

Amphicyllis globiformis Sahlb. 1 Stck. Elm 5. 32. B.

Agathidium haemorrhoum Er. 1 Stck. Frohser Berge 9. 35. B.

A. sphaerula Rtt. Siehe A B; auch 1 Stck. Oderbrück an einem Baumstumpf 6. 35. B.

A. piceum Er. in SW ist *Amphicyllis globus* F. Aber: 1 Stck. Salchau gesiebt 11. 35. B.

Calyptomerus alpestris Redtb. 1 Stck. Elend 7. 20 in S Manzek.

C. dubius Mrsh. in SW ist *Clambus pubescens* Redtb.

Clambus minutus Str. in SW ist *punctulum* Beck. Aber: Braunschweig nach H, 1 Stck. Altenau gestreift 7. 33. B.

C. punctulum Beck in SW ist richtig; auch als *minutus* Str. und *Cybocephalus politus* Germ. in SW. Je 1 Stck. Grünewalde 4. 33, Schönebeck 5. 23 und Borne 7. 29. B.

Sacium pusillum Gyll. in SW ist eine nicht zu bestimmende *Acrotrichis*-Art.

Orthoperus punctatus Wank. in SW ist *brunnipes* Gyll.

O. brunnipes Gyll. in SW ist *atomus* Gyll.; aber: als *Klucki* Wank., *punctatus* Wank. und *Sphaerius acaroides* Waltl. in SW. Braunschweig nach H.

O. atomus Gyll. ist als *anxius* Rey, *brunnipes* Gyll., *coriaceus* Rey und *Sphaerius acaroides* Waltl. in SW. Elbenau mehrfach, 1 Stck. Magdeburgerforth. B.

O. coriaceus Rey in SW ist *atomus* Gyll.

Sphaerius acaroides Walk. in SW ist *Orthoperus atomus* Gyll. und *brunnipes* Gyll.

Ptenidium laevigatum Er. Wenn *punctulum* Steph. = *laevigatum* Gyll. hierhergehört, so ist es falsch: *nitidum* Heer und *pusillum* Gyll. Aber: Braunschweig und Elm beim Maulwurf nach H.

P. longicorne Fuß in SW ist *fuscicorne* Er.

P. punctatum Gyll. in SW ist *Ptiliolum fuscum* Er.

P. nitidum Heer. 1 Stck. als *punctulum* Steph. in SW. Auch: um Braunschweig nach H.

Millidium minutissimum Weber in SW ist *Ptilium exaratum* All.

Ptilium affine Er. Braunschweig an Waldsümpfen nach H.

P. exaratum All. 1 Stck. als *Millidium minutissimum* Weber in SW.

Ptiliolum fuscum Er. 1 Stck. als *Ptenidium punctatum* Gyll. in SW.

Euryptilium saxonicum Gillm. in SW ist *Ptiliolum Kunzei* Heer.

Ptinella testacea Heer. Möser. U.
Nephanes Titan Newm. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. Borne aus Kompost 8. 22. B.
Acrotrichis Montandoni All. in SW ist *sericans* Heer. Aber: Brockenkuppe und Querum nach H., Grünewalde und Borne. B.
A. Chevrolati All. in SW ist *brevipennis* Er.
Platysoma deplanatum Gyll. in SW ist *compressum* Hbst.
P. angustatum Hoffm. Querum selten unter Kiefernrinde nach H.
Hister quadrimaculatus L. in SW ist richtig. Braunschweig nach H, 1 Stck. gegenüber von Arneburg 5. 28. B.
H. striola Sahlb. in SW ist richtig.
H. helluo Truqui in SW ist *bissexstriatus* F. Aber: Alte Fähre an Erlen. U.
H. ruficornis Grimm. in SW ist *purpurascens* Hbst.
H. ignobilis Mars. in SW ist *neglectus* Germ.
H. corvinus Germ. 1 Stck. Sülldorf 8. 20 in S Manzek.
Saprinus lautus Er. in SW ist richtig. Auch: 1 Stck. Schönebeck 6. 27. B.
S. politus Brahm. Quedlinburg 7. 19 nach Kühlhorn.
S. immundus Gyll. ist nicht in SW.
S. specularis Mars. ist vom Harz in SW.
S. quadristriatus Hoffm. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. Biederitz 1899 in S Pohl.
S. rugifrons Payk. ist nicht in SW. Aber: Grünewalde mehrfach am Elbufer. U und B.
Teretrius picipes F. ist nicht in SW.
Plegaderus saucius Er. Braunschweig nach H, Calvörde nach Gerhard, 1 Stck. Gommern 10. 27. B.
Abraeus globulus Creutz ist nicht in SW.
Acritus homoeopathicus Woll. ist nicht von W angegeben, trotz Reitter.
Trox Eversmanni Kryn. Magdeburg durch Hahn in SW.
Aphodius lugens Creutz. in SW ist *sordidus* F. Aber: Magdeburg 1895 und 9. 16 in S Pohl.
A. immundus Creutz. in SW ist *sordidus* F. Aber: 1 Stck. durch Hahn von Magdeburg in SW; von dort auch in S Pohl.
A. nemoralis Er. in SW ist *Heptaulacus villosus* Gyll. Aber: 1 Stck. Brockenkuppe 8. 21 in S Manzek, Eckertal und Helmstedt nach H.
A. borealis Gyll. 1 Stck. Magdeburg 6. 07 in S Pohl.
A. corvinus Er. Elend 8. 20 in S Manzek.
A. varians Dft. in SW von Magdeburg ist richtig; von dort auch als *niger* Panz. in SW. Querum und Waggum nach H, 1 Stck. Biederitz 5. 27 in S Pohl.
A. plagiatus L. in SW von Weferlingen ist *niger* Panz. von Magdeburg ist richtig. Querum nach H, Schönebeck U.
A. niger Panz. in SW von Magdeburg ist *varians* Dft.; aber: als *plagiatus* L. von Weferlingen in SW. Querum nach H.
A. scrofa F. ist nicht in SW. Aber: Magdeburg mehrfach in S Pohl.
A. quadriguttatus Hbst. in SW ist richtig.
A. biguttatus Germ. ist nicht in SW. Aber: siehe A B.

A. conspurcatus L. in SW ist *inquinatus* F. und *melanostictus* Schmidt.
A. affinis Panz. in SW ist *obliteratus* Panz.
A. serotinus Panz. in SW ist *punctatosulcatus* Str.
A. maculatus Str. in SW ist richtig. Auch vom Harz in SW und von Elend in Anzahl 8. 20 in S Manzek.
A. Zenkeri Germ. in SW ist richtig. Auch vom Harz in SW.
A. satellitius Hbst. ist nicht in SW. Aber: je 1 Stck. Biederitz 5. 03 und Magdeburg 5. 16 in S Pohl.
Heptaulacus villosus Gyll. 1 Stck. Helmstedt als *Aphodius nemoralis* Er. in SW. Vienenburg nach H.
H. sus Hbst. ist nicht in SW. Aber: Brocken nach H, Schönebeck im Zimmer in S Manzek.
Geotrupes alpinus Hagenb. in SW ist *vernalis* L.
Sisyphus Schäfferi L. ist nicht in SW.
Oniticellus fulvus Goeze in SW ist richtig.
Onthophagus verticicornis Laich. ist nicht in SW. Aber: Querum und Asse nach H, Magdeburg in S Pohl, Alte Fähre 7. 23 in S Manzek.
O. vacca L. in SW ist richtig. Frellstedt, Biederitz und Magdeburg in S Pohl, Schönebeck, Frohser Berge und Sülldorf. B.
Rhizotrogus aestivus Ol. in SW ist richtig. Westeregeln in S Manzek.
Amphimallus ater F. in SW ist *solstitialis* L. v. *ochraceus* Knoch.
A. ruficornis F. ist nicht in SW.
Gnorimus variabilis L. ist nicht in SW. Aber: Querum nach H.
Helophorus affinis Mrsh. ist nicht in SW.
Ochthebius gibbosus Germ. ist nicht in SW.
O. bicolon Germ. in SW von Sülldorf ist *auriculatus* Rey. Aber: Braunschweig nach H, Schönebeck U, Sülldorf 4. 35. B.
O. auriculatus Rey ist als *bicolon* Germ. von Sülldorf in SW.
Hydraena testacea Curt. 1 Stck. im Umflutkanal 8. 27. B.
H. angulosa Muls. ist von Sülldorf trotz Schilsky nicht nachzuweisen.
H. pulchella Germ. ist nicht in SW.
Hydrophilus flavipes Stev. 1 Stck. Biederitz 6. 27 in S Pohl.
Paracymus aeneus Germ. in SW von Sülldorf ist richtig. Auch von U und B dort gefangen.
Laccobius sinuatus Motsch. ist nicht in SW.
Limnebius nitidus Mrsh. in SW ist *crinifer* Rey. Aber: Braunschweig nach H.
Cercyon bifenestratus Küst. 4 Stck. im Umflutkanal 5. 29. B.
C. lateralis Mrsh. in SW ist *quisquilius* L. und *unipunctatus* L. Aber: Braunschweig nach H, zweimal Borne im Garten. B.
C. granarius Er. in SW ist *tristis* Ill. Aber: 1 Stck. Grünewalde 11. 30. U.
Ostoma ferrugineum L. 2 Stck. Möser 6. 94 und 1 Magdeburg 6. 12 in S Pohl.
Cybocephalus politus Germ. in SW ist *Clambus punctulum* Beck. Aber: 1 Stck. Elbenau 6. 32. B.
Meligethes brevis Str. in SW ist *viduatus* Str.; aber: 1 Stck. als *subrugosus* Gyll. in SW.
M. atramentarius Först. in SW ist *haemorrhoidalis* Först.
M. subaeneus Str. in SW ist *aeneus* F. und *coeruleovirens* Först. Aber: 1 Stck. Braunlage 7. 28. B.

M. corvinus Er. in SW ist *lumbaris* Str.
M. subrugosus Gyll. in SW ist *brevis* Str.
M. serripes Gyll. in SW ist *solidus* Str.
M. bidens Bris. Je 1 Stck. Schönebeck 5. 28 U und Mühlinger Berge 7. 31. B.
M. incanus Str. ist nicht in SW.
M. ovatus Str. in SW ist *picipes* Str.
M. fuliginosus Er. 1 Stck. Biederitzer Busch 8. 13 in S Feuerst.
M. haemorrhoidalis Först. 1 Stck. als *atramentarius* Först. in SW. Je 1 Stck. Magdeburg 6. 09 in S Manzek und Schönebeck 5. 28. U.
M. morosus Er. 1 Stck. ohne Namen in SW.
M. assimilis Str. in SW ist *lumbaris* Str. und *rufipes* Gyll. Aber: 1 Stck. Staßfurt 5. 20 U und 4 Kamern 5. 28 B.
M. lepidii Mill. in SW ist *pedicularius* Gyll.
M. egenus Er. in SW ist richtig.
M. fumatus Er. in SW ist *erythoprus* Gyll.
Omosita depressa L. ist nicht in SW. Aber: Braunschweig verbreitet nach H.
Epuraea silacea Hbst. in SW von Sülldorf ist richtig; mehrere Stücke sind vorhanden. Brocken nach H.
E. deleta Er. in SW ist *florea* Er. Aber: Querum einmal nach H, Neundorf U, Schönebeck U und B.
E. variegata Hbst. in SW ist *depressa* Gyll. Aber: Asse und Elm nach H.
E. rufomarginata Steph. in SW ist *obsoleta* F. und *pusilla* Ill.
E. terminalis Mnnh. ist nicht in SW. Aber: Eisfelder Talmühle (Harz) durch Petry in S B.
E. pygmaea Gyll. in SW ist *obsoleta* F.; aber: vom Harz in SW. Dort auch nach Petry, H und B. Ferner: Querum nach H.
Rhizophagus cribratus Gyll. in SW ist *parallelocollis* Gyll.
Silvanoprus fagi Guer. in SW ist *Silvanus unidentatus* F.
Phloeostichus denticollis Redtb. 1 Stck. Thale an einer Buche 1912 in S Pohl.
Pediacus dermestoides F. ist von Magdeburg durch Hahn in SW.
Laemophloeus Kraussi Gnglb. 1 Stck. Biederitz an Birkensaft 6. 03 in S Pohl.
L. duplicatus Waltl. in SW ist richtig; auch als *minutus* Ol. in SW. Elbenau mehrfach und Letzlingen mehrere. B.
L. corticinus Er. ist nicht in SW.
L. ater Ol. a. *capensis* Waltl. 3 Stck. Grünewalde unter Hainbuchenrinde 11. 29. B.
L. minutus Ol. in SW ist *duplicatus* Waltl.
L. ferrugineus Steph. Je 1 Stck. Schönebeck im Haus 9. 31 und Frohser Berge 1. 27. B.
L. alternans Er. in SW ist richtig. Lappwald nach Gerhard, Querum nach H.
Prostomis mandibularis F. Querum einmal nach H, Lappwald 1906 unter Eichenrinde nach Gerhard, je 1 Stck. Elend 8. 05 und 6. 13 in S Pohl.

Telmatophilus sparganii Ahr. in SW ist richtig. Elbenau 5. 20. U.
Henoticus serratus Gyll. in SW ist *Cryptophagus scanicus* L.
Cryptophagus vini Panz. in SW ist *abietis* Payk. und *pubescens* Str. Aber: Elend und Altenau. B.
C. bimaculatus Panz. Je 1 Stck. gesiebt: Elbenau 3.23, Grünewalde 10.23 und Schönebeck 12. 35. B.
C. populi Payk. in SW ist *fumatus* Mrsh. Aber: Querum nach H.
C. distinguendeus Str. in SW ist *pallidus* Str. Aber: Braunschweig nach H, 1 Stck. Borne in der Scheune 7. 29. B.
C. fuscicornis Str. in SW von Weferlingen ist richtig.
C. pallidus Str. ist als *distinguendus* Str. von Weferlingen, als *fuscicornis* Str. vom Harz in SW. Braunschweig nach H, Arneburg, Schönebeck und Borne. B.
C. subfumatus Kr. in SW ist *pilosus* Gyll. Aber: Braunschweig nach H, Schönebeck zweimal im Haus. B, Quedlinburg nach Kühlhorn.
C. Thomsoni Rtt. in SW ist *scanicus* L. a. *patruelis* Str.
C. validus Kr. in SW ist *cellaris* Scop. Aber: Querum nach H.
C. subdepressus Gyll. in SW ist *punctipennis* Bris.
Atomaria fimetarii Hbst. in SW ist *fuscicollis* Mrsh. und *linearis* Steph. Aber: Braunschweig ziemlich häufig nach H.
A. umbrina Gyll. in SW ist *nigriventris* Steph.; aber: 1 Stck. als *fuscicollis* Mrsh. in SW.
A. diluta Er. ist vom Harz in SW.
A. procerula Er. 1 Stck. als *Paramecosoma melanocephalum* Hbst. in SW.
A. prolixa Er. ist von Braunschweig als *impressa* Er. in SW.
A. impressa Er. in SW ist *prolixa* Er.
A. Zetterstedti Zett. in SW ist richtig.
A. turgida Er. in SW ist richtig.
Ephistemus globosus Waltl. in SW ist *globulus* Payk.
E. exiguus Er. in SW ist *globulus* Payk.
Diphyllus fagi Guer. in SW ist richtig. 2 Stck. Thale 5. 25 in S Pohl.
Dacne notata Gmel. ist nicht in SW.
Phalacrus substriatus Gyll. in SW ist *Olibrus affinis* Str.
Olibrus flavicornis Str. in SW ist richtig; auch als *liquidus* Er. in SW.
O. liquidus Er. in SW ist *flavicornis* Str.
Lathridius alternans Mnnh. in SW ist *angusticollis* Gyll.
Enicmus consimilis Mnnh. in SW ist *minutus* L.
E. brevicornis Mnnh. ist als *rugosus* Hbst. in SW.
Corticaria fulva Com. ist nicht in SW; aber: von Weferlingen und Sülldorf als *elongata* Gyll. in SW, Braunschweig nach H, Magdeburg. U.
C. crenulata Gyll. in SW ist *pubescens* Gyll.
C. obscura Bris. ist als *linearis* Payk. in SW.
C. umbilicata Beck. ist als *bella* Redtb. und *serrata* Payk. in SW. Schönebeck mehrfach. U und B, Könnern. B.
C. abietum Motsch. Je 1 Stck. Magdeburg U und Elend 7. 20 in S Manzek.
C. linearis Payk. in SW ist *obscura* Bris. Aber: Waggum in einem Stall nach H.

C. bella Redtb. in SW ist *umbilicata* Beck.
C. saginata Mnnh. in SW ist *impressa* Ol. und *serrata* Payk.
C. similata Gyll. in SW ist *fuscula* Gyll. und *Melanophthalma transversalis* Gyll.
Corticarina truncatella Mnnh. in SW ist *fuscula* Gyll. Aber: Schönebeck. U und B.
Melanophthalma distinguenda Com. in SW ist *transversalis* Gyll.
Mycetophagus quadriguttatus Müll. Schönebeck 5. 10. U.
Lyctus pubescens Panz. ist nicht in SW.
Cis elongatulus Gyll. in SW ist *hispidus* Gyll.
C. nitidus Hbst. ist nicht in SW. Aber: Braunschweig häufig nach H.
C. Jacquemarti Mell. in SW ist *alni* Gyll. Aber: Gommern 7. 23 und Schollene 5. 28. B.
C. quadridens Mell. ist nicht in SW.
C. alni Gyll. in SW ist richtig; auch als *Jacquemarti* Mell. in SW. Hakel 5. 35. B.
C. bidentatus Ol. in SW ist *boleti* Scop. und *micans* F.
C. festivus Gyll. in SW ist *castaneus* Mell.; aber: 1 Stck. von Magdeburg in SW.
C. oblongus Mell. ist von Magdeburg als *alni* Gyll., vom Drömling als *bidentulus* Rosh. in SW. Dessau 5. 21. U, Elm 5. 32. B.
C. castaneus Mell. in SW ist *Ennearthron affine* Gyll.; aber: in SW von Magdeburg, von Sülldorf durch Hahn, von Weferlingen als *festivus* Gyll.
C. bidentulus Gyll. in SW ist *castaneus* Mell. und *oblongus* Mell.
Rhopalodontus perforatus Gyll. in SW ist z. T. richtig. Braunschweig nach H, Schönebeck. U, Gommern. B.
Pycnomerus terebrans Ol. ist nicht in SW.
Orthocerus crassicornis Er. An der gleichen Stelle, die A B meldet, streifte ich ein zweites Stück am 15. 7. 35; dann fand ich mit Herrn Rektor Manzek zusammen 25 Stck. auf dem Kiesboden kriechend auf einer Fläche von 2-3 qm am 12. 9., 15 Stck. ebenso am 16. 9. und 6 Stck. ebenso mit Herrn Dr. Ihssen am 23. 9., darunter eine Begattung. Ich hatte den Eindruck, die Tiere kämen aus dem Kies hervor; ein Zusammenhang mit den reichlich vorhandenen Flechten ließ sich nicht nachweisen, im Gegenteil liefen die Käfer meistens auf davon freien Stellen. Am ersten Tag müssen Tausende auf den Kuppen vorhanden gewesen sein. Die ganze Beobachtung belegt wundervoll den Satz, daß es „seltene" Tiere nicht gibt; dabei weise ich auch auf *Sibinia variata* in A B hin.
Synchita mediolanensis Villa ist nicht in SW.
Cicones variegatus Hellw. in SW ist richtig.
Colobicus marginatus Latr. in SW ist richtig.
Colydium elongatum F. in SW ist *filiforme* F. Aber: 2 Stck. in einer Magdeburgischen Fabrik 6. 17 und 1 Biederitz 1889 in S Pohl.
Cerylon impressum Er. in SW ist *histeroides* F. Aber: Querum nach H, 2 Stck. Möser 7. 11 in S Pohl.

C. deplanatum Gyll. ist nicht in SW. Aber: Querum häufig nach H, 1 Stck. Eisleben durch Feige in S B. Dieser Fundort fehlt bei Rapp.

Sphaerosoma pilosum Panz. ist nicht so, aber als *piliferum* Müll. in SW.

S. piliferum Müll. in SW ist *pilosum* Panz.

Scymnus ferrugatus Moll. in SW ist *haemorrhoidalis* Hbst. Aber: Magdeburg und Biederitz in S Pohl, Schönebeck mehrfach. U.

S. rufipes F. Siehe A B; 1 Stck. Schönebeck 6. 23 in S U.

S. quadrimaculatus Hbst. in SW ist richtig.

S. Apetzi Muls. in SW ist *frontalis* F.

Novius cruentatus Muls. ist nicht in SW. Aber: Querum nach H, Magdeburg 9. 09 in S Pohl, siehe A B.

Brumus oblongus Weidenb. in SW ist *Exochomus quadripustulatus* L.

Semiadalia notata Laich. ist vom Harz in SW. Von dort auch: Stolberg durch Feige in S B, Alexisbad und Elend in S Pohl.

Halyzia 12-guttata Poda in SW ist richtig. 1 Stck. Frellstedt 1899 in S Pohl.

H. 10-guttata L. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. Schönebeck im Haus U, Ilsenburg in S Pohl.

Dermestes atomarius Er. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. Schönebeck gesiebt 11. 35. B.

D. Erichsoni Gnglb. ist nicht in SW.

D. mustelinus Er. ist nicht in SW.

Attagenus Schäfferi Hbst. in SW ist *piceus* Ol.

A. pantherinus Ahr. in SW ist *Trogoderma nigrum* Hbst.

Globicornis marginata Payk. in SW von Letzlingen und z. T. von Weferlingen ist richtig.

G. nigripes F. Je 1 Stck. Ranies 5. 33 und Grünewalde 6. 33. B.

Trogoderma versicolor Creutz. Je 1 Stck. an den Kleidern meiner Begleiter Elbenau und Gommern 7. 30. B.

T. nigrum Hbst. 1 Stck. von Sülldorf als *Attagenus pantherinus* Ahr. in SW. 1 Stck. Grünewalde an U's Kragen 7. 33. B.

Limnichus sericeus Dft. 1 Stck. Erkerode/Elm in schnell fließendem Bach 5. 32. B.

Simplocaria acuminata Er. ist nicht in SW.

Byrrhus arietinus Steff. Querum und Leiferde nach H, Braunlage, Altenau und Elm. B.

B. luniger Germ. ist nicht in SW.

Syncalypta spinosa Rossi. Von Magdeburg durch Hahn in SW. Braunschweig nach H.

S. setigera Ill. ist nicht in SW. Aber: um Braunschweig mehrfach nach H.

Dryops lutulentus Er. in SW ist *auriculatus* Geoffr.; aber: vom Harz in SW.

D. rufipes Kryn. in SW vom Harz ist richtig.

D. griseus Er. in SW ist *auriculatus* Geoffr.

D. luridus Er. in SW ist *auriculatus* Geoffr.

Esolus parallelepipedus Müll. ist von Braunschweig und vom Harz in SW. Siehe A B.

Helmis obscura Müll. 1 Stck. Schönebeck 5. 09. U.
Buprestis novemmaculata L. 1 Stck. Möser 7. 10 in S Pohl.
Anthaxia grammica Lap. in SW ist richtig.
Coraebus rubi L. nennt W nur von Berlin, trotz Schilsky. Aber: 1 Stck. Biederitz 6. 01 in S Pohl.
Agrilus sexguttatus Brahm. 1 Stck. Biederitz 6. 90 in S Pohl.
A. auricollis Kiesw. in SW ist *viridis* L.
A. betuleti Ratz. in SW ist *angustulus* Ill. Aber: 1 Stck. Glinde 6. 26 in S Manzek.
A. obscuricollis Kiesw. in SW ist richtig; auch von Magdeburg als *hyperici* Creutz. in SW. Siehe A B, aber 7. 32 steckte mit dem Zettel *convexicollis* Redtb. versehentlich unter *obscuricollis* Kiesw.; 1 Stck. Schönebeck 7. 13 in S Manzek.
A. convexicollis Redtb. in SW ist *olivicolor* Kiesw. Aber: siehe A B.
A. sinuatus Ol. ist nicht in S Pohl.
A. graminis Lap. in SW ist *angustulus* Ill.; aber: als *convexifrons* Kiesw. und *derasofasciatus* Lac. in SW. Siehe A B.
A. derasofasciatus Lac. in SW ist meistens *graminis* Lap., nur 1 Stck. ist richtig.
A. hastulifer Ratz. in SW ist *laticornis* Ill.
A. hyperici Creutz. in SW ist *obscuricollis* Kiesw. und *viridis* L. Aber: 1 Stck. Rogätz 6. 94 in S Pohl.
A. convexifrons Kiesw. in SW ist *graminis* Lap.
Trachys pygmaea F. in SW ist *minuta* L. Aber: 2 Stck. Helmstedt 6. 96 und 1 Stck. Frellstedt 1899 in S Pohl.
T. problematica Obenb. Mehrere Könnern an *Stachys recta* 5. 30, 5. 34 und 6. 35. B. Hierher wohl sicher *pumila* Ill. in A Daehne.
T. pumila Ill. in A Daehne ist wohl sicher *problematica* Obenb.
T. fragariae Bris. ist als *Habroloma nana* Hbst. in SW. Schönebeck in S Manzek, Grünewalde in S Pohl, Unseburg. B.
Habroloma nana Hbst. in SW ist *Trachys fragariae* Bris. Daehnes Angaben sind fraglich, denn Pohls Tiere von Grünewalde sind *Trachys fragariae* Bris. Aber: 2 Stck. Quedlinburg 6. 28 in S Manzek.
Aphanisticus pusillus Ol. in SW ist richtig.
Trixagus brevicollis Bonv. in SW ist *dermestoides* L.
T. elateroides Heer in SW ist *carinifrons* Bonv. und *dermestoides* L.
T. exul Bonv. Mehrere als *obtusus* Curt. in SW. Schönebeck je einmal. U und B.
Selatosomus incanus Gyll. in SW ist *Agriotes gallicus* Lac. Aber: im Harz verbreitet. Braunschweig nach H.
S. melancholicus F. 1 Stck. Elend 6. 21 in S Pohl.
Adrastus limbatus F. in SW ist *axillaris* Er. Nicht in S Feuerst., womit dessen Angabe hinfällig wird.
A. axillaris Er. ist als *limbatus* F. und *pallens* F. in SW.
A. lacertosus Er. in SW ist *rachifer* Geoffr.

A. pallens F. in SW ist *axillaris* Er. und *rachifer* Geoffr. Aber: siehe A Feuerst., Braunschweig nach H, Borne und Schönebeck. B.
A. montanus Scop. ist nicht in SW.
Pheletes lythrodes Germ. in SW ist *Limonius minutus* L.
Athous austriacus Desbr. in SW ist *longicollis* Ol.
Melanotus crassicollis Er. in SW ist *Athous haemorrhoidalis* F. Aber: Braunschweig verbreitet nach H.
Cardiophorus rufipes Geoffr. in SW ist *Erichsoni* Buyss.
C. equiseti Hbst. ist nicht in SW. In S Feuerst. steckt als diese Art *cinereus* Hbst. Aber: Braunschweig mehrfach nach H, Biederitz in S Pohl, Gommern. B.
C. rubripes Germ. ist nicht in SW und S Feuerst.
Paracardiophorus musculus Er. 2 Stck. Thale 5. 24 in S Pohl.
Betarmon ferrugineus Scop. ist nicht in SW und S Feuerst. Aber: je 1 Stck. Thale 7. 89 und 6. 90 in S Pohl.
Porthmidius austriacus Schrnk. von der Roßtrappe in SW ist richtig, von Braunschweig nicht in SW. Thale 7. 99 und Regenstein 6. 00 in S Pohl.
Anchastus acuticornis Germ. in SW ist richtig.
Elater pomonae Steph. 1 Stck. als *praeustus* F. in SW. Auch sonst im Gebiet verbreitet.
E. elegantulus Schönh. in der A Feuerst. ist wohl falsch.
E. Megerlei Lac. in SW ist *Agriotes gallicus* Lac. Nicht in S Feuerst.
Microcara Bohemanni Mnnh. in SW ist *testacea* L.
Hydrocyphon deflexicollis Müll. in SW ist *Scirtes hemisphaericus* L. Vom Harz in SW.
Homalisus fontisbellaquei Geoffr. 1 Stck. Biederitz 7. 14 in S Pohl.
Cantharis longicollis Kiesw. in SW ist *violacea* Payk.
C. pulicaria F. in SW ist *obscura* L. Aber: 1 Stck. Grünewalde 5. 34. B.
C. Erichsoni Bach ist im Harz verbreitet nach SW, Pohl und B.
C. sudetica Letzn. in SW ist *discoidea* Ahr.
Malthinus fasciatus Ol. in SW ist *facialis* Thoms.
M. facialis Thoms. ist als *fasciatus* Ol. in SW.
Malthodes trifurcatus Kiesw. in SW ist richtig.
M. guttifer Kiesw. in SW ist *dispar* Germ.
M. dispar Germ. ist als *guttifer* Kiesw. in SW. 4 Stck. Schönebeck 7. 30. B.
M. fibulatus Kiesw. in SW ist *fuscus* Waltl. und *marginatus* Latr.
M. crassicornis Mäkl. in SW ist richtig.
Charopus concolor F. Magdeburg. U und Pohl. Um Schönebeck mehrfach. U und B.
Ch. pallipes Ol. in SW ist *Ebaeus appendiculatus* Er.
Ebaeus ater Kiesw. in SW ist *Hypebaeus flavipes* F.
E. appendiculatus Er. 1 Stck. als *Charopus pallipes* Ol. in SW.
Malachius rufus Ol. ist nicht in SW.
M. aeneus L. hat sich seit Jahrzehnten nicht finden lassen.

M. elegans Ol. in SW ist *spinosus* Er.

Danacaea pallipes Panz. in SW ist *nigritarsis* Küst. Aber: Thale 6. 93 in S Pohl.

D. nigritarsis Küst. ist von Magdeburg als *pallipes* Panz. in SW. Braunschweig nach H, siehe A B.

Dasytes aerosus Kiesw. Um Schönebeck mehrfach. U, Jävenitz und Magdeburgerforth. B.

Opilo pallidus Ol. 1 Stck. Mahlwinkel 7. 29. U. Siehe A B.

Allonyx quadrimaculatus Schall. in SW ist richtig. Biederitz zweimal in S Pohl.

Orthopleura sanguinicollis F. ist nicht in SW.

Corynetes coeruleus Deg. Borne und Schönebeck. U und B.

C. meridionalis Obenb. Diesdorf (Altmark). B, Magdeburg. U.

Lichenophanus varius Ill. in SW ist richtig.

Dryophilus rugicollis Muls. ist nicht in SW.

Gastrallus immarginatus Müll. in SW ist richtig; auch als *laevigatus* Ol. in SW.

G. laevigatus Ol. in SW ist *immarginatus* Müll.

Ernobius Kiesenwetteri Schils. in SW ist *abietinus* Gyll. und *densicornis* Muls.

E. densicornis Muls. 1 Stck. als *Kiesenwetteri* Schils. in SW. Siehe A B.

E. tabidus Kiesw. Je 1 Stck. Roßtrappe 7. 23 nach Kühlhorn und Friedrichsbrunn 6. 35. B.

E. parvicollis Muls. 1 Stck. Diebzig 6. 31 in S Manzek.

E. abietinus Gyll. ist in einem Stück als *Kiesenwetteri* Schils. in SW.

E. pini Str. Viktorshöhe (Harz) 7. 20 nach Kühlhorn, Gommern 6. 32. B.

Ochina ptinoides Mrsh. Magdeburg in SW und S Pohl; siehe A B.

Mesocoelopus niger Müll. Magdeburg in SW, S Pohl und S U, Wiesenburg B und Quedlinburg nach Kühlhorn. „All" bei Schilsky steht irrtümlich.

Dorcatoma flavicornis F. in SW ist *chrysomelina* Str. und *serra* Panz.

D. dresdensis Hbst. ist nicht in SW. Aber: Querum nach H.

D. serra Panz. 1 Stck. als *chrysomelina* Str., 2 als *flavicornis* F. in SW.

Caenocara subglobosa Muls. 1 Stck. Elend 8. 20 in S Pohl.

C. affinis Str. in SW ist richtig.

Ptinus bicinctus Str. 1 Stck. als *subpilosus* Str. in SW.

P. latro F. in SW ist *fur* L. Aber: 1 Stck. Borne. B.

P. brunneus Dft. in SW ist *fur* L. und *pilosus* Müll. Aber: 1 Stck. Schönebeck in Zuckerwaren 1. 24. B.

P. variegatus Rossi ist nicht in SW.

P. raptor Str. Nur 1 Stck. in SW ist richtig.

P. nitidus Dft. in SW ist *pilosus* Müll.

Pentaphyllus testaceus Hellw. ist nicht in SW.

Hypophloeus fraxini Kug. ist nicht in SW; aber: Weferlingen und Letzlinger Heide als *pini* Panz. in SW.

H. pini Panz. in SW ist *fraxini* Kug.

Tribolium madens Charp. Je 1 Stck. Magdeburg 12. 16 und Biederitz 10. 23 in S Pohl.

Melasia culinaris L. in SW ist richtig.

Tenebrio opacus Dft. in SW ist *molitor* L.

T. picipes Hbst. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. in einer Magdeburgischen Fabrik 1893 in S Pohl.

Helops laevioctostriatus Goeze ist nicht in SW. Aber: in Heidegebieten nördlich von Braunschweig verbreitet nach H.

Pseudocistela ceramboides L. ist nicht in SW.

Isomira semiflava Küst. Gommern im Kiefernwald schwarz und mit braunen Decken 6. 24. B.

Mycetochara flavipes F. in SW ist *axillaris* Payk. Aber: je 1 Stck. Magdeburg 6. 98 in S Pohl und Quedlinburg. B.

Omophlus rufitarsis Leske in SW ist *lividipes* Muls. Aber: Magdeburg. U, Rogätz, Barleben und Ilsenburg in S Pohl.

O. lividipes Muls. Letzlinger Heide als *rufitarsis* Leske in SW.

Anisoxya fuscula Ill. in SW ist *Abdera affinis* Payk.

Abdera quadrifasciata Curt. Möser dreimal in S Pohl.

Stenalia testacea F. in SW ist *Mordellistena Neuwaldeggiana* Panz.

Mordellistena humeralis L. ist häufiger und viel verbreiteter, als es nach W scheint.

Anaspis pulicaria Costa. Braunschweig nach H, Könnern. U, Rühen, Elm und Frohser Berge. B.

A. ruficollis F. in SW ist *thoracica* L.

A. varians Muls. Viele Borne in einem Steinbruch 6. 30. B.

A. brunnipes Muls. ist als *rufilabris* Gyll. in SW. Braunschweig nach H, um Schönebeck mehrfach. U und B.

Meloe rugosus Mrsh. in SW ist richtig. Magdeburg mehrfach in S Pohl und U.

Hylophilus populneus Panz. in SW ist *pygmaeus* Deg. Aber: Elbenau mehrfach. B.

H. nigrinus Germ. in SW ist richtig. Das Tier habe ich im Gebiet sehr verbreitet gefangen.

Notoxus brachycerus Fald. 1 Stck. Ilsenburg in S Pohl.

Anthicus sellatus Panz. Je 1 Stck. Biederitz 6. 02 und Ilsenburg 7. 15 in S Pohl.

A. nectarinus Panz. Noch vom 5. 17 ist 1 Stck. von Magdeburg in S Pohl.

Nacerda melanura L. habe ich mehrfach auf der Straße bei der Schönebecker Saline gefunden, wohin das Tier offenbar aus dem salzgetränkten Holz geraten ist.

Anoncodes adusta Panz. Magdeburg zweimal in S Pohl.

A. ustulata F. Magdeburg zweimal und Barleben in S Pohl.

Oedemera flavipes F. ist nicht in SW. Aber: Braunschweig nach H.

Lissodema cursor Gyll. Möser in Anzahl 1900 in S Pohl, um Schönebeck zweimal. U, siehe A B.

Sphaeriestes ater Payk. ist nicht in SW.

Rhinosimus aeneus Ol. in SW ist *planirostris* F.

Rh. viridipennis Latr. in SW ist *ruficollis* L.; aber: 1 Stck. Weferlingen als „nov. spec.?" in SW. Thale durch Fehse in S B, Hakel 5. 35. B.

Mycterus curculionides Ill. ist nicht in SW.

Acmaeops pratensis Laich. Je 1 Stck. Ilsenburg 7. 01 und Thale 5. 25 in S Pohl.

Leptura fulva Deg. Die Angabe in A Feuerst. bezieht sich auf *dubia* Scop.

L. dubia Scop. Je 1 Stck. Helmstedt 6. 96 und Biederitz 6. 05 in S Pohl.

Strangalia pubescens F. Siehe A Feuerst. Aber: 1 Stck. Frellstedt 8. 14 in S Pohl.

Necydalis Panzeri Harold in SW ist *major* L. Also auch in A Feuerst. sehr fraglich.

Caenoptera Kiesenwetteri Muls. Biederitz 6. 02 in S Pohl.

Stenopterus rufus L. im Korrespondenzblatt des Ent. Ver. zu Halle von 1886 ist sicher falsch.

S. ater L. in S Pohl ist richtig; 2 Stck.

Purpuricenus Kaehleri L. ist aus dem Gebiet nicht nachzuweisen.

Rosalia alpina L. hat sich seit etwa 1890 nicht wieder finden lassen.

Rhopalopus hungaricus Hbst. ist nicht in S Feuerst. Im Harz anscheinend ziemlich verbreitet, aber sehr selten.

Clytanthus Herbsti Brahm in SW ist richtig.

Monochamus sartor F. ist nicht in SW. Aber: Magdeburg in einer Fabrik und Möser zweimal in S Pohl.

Exocentrus punctipennis Muls. 1 Stck. Biederitz an einem Eichenast 6. 27 in S Pohl.

Pogonochaerus ovatus Goeze ist nicht in SW. Aber: in S Feuerst. ist richtig; Braunschweig und Querum nach H.

Stenostala nigripes F. Die Angaben in A Feuerst. sind äußerst fraglich.

Phytoecia virgula Charp. Je 1 Stck. Ilsenburg 7. 01 und Biederitz 5. 27 in S Pohl.

Ph. nigricornis F. in SW ist *coerulescens* Scop. Nicht in S Pohl, womit die Angaben in A Feuerst. hinfällig werden.

Donacia obscura Gyll. in SW ist *thalassina* Germ. Aber: Schollene 5. 28. B.

D. antiqua Kunze ist nicht in SW.

Plateumaris rustica Kunze. Harzburg in S Manzek. Selkemühle, Elm und Schollene. B.

Lachnaea sexpunctata Scop. vom Unterharz ist nicht in SW, von Braunschweig ist richtig.

Cryptocephalus punctiger Payk. in SW ist richtig; auch als *pallifrons* Gyll. in SW.

C. pallifrons Gyll. 1 Stck. in SW ist richtig, das andere ist *punctiger* Payk.

C. coerulescens Sahlb. Einige als *parvulus* Müll. in SW. Magdeburg, Biederitz und Möser in S Pohl.

C. marginatus F. ist für den Harz nicht sicher nachgewiesen. Aber: je 1 Stck. Biederitz 5. 90 in S Pohl.

C. signatus Laich. Rogätz 6. 94 in S Pohl.
C. octacosmus Bedel ist nicht in SW.
C. saliceti Zebe ist nicht in SW.
C. vittula Suffr. 1 Stck. Könnern 6. 33. B.
C. macellus Suffr. 2 Stck. Weferlingen als *populi* Suffr. in SW.
C. populi Suffr. in SW ist *macellus* Suffr. Aber: Möser in S Pohl, im Umflutkanal mehrfach. B.
Pachybrachys tesselatus Ol. in SW ist *hieroglyphicus* Laich. Aber: siehe A B.
Timarcha metallica Laich. 1 Stck. Weferlingen als *gibba* Hoppe in SW. Im Oberharz verbreitet.
T. gibba Hoppe in SW ist *metallica* Laich.
Chrysomela gypsophilae Küst. Schönebeck mehrfach. U, Magdeburg und Möser in S Feuerst.
Ch. lurida L. Je 1 Stck. Letzlinger Heide und Weferlingen in S Feuerst.
Ch. globosa Panz. ist nicht in SW.
Ch. rufa Dft. 1 Stck. Harzburg 6. 08 in S Manzek.
Ch. asclepiadis Villa in SW ist richtig.
Phytodecta pallida L. in SW ist *olivacea* Forst. Aber: Ilsenburg in S Pohl, Altenau. B.
Phyllodecta atrovirens Corn. in SW ist *laticollis* Suffr. Aber: Grünewalde. U, Rühen. B.
Galeruca circumdata Dft. in SW ist *pomonae* Scop.
G. laticollis Sahlb. Querum nach H, Elend und Wieda in S Pohl, siehe A B.
Galerucella luteola Müll. 1 Stck. Möser 6. 12 in S Ringelke.
G. grisescens Joann. in SW ist *nymphaeae* L. Aber: Querum nach H, Jävenitz. B.
Luperus pinicola Dft. in SW ist z.T. richtig. Ramstedt in S Ringelke, Elend in S Pohl.
L. viridipennis Germ. in SW ist *flavipes* L.
Minota obesa Waltl. Plessenburg (Harz) 7. 01 in S Pohl.
Mantura ambigua Kutsch. in SW ist *obtusata* Gyll.
Chaetocnema arida Foudr. Gifhorn nach H.
Haltica quercetorum Foudr. ist nicht in SW. Aber: Querum nach H, Ilsenburg in S Pohl, Biederitz in S Pohl und Feuerst., Ramstedt in S Feuerst.
Haltica tamaricis Schrnk. Je 1 Stck. Alte Fähre 5. 15 in S Manzek und Schönebeck 7. 32. B.
H. pusilla Dft. ist nicht in SW. Aber: 2 Stck. Kreuzhorst 8. 10 in S U.
Phyllotreta diademata Foudr. Zweimal um Schönebeck. U und B.
Aphthona flaviceps in SW ist *abdominalis* Dft.
A. abdominalis All. in SW ist *cyparissiae*; aber: Schwanefeld als *flaviceps* in SW.
A. pallida Bach. W erwähnt nur die Stf. von Thüringen, nennt ssp. *nigriceps* Redtb. gar nicht trotz Schilsky.

A. violacea Koch ist nicht in SW.
A. atrovirens Först. in SW ist *euphorbiae* Schrnk. und *venustula* Kutsch.
A. ovata Foudr. in SW ist *euphorbiae* Schrnk. und *venustula* Kutsch.
Longitarsus jacobaeae Waterh. in SW ist *succineus* Foudr. Aber: Biederitz in S Pohl, Pretzien. U, siehe A B.
L. ochroleucus Mrsh. in SW ist *exoletus* L. und *succineus* Foudr. Aber: Schönebeck. U, Frohser Berge und Westeregeln in S Manzek, siehe A B.
L. membranaceus Foudr. in SW ist *exoletus* L. und *succineus* Foudr.
L. nanus Foudr. 6 Stck. Herrenkrug/Magdeburg in S Feuerst.
L. pulmonariae Wse. Hakel 6. 11 in S Manzek, siehe A B.
L. nigrofasciatus Goeze. Ramstedt 10. 28. U, siehe A B.
L. Waterhousei Kutsch. ist als *pellucidus* Foudr. in SW.
L. ballotae Mrsh. in SW ist richtig. Magdeburg. U.
L. lycopi Foudr. Wenn *tantulus* bei W hierhergehört, ist er falsch: *pratensis* Panz. Aber: um Schönebeck mehrfach. U, Manzek und B.
L. curtus All. ist als *minusculus* Foudr. in SW. Schönebeck. U.
L. suturalis Mrsh. in SW ist *atricillus* L. und *luridus* Scop.
L. lateripunctatus in SW ist *atricillus* L.
L. stragulatus Foudr. in SW ist *atricillus* L.
L. minusculus Foudr. in SW ist *curtus* All.
L. apicalis Beck. in SW ist richtig. Elend 7. 20 in S Manzek.
L. obliteratus Rosh. in SW ist *anchusae* Payk.; aber: als *rectelineatus* Foudr. in SW. Sülldorf 1888 in S Pohl.
L. niger Koch in SW ist *luridus* Scop. Aber: Schönebeck 4. 08 und Sülldorf 8. 24. U.
L. rectelineatus Foudr. in SW ist *obliteratus* Rosh.
L. echii Koch ist nicht in SW. Aber: auf trockenen Höhen bei Schönebeck regelmäßig. U, Manzek und B.
Argopus Ahrensi Germ. hat sich seit Jahrzehnten nicht wieder finden lassen.
Apteropeda orbiculata Mrsh. in SW von Weferlingen ist richtig, vom Harz ist *splendida* All.; auch als *splendida* All. in SW.
A. splendida All. in SW ist *orbiculata* Mrsh.; aber: vom Harz als *orbiculata* Mrsh. in SW. Thale und Elend in S Pohl.
Dibolia Schillingi Letzn. in SW ist *Psylliodes cuprea* Koch.
D. femoralis Redtb. 1 Stck. Barleben in S Pohl.
D. Foersteri Bach ist als *cryptocephala* Koch in SW.
D. depressiuscula Letzn. 1 Stck. vom Drömling als paludina Foudr. in SW. Siehe A B.
D. occultans Koch in SW ist richtig; auch vom Drömling als *paludina* Foudr. in SW.
D. paludina Foudr. in SW ist *depressiuscula* Letzn. und *occultans* Koch.
D. cynoglossi Koch in SW ist *Psylliodes hyoscyami* L. Aber: siehe A B.
D. rugulosa Redtb. in SW ist richtig.
D. cryptocephala Koch in SW ist *Foersteri* Bach.
Psylliodes cuprea Koch in SW ist *cupreata* Dft.; aber: 2 Stck. von Weferlingen als *Dibolia Schillingi* Letzn. in SW. 3 Stck. Könnern 6. 33. B.

P. cupreata Dft. Sülldorf und Braunschweig als *cuprea* Koch in SW. Magdeburg und Sohlen. U, Schönebeck in S Manzek.
P. instabilis Foudr. Könnern mehrfach. U und B.
P. luteola Müll. in SW vom Harz ist richtig. Auch: Schönebeck 7. 12 in S Manzek.
Cassida splendidula Suffr. in SW ist *stigmatica* Suffr.
C. canaliculata Laich in SW ist *murraea* L.
C. atrata F. 1 Stck. Ilsenburg auf einem Kleefeld 6. 06 in S Pohl.
C. ferruginea Goeze ist nicht in SW.
C. stigmatica Suffr. in SW ist *denticollis* Suffr. und *sanguinolenta* Müll.; aber: als *splendidula* Suffr. in SW.
C. rufovirens Suffr. in SW ist *denticollis* Suffr.
C. prasina Ill. in SW ist *denticollis* Suffr. Aber: je 1 Stck. Magdeburg in S Feuerst. und Schönebeck 5. 25. B.
Laria affinis Fröl. in SW ist *atomaria* L.
Tropideres undulatus Panz. 1 Stck. Elbenau 7. 13. U.
Otiorrhynchus porcatus Hbst. ist nicht in SW.
O. pinastri Hbst. Je 1 Stck. Elend 8. 06 und 9. 12 in S Pohl.
O. conspersus Germ. 1 Stck. am Huy 5. 01 in S Feuerst.
O. juvencus Gyll. Siehe Ent. Bl. 1928, S. 187.
Peritelus sphaeroides Germ. 1 Stck. Magdeburg an der Elbe 5. 09 in S Pohl.
Mylacus seminulum F. ist nicht in SW.
Rhinomias forticornis Boh. ist nicht in SW. Aber: Elm und Asse nach H.
Phyllobius parvulus Ol. Querum nach H, 1 Stck. Helmstedt 1899 in S Pohl.
Brachysomus setiger Boh. in SW ist *echinatus* Bonsd. und *Foucartia squamulata* Hbst. Aber: um Schönebeck mehrfach. U und B, Randau. U.
Barypithes araneiformis Schrnk. Hillersleben nach Hahn, von Reitter bestimmt. Barleben und Biederitz in S Pohl.
Polydrosus confluens Steph. 1 Stck. Helmstedt als *chrysomela* Ol. in SW.
P. chrysomela Ol. in SW ist *confluens* Steph.
P. pilosus Gredl. Querum nach H, Harz durch Petry in S B, Elm 5. 32. B.
P. coruscus Germ. in SW ist *impressifrons* Gyll.; aber: Magdeburg als *flavipes* Deg. in SW, Helmstedt 6. 12 in S Pohl.
P. flavipes Deg. in SW ist *coruscus* Germ. Aber: 1 Stck. Biederitzer Busch. U.
P. impressifrons Gyll. in SW ist *cervinus* L.; aber: als *coruscus* Germ. in SW. Auch sonst ziemlich verbreitet.
P. picus F. 1 Stck. Thale 1925 in S Pohl.
Scythropus mustela Hbst. ist nicht in SW. Aber: Querum und Asse nach H, Möser 1906 in S Pohl.
Liophloeus Schmidti Boh. in SW ist *tessulatus* Müll. Aber: 1 Stck. Magdeburg 1911 in S Pohl.

Neliocarus retusus Mrsh. in SW ist *Strophosomus rufipes* Steph.

N. lateralis Payk. ist anscheinend in allen Heidegegenden des Gebietes zu finden, wenn auch meistens einzeln.

Sitona gressorius F. habe ich nun auch in der Letzlinger Heide bei Salchau gestreift.

S. lineellus Bonsd. ist nicht in SW. Aber: Schönebeck mehrfach. U und B.

S. Waterhousei Walt. in SW ist *crinitus* Hbst. Aber: 1 Stck. Grünewalde 9. 14 in S U.

S. inops Gyll. in SW ist *flavescens* Mrsh.

Trachyphloeus digitalis Gyll. in SW ist *spinimanus* Germ.

T. Olivieri Bed. Je 1 Stck. Schönebeck 7. 11. U, Frohser Berge 9. 24. U, Borne 5. 31: B.

Tropiphorus tomentosus Mrsh. in SW ist richtig; auch als *globatus* in SW. 1 Stck. Hohes Holz 6. 27. B.

T. globatus Hbst. in SW ist *tomentosus* Mrsh.

Chlorophanus graminicola Gyll. Braunschweig nach H, Helmstedt, Frellstedt und Biederitz in S Pohl.

Coniocleonus nigrosuturatus Goeze. 2 Stck. Biederitz 5. 27 in S Pohl.

C. nebulosus L. ist nicht in SW. Aber: Heiden nördlich von Braunschweig nach H, 1 Stck. Jävenitz 5. 31. B.

Pachycerus varius Hrbst. ist nicht in SW.

Mecaspis alternans Hrbst. 2 Stck. Biederitz 5. 06 in S Pohl.

Lixus sanguineus Rossi. Je 1 Stck. Lostau 1889 und 1905 in S Pohl.

L. cylindricus L. ist nicht nachzuweisen, trotz Schilsky.

L. algirus L. 2 Stck. Frellstedt 5. 99 in S Pohl.

L. elongatus Goeze in SW ist richtig. Rogätz. U, Biederitz in S Pohl, Möser. U, Mühlinger Berge. B.

Larinus sturnus Schall. in SW ist richtig.

L. turbinatus Gyll. in SW ist richtig. Von dort auch in S Pohl.

Hypera intermedia Boh. in SW ist *Phytonomus elongatus* Payk.

H. oxalidis Hrbst. in SW ist *Phytonomus contaminatus* Hrbst. Aber: Querum nach H.

H. comata Boh. 1 Stck. Biederitz 1892 in S Pohl.

H. tesselata Hrbst. in SW ist *Phytonomus pedestris* Payk. und *rumicis* L. Aber: Gommern zweimal. U und B, Alte Fähre. B.

Phytonomus pastinacae Rossi in SW ist *murinus* F.

Ph. contaminatus Hrbst. ist als *Hypera oxalidis* Hrbst. in SW. Magdeburg und Schönebeck mehrfach U, 1 Stck. Calbe/Milde 8. 32. B.

Ph. elongatus Payk. 1 Stck. Weferlingen als *Hypera intermedia* Boh. in SW. Ist im Gebiet verbreitet, aber einzeln.

Hylobius pinastri Gyll. ist nicht in SW. Aber: Querum und Waggum nach H, je 1 Stck. Barleben 1899 und Möser 6. 14 in S Pohl.

H. fatuus Rossi. 1 Stck. von Braunschweig in SW; dort auch nach H. 1 Stck. Regenstein bei Blankenburg 5. 01 in S Pohl. Das Tier lebt bestimmt auf Lythrum; daran gefunden: Rühen 6. 22. B, Grünewalde 7. 23. U, Elbenau und Alte Fähre 8. 35. B.

Liparus dirus Hrbst. ist nicht in SW.

Minyops carinatus L. in SW von Torgau ist richtig. 1 Stck. an den Aschenhalden der Schönebecker Saline 5. 09. U.

Pissodes scabricollis Mill. 1 Stck. Braunlage in S Manzek.

Magdalis quercicola Weise. Diebzig 6. 21. U.

M. mixta Desbr. ist nicht in SW.

M. exarata Bris. Ramstedt 5. 16 in S Manzek, Schönebeck, Elbenau und Ranies. U.

Cossonus cylindricus Sahlb. Biederitz 08 und 7. 11 in S Pohl.

Codiosoma spadix Hrbst. Je 1 Stck. dicht nördlich von Magdeburg 4. 04 in S Feuerst., 5. 09 in S Pohl.

Eremotes reflexus Boh. in SW ist *porcatus* Germ.

E. porcatus Germ. 1 Stck. Weferlingen als *reflexus* Boh. in SW. Biederitz in S Pohl.

Rhyncolus culinaris Germ. in SW ist *lignarius* Mrsh.

Rh. turbatus Schönh. 1 Stck. als *gracilis* Rosh. in SW. Dessau 7. 26 in S Fehse.

Rh. gracilis Rosh. in SW ist *lignarius* Mrsh. und *turbatus* Schönh.

Camptorrhinus statua Rossi in SW ist richtig.

Gasterocercus depressirostris F. Kolbitz an Eichenholz 6. 17 in S Pohl.

Acalles lemur Germ. in SW ist *hypocrita* Boh. Aber Mascherode nach H.

A. hypocrita Boh. ist als *lemur* Germ. in SW. Möser in S Pohl, Harzburg in S Manzek.

A. pyrenaeus Boh. Je 1 Stck. Thale und Ilsenburg in S Pohl.

Acallocrates denticollis Germ. in SW ist — *Rhinoncus perpendicularis* Reich. Aber: je 1 Stck. Wahlitz 6. 93 und Dessau 6. 03 in S Pohl.

Zacladus exiguus Ol. in SW ist *Ceutorrhynchus atomus* Boh. und *griseus* Bris.
Ceutorrhynchus radula Germ. in SW ist *geographicus* Goeze.

C. viduatus Gyll. Je 1 Stck. an Gräben Grünewalde 9. 25, Randau 6. 32 und Elbenau 8. 35. B.

C. ornatus Gyll. in SW ist *litura* F.

C. pallidicornis Bris. Siehe A B. Hohes Holz. U, 1 Stck. Hakel 5. 25. B.

C. urticae Boh. ist in den Auenwäldern jenseits von Schönebeck nicht selten.

C. arquatus Hrbst. in SW ist *melanostictus* Mrsh. Aber: 1 Stck. Magdeburg. U, mehrere Grünewalde und Elbenau 8. 35. B.

C. denticulatus Schrnk. in SW ist richtig. Je 1 Stck. Aschersleben 4. 16. U, Schönebeck 5. 20. B.

C. querceti Gyll. in SW ist *Sirocalus terminatus* Hrbst.

C. consputes Germ. in SW ist *Sirocalus terminatus* Hrbst. Aber: Westeregeln in S Manzek, Unseburg. B, Schönebeck. U.

C. inaffectatus Gyll. Schönebeck im Garten 6. 22 in S Manzek, 2 Stck. Thale 5. 25 in S Fehse.

C. rapae Gyll. in SW ist *pleurostigma*. Mrsh. Aber: Barleben 1890 in S Pohl.

C. nanus Gyll. in SW ist *Sirocalus nigrinus* Mrsh.

C. griseus Bris. Mehrere als *neutralis* Gyll., *sophiae* Stev. und *Zacladus exiguus* Ol. in SW. Calbe a. d. Saale 7. 16 und Wildemann i. Harz 6. 24. U.

C. sophiae Stev. in SW ist *griseus* Bris.

C. resedae Mrsh. in SW ist — *Cidnorrhinus quadrimaculatus* L.

C. hirtulus Germ. Ramstedt 4. 16 in S Manzek, Grünewalde 9. 14. U, Thale 5. 25 in S Fehse.

C. barbaraeae Suffr. in SW ist *ignitus* Germ. Aber: siehe A B, 1 Stck. Thale 5. 22 in S Fehse.

C. ignitus Germ. 1 Stck. Braunschweig als *barbaraeae* Suffr. in SW; dort auch nach H. Siehe A B.

C. pectoralis Weise. Je 1 Stck. Schönebeck auf *Barbaraea* 4. 13 und Diebzig 6. 21. U.

Rhinoncus albicinctus Gyll. in SW ist *perpendicularis* Reich.

Phytobius quadrinodosus Gyll. in SW vom Harz ist richtig, von Lockstedt nicht in SW.

Ph. granatus Gyll. in SW ist *quadrituberculatus* F. Aber: 1 Stck. Biederitz 5. 00 in S Pohl.

Ph. velaris Gyll. in SW ist *Waltoni* Boh.

Drusenatus nasturtii Germ. ist nicht in SW.

Baris analis Ol. Das letzte Stück: Magdeburg im Haus 6. 10 in S Pohl.

B. chloricans Germ. in SW von Weferlingen ist richtig, von Magdeburg ist *coerulescens* Scop.

Limnobaris pilistriata Steph. ist im Gebiet sehr verbreitet; auch Elend. B.

Sphenophorus piceus Pall. 1 Stck. Magdeburg am Elbufer 4. 09 in S Pohl.

S. abbreviatus F. Magdeburg 4. 90 und Biederitz 6. 11 in S Pohl.

S. striatopunctatus Goeze. Siehe A B, Biederitz zweimal in S Pohl.

Balaninus elephas Gyll. ist nicht in SW.

Anthonomus pubescens Payk. in SW ist *rufus* Gyll. Aber: 1 Stck. Schönebeck 4. 14 in S Manzek.

A. bituberculatus Thoms. Um Schönebeck wiederholt gefangen. B.

A. humeralis Panz. in SW ist *pedicularius* L.

A. spilotus Redtb. ist nicht in SW. Aber: siehe A B.

A. undulatus Gyll. in SW ist *pedicularius* L.

A. rufus Gyll. 2 Stck. Weferlingen als *pubescens* Payk. in SW. Siehe A B, 1 Stck. Frellstedt 1907 in S Pohl.

Bradybatus Kellneri Bach. Thale in S Manzek und durch Fehse in S B.

B. subfasciatus Gerst. 2 Stck. der v. *rufipennis* Rtt. Ende Mai am Hagholz von Weißdornblüten geklopft in SW.

Dorytomus hirtipennis Bed. Je 1 Stck. Elbenau 4. 30 und 4. 32. B.

D. nebulosus Gyll. Rogätz 5. 96 in S Pohl, Westeregeln 5. 07 und Hakel 5. 11 in S Manzek.

D. villosulus Gyll. in SW ist *rufulus* Bed. Aber: Schönebeck in S Manzek.

D. occalescens Gyll. ist nicht in SW, die Tiere sind aber nach Hahn von Kirsch bestimmt. Burg 7. 26 in S Fehse.

D. salicis Walt. Biederitz 5. 90 und Rogätz 99 in S Pohl, Thale 6. 27 in S Fehse.

D. salicinus Gyll. in SW ist *flavipes* Panz.

Notaris Maerkeli Boh. in SW ist *acridulus* L.

Pachytychius sparsutus Ol. ist nicht in SW.

Smicronyx coecus Reich. Mehrere Könnern 6. und 7. 35. B.

Dicranthus elegans F. Letzter Fund: 1 Stck. Biederitz 4. 87 in S Pohl.

Bagous lutosus Gyll. in SW ist *glabrirostris* Hrbst. Aber: je 1 Stck. Lostau 5. 09 und Biederitz 1911 in S Pohl, siehe A B.

B. limosus Gyll. 1 Stck. Schönebeck am Elbufer 5. 29. U, 2 ebenda 4. 34. B.

B. nodulosus Gyll. in SW ist *longitarsis* Thoms. Aber: um Schönebeck nicht selten. U, Manzek und B, Barleben in S Pohl, Querum nach H.

B. argillaceus Gyll. in SW ist *glabrirostris* Hrbst.

B. claudicans Boh. 1 Stck. Grünewalde auf *Equisetum limosum* 7. 21. U.

B. frit Hrbst. Magdeburg, von Reitter bestimmt, nach Hahn; 1 Stck. Schönebeck 5. 13 in S Manzek, siehe A B.

B. tempestivus Hrbst. Magdeburg, Randau und Grünewalde. U, Schönebeck in S Manzek, Ranies. B.

Elleschus infirmus Hrbst. ist nicht in SW.

Tychius femoralis Bris. 1 Stck. Könnern 6. 33. B.

Sibinia viscariae L. ist nicht in SW; aber: als *pellucens* Scop. in SW. Auch sonst im Gebiet verbreitet.

S. fugax F. 1 Stck. Möser 6. 19. U.

Rhynchaenus erythropus Germ. in SW ist *rufitarsis* Germ. Aber: Querum nach H.

Gymnetron melanarium Germ. in SW ist *rostellum* Hrbst.

G. villosulum Gyll. ist als *beccabungae* L. in SW. Eggersdorf und Mühlingen. U.

G. asellus Grav. Je 1 Stck. Plötzky 5. 15. U und Magdeburg 6. 00 in S Feuerst.

G. hispidum Brullé in SW ist *antirrhini* Payk.

G. bipustulatum Rossi in SW ist *beccabungae* L. Aber: 1 Stck. Magdeburg 6. 16 in S Pohl.

Miarus micros Germ. in SW ist *Gymnetron netum* Germ.

M. plantarum Germ. in SW ist *Gymnetron linariae* Panz.

Cionus Olivieri Rosh. ist nicht in SW. Aber: Rogätz 8. 88 und 8. 90 in S Feuerst.

C. longicollis Bris. ssp. *montanus* Wglm. viele Harzburg 7. 25 in S Manzek.

Nanophyes hemisphaericus Ol. in SW ist richtig.

N. gracilis Redtb. in SW ist richtig; auch von Magdeburg als *globulus* Germ. in SW. Siehe A B.

N. globulus Germ. in SW ist *gracilis* Redtb.

Apion armatum Gerst. in SW ist *carduorum* Kirby.

A. amethystinum Mill. in SW ist *loti* Kirby.

A. elongatum Germ. in SW ist *seniculus* Kirby.

A. serphyllicola Wenck. Mindestens 10 Stck. als *aciculare* Germ. in SW.

A. ononicola Bach. in SW ist *apricans* Hrbst. Aber: Rieseberg nach H, Quedlinburg nach Kühlhorn, siehe A B.

A. aciculare Germ. in SW ist *serpyllicola* Wenck.

A. sedi Germ. in SW ist *curtirostre* Germ. Aber: Querum und Waggum nach H, siehe A B, dort auch von U, Harzburg in S Manzek.

A. hydrolapathi Mrsh. in SW ist *violaceum* Kirby.

A. striatum Kirby in SW ist *vicinum* Kirby.

A. alcyoneum Germ. in SW ist *Spencei* Kirby.

A. Sundevalli Boh. in SW ist *aethiops* Hrbst.

A. punctirostre Gyll. in SW ist *astragali* Payk. und *virens* Hrbst. Aber: Hakel 5. 16 in S U.

A. punctigerum in SW ist *aethiops* Hrbst. Aber: 1 Stck. Könnern 5. 30. B, Harzburg in S Manzek.

Nemonyx lepturoides F. in SW ist richtig. Ramstedt in S Pohl, siehe A B, nun auch Frohser Berge 7. 35. B.

Auletes basilaris Gyll. 2 Stck. Patzetz an *Sanguisorba officinalis* 7. 15 in S Manzek.

Deporaus tristis F. in SW ist *Mannerheimi* Humm. Aber: 1 Stck. Biederitz 6. 05 in S Pohl, 1 Huy 6. 35. B.

Rhynchites olivaceus Gyll. ist nicht in SW. Aber: siehe A B, je 1 Stck. Ilsenburg 7. 01 in S Pohl und Thale in S Fehse.

Rh. pubescens F. Siehe A B, 2 Stck. Wulfen. U, Lostau in S Pohl.

Scolytus pygmaeus F. Magdeburg durch Hahn in SW und in S Pohl, Unseburg nach Gerhard, Elbenau. B.

Hylesinus toranio Bernard in SW ist richtig. Grünewalde und Schollene. B.

Kissophagus hederae Schmidt in SW ist *Hylastinus obscurus* Mrsh. Aber: Braunschweig selten nach H.

Hylastinus obscurus Mrsh. 2 Stck. als *Kissophagus hederae* Schmidt in SW. Siehe A B.

Polygraphus subopacus Thoms. 1 Stck. Helmstedt. U.

Lymantor coryli Perris ist von Barby durch Hahn in SW, Mascherode nach H.

Pityogenes trepanatus Nördl. ist nicht in SW. Aber: 1 Stck. Grünewalde 8. 32. B.

P. quadridens Hartig in SW ist *bidentatus* Hrbst. und *Pityokteines Vorontzowi* Jakobs. Aber: Querum und Gifhorn nach H.

Pityokteines Vorontzowi Jakobs. 1 Stck. als *Pityogenes quadridens* Hartig in SW.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: 33

Autor(en)/Author(s): Borchert Walter

Artikel/Article: Mitteilungen über die Käfer Ostfalens. 242-261