

Die Lepidopteren-Fauna v. Schwabach u. Umgebung.

Von Heinrich Wendel, Schwabach.

(Fortsetzung).

VI. Hesperidae.**Pamphila** Wats.**Palaemon**, Pall. Häufig im Mai und Juni auf Brombeersträuchern und blühenden Disteln.**Adopaea** Wats.**Lineola** O. Verbreitet im Juli und August.**Thaumas** Hufn. Ueberall, nicht selten im Juni und Juli.**Augiades** Wats.**Comma** L. Juli, August verbreitet, nicht selten.**Sylvanus** Esp. Juni, Juli in Waldschlägen, nicht selten.**Carcharodus** Wats.**Alcaeae** Esp. Verbreitet doch nicht häufig im Mai, Juli und August.**Hesperia** Wats.**Carthami** Hb. Nicht häufig im Juni, Juli und August.**Sao** Hb. Vereinzelt, selten.**Alveus** Hb. Häufig im Juli und August.**ab Fritillum** Pr. öfter gefangen.**Malvae** L. Häufig.**Thanaos** B.**Tages** L. Vereinzelt doch nicht selten im Mai, Juli und August in Waldschlägen.

Heterocera (Nachtfalter.)

VII. Sphingidae.**Acherontia** O**Atropos** L. (Totenkopf.) Dieser prächtige Schwärmer wird in hiesiger Gegend ziemlich selten gefunden, häufig dagegen die Raupen und Puppen. Die Raupe meist an Kartoffeln und an Bocksdorn. Im Jahre 1900 wurden hier besonders viele Raupen gefunden; während im Jahre 1905 und 1906 nur 2 Falter und 10 Raupen gesammelt wurden.**Smerinthus** Latr.**Populi** L. Pappelschwärmer. Häufig. Die Raupen werden alljährlich an Pappel und Aspe in Anzahl gesammelt. Juli, August.**Ocellata** L. Abendpfaunauge. Häufig. Raupe im Juli, August auf Weiden, auch auf Apfelbäumen wiederholt gefunden.**Dilina** Dam.**Tiliae** L. Lindenschwärmer. Häufig. Raupen im Juli, August auf Linden.**ab Brunnescens** Stgr.**ab Ulmi** Stgr. Beide Aberrationen sind hier nicht selten.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Wendel Heinrich

Artikel/Article: [Die Lepidopteren-Fauna von Schwabach und Umgebung. 108](#)