

Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen.

Von R. Kleine, Halle (Saale).

(Fortsetzung.)

76. Genus: ***Ceutorrhynchus*** Germar.*Sirocalus* Heyd. emend. *Calosirus* Thomson.

<i>geographicus</i> Goeze <i>echii</i> Fabr.		Käfer auf	Echium vulgare L. Lycopsis arvensis L.
<i>Korbi</i> Schultze		Käfer auf	? Echium vulg. L. ? " rubrum Jacq. ? " altissimum L.
<i>crucifer</i> Ol. <i>cruciger</i> Herbst <i>4-maculatus</i> Germ.		Käfer auf	Echium vulgare L. Cynoglossum officinale L. Lycopsis arvensis L. Anchusa italicica Retz. Verbascum thapsus L.
<i>trisignatus</i> Gyll. <i>cynoglossi</i> Fraufld.	Larve in verholzten Stengeln u. Wurzeln	Blattfraß des Käfers.	Cynoglossum officinale L.
<i>asperifoliarum</i> Gyll.	Larve an	Käfer auf	Cynoglossum officinale L. Anchusa arvensis B. " officinalis. Symphytum officinale L. Myosotis palustris With.
<i>raphani</i> Fabr.	Larve an Blättern.	Käferfraß an	Symphytum officinale L.
<i>dimidiatus</i> Friv.		Käferfraß an	Nonnea pulla D.-C.
<i>sympniti</i> Bed. ? <i>raphani</i> Fabr.	Larve im Stengel.	Käfer auf der Pflanze.	Symphytum officinale L.
<i>floralis</i> Payk.	Larve in den Schooten Samen fressend.		Capsella bursa pastoris Mch. Lepidium Draba L. " sativum L.
<i>pleurostigma</i> Marsh. <i>sulcicollis</i> Thoms.	Larve in Wurzelgallen.		Sinapis arvensis L. Berteroa incana D.-C. Raphanus raphanistrum L. Erysimum cheiranthoides L. Brassica nigra Koch " napa L.
	Am Wurzelhals.		

<i>rapae</i> Gyll.	Larve in Wurzeln.		Lepidium Draba L. Alyssum saxatile L.
<i>napi</i> Gyll.	Larve im Stengel.		Brassica rapa L.
<i>borraginis</i> Fabr.		Käferfraß an	Borago officin. L. Brassica-Arten Raphanus rapha- nistrum L. Cochlearia armo- riaca L. Nasturtium off. R. Br.
<i>assimitis</i> Payk. <i>fallax</i> Boh. <i>brassicae</i> Focill. <i>a. sardeanensis</i> Schultze	Larve in den Schoten.		Brassica-Arten. Sisymbrium Sophia L.
<i>v. fallax</i> Schultze	Gallen an der Wurzel		Raphanus sativus L.
	Gallen ohne nähere Angabe	Käfer in Blüten.	Sinapis arvensis L. Brassica rapa L. Reseda lutea L.
<i>cochleariae</i> Gyll. <i>atratulus</i> Gyll. <i>austerus</i> Gyll. <i>v. filirostris</i> Reitt. <i>svaneticus</i> Schultze	Larve in Wurzeln.	Käferfraß an	Cochlearia Armo- riaca L. Cardamine pra- tensis L.
<i>vanus</i> Gyll.		Desgleichen.	Alyssum calycinum L. Lepidium Draba L.
<i>albosignatus</i> Gyll.		Käferfraß an	Capsella bursa pas- toris L.
<i>alliariae</i> Bris. <i>inornatus</i> Waterh.	Larve an den Wurzeln.	Käferfraß an	Sisymbrium Alli- ariae Scop.
<i>barbareae</i> Suffr. <i>cyanopterus</i> Redtb.		Käferfraß an	Barbara vulgaris R. Br.
<i>chalybaeus</i> Germ. <i>coeruleescens</i> Gyll.	Larve in Wurzeln.	Käfer auf Laub.	Thlaspi arvense L.
<i>chlorophanus</i> Roug.		Käfer auf	Diplotaxis tenui- folia D.-C. Erysimum lanceo- latum R. Br.
<i>scapularis</i> Gyll. <i>obscurecyaneus</i>		Käfer an	Lunaria annua L.
<i>laetus</i> Rosh. <i>smaragdinus</i> Bris.	Larve an Blättern.	Käfer an	Diplotasis tenui- folia D.-C.

<i>re sedae</i> Marsh.		Käferfraß an	Raphanus.
<i>Roberti</i> Gyll.	Larve in Stengel-gallen.	Desgleichen.	Raphanus rapha-nistrum L. Sisymbrium Alliaria Scop.
<i>constrictus</i> Marsh.	Larve in Wurzeln.		Sisymbrium Alliaria Scop. Thlaspi arvense L.
<i>sulcicollis</i> Payk. <i>cyanipennis</i> Germ.	Larve in Stengel-gallen.	Desgleichen.	Sinapis arvensis L. Capsella bursa pas-toris Mch. Cochlearia amoriaca L. Achillea millefolium L.
<i>pictarsis</i> Gyll. <i>tarsalis</i> Boh.	Larve an der Wurzel.		Brassica napus L.
<i>Pandellei</i> Bris.		Käfer auf	Cardamine annua L.
<i>ignitus</i> Germ.		Desgleichen.	Berteroa incana D.-C.
<i>Gerhardtii</i> Schulze		Desgleichen.	Thlaspi arvense L.
<i>nasturtii</i> Germ. <i>olivaceus</i> Gyll.		Käferfraß an	Nasturtium amphibium R. Br. , palustre D.-C. Sisymbrium-Arten.
<i>quadridens</i> Panz. <i>borraginis</i> Gyll.	Larve in Wurzel-gallen.	Desgleichen.	Brassica napus L. Sinapis nigra L. Nasturtium off. R. Br.
<i>mogunthiacus</i> Schultze		Desgleichen.	Diplotaxis tenuifolia D.-C.
<i>inaffectatus</i> Gyll. ♀ <i>glabrirostris</i> Gyll.		Desgleichen.	Hesperis matronalis L.
<i>parvulus</i> Bris.		Desgleichen.	Lepidium cam-pestre R. Br.
<i>atomus</i> Boh. <i>setosus</i> Boh.	Larve in schwachen Anschwellungen d. Haupt- und Neben- achsen.		Sisymbrium Thalia-num Gaud.

<i>erysimi</i> Fabr. a. <i>chloropterus</i> Steph. a. <i>cyaneus</i> Ws. a. <i>subniger</i> Gerh.		Käfer an	Capsella bursa pastoris L. Lepidium graminifolium L. Cardamine amara L. Erysimum spec. L.
<i>hirtulus</i> Germ. <i>drabae</i> Laboulb.	Larve in Stengel- anschwellungen der unteren Teile.	Käfer an	Nasturtium amphibium D-C. Draba verna L. Thlaspi arvense L.
<i>aeneicollis</i> Germ. <i>metallinus</i> Fairm.		Käfer an	Lepidium graminifolium L.
<i>contractus</i> Marsh.	Larve in gallen- artigen Anschwel- lungen der Stengel und Zweige.	Käfer auch an	Thlaspi arvense L. Lepidium graminifolium L. Draba verna L. Sinapis arvensis L. Salix-Arten.
<i>pyrrhorhynchus</i> Marsh. <i>achilleae</i> Gyll. <i>cochleariae</i> Thoms. <i>erythrorhynchus</i> Gyll. <i>phlaeorrhynchus</i> Mrsh.	Larve in den Blüten- köpfen.	Käfer auf	Cirsium arvense Scop. Sisymbrium officinale.
<i>pulvinatus</i> Gyll.	Desgleichen.		Desgleichen und Sisymbrium Sophia L.
<i>ornatus</i> Gyll. ? <i>Andreae</i> Germ.	?	?	Carduus pycnocephalus L.
<i>litura</i> Fabr.	?		Carduus nutans L. " crispus L. Cirsium palustre Scop. " lanceolatum Scop.
<i>trimaculatus</i> Fabr. a. <i>hybridus</i> Schultze	Larve an	Käfer an	Dipsacus fullonum L. Verbascum thapsus L. Carduus nutans L. " pycnocephalus L.
<i>chrysanthemi</i> Germ. a. <i>rubiginosus</i> Schze.	Larve im oberen Stengelteil.		Chrysanthemum leucanthemum L. Matricaria chamomilla L.

<i>variegatus</i> Ol. <i>campestris</i> Gyll. <i>lepidus</i> Gyll.	Larve in Wurzel.	Käfer auch auf	Matricaria chamo-milla L. Chrysanthemum leucanthemum L.
<i>molitor</i> Gyll.		Käfer auf	Matricaria chamo-milla L.
<i>marginatus</i> Payk.	Larve an	Desgleichen.	Taraxacum off. Wigg. Trifolium pratense L.
<i>rugulosus</i> Herbst <i>gallicus</i> Gyll.	Larven im Stengel.		Chrysanthemum leucanthemum L. Achillea millef- lium L. Matricaria chamo-milla L. Anthemis nobilis L.
<i>campestris</i> Gyll. ? <i>variegatus</i> Ol. a. <i>lepidus</i> Gyll.		Käferfraß an	Achillea millef- lium L. Chrysanthemum leucanthemum L.
<i>triangulum</i> Boh. <i>vicinus</i> Kraatz.		Desgleichen.	Chrysanthemum leucanthemum L.
<i>ericae</i> Gyll. <i>albosetosus</i> Gyll.	Larve an Blättern und Früchten.	Käferfraß an	Erica carnea L. " cinerea L. " tetralix L. Calluna vulgaris Sahlb.
<i>ferrugatus</i> Perris	Desgleichen.	Desgleichen.	Erica scoparia L.
<i>posthumus</i> Germ. <i>pumilio</i> Gyll. <i>asperulus</i> Boh. <i>Poweri</i> Rye.		Käfer an	Calluna vulgaris Sahlb. Erica tetralix L. Capsella bursa pas-toris Mch.
<i>quercicola</i> Payk. <i>grypus</i> Herbst <i>depressicollis</i> Gyll. <i>versicolor</i> Bris.		Käfer auf Laub.	Calluna vulgaris Sahlb. Acer campestris L.
<i>suturalis</i> Fabr.		Desgleichen.	Linaria vulgaris Mill.
<i>Sahlbergi</i> Boh. <i>lamii</i> Sahlb.		Käfer an	Galeobdolon luteum L. Lamium. Urtica.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine Richard

Artikel/Article: [Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen. 261-265](#)