

Die Verbreitung des *Bembidion atrocoeruleum* Steph.

Von Dr. Fritz Netolitzky (Czernowitz).

Bembidion atrocoeruleum Steph. ist vornehmlich eine westeuropäische Art, deren bisher beobachteter östlichster Fundort das Isergebirge ist. Von England wurde die Art zuerst beschrieben. Den eigentlichen Alpen fehlt sie, wenngleich einige Fundorte in sie hineinreichen (Frankreich, Schweiz). Interessant ist das Vorkommen im Böhmerwalde, bei Aussig, Dresden, Schwarzbach im Isergeb., wodurch es wahrscheinlich wird, daß die ganzen Randgebirge Böhmens die Art beherbergen.

Aus zoogeographischen und anderen Gründen habe ich *B. cumatile* Schiödt nicht in das Verbreitungsgebiet aufgenommen, da ich von der Identität nicht überzeugt bin; daher das Fragezeichen bei Kopenhagen, von wo die Art beschrieben ist!

Fundorte.

1. Großbritannien und Irland.

Halifax, Grafschaft York (Stephens. Von hier beschrieben). Falkirk, Scotland (Dan.¹). Braemar, Aberdeen und Aviemore, Inverness-shire (Dan.). Bickleigh, Devon (Dan.).

2. Spanien und Portugal.

*Ponferrada, *Caboalles (Paganetti). Coimbra (Dan.). Huelamo (Dan.).


3. Belgien und Holland.


Ostende (Dan.). Brüssel, Lüttich, Verviers, Dolhain (Fauvel, Fn. Gallo-rhén. 201). Amsterdam (Kinker) und Maurissen (Limmel) Coll. Ewerts.

4. Frankreich.

Champagnole (Dan.). *Savoie (Morel); Mt. Cenis (Fauvel l. c.); * Guiers (Fauvel, Planet.) Aube, Foicy (Fauvel l. c.); Isère (Morel), Mont-

¹) „Dan.“ bedeutet, daß der Fundort in Daniels Revision usw. Münch. Kol. Zeit. I. 17 und 18 aufgezählt ist.





Die Verbreitung des *Bembidion atrocoeruleum* Steph.

Dore (Fauvel l. c.). Cantal (Fauvel l. c.). Amélie-les-bains (Dan.); Collioure (Fauvel l. c.); Belcaire, Aude (Deville). Toulouse (Fauvel l. c.). Hautes-Pyrénées: Luchon, *Eaux-bonnes, Lourdes (Dan.); Pierrefitte (Fauvel l. c.). *Gavarnie (Nicolas). Nîmes; Laruns, Marvejols (Nicod).

5. Schweiz.

Siselen, Bern (Dan.).

6. Deutschland und Oesterreich.

Witten (Dan.); Arnsberg. Büresheim, Eifel (Dan.). Bonn, Ahrweiler, Siegburg, Ems (Dan.). *Braunschweig, *Vienenburg (Heinemann); Hildesheim (Coll. Roubal). *Harz (Rauterberg, Hillecke); Lauterberg (Petry). Kassel (Riehl). Thüringer Wald: Arnstadt, Stützerbach, Rudolstadt (Dan.). [Vgl. Hubenthal, Entom. Bl. VII. 1911. 187; Jänner Thür. Laufk.]. Heidelberg (Hubenthal, brieflich). Vogesen. Schwarzwald: Albtal, Buhlbach (Dan.); *Fahnau (Hartmann). *Böhmerwald: Arber (Roubal). *Dresden (ein defektes Stück in unpräpariertem Materiale von Hänel). *Aussig (Böhmen, F. Gabert). Isergebirge, Schwarzbach (Dan.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: [Die Verbreitung des *Bembidion atrocoeruleum* Steph. 145-146](#)