

## Die Verbreitung von *Quedius auricomus* Kiesw.

Von J. Sainte-Claire Deville in Paris.

*Quedius auricomus* Kiesw., Stett. ent. Zeit., XI, 1850, p. 220. — *tomentoso-maculatus* Corn., ibid., XXIV, 1863, p. 130. — *decoratus* Petri, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1902, p. 153; Bernhauer, Ent. Zeit., Frankfurt, XXV, Nr. 50.

Vorkommen. Im überrieselten Moose an Quellen, Gebirgs- und Waldbächen; von der Meereshöhe (England, Nordwestfrankreich) bis zu ungefähr 16—1800 m (Alpen, Pyrenäen) hinaufsteigend. In Westengland sowie in den Pyrenäen und Westalpen weniger selten und ziemlich regelmäßig verbreitet.


### Fundorte:


Irland. Counties Sligo und Fermanagh (Chaster, nach Halbert u. Johnson).

Großbritannien. Schottland: Tay, Clyde, Tweed und Solway districts (nach W. W. Fowler); Northumberland (id.); Wales: Llangollen, Barmouth (id.), Snowdon (Bedwell), Clanfairfechan (Elliman); Matlock (W. W. Fowler); Herefordshire (Tomlin); Devon und Cornwall, passim (Ph. de la Garde, Keys, Butler, Th. Wood usw.).

Frankreich. Calvados: Longues (Fauvel). Finistère: St. Jean-du-Doigt, Huelgoat (Hervé). Puy-de-Dôme: Mont-Dore (Fauvel). Basses-Pyrénées: La Rhune (Vauloger!), forêt d'Itte (de Borde), Gabas! Hautes-Pyrénées: Lourdes (Bernhauers Sammlung), vallée d'Aure (Pandellé). Pyrénées-Orientales: La Preste (v. Kiesenwetter, Fundort des Typus), Arles-sur-Tech (Mayet). Haute-Marne: Auberive!, Nogent-en-Bassigny!. Vosges: St. Maurice-sur-Moselle!. Belfort: Giromagny!. Doubs: Maichel, Malbuisson! Savoie: cascade de Couz (Fauvel). Isère: Grande-Chartreuse (Planet!), Gresse (Normand!). Hautes-Alpes: St. Etienne-en-Dévoluy (Falcoz!). Alpes-Maritimes: St. Martin-Vésubie!

Belgien. Verviers (Chapuis).





Die Verbreitung von *Quedius auricomus* Kiesw.

Deutschland. Elberfeld (Cornelius; Fundort von *tomentosomaculatus* Corn.); Düsseldorf (Fuss); Nassau (Buddeberg); Schwarzwald (Bernhauers Sammlung).

Schweiz. Tourlopaß, im Monte-Rosa-Gebiet (nach Bernhauer).

Oesterreich-Ungarn. Südtirol: Campogrosso (nach Bernhauer). Siebenbürgen: Auf dem Negoj und dem Paringul (Petri, Fundorte von *Q. decoratus* Petri).

Rumänien. Sinaia (Montandon).

Anmerkungen. *Quedius auricomus* Kiesw. gehört zu der Urfauna Westeuropas und ist kein asiatischer Immigrant. Er bewohnt symmetrische Landschaften auf beiden Seiten des Kanals La Manche und des Rheintals, demzufolge scheint seine Verbreitung sehr alt und gewiß präglazial zu sein. Er wird den Karpathenzug durch die mitteldeutschen Gebirge und die böhmische Masse erreicht haben, in diesen letzteren Gegenden aber während der Eiszeit verschwunden sein.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Sainte-Claire Deville Jean

Artikel/Article: [Die Verbreitung von \*Quedius auricomus\* Kiesw. 241-242](#)