

Die Verbreitung des *Bembidion prasinum* Duft.

Von Dr. Fritz Netolitzky (Czernowitz).


Fundorte:


Oesterreich: Wien (Duftschmid Faun. Austr. 1812. II. 201); *Graz (Murfluß, Penecke, Weber, Netolitzky), *Cilli (Sannufer, Strupi), Marburg (Steiermark, Dr. Krauss), *Steinbrück (Netolitzky), *Reichenburg (Saveufer, Netolitzky), Wochein (Schuster), *Savica (Saveursprung, leg. Heyrovsky). — Altvater (Coll. Schilsky), Mähr. Weißkirchen (Schuler), Paskau (Reitter, Graf, Zoufal), *Mähr. Ostrau (Zoufal); Barania (Novicki, Verz. Galiz. Käf., p. 14, 1873.), Beskiden (Coll. Hänel, brieflich und Coll. Petz, Steyr): Prag-Umgebung (*Károv und *Vrané [leg. Klenka], Zavist und Troja [leg. Roubal]); *Aussig (Gabert), Böhm. Mittelgebirge (Coll. Hänel, brieflich). (Nach brieflicher Mitteilung fehlt der Käfer in Mittel- und Westgalizien [Dr. Lomnicki]). Bodensee bei Bregenz (Dr. J. Müller).

Ungarn: Komitat Trenczén (Dr. Branczik, Wiener Hofmus.) Trnje (Agram, Csiki) und im Papukgebirge (Csiki, Magyar. Fn. I. 223).

Deutschland: *Glatz (Bodemeyer), Kamenz (Silesia, Bodemeyer in Coll. v. Heyden); Thüringen: Sitzendorf, Blankenburg, Weidmannsheil, Rudolstadt, Jena, Arnstadt (Jänner, G., Die Thüringer Laufkäfer, Sep.-Abd. a. d. Entom. Jahrbuch 1905, p. 23). Harz (Hornung, E. G., Käf. d. Harzes); *Hildesheim (leg. Rauterberg); Cassel (Riehl, Verz. d. b. Cassel gef. Coleopt., ein Belegstück in der Coll. v. Heyden); Elberfeld und Neviges (Cornelius, Verz. d. Käf. von Elberfeld), Witten (Fügner, Coll. Schilsky), Boppard, Düsseldorf, Elberfeld und Ruhr (A. Förster, Käf. d. Rheinprovinz), *Ahrweiler (Dr. Dormeyer); *Crefeld (legit.?); Ems, Wiesbaden, Moosbach, Lorch und Wetzlar (an der Lahn, B. Eichhoffi Bach) (v. Heyden, Käf. Nassau u. Frankfurt, II. Aufl. 1904), Coblenz (Kgl. zool. Mus. Dresden) *Fahrdau im Schwarzwalde (Hartmann). Heilbronn (E. Scriba brieflich), Württemberg (Keller: Verz. d. i. Württemberg aufgef. Käfer). München (Daniel K., Münch. Kol. Zeitschr., III, 41: am Isar- und Amperufer). Hilchenbach, Ennepetal (bei Hagen), Hohensyburg, Paderborn, Fritzlar. Minden, Bückeburg (Fauvel, Fn. gallo-rhen., I, 175 nach Westhoff), Metz (Fauvel ibid.); Mühlhausen (Fischer) und Colmar (Scherdlin)

* Die mit * bezeichneten Fundorte sind in meiner Sammlung vertreten.





F. Netolitzky: Die Verbreitung des *Bembidion prasinum* Duft.

(beide nach brieflicher Mitteilung von P. Scherdlin, Straßburg). Dresden (Coll. Knauth und v. Haupt, brieflich von Hänel), Sächsische Schweiz (Coll. v. Haupt, dto.).

Italien: Im Katalog von Bertolini für die Lombardei zitiert und von hier in den Katalog von Jakobson (mutmaßlich) übernommen. Herr Doderò hält die Angabe für höchst zweifelhaft (briefliche Mitteilung). Auch ich bezweifle entschieden die Richtigkeit.

Frankreich: Troyes-Aube (Laverdet, Fauvel. Fn. gall. rhén. I. 175), Larzicourt-Marne (G. de Buffévent), Epinal, Vosges (St. Claire Deville), Lyon (Rey, Fauv. l. c.), Ain (bords du Rhône et le l'Aine, Viturat & Fauconnet, Cat. Col. Saône et Loire), Rhône (bords du Rhône, Viturat et Fauconnet, ibid.); Armagnac-Gers (Gabert, ibid.). Bézérac (Lareynie, Duval Ann. Fr. 1852. 523, Dordogne), Marmande-Lot et Garonne (Dr. Boitel); Clermont-Ferrand (Bayle). (Alle von Ste. Cl. Deville brieflich bestätigt resp. mitgeteilt.)

Niederlande: Maastal; nördlichster Fundort: Roermond (Uyttenboogaart, brieflich).

Belgien: Vielsalm, Dinant, Liège (Preudhomme de Borre, Matér. p. l. Faune entom. etc.).

England: Fowler zählt in Col. of the British Islands (1887, 119) folgende Fundorte auf: Hastings; Bewdley am Severn, Llangollen am Dee; Ribblesfluß, Lancashire; Helonsley, Yorks; Carlisle; Northumberland und Durham; Schottland: Solway, Tweed, Forth, Tay, Moray. (In Irland noch nicht gefunden.)

Norwegen: Christiania; Ringerike; Aaset, Nabset, Aamot-Hedemarkia; Laerdal; Kongsvold in alpe Dovre (Siebke, Ins. Now. p. 86). Høugsund (var. Kolströmi) und Varanger (Grill, Cat. Col. Scand. etc. p. 11.), *Kongsberg (Münster), *Karasjok (var. Kolströmi, Münster. Coll. Leonhard) Prov. Norland (Coll. Thomson, Mus. Zool. Univ. Berlin). Nyland (Coll. Schuster).

Schweden: Dalarne (Grill. l. c. p. 11).

Rußland und Finnland: Kantalahti, Ponojfluß und Imandra (Lapponia rossica (Coll. J. Sahlberg); *Inari (=Enara) (Krogerus, Sahlbg.); Pinega inferior (Gouv. Archangelsk, Coll. J. Sahlbg.); Petschora-Tundra (Fluß Adsjwa, vergl. Poppius, Col. arkt. Geb. 1910 in Fn. arctica (Bd. V, 312). Im Verzeichnisse von Leder-Schneider (Caucasus) ist die Art nicht enthalten.

Sibirien: Jenissejgebiet: Dudinka (69° 25'). Tolstojnoss *Jenisseisk, Turuchansk, Krasnojarsk (J. Sahlbg., Kgl. Sven. Vet. Akad. Handl. XVII, Nr. 4, 1880, p. 16, vgl. Poppius l. c.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: [Die Verbreitung des Bembidion prasinum Duft. 57-59](#)