

Die Verbreitung von *Saprinus (Pachylopus) dimidiatus* Ill.

(17. Beitrag zur Kenntnis der Histeriden.)

Von H. Bickhardt in Cassel.

Pachylopus dimidiatus Ill. ist ebenso wie sein naher Verwandter *P. maritimus* (ich halte letzteren nur für eine Rasse des ersteren) ein ausschließlicher Küstenbewohner. Er findet sich auf sandige Strände unter den Tangansammlungen oder unter Aas oder unter tierischen Exkrementen, und zwar sehr oft mehrere Zoll tief im feuchten Sande.

Sein Verbreitungsgebiet umfaßt im wesentlichen alle Küstenländer des Mittelmeeres einschließlich aller Buchten und damit verbundenen Meeresteile, wie das Schwarze Meer usw. Ferner kommt *dimidiatus* an der atlantischen Küste der iberischen Halbinsel, Südwestfrankreichs und Marokkos sowie am Strande der Azoren und Kanarischen Inseln vor. Ob er auch die Küsten des Roten Meeres bewohnt, ist noch nicht festgestellt.

P. maritimus Steph. hat sein Verbreitungsgebiet in der Fortsetzung desjenigen des *dimidiatus* an den Küsten von Frankreich, Belgien, Holland und Großbritannien. Der östlichste bekannte Fundort ist die Nordseeinsel Wangeroo.

An der Westküste Frankreichs kommen die beiden Formen nach Angabe meines geschätzten Freundes J. Sainte-Claire Deville, dem ich für seine Unterstützung hiermit meinen besten Dank ausspreche, auf einer verhältnismäßig kurzen Küstenstrecke zwischen La Rochelle und Marennes (Charente Inférieure) zusammen vor.

Eine Reihe von Kollegen hat mich durch Mitteilung von Fundorten oder Übersendung von Material unterstützt; ich sage ihnen allen, deren Namen meist in Klammern neben den Fundorten angegeben sind, hiermit besten Dank für ihre Mitwirkung.


Fundorte des *P. dimidiatus* Ill.

Portugal: Portimás, Algarve [Flach], Leça, Espinho¹⁾ [teste Fuente].
Spanien: Cadix, Valencia, Malaga, Barcelona [coll. m.], Albas [Asturien], Cataluña, Alberes, Balearn, Mallorca [teste Fuente] Caril [Paganetti].

Frankreich: La Rochelle [d'Orbigny, coll. Deville], Arcachon, Cap Breton [Deville], St. Jean-de-Luz [teste Fuente], Biarritz [Deville, Fuente; coll. m.], Collioure [Mayet], La Nouvelle [Gavoy], Béziers, Cette [Deville, Dr. Fiedler; coll. m.], Palavas [Mayet], Aigues-Mortes, Marseille [Abeille], Dep. Var. [Dr. Nodier], Hyères [Abeille], Cannes [Deville; coll. m.].

¹⁾ Fuente gibt diesen Fundort für *maritimus* an (Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 1908, p. 222), es handelt sich sicher um *dimidiatus*.





H. Bickhardt: Die Verbreitung von *Saprinus (Pachylopus) dimidiatus* Jll.

Corsica: Ajaccio Bastia [coll. m.].

Sardinien: Marinella¹⁾ [G. C. Champion].

Sizilien: Mondello, Palermo [Flach].

Italien: Rom, Pompei, Salerno, Rimini [Roubal].

Österreich-Ungarn: Grado (Istrien), Castelnuovo (Dalmatien)
[coll. m.].

Griechenland: Epirus [coll. m.], Phaleron [Flach].

Türkei: Dedeagatsch [Flach].

Bulgarien: Burgas [Rambousek].

Rumänien: Mangalia (Dobroudja) [coll. m.].

Rußland: Odessa [coll. m.].

Außereuropäisches Gebiet: Tunis, Hamman Lif, Aïn-Beïda [Seyzig,
coll. Deville], Bona, Algier, Lobos, Marokko, Kanarische Inseln,
Lanzarote, Azoren [alle auch in coll. m.].

Fundorte von *P. maritimus* Steph.

Frankreich: Marennes [Fauvel, teste Deville], Noirmoutiers [Fauvel],
La Bernerie [Brisout], Le Croisic [Deville], Finistère, Fouesnant,
Morlaix [Hervé], Merville (Calvados) [Dubourgais, coll. Deville],
Beuzeval (Calvados), Boulogne [coll. m.], Dünkirchen [coll. m.].

Belgien: Ostende [coll. m.].

Niederlande: Nach Everts (Col. Nederl.) überall häufig an der
Küste.

Deutschland: Borkum [O. Schneider], Wangeroog [O. Schneider, Die
Tierwelt der Nordseeinsel Borkum, Abh. Nat. Ver. Bremen, XVI,
1, 1898, p. 68].

Großbritannien: a) England: Südküste, Penzance, Plymouth, Ex-
mouth, Weymouth, Portland, Hayling-Island, Southsea, Hastings,
Deal, Margate, Southend [G. C. Champion].

Ostküste: Harwich, Yarmouth, Waxhaw, Hunstanton, Spurn Point,
Stockton [G. C. Champion].

Westküste: Barmouth, Liverpool usw., Insel Man [G. C. Champion].

b) Schottland: sehr selten im Forth-Gebiet [G. C. Champion].

c) Irland: Ulster, Connaught, Leinster, Munster [G. C. Champion].

d) Scilly-Inseln [G. C. Champion].

Bemerkung.

Auf der Karte sind die Fundorte des *dimidiatus* durch rote, die des *maritimus*
durch grüne Punkte gekennzeichnet.

¹⁾ Die Stücke gingen mir von Champion, dem ich hier noch besonders
danke, als *maritimus* zu.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Bickhardt Heinrich

Artikel/Article: [Die Verbreitung von Saprinus \(Pachylopus\) dimidiatus Jll. 201-202](#)