

♀ wie der ♂, Fühlerschaft den Hinterrand des Kopfes nur um seine Dicke überragend; Geißelglieder etwas kürzer, Pro- und Mesonotum zusammen etwas querrechteckig. Vorderecke des Pronotums sehr scharf reckteckig. Abschüssige Fläche des Epinotums fast doppelt so lang wie die Basalfläche, schräg und eben abfallend, die sie beiderseits begrenzenden Kanten bilden je einen sehr breiten, flachen, abgerundeten Zahn; Basalfläche querrechteckig, doppelt so breit wie lang. — Feine Streifung des Kopfes weiter nach hinten ausgedehnt, Stirnfeld, Hinterkopf und Seiten glatt und glänzend. Thorax bis auf die glänzend glatte abschüssige Fläche des Epinotums fein gestreift. Schuppe an der Seite glatt. Behaarung wie ♂. Rotbraun, Gaster dunkelbraun. Flügel schwach bräunlich getrübt, mit braunem Geäder; 1 Cubital- und 1 Discoidal-Zelle, Radialzelle geschlossen. — L. 6 mm. — Liverpool.

Von *ectatommoides* durch Körperform, Skulptur und Behaarung verschieden, aber möglicherweise doch nur eine extreme Unterart.

(Schluß folgt)

Synonymie und neue Fundorte der Braconiden Indiens. (Hym.)

Von Cedric Dover, London.

Im „Report of the Proceedings of the V. Entomological Meeting (Pusa 5th. to 10th. February 1923), pp. 352—362 (1924) hat Herr T. V. Ramakrishna Aiyar sein Verzeichnis der Braconiden Indiens veröffentlicht. Im folgenden gebe ich einige Verbesserungen und Zusätze dazu:

1. *Aphrastobracon flavipennis* Ashmead. Kodaikanal, S. Indien.
 2. *Vipio nursei* Cam.
Vipio unicolor Cam.
Iphiaulax smeenus Cam. } = *Glyptomorpha pectoralis* Brulle (1832)
 3. *Bracon deesae* Cam. = *Glyptomorpha deesae* Cam. Karachi.
 4. *Bracon v-macula* Cam. = *Elphea v-macula* Cam.
 5. *Bracon umbratilis* Cam. = *Campyloneurus umbratilis* Cam. Naga-gebirge, Assam; Luang Prabang.
 6. *Iphiaulax campbelli* Cam. = *Campyloneurus campbelli* Cam.
 7. *Pycnobracon niger* Cam. } = *Campyloneurus niger* Cam.
Iphiaulax sal Cam. }
 8. *Iphiaulax hookeri* Cam. = *Atanycolus hookeri* Cam.
 9. *Iphiaulax greeni* Cam. = *Sigalphogastra greeni* Cam.
 10. *Iphiaulax ernesti* Cam. = *Sigalphogastra ernesti* Cam.
- Fundorte: Simla; Kaluwala, Dehra Dun („on Sal leaf“).

40 Synonymie und neue Fundorte der Braconiden Indiens. (Hym.)

11. *Iphiaulax lineaticarinatus* Cam. ♂
Iphiaulax bhotanensis Cam. ♀
Bracon lepcha Cam. } = *Iphiaulax lepcha* Cam.
Fundorte: Buxa, Bhutan; Khasigebirge, Assam; Sikkim; Rangoon.
12. *Iphiaulax haundrawensis* Cam. Nankaurie, Nicobar Inseln; Luang Prabang; Yon Boi, Hainan.
13. *Iphiaulax spilocephalus* Cam. = *Iphiaulax xanthopsis* Cam.
Fundorte: Disa; Nasik; Karachi; Birma; Elephant Pass, Ceylon.
14. *Campyloneurus trichinotus* Cam. = *Iphiaulax stramineus* Cam.
Fundorte: Tenasserim; Disa.
15. *Iphiaulax fulvopilosus* Cam. = *Macrobracon fulvopilosus* Cam.
16. *Spinaria albiventris* Cam. Sikkim; Laos; Hoabin, Tonkin.
17. *Spinaria leucomelaenea* West. = *Batotheca leucomelaenea* West.
18. *Spinaria spinator* Guer. Nepal.
19. *Exothecus maculipennis* Cam. = *Exobracon maculipennis* Cam.
Chandapur, Gonda, U. P.; Dehra Dun; Pathi, Saharanpur; Hoabin.
20. *Nombrus inarmatus* Cam. = *Holcobracon inarmatus* Cam.
21. *Agathis perornatus* Cam. = *Euagathis perornata* Cam.
22. *Agathis lepcha* Cam.
Agathis nigritarsis Cam. } = *Disophrys forticarinata* Cam.
Agathis forticarinata Cam.
23. *Agathis abuensis* Cam.
Agathis oya Cam. } = *Disophrys kandyensis* Cam.
Agathis kandyensis Cam.
Fundorte: Abu; Disa; Madras; Kandy, Pundaloya, Colombo (Ceylon).
24. *Agathis ceylonicus* Cam. = *Disophrys ceylonicus* Cam.
25. *Agathis subfasciata* Brulle = *Disophrys subfasciata* Brulle.
Fundorte: Disa; Karachi; Nasik.
26. *Microdus tuberculatus* Cam. = *Disophrys tuberculatus* Cam. Calcutta („bred from pupae of the Lasiocampid *Trabala vishnou* Lef.“).
27. *Agathis rufoplagiata* Cam. = *Disophrys rufoplagiata* Cam.
28. *Microdus fumipennis* Cam. = *Disophrys fumipennis* Cam.
29. *Disophrys erythrocephala* Cam. Dehra Dun; Nasik; Disa; Kandy Hlaingdet Thazi, Birmanie; Luang Prabang.
30. *Microdus greeni* Cam. = *Braunsia greeni* Cam.
31. *Braunsia flavipennis* Sm. (Journ. Linn. Soc. Zool., vii, p. 12 ♀, 1863). — Fundorte: Ceram; Sarawak; Luang Prabang; Andaman Inseln.
32. *Cardiochiles ruficollis* Cam. = *Cardiochiles saltator* Fabr.
Fundorte: Disa, nicht Simla; Palaearktisches Faunengebiet.
33. *Cardiochiles fulvus* Cam. Disa; Sigiri, Ceylon.
34. *Ernestiella nigromaculata* Cam. (Spol. Zeyl., III, p. 81, 1905) = *Cardiochiles nigromaculata* Cam.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [14_1925](#)

Autor(en)/Author(s): Dover Cedric

Artikel/Article: [Synonymie und neue Fundorte der Braconiden Indiens. \(Hym.\) 39-40](#)