

Von *Aeg. laevicollis* (= *punctiger*) ♀ unterscheidet sich das vorliegende Stück durch die weit vorgezogenen gerundeten Vorderecken des Prothorax und dessen parallele Seiten, die Zahl der Flügeldeckenstreifen und deren unterschiedliche Punktierung, sowie durch die Einzahl der Dornen an den Mittel- und Hinterschienen.

Hannover, im Dezember 1924.

Fauna sumatrensis.

(Beitrag No. 4).*)

Rutelidae (Col.).

Von Dr. F. Ohaus, Mainz.

(Das Material von Fort de Kock ist von Herrn Edw. Jacobson gesammelt.)

I. Tribus *Rutelini*: Gen. *Parastasia* Westw.

confluens Westw. W. Sumatra: Ampugadang, 150 m, 1924 (A. de Kock S.)

Die Art ist von den Andamanen und Nicobaren im Westen über Malakka, die Sunda-Inseln und Philippinen bis zum westlichen Teil von Neu-Guinea (nicht im Osten dieser Insel) verbreitet. Roepstorff fand Käfer, Larven und Puppen in großer Zahl in einem morschen Baumstamm; ebenso L. J. Toxopeus auf Buru in einem morschen Stamm der Cocospalme; sonst ist über die Biologie dieser interessanten Art nichts bekannt.

nigripennis Sharp. Tambangsawah (Bangkulu).

Die Art ist beschrieben von Palembang: Boenga Maas (v. Hasselt S.) und scheint selten zu sein; ich besitze auch ein Stück aus Borneo: Sarawak (Moulton S.); ihre Biologie ist ganz unbekannt.

II. Tribus *Anomalini*: Gen. *Anomala* Sam.

Subgen. *Aprosterna* Hope-Ohs.

breviceps Sharp. Fort de Kock (Sumatra Westküste), 920 m. — Ampugadang, 120 m.

Beschrieben nach Stücken aus Fort de Kock, Sidjoendjoeng und Padang. Ich besitze sie auch von Sibolangit (Sum. Ostküste) und Siantar (J. B. Corporaal S.)

Subgen. *Anomala* Sam. sens. strict.

chalcescens Sharp. Fort de Kock, 920 m. und Ampugadang, 120 m.

Beschrieben nach Stücken aus Agam, Paja Koemboeh und Rawas District. Ich besitze sie auch aus Paignan (Weyers S.); Pa-

*) Die Beiträge Nr. 1—3 dieser Serie sind unter dem Titel „Sumatranische Insekten“ in den „Entom. Mitteil.“ XIII, 1924, p. 308 und XIV, 1925 p. 51 u. 58 erschienen. Da auch Acarinen etc. demnächst in dieser Serie erscheinen sollen, mußte der Titel etwas geändert werden.

dang Pandjang (Kannegieter S.); Serdang: Lan Rakit (Corporaal S.); Solok; Sibolangit; und von Perak: Kwala Kangsar Grubaur S.).

fuscus Sharp, Tambangsawah (Bangkulu).

Die Art ist beschrieben nach Stücken aus Silago, Moeara Laboe, Loeboek Gadang und Rawas Distr. Ich besitze sie auch von Palembang; Paiguan (Weyers S.); ebenso von Java: Semarang (Drescher S.) und Borneo: Kuching, Baram-Fluß (Moulton S. und Tameang Lajang).

inguinalis Ohs. Fort de Kock, 920 m. und Tambangsawah (Bangkulu)

Beschrieben nach Stücken aus Java: Malang und Nias, findet sie sich auf Sumatra auch in Tebing-tinggi (Dr. Schultheiss S.) Palembang; Manna (Knappert S.).

saetipes Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Auf Sumatra, Borneo und Java nicht selten.

varicolor Gyll. Fort de Kock, 920 m; Ampu Gadang, 150 m.

Die Art ist über den westlichen Teil des malayischen Archipels Philippinen, Süd-China, Hinterindien und Teile von Britisch Indien verbreitet.

Windrathi Nonfr. Tambangsawah.

Beschrieben nach Stücken aus Borneo, findet sie sich vereinzelt auch auf Sumatra. Die Fundortsangabe Siam erscheint fraglich

xanthopyga Ohs Fort de Kock.

Auf Sumatra auch in Medan: Dolok Barros; Bekassa und Lan Rakit (Corporaal S.); ferner auf Java.

Subgen. *Euchlora* Macleay.

chalcites Sharp. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken von Silago, Moeara Laboe, Loeboek Gadang, Indrapoera, 1000 m, Padang, Rawas District, ist die Art überall auf Sumatra häufig, auch auf Nias, jedoch nicht auf Java und Borneo, wie Sharp angibt; ihre Biologie wie die der übrigen *Euchlora*-Arten ist noch ganz unbekannt.

colobocaula Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken aus Bedagei; Manna; Tandjoeng Poesa; auch auf Nias gefunden (v. Hasselt S.).

diglossa Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Auf Sumatra weit verbreitet, aber selten; außerdem auch von Perak bekannt: Kwala Kangsar (Grubauer S.).

nigrescens Ohs. var. *foliacea* Ohs. Fort de Kock, 920 m; Ampugadang, 200 m.

Beschrieben nach Stücken aus Padang (E. Jacobson S. IX. 1913).

phyllochroma Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken aus Padang und Agam (F. Drescher S.) und auf Sumatra weit verbreitet, wenn auch selten; die in der Beschreibung erwähnten Stücke aus Java ohne nähere Fundortsangabe stammen von dem Naturalienhändler H. Fruhstorfer und erscheint die Fundortsangabe zweifelhaft.

ptenomeloides Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Wie die vorhergehende Art, mit der sie meist zusammen gefunden wird, ein Gebirgstier und auf Sumatra weit verbreitet, aber selten gefunden. Grubauer fand sie auch auf dem Kwala Kangsar.

semipurpurea Burm. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken aus Sumatra und überall auf der Insel häufig.

Gen. *Mimela* Kirby.

discoidea Burm. subsp. *sumatrana* Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Die Nominatform ist beschrieben nach Stücken aus Java und die Unterart beschrieb ich nach Stücken aus Deli, Siboga, Padang und Paignan auf Sumatra.

III. Tribus **Adoretini**: Gen. *Adoretus* Lap.

compressus Web. Fort de Kock, 920 m.

Der Käfer ist als Imago und Larve Kulturschädling und mit Kulturpflanzen weit verschleppt, von Batavia aus, von wo die Art beschrieben wurde, östlich bis Djilolo, westlich bis zum Kapland. Hier, wie auf Ceylon ist er bald nach der Einschleppung wieder ausgestorben; ob er da, wo er sich nach dem Einschleppen länger gehalten hat, wie auf Sumatra, Borneo, Hinterindien, besondere lokale Rassen bildet, vermag nur eine genaue Untersuchung an einwandfreiem Material zu entscheiden.

Une race peu connue d'*Onthophagus* de la Chine méridionale (Col.)

par A. Boucomont.

Onth. viduus flavopunctatus d' Orb.: *Ovatus sat latus nitidus castaneus subaeneus elytris dilutioribus luteo vel rufomaculatis macula basali et altera apicali epipleuris rufis pygidio rufo medio infuscato femoribus quatuor posticis plerumque rufis, pectoris et abdominis lateribus rufomaculatis, antennarum clava rufocinerea; supra glaber tamen elytrorum lateribus brevissime fulvopilosis. Capite subrotundato apice*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [14_1925](#)

Autor(en)/Author(s): Ohaus Friedrich

Artikel/Article: [Fauna sumatrensis. Rutelidae \(Col.\). 176-178](#)