

phyllochroma Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken aus Padang und Agam (F. Drescher S.) und auf Sumatra weit verbreitet, wenn auch selten; die in der Beschreibung erwähnten Stücke aus Java ohne nähere Fundortsangabe stammen von dem Naturalienhändler H. Fruhstorfer und erscheint die Fundortsangabe zweifelhaft.

ptenomeloides Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Wie die vorhergehende Art, mit der sie meist zusammen gefunden wird, ein Gebirgstier und auf Sumatra weit verbreitet, aber selten gefunden. Grubauer fand sie auch auf dem Kwala Kangsar.

semipurpurea Burm. Fort de Kock, 920 m.

Beschrieben nach Stücken aus Sumatra und überall auf der Insel häufig.

Gen. *Mimela* Kirby.

discoidea Burm. subsp. *sumatrana* Ohs. Fort de Kock, 920 m.

Die Nominatform ist beschrieben nach Stücken aus Java und die Unterart beschrieb ich nach Stücken aus Deli, Siboga, Padang und Paignan auf Sumatra.

III. Tribus **Adoretini**: Gen. *Adoretus* Lap.

compressus Web. Fort de Kock, 920 m.

Der Käfer ist als Imago und Larve Kulturschädling und mit Kulturpflanzen weit verschleppt, von Batavia aus, von wo die Art beschrieben wurde, östlich bis Djilolo, westlich bis zum Kapland. Hier, wie auf Ceylon ist er bald nach der Einschleppung wieder ausgestorben; ob er da, wo er sich nach dem Einschleppen länger gehalten hat, wie auf Sumatra, Borneo, Hinterindien, besondere lokale Rassen bildet, vermag nur eine genaue Untersuchung an einwandfreiem Material zu entscheiden.

Une race peu connue d'*Onthophagus* de la Chine méridionale

(Col.)

par A. Boucomont.

Onth. viduus flavopunctatus d' Orb.: *Ovatus sat latus nitidus castaneus subaeneus elytris dilutioribus luteo vel rufomaculatis macula basali et altera apicali epipleuris rufis pygidio rufo medio infuscato femoribus quatuor posticis plerumque rufis, pectoris et abdominis lateribus rufomaculatis, antennarum clava rufocinerea; supra glaber tamen elytrorum lateribus brevissime fulvopilosis. Capite subrotundato apice*

vix truncato genis obtuse projectis. Prothoracis lateribus antice rotundatis postice leviter sinuatis, basi vix perspicue marginata, sulco medio fere nullo, superficie crebre disco tenuiter lateribus fortius punctata. Elytrorum striis sat latis transversis punctis leviter notatis interstitiis convexis haud seriatim punctatis punctis ad suturam simplicibus ad latera asperis et subgranosis. Pygidio crebre inaequaliter punctato.

♂. *Capite minute aequaliter punctato clypei apice reflexo fronte carina curvata sat brevi ante oculos munita, vertice mutico. Prothorace duobus turbinatis tuberculis inter se sat propinquis post medium armato, antice subcavato.*

♀. *Clypeo rugato capite bicarinato frontis carina subelongata curvata, verticis postice subangulata inter oculorum antica ora posita. Prothorace mutico antice brevissime declivi.*

Long. 6—7 millim. Chine méridionale: Pingshiang (Dr. Kreyenberg). Collection du Deutsche Entomologische Institut.

Voisin aussi d' *O. Duporti* Bouc. (Ann. Mus. Genova, XLVI, 1914 p. 228), en diffère par la taille plus grande, par la finesse de la marge basale du thorax, par la ponctuation uniformément assez fine, sans mélange de points plus fins, par l'absence de tubercule au sommet du thorax dans les deux sexes, par l'absence de carène sur le vertex chez le mâle et par la carène anguleuse du vertex chez la femelle.

La tache basale des élytres est placée sur les 5^o et 6^o intervalles et s'étend très étroitement sur la base des précédents; la tache apicale occupe le sommet de tous les intervalles, sauf le sutural et enclot une petite tache foncée transverse.

Eine neue Distipsidera aus Neu-Guinea (Col.).

Von Walther Horn, Berlin-Dahlem.

Distipsidera Thiertelderi n. (n. sp.): *Species generis maxima; discoidali media elytrorum signatura deficiente; elytrorum margine inter maculam marginalem mediam et ante-apicalem glabro, sparsissime punctato. Long. 19 mm (sine labro). — Differt a. D. Gruti* ♀ *statura majore longiore; labro longiore antice angustiore; oculis magis prominentibus; prothorace angustiore, lateribus minus curvatis; elytris longioribus angustioribus, rugis minus profundis et in disco posteriore minus longis, sculptura totum marginem lateralem versus multo leviore rarioreque (rugis hoc in loco deficientibus; punctis insculptis, praecipue pone medium, multo rarioribus parvis) Pedibus multo longioribus. Tota superficie fera nigra. Signatura: macula basali, humerali, posthumerali parvis longe separatis; margine medio macula parva longitudinali (fere aequae atque ante-apicem) ornato.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [14_1925](#)

Autor(en)/Author(s): Boucomont-Cosne A.

Artikel/Article: [Une race peu connue d'Onthophagus de la Chine méridionale 178-179](#)