

Fauna sumatreensis.

(Beitrag Nr. 9).

Melolonthini (Col.)

Von J. Moser, Ellrich a. H.

Autoserica sincera Brsk.; Fort de Kock (Sumstras Westküste coll. Ed. Jacobson). 920 m.

Autoserica rufescens Nonfr.; Fort de Kock.

Autoserica Moffartsi Brsk.; Fort de Kock.

Autoserica limbata Brsk.; Fort de Kock.

Microserica pulchella Brsk.; Fort de Kock.

Microserica striata Brsk.; Fort de Kock.

Microserica singalangia Brsk.; Fort de Kock.

Microserica vittipennis (*n. sp.*): Statura *M. pulchellae* Brsk. Lutea opaca, capite, elytrorum sutura vittaque disci nigris. Capite punctato, fronte opaca, clypeo medio paulo convexo, margine antico reflexo, sub-sinuato; antennis fulvis, 10 articulatis, flabello maris 4 articulato, stipiti longitudine subaequali, flabello feminae 3 articulato, stipite paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, setosis, angulis anticis paulo acutis porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso subtiliter punctato, margine antico medio plus minusve nigrescente; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, fere laevibus; pygidio sat crebre punctato, ante apicem setoso. Subtus pectoris lateribus coxisque posticis punctatis, coxis juxta latera setosis, abdominis segmentis transversim setosis, femoribus posticis modice dilatatis, margine postico in parte apicali sinuato; tibiis posticis paulo abbreviatis et paulo dilatatis. — Long. 4 mm. Fort de Kock.

Die Art ist von der Gestalt der *M. pulchella* Brsk. Alle vorliegenden 15 Exemplare sind gleich gefärbt. Das Halsschild ist braun, ein mehr oder weniger deutlicher Fleck in der Mitte des Vorderrandes ist schwärzlich. Auf den Flügeldecken befindet sich die schwarze Längsbinde nicht wie bei *pulchella* am Seitenrande, sondern sie zieht von der Schulter nach dem Endbuckel, während die Seiten der Flügeldecken, mit Ausnahme eines ganz schmalen beborsteten schwarzen Randes, braun gefärbt sind. Die Unterseite ist bei allen Exemplaren braun, bei *pulchella* braungrün. — Typen im Museum in Leyden, Cotypen in meiner Sammlung.

Apogonia expeditionis Rits.; Fort de Kock.

Apogonia neglecta Brsk.; Fort de Kock; Ajer Bangis.

Apogonia laevicollis Lsbg.; Fort de Kock.

Apogonia Leeuweni Brsk.; Ajer Bangis.

Apogonia Vethi Mos.; Ajer Bangis.

Psilopholis vestita Sharp.; Fort de Kock.

Exopholis hypoleuca Wied.; Fort de Kock.

Lepidiota stigma F und var. *alba* F.; Padang (Sumatras Westküste); Fort de Kock.

Holotrichia sumatrensis Sharp.; Fort de Kock.

Holotrichia convexa Sharp.; Fort de Kock.

Microtrichia Sharpi Brsk.; } Ampugadang (Sumatras Westküste); Fort de Kock.

Microtrichia pumila Sharp.; }

Schoenherria Argus Burm., Fort de Kock; Ampugadang; Tambangsawah (Bengkulu).

Hoplia pulchella Mos.; Fort de Kock.

Fauna sumatrensis.

(Beitrag Nr. 10).

Cetonini (Col.)

Von J. Moser, Ellrich a. H.

Prigenia squamosa Rits.; Fort de Kock (Sumatras Westküste). 920 m.

Heterorrhina sexmaculata F.; Fort de Kock; Tambangsawah (Bengkulu).

Agestrata orichaleca L.; Padangpandjang (Sumatras Westküste).

Thaumastopeus viridiaeneus G.P.; Fort de Kock.

Clinteria vidua Voll., Padangpandjang.

Clinteria egens Voll.; Fort de Kock.

Macronota adspersa Mos.; Tambangsawah.

Macronota cinerea G.P. var. *variegata* Wall.; Fort de Kock.

Macronota monacha G.P.; Tambangsawah.

Macronota trifasciata Krtz.; Tambangsawah.

Macronota regia F. var.; Fort de Kock.

Coelodera Maindroni Bourg.; Ampugadang (Sumatras Westküste) 120 m; Tambangsawah.

Cetonia Jacobsoni (n. sp.): *C. Rhododendri* Gestro simillima, prae-
cipue differt: prothorace postice latiore, juxta margines laterales setoso
Cuprea vel viridi-cuprea, supra opaca, subtus nitida, albido-maculata
Capite nitido, fortiter punctato, margine antico bilobato, fronte medio
leviter carinata, utrinque juxta carinam setosa; prothorace postice latiore
quam longiore, antrorum fortiter angustato, lateribus leviter curvatis,
dorso albo 4 punctato, medio parce juxta latera densius aciculato-punctato,
punctis griseo-setosis; scutello laevi; elytris juxta suturam laxe, ad latera
versus densius aciculato-punctatis, sparsim albido-maculatis, sutura postice
elevata, spinosa; pygidio granuloso, subrugoso, albido-4-maculato. Subtus
pectoris medio laevi, pectoris lateribus fortiter sat crebre aciculatis, fla-
vido-pilosis, abdominis segmentis in mare flavidoo-quadrifaciatatis, in femina
bimaculatis, abdominis medio sparsissime, abdominis lateribus paulo densius
aciculato-punctatis, punctis setosis, abdominis segmento ultimo in mare

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [14_1925](#)

Autor(en)/Author(s): Moser J.

Artikel/Article: [Fauna sumatrensis. Melolonthini \(Col.\) 252-253](#)