

I am greatly indebted to Mr. S. A. Rohwer, Entomologist, in charge of Taxonomic Investigations, United States Department of Agriculture, for much information and valuable criticism in preparing the present paper.

Systematische und faunistische Notizen über Käfer, nebst einem neuen *Colpodes*.

Von Dr. K. M. Heller, Dresden.

(Schluß).

- VIII, 2245. — *Pseudopocyptus productus* Heller (Phil. Journ. Sc. VII, 1912, 330) Philippinen, von Luzon, Prov. Nuova Viscaya: Imugan, ges. v. G. Boettcher.
- VIII, 2528. — *Alcides laetus* Heller (Ent. Z. Stettin 1908, 165, Taf. 1, Fig. 3) Borneo, auch von der Insel Siargo (N.-O. von Mindanao), ges. von G. Boettcher.
- VIII, 2528 — *Alcides albolineatus* Boh. D. Ent. Zeitschr. 1922, 3, 5. Zeile v. o. muß heißen *A. sexvittatus* Faust (Ann. Mus. Genova 1894, 243) nom. nov. für *A. albolineatus* Roelofs Ann. Soc. Ent. Belg. 1875, 152.
- VIII, 2315. — *Aesiotes notabilis* Pasc. Queensland, kommt nicht, wie man aus W. Schultzes Catal. Philipp. Coleopt. 1915, 141 entnehmen könnte, sondern nur in der von mir als var. *sachezei* beschriebenen Form auf den Philippinen vor, von der ich ein zweites, mit dem Typus genau übereinstimmendes Stück, ebenfalls aus Luzon, Prov. Benguet: Bagnio (bei Dr. O. Staudinger und Bang Haas) sah, das es sehr wahrscheinlich macht, daß es sich bei der philippinischen Form mindestens um eine Subspezies handelt, die außer durch die rotbraune Färbung, durch folgende plastische Merkmale zu unterscheiden ist: Halsschild kürzer, sein Vorderrand viel schwächer zweihöckerig, Schildchen kleiner, in der halben Länge nicht eingeschnürt, Fld. viel schwächer gekörnelt, die Naht ganz ohne Körnerreihe, die gekörnte Leiste auf dem zweiten Spatium vor dem Deckenabsturz nicht so hoch, weniger scharf nach innen umgebogen und schwach gekörnelt, der subapikale Zapfen an der Spitze von Spatium 4 und 5 kürzer und mehr seitlich gerichtet.
- VIII, 2589. — [*Arachnopus biplagiatus* G. A. K. Marshall (Trans. Zool. Soc. XX, Part 16, 1915, 526) = *A. fimbriatus* Heller, Nova Guinea. Leiden 1914, 656.
- IX, 2724. — *Eugigas whiteheadi* Jord, W. Schultze Catal. Philipp. Col. 1915, 121 gehört in die Gattung *Meganthribus* Jord. Nov. Zoolog. XX, 1913, 263.
- IX, 2724. — *Mecocerus guttata jordani* Heller, W. Schultze, Catal

- Philipp. Col. 1915, 121 ist als eine *Mecocerina* Jord. Ent. Zeit. Stettin 1895, 164 beschrieben, in welche Gattung sie auch gehört.
- 73, 136. — *Calymnophis* Thoms. Coleopter. Catalogus, 1922, muß *Calymnophis* heißen.
- 73, 219. — [*Heteroclytomorpha*] *davoana* Heller Philipp. Journ. Sc. XIX, 1921, 538 ist besser zu *Homonoeca* zu stellen.
- 73, 221. — [*Heteroclytomorpha*] *quadripunctata* Heller Tijdschr. voor Ent. 1923, 40 ist in die Gattung *Homoomorpha* Auriv. zu stellen.
- ✓ 73, 247. — [*Alidus biplagiatus* Gah. (Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, 258)] = *Mesosa bispecularis* White muß jetzt *Alidus bispecularis* White heißen.
- ✓ 73, 282. — [*Mycerinella subbifasciata* Heller (Ent. Mitteil. 1924, 203)] = *Eunidia philippinarum* Auriv. (Ark. f. Zoolog. 1922, 21); die Bemerkung daselbst „Eine ächte *Eunidia*“ ist insofern irreführend, als das 3. Fühlerglied bei dieser Art unbewehrt, bei den typischen *Eunidia*-Arten aber bewehrt ist.
- ✓ 74, 512. — *Moraecamus* Schultze, Catal. Philipp. Col. 1915, 122 recte: *Moraegamus cosmopolita* Thoms. = *Nupserha fricator* Daln.
- 59, 83. — *Trichochrysea bhamoensis* M. Jacoby, Fauna Brit. India, Col. 1908, 388 wird in Coleopter. Cat. 59, 83, synonym zu *Heterapis bhamoensis* Jac. (Ann. Mus. Genova XXXII, 1892, 910) gezogen, was nach den Beschreibungen kaum möglich zu sein scheint. (Letztere ist u. a. 5.5 mm, erstere 9 mm lang!)
- ✓ 39, 426. — [*Dere virescens* Aur. Ark. f. Zool. XV, 1923, 8] = *Dere philippinensis* Heller D. Ent. Zeitschr. 1923, 420.
- 72, 134. — *Macronota annae* Wallace [Trans. Ent. Soc. (3) IV, London 1868, 558] fehlt im Coleopteror. Cat. 1921, 72, 134.
- 72, 91. — *Gymnetis atropurpurea* ist nicht Schaum, sondern Burmeister 1842 der Autor, ersterer erwähnt die Art (Ann. Soc. Ent. France 1845, 41) nur, ohne sie zu beschreiben (Citat in Gemm. & Har. Cat. IV, 1288, lückenhaft und daher unverständlich).
- 73, 143. — [*Agelasta villosicornis* Aur. Ark. f. Zool. XV, 1923] = *A. isthmicola* Heller Entomolog. Mitt. XII, 1923, 207, auf Grund freundlicher Mitteilung des Herrn B. Schwarzer.
- 73, 144. — *Choeromorpha subviolacea* Heller (Ent. Mitt. XII, 1923, 209) Negros, auch von der Ins. Masbate: Aroroy, ges. G. Boettcher.
- ✓ 73, 247. — *Proteuclea [sulfureomaculata* Schultze, 1916] = (*Euclea cynthia* Thoms.
- Berichtigung. Im vorhergehenden Teil dieser Notizen (Ent. Mitt. XV, 1925, 92) ist die unter VIII, 2184 gemachte Bemerkung über *Antinia*, von „außerdem an, zu streichen und unter VIII, 2564a, 2. Zeile „*leucometobus*“ in *leucometopus* zu berichtigen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [15_1926](#)

Autor(en)/Author(s): Heller Karl Maria

Artikel/Article: [Systematische und faunistische Notizen über Käfer, nebst einem neuen Colpodes. 195-196](#)