

Lycosa vagula (Thor.) — 3 ♀ aus Simalur.

Lycosa rabulana (Thor.) — 5 ♀ aus Simalur, 2 ♀ aus Pulu-Babi.

H. Sauter's Formosa-Ausbeute: *Heteromera* [ex parte] (Col.).

Par M. Pic.

Les Coléoptères-Hétéromères groupés ici comprennent les *Oedemeridae* et le genre *Ospbia* Ill. (in *Melandryidae*). Les types uniques des nouveautés se trouvent dans les collections du Musée de Berlin-Dahlem mais je possède aussi des types de *Oedemera Sauteri* et *testaceithorax*.

Oedemeridae. *Ananca*? sp. Anping.

Je n'ose pas nommer cette espèce dont je n'ai vu qu'un seul exemplaire privé d'antennes. Cet insecte est robuste, en partié roussâtre sur l'avant corps avec les élytres obscurcis sur le disque et en arrière, le dessous (sommet de l'abdomen obscurci), les pattes, palpes et le 1^{er} article des antennes, seul existant, tectacés.

Eobia florilega Lewis, ou sp. près. — Anping. Espèce entièrement testacée, sauf les yeux noirs et l'abdomen plus ou moins foncé; tarses et antennes, moins leur base, parfois d'un roux brunâtre.

Eobia formosana Pic (Mélanges Exot.-Ent. 39, 1923, p. 31) Anping.

Cette espèce a été confondue tout d'abord avec *E. chinensis* Hope et paraît s'en distinguer, à première vue, par les antennes noires à la base et diversement teintées de roux à l'extrémité.

Eobia curticornis Pic et var. — Tainan, Anping.

Parfois chez cette espèce, (décrite en 1911¹⁾, le prothorax devient testacé, c'est alors la var. nov. *diversithorax*.

Asclera rugosipennis Pic. — Kosempo, Taihorin, Shis, Kankau.

Espèce décrite en 1910 dans l'Echange, ainsi que la suivante, les deux provenant de ma collection.

Asclera formosana Pic, Kosempo, Shis.

Oedemera Sauteri n. sp. — Hokuto, Kosempo.

Elongatus, subnitidus, griseo pubescens, viridescens, thorace aureo, antennis plus minuscule, palpis, abdomine apice testaceis; pedibus obscuris et simplicibus ♀, femoribus positcis dilatatis et pro parte testaceis ♂.

Allongé, un peu brillant, revêtu d'une pubescence grise, fine et peu serrée, verdâtre, avec le prothorax à reflets dorés, partie des antennes, palpes, extrémité de l'abdomen et un peu plus de la moitié des cuisses postérieures chez ♂ testacées. Tête longue, ruguleusement ponctuée, impressionnée entre les yeux; antennes testacées, plus ou moins rembrunies à l'extrémité; prothorax un peu plus long que large, sinué sur les côtés,

¹⁾ Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 188.

peu élargi en avant, inégal et rugueusement ponctué sur le disque; élytres rtroits et longs, longuement déhiscent, marqués chacun des 3 côtes nettes; dessous du corps vert brillant, sommet de l'abdomen ou pygidium testacé; pattes grêles et foncées chez ♀, cuisses postérieures épaissies largement testacées à la base ♂ Long. 8—10 mm.

Par son système de coloration et la diversité sexuelle se rapproche *Oe. sexualis* Mars., en diffère par la coloration dorée du prothorax, les cuisses du ♂ non complètement testacées et la coloration de l'abdomen ♀

***Oedemera testaceithorax* Pic.** — Hokuto, Kosempo, Shis.

Elongatus, nitidus, griseo pubescens, viridescens aut cyaneo-viridis, thorace, abdomine, apice, antennis palpisque plus minusve testaceis, tibiis anticis diverse rufotestaceis, aliquot fere nigris, femoribus posticis plus minusve dilatatis ♂. — Long. 8—10 m.

Voisin de l'espèce précédente dont elle se distingue nettement par le prothorax non ruguleux et testacé; voisin également de *Oe. flaviventris* Fairm., mais cette dernière espèce à l'abdomen entièrement testacé.

Antérieurement étudié et possédé par moi de Chine.

Melandryidae.

***Osphya formosana* n. sp.** — Kosempo.

Elongata, subparallela, nitida, griseo pubescens, niger, elytris subcaeruleis, capite antice, thorace, pygidio, antennis pedibusque pro parte testaceis.

Allongé, subparallèle, brillant, revêtu d'une pubescence grise conchée pas très dense, noir avec les élytres blenâtres à reflets métalliques, devant de la tête, prothorax, pygidium, partie des antennes et des pattes testacés. Tête assez longue, très penchée, noire en arrière, testacée en avant à partir du devant des yeux, peu fortement et densément ponctué; antennes peu longues, grêles, testacées avec les articles medians tachés de brun prothorax plus large que la tête, pas très large, un peu arqué et rabattu sur les côtés, un peu plus étroit en arrière, peu fortement et densément ponctué; écusson large, pubescent de gris; élytres un peu plus larges que le prothorax, convexes, longs, courtement rétrécis à l'extrémité, un peu déhiscent au sommet, à ponctuation un peu ruguleuse, pas très forte et très dense; pattes noires avec les cuisses et la base des tibias testacées dessous du corps foncé, abdomen un peu taché de roux, pygidium testacé. — Long. 7 mill.

Plus allongé que *O. aeneipennis* Krich., élytres moins brillants et moins métalliques, tête un peu plus allongée.

Sauter a recueilli à Tainan une autre espèce d'*Osphya* Ill. que j'ai nommée *trilineata* et dont le type se trouve dans ma collection.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [16 1927](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Heteromera \[ex parte\] \(Col\). 48-49](#)