

Zur Erforschung des Persischen Golfes.

(Beitrag Nr. 5).

Orthoptera.

Von B. P. Uvarov, London.

Die kleine Ausbeute von Herrn Schmidt am Persischen Golfe enthält zwar keine neuen oder geographisch unerwarteten Arten; da aber die Fauna noch außerordentlich schlecht bekannt ist, sind alle exakten Daten wertvoll.

Blattidae.

Polyphaga aegyptiaca L. Basra, 13.—15. IV., 1 ♂

Polyphaga sp.: Buschehr, 1.—5. V. 1 larva ♀.

Gryllidae.

Gryllus sp. Buschehr, 1.—5. V. 1 larva.

Gryllotalpa africana P. B.: Basra, 13.—15. IV., 1 ♀.

Tridactylus variegatus Latr.: Basra, 14. IV., 1 ♀.

Acrididae.

Acridella miniata Klug.: Basra, 16.—22. IV., 1 ♂.

Sphingonotus octofasciatus Serv.: Basra, 13.—15. IV., 12 ♂♂, 26 ♀♀

savignyi Sauss.: Buschehr, 29.—30. IV., 2 ♀♀.

rubescens Wlk.: Basra, 13.—15. IV., 1 ♀.

„ *satrapes* Sauss.: Bender-Abbas, 27.—29. V., 1 ♀.

Acrotylus insubricus Scop.: Basra, 13.—15. IV., 1 ♀; Buschehr., 29. bis 30. IV., 1 ♀.

Chrotogonus lugubris Blanch.: Buschehr, 22. — 30. IV., 1 ♀.

Pyrgomorpha conica Ol.: Basra, 16.—22. IV., 1 ♀.

Anacridium aegyptium L.: Basra, 16.—22. IV., 1 ♀; Buschehr, 1.—5. V., 1 ♀.

Schistocerca gregaria Forsk.: Koweit, 1 ♀, 2 larvae.

Tropidopola cylindrica obtusa Uv.: Basra, 16. — 22. IV., 1 ♂.

Zoogeographisches Ergebnis: Alle obengenannten Arten gehören zu der paläarktischen Wüsten-Subregion (Eremian subregion; Uvarov, Proc. Zool. Soc. London, 1921, S. 450) und man kann darunter keine Spuren von äthiopischen Arten, die in Südarabien erscheinen, entdecken. Von echten orientalischen (indischen) Arten sind auch keine in der Sammlung vertreten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [16_1927](#)

Autor(en)/Author(s): Uvarov B.P.

Artikel/Article: [Zur Erforschung des Persischen Golfes. Orthoptera. 186](#)