

seltener von gemeinen Arten, ist es der Kennerschaft nur allzu leicht Schiebungen vorzunehmen, die vielleicht erst nach Jahrzehnten von einem Fachmann aufgedeckt werden. Einen derartigen Mißbrauch seiner Kenntnisse einem verpflichteten und auskömmlich bezahlten Beamten, dem an der Vermehrung und Erhaltung der Sammlung aus persönlichem Interesse gelegen sein muß, noch dazu bei dem relativ geringen Geldeswert der Objekte, zumuten zu wollen, scheint ebenso der Berechtigung zu entbehren, wie einer so umständlichen Inventarisierung, wie der anfangs erwähnten, das Wort reden zu wollen.

Nouveaux Coleoptères exotiques.

Par M. Pic, Digoïn.

Les types des nouveautés décrites ci-dessous appartiennent à diverses familles et font partie des collections du Musée de Dahlem, mais je possède des co-types de: *Orphinus Horni*, *Mesocaelopus rufescens*, *Theca bicolor*, *Bruchus Sauteri*, *Aploglossa* v. *Germaini*.

Attagenus rufiventris n. sp.: Transvaal (Hartmann).

Oblongus, nitidus, rufus, supra niger, regulariter sat sparse griseo aut fulvo pubescens, elytris in singulo ad scutellum rufo rotundato-maculatis et antice rufo fasciatis, fascia sat lata, suturam non attingente, paulo obliqua, externe ad humeros remota. Thorace valde transverso, mediocre et dense punctato; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, postice paulo attenuatis, mediocre sat sparse punctatis. — Long. 5 mm.

Espèce distincte entre toutes par les dessins particuliers des élytres. Peut se placer près de *A. fulvicollis* Reitt.

Attagenus rufimembris n. sp.: Zanzibar.

Oblongus, nitidus, niger, membris rufis, regulariter sat sparse griseo pubescens, thorace elytrisque ad basin signaturis auratis ornatis. Thorace sat breve, antice attenuato, mediocre sat dense punctato, supra lateraliter, medio aurato notatis; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, postice paulo attenuatis, mediocre sat dense punctatis, antice aurato fasciatis, fascia fere recta et ad scutellum, in singulo, aurato maculatis. — Long. 5 mm.

Voisin du précédent, très distinct par le dessous du corps foncé, le prothorax moins court, orné de dessins faits d'une pubescence jaune dorée, les élytres à fascie étroite non rousse, mais composée de poils d'un jaune doré, ainsi que la macule près de l'écusson.

Thaumaglossa rufiventris n. sp.: Kamerun (Conradt).

Subovata, nitida, sparse griseo pubescens, elytris antice arcuate griseo fasciatis, niger, membris abdomineque rufis, elytris apice rufo marginatis. Thorace breve et lato, antice paulo attenuato, postice medio arcuate lobato,

lobo apice depresso, utroque oblique et reducte sulcato, lateraliter mediocre, medio minute et sparse, punctato; elytris latis et brevibus, postice paulo attenuatis, sat fortiter, pro parte dense, punctatis; pygidio rufo, luteo pubescente. — Long. 3 mm.

Très voisin de *T. rufoapicalis* Pic, en diffère par les élytres moins marqués de roux au sommet, le ventre roux et la présence, de chaque côté du lobe médian du prothorax, d'un sillon oblique très marqué.

Thaumaglossa Conradti n. sp.: Kamerun (Conradt).

Subovata, nitida, sparse luteo pubescens, elytris brevior et parum dense griseo pubescentibus, niger, pedibus rufis, pygidio brunneo, luteo pubescente. Thorace breve et lato, antice paulo attenuato, postice medio arcuate lobato, utroque parum impresso, minute plus minusve sparse punctato; elytris latis, sat brevibus, postice attenuatis, sat fortiter et parum sparse punctatis — Long. 4 mm.

Plus grand que le précédent avec les élytres moins courts, dépourvus de bande grise; très distinct, d'autre part, de *T. Hilleri* Reitt., par la ponctuation moins forte, ou moins dense, surtout sur les élytres, d'où aspect plus brillant.

Orphinus Horni n. sp.: Ceylon: Anuradhapura (W. Horn, 1899).

Subovatus, parum convexus, nitidus, sparse sat longe griseo pubescens, niger, vage subaenescens, antennis pedibusque testaceis. Capite fortiter sat dense, thorace mediocre et sparse, punctatis, illo breve et lato, antice attenuato, lobo breve producto, postice arcuato; elytris thorace non latioribus, brevibus, postice attenuatis, sparse et diverse, pro parte fortiter, et ruguloso-punctatis. — Long. 2—2,5 mm.

Voisin de *O. malabarensis* Pic, mais s'en distinguant, à première vue, par la forme moins allongée et la ponctuation plus nette ou plus forte; diffère, d'autre part, de *O. funestus* Arrow, par les membres testacés, le dessus peu convexe et la ponctuation pas plus forte sur les côtés qu'au milieu des élytres.

Calymmaderus humilis var. nov. *latior* — Brésil: Blumenau.

Oblongo-subovatus, nitidus, glaber, ruber, elytris nigris; articulis tribus ultimis antennarum validis; thorace breve, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris thorace sat latioribus, humeris prominulis, sat brevibus, pro majore parte minute et sparse punctatis. — Long. 3 mm.

Diffère de *C. humilis* Pic par les élytres débordant nettement la base du prothorax et plus courts, la ponctuation plus espacée.

Mesocoelopus rufescens n. sp.: Zanzibar.

Oblongo-subovatus, convexus, nitidus, luteo holosericeo pubescens, rufus, oculis nigris. Thorace breve et lato, minute denseque punctato, luteo pubescente, pro parte denudato; elytris sat brevibus, postice valde

attenuatis, sat uniformiter luteo pubescentibus, minute et dense punctatis, lateraliter valde compressis, humeris paulo prominulis. — Long. 3 mm.

Voisin de *M. niger* Müll. mais plus large, moins foncé, avec la pubescence non disposée de façon continue sur le prothorax.

Theca bicolor n. sp.: Zanzibar.

Oblongo-subovata, nitida, sparse griseo pubescens, supra longe hirsuta, nigra, scutello, elytris abdomineque rufis. Capite thoraceque minute sat sparse punctatis, illo breve et lato, antice paulo attenuato; elytris thorace non latioribus, brevibus, apice breve attenuatis, minute striatis, striis externis sat impressis, intervallis latis, ad scutellum punctatis, humeris prominulis; membris nigris. Long. 2,5 mm.

Peut se placer près de *T. Oneili* Pic, plus court, élytres à stries plus fines, intervalles plus larges. Coloration particulière qui permet de reconnaître cette espèce à première vue.

Caenocara Conradti n. sp.: Kamerun (Conradt).

Subovata, convexa, nitida, sparse albo pubescens et paulo hirsuta, rufa, scutello, elytris pectoreque nigro-piceis, antennis testaceis, articulis tribus ultimis grandis, diversis. Capite thoraceque minute sat sparse punctatis, illo breve et lato, antice medio subarcuato; scutello parvo; elytris thorace non latioribus, humeris prominulis sed rotundatis, brevibus, postice paulo attenuatis, fortiter et sparse punctatis, ad suturam uni (et reducte)-sulcatis, lateraliter trisulcatis, sulcus infrahumeralis reductus. — Long. 2 mm.

Espèce très distincte par sa coloration et la structure des élytres qui ont une strie présuturale antérieure raccourcie laissant, entre elle et la suture, un petit espace surélevé presque lisse, commun aux deux étuis.

Bruchus Sauteri n. sp.: Formosa: Kankau (H. Sauter, VII. et VIII. 1912).

Oblongus, antice valde attenuatus, parum nitidus, uniformiter parum dense griseo pubescens, niger. Capite elongato, dense ruguloso-punctato, oculis magnis, prominulis; antennis elongatis, sat gracilibus, articulis 4 et sequentibus extus apice dentatis; thorace elongato, antice valde attenuato, dense ruguloso-punctato, postice biimpresso, lobo lato, medio impresso, postice subarcuato; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, lateraliter subarcuatis, striatis, intervallis minute et dense ruguloso-punctatis; pygidio elongato, uniformiter griseo pubescente et distincte punctato; pedibus posticis validis, femoribus inspinosis, postice infra incis, tibiis carinatis. — Long. 4—5 mm.

Voisin de *B. indicus* Pic, en diffère par la ponctuation plus forte de l'avant-corps, les élytres moins larges par rapport au prothorax, la pubescence du dessus moins rapprochée.

Mordellistena Horni n. sp.: Ceylan: Weligama (W. Horn 1899).

Angustata, nitida, luteo pubescens, testacea, elytris ad medium lateraliter et ad apicem piceo notatis. Capite sat valido, minute sat dense punctato, oculis nigris, maximis; antennis sat gracilibus, fere filiformibus; thorace parum elongato, mediocre et sparse punctato, angulis posticis fere rectis; elytris thorace non latioribus, elongatis, subparallelis, postice attenuatis, mediocre sat sparse punctatis; tibiis posticis sat brevibus, oblique nigro bistriatis, stria prima interna, postica reducta, apice nigro marginatis, articulis 1,2 tarsarum posticarum nigro bistriatis et apice nigro marginatis, spinis valde divergentibus; pygidio elongato, spiniforme, apice truncato; infra corpore testaceo, pectore pro parte brunnescente. — Long. 3 mm.

Par sa forme étroite et allongée se rapproche de *M. curteapicalis* Pic, en diffère par la présence d'une macule latérale médiane foncée aux élytres, les tibias postérieurs n'ayant que deux rainures noires avec celle du dessus plus longue, occupant toute la largeur du tibia.

Aploglossa aureonotata var. nov. *Germani*. — Bolivia: Jungas (Germain).

Nigra, thorace lateraliter elytrisque ad basin pro parte aurantiacis, his ad suturam late et externe reducte nigro lineatis, ad apicem nigro maculatis.

Distinct, à première vue, de la forme type par les dessins noirs des élytres réduits et interrompus antérieurement.

Ptilodactyla sinensis var. nov. *Sauteri*. ♀: Formosa: Kankau (H. Sauter, 1912).

Parum lata, oblongo-elongata, subdepressa, nitida, sparse sat breve griseo pubescens, rufescens, supra castanea, thorace lateraliter elytrisque ad humeros et apice rufescentibus, membris testaceis. Antennis elongatis, filiformibus, capite thoraceque, illo in disco parum dense, fortiter punctatis; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, subparallelis, postice attenuatis, in disco pro parte substriatis, minute sed distincte multi punctatis, humeris fere rectis. — Long. 5 mm.

Diffère de *P. sinensis* Pic type par la forme plus large, la ponctuation du prothorax plus forte, celle des élytres plus distincte, les épaules à angle droit (angle huméral pas très arrondi chez *sinensis* Pic).

Ptilodactyla nitidissima n. sp. ♀: Formosa: Fuhosho (H. Sauter).

Oblongo-elongata, depressa, nitida, sparse griseo pubescens, rufo-testacea. Capite minute, fortiter sparseque punctato, oculis nigris, sat minutis, antennis testaceis, ramulis brunneo tinctis, elongatis, gracilibus, articulo 2° breve, 3° elongato 4° et sequentibus sat longe et recte flabellatis; thorace breve et lato, antice subarcuato, sat minute et sparse punctato, postice sinuato et nigro marginato, medio tridentato, angulis posticis paulo prominulis; scutello lato, minute punctato; elytris lateraliter

subarcuatis, postice attenuatis, instriatis, minute sat sparse punctatis, apice marginato explanatis. — Long. 5 mm environ.

Ressemble à *P. nitidior* Pic, en diffère par les yeux petits (au lieu d'être grands), les branches flabellées des antennes plus longues, le prothorax plus robuste et les élytres sans aucune strie marquée.

II. Nouveaux Malacodermes de Bolivie (Col).

Les nouveautés décrites dans cet article proviennent des chasses de Germain dans les Jungas de Bolivie; elles figurent dans les collections du Musée de Dahlem et je les possède également, à l'exception de: *Discodon claricolle*, *Maronius testaceiceps*, *Malthodes boliviensis*, *Dasytes binotaticollis*, *Haplamaurus opaciceps*, *Attalus* var. *inapicalis* et *A. tricoloripennis*.

Polemius subdilaticornis (n. sp.): Parum elongatus, subparallelus, nitidus sparse griseo pubescens, niger, thorace externe parum distincte rufo notato. Antennis validis, sat elongatis; thorace breve et lato, ad medium minute sed distincte inciso, parum punctato; elytris thorace paulo latioribus, subelongatis, fere incostatis, diverse ruguloso-punctatis. Long. 7 mill.

Voisin de *P. nigricolor* Pic, prothorax non entièrement noir et plus brillant, élytres moins longs.

Polemius bilateralis (n. sp.): Elongatus, nitidus, griseo pubescens et pro parte hirsutus, niger, antennis apice, coxis, femoribus et pectore pro parte rufis, capite antice et infra, thorace circa et elytris externe, ad humeros, ultra medium, aurantiacis. Capite thorace latiore, oculis prominulis; antennis ad medium depresso, apice attenuatis, articulis intermediis sat elongatis et impressis; thorace parum elongato, antice subarcuato, lateraliter sinuato, medio paulo dentato, angulis posticis prominulis; elytris thorace distincte latioribus, elongatis, postice paulo latioribus, minute, pro parte, ruguloso punctatis, incostatis. — Long. 7 mill.

Peut se placer près de *P. megalophthalmus* Champ., très distinct par sa coloration, ses antennes moins grêles et à sommet clair.

Polemius bolivianus (n. sp.): Parum elongatus, subnitidus, griseo pubescens, pro parte hirsutus, niger, antennis apice, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad suturam antice nigro lineatis et apice nigro maculatis. Capite thorace paulo latiore, oculis mediocris; antennis ad medium depresso, apice attenuatis, articulis intermediis diverse elongatis et impressis; thorace parum elongato, antice attenuato, lateraliter sinuato, angulis posticis fere rectis; elytris thorace distincte latioribus, parum elongatis, lateraliter sinuatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, ad humeros externe minute sed distincte costatis et in disco paulo costulatis. Long. 7 mill.

Voisin du précédent, en diffère, en outre de la coloration, par la forme du prothorax et la présence d'une carène nette en dessous des épaules.

Polemius Germaini (n. sp.): Plus ♂, minusve ♀, elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, infra corpore aliquot pro parte rufo, antennis apice et femoribus ad basin testaceis, supra aurantiaca, capite et thorace medio nigro notatis, elytris ad suturam antice longe et apice late nigro notatis. Capite thorace non ♀, aut paulo ♂, latiore, oculis mediocris ♀, aut validis ♂, antennis gracilibus; thorace sat breve et parum lato, lateraliter sinuato, ad medium sat fortiter inciso ♂, aut tuberculato plicato ♀; elytris thorace distincte latioribus, distincte pro parte ruguloso-punctatis, in disco costulatis. Long. 5 - 6 mm.

Très voisin de *P. disjunctus* Pic., s'en distingue, à première vue, par le dessin noir antérieur des élytres réduit à une bande suturale non dilatée postérieurement.

Discodon Kraatzi (n. sp.): Elongatum, subparallelum, nitidum, griseo pubescens et hirsutum, nigrum, capite-antice, antennis ad basin infra, thorace lateraliter femoribusque ad basin rufis, elytris luteis, ad scutellum minute et ad apicem reducte, nigro notatis. Capite parum lato, antennis ad medium depressis, apice attenuatis, articulis intermediis elongatis, impressis aut plicatis; thorace breve et lato, lateraliter sinuato; elytris thorace non latioribus, subparallelis, elongatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, parum distincte costulatis. — Long. 8 mm.

A placer près de *D. subannulipes* Pic, s'en distingue, à première vue, par le dessin noir antérieur des élytres réduit.

Dédiée à la mémoire du Dr. Kraatz.

Discodon reductum (n. sp.): Elongatum, subparallelum, nitidum, griseo pubescens aut hirsutum, nigrum, capite pro parte, aliquot femoribus ad basin, rufis, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice nigro notatis, incostatis. — Long. 7—8 mm.

Tout à fait voisin du précédent, en différant, à première vue, au moins à titre de variété, par l'absence de macule prescutellaire noire.

Discodon Horni (n. sp.): Elongatum, nitidum, griseo pubescens et hirsutum, nigrum, infra corpore antice, mandibulis, thorace, scutello, coxis femoribusque ad basin flavis. Capite sat lato, parum punctato, oculis prominulis; antennis gracilibus; thorace sat breve, antice subarcuato, lateraliter sinuato, parum punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subsinuatis, pro parte distincte granulatis, non aut fere indistincte costulatis. Variat: pedibus nigris, elytris obscuriore pilosis (v. nov. obscuripes). — Long. 9—10 mm.

Voisin de *D. atripenne* Pic, s'en distingue par le prothorax moins court et non marqué de noir.

Discodon piceovittatum (n. sp.): Elongatum, nitidum, griseo pubescens et hirsutum, testaceum, elytris in disco piceo vittatis. Capite breve et lato, oculis nigris, prominulis; antennis gracilibus; thorace parum breve,

sat lato, antice subarcuato, lateraliter sinuato, postice marginato; elytris thorace non latoribus, elongatis, subparallelis, pro parte distincte granulatis, incostatis. — Long. 7 mm.

Par sa forme voisin du précédent, mais prothorax différent et coloration tout autre.

Discodon claricolle (n. sp.): ♀. Sat elongatum, nitidum, elytris opacis, griseo aut fusco pubescens et hirsutum, nigrum, mandibulis, thorace coxisque pro parte testaceis. Capite breve et lato, minute et sparse punctato, oculis paulo prominulis; antennis gracilibus et brevibus; thorace breve et lato, antice subarcuato, lateraliter subsinuato; elytris thorace paulo latoribus, parum elongatis, subparallelis, distincte rugulosis, in disco antice minute costulatis. — Long. 8 mm.

Moins allongé que le précédent et en différant, en outre, par le prothorax plus transversal, l'écusson foncé. La coloration mime *D. implicatum* Pic, il s'en distingue, en outre des antennes entièrement foncées, par le prothorax non rétréci en avant et les élytres non brillants.

Chauliognathus Germaini (n. sp.): Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, capite ad oculos flavo, thorace lateraliter, elytris, his ad scutellum et apice nigro maculatis, pectore et abdomine pro parte aurantiacis, aliquot infra corpore nigro. Capite parum lato, elongato; antennis gracilibus; thorace parum elongato, lateraliter fere recto, marginato, medio sulcato; elytris thorace sat latoribus, elongatis, parallelis, apice subrotundatis, paulo rugulosis; pectore albo pubescente, pro parte testaceo; pedibus gracilibus, nigris. Variat: elytris aurantiacis, apice nigro maculatis (v. nov. *nigroapicalis*). — Long. 8—10 mm.

Voisin de *C. aterrimus* Gorh. mais tout autre par sa coloration.

Malthesis ephippiatus var. *inapicalis* ♀ (nov. var.): Elytris parum latis, apice valde dehiscentibus, aurantiacis, ad suturam antice nigro lineatis; thorace parum lato, lateraliter subarcuato. — Long. 8 mm.

La forme type a les élytres plus largement marqués de noir. Le prothorax est plus étroit et plus droit sur les côtés chez le ♂ type que chez la ♀ ici décrite.

Oontelus boliviensis (n. sp.): Parum elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, testaceus, capite postice, thorace diverse circa, scutello, elytris et infra corpore nigro-piceis, abdomine flavo marginato. Capite lato, fere impunctato, nigro, antice testaceo, antennis testaceis, filiformibus, articulo 3^o curvato, aliquot nigro notato, 4^o triangulare aut claviforme, sequentibus elongatis; thorace breve et lato, marginato, lateraliter ante medium angulato, medio supra impresso, externe postice foveolato, fere impunctato; elytris thorace paulo latoribus, parallelis, depressis, lineato-fenestrato punctatis, lateraliter costatis. — Long. 3 mm.

Diffère, à première vue, de *O. reticulatus* Sol. par le prothorax plus large, en partie foncé et la structure des antennes.

Maronius Cermaini (n. sp.): Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger aut pro parte piceus, thorace, scutello et infra corpore pro majore parte (abdomine apice nigro) rubrotestaceis, antennis apice femoribusque ad basin testaceis. Capite thorace paulo latiore, parum punctato; antennis elongatis, sat gracilibus, apice paulo attenuatis; thorace parum elongato, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, fere laeve, in disco postice impresso et medio subcarinato; elytris thorace paulo latioribus, postice attenuatis et paulo dehiscentibus, apice rufescentibus, supra ad suturam impressis et ad humeros subcarinatis, parum et irregulariter punctatis; pedibus elongatis, gracilibus. — Long. 7—8 mm.

Voisin de *M. mendesensis* Pic, en diffère par les élytres élargis vers les épaules, non foncés à l'apex et les pattes en majeure partie foncées.

Maronius testaceiceps (n. sp.): Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus aut testaceus, elytris nigris, apice sulphureo guttatis. Capite thorace paulo latiore, parum punctato; antennis sat elongatis, filiformibus; thorace parum lato, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, in disco paulo impresso, fere impunctato; elytris thorace paulo latioribus, postice paulo attenuatis et dehiscentibus, in disco costulatis, distincte et irregulariter punctatis, ad apicem transverse plicatis; pedibus elongatis et gracilibus. — Long. 8 mm.

Par sa coloration en majeure partie claire, distinct, à première vue, de l'espèce précédente ainsi que de la plupart des autres du genre. Diffère, d'autre part de *M. inapicalis* Pic, par les élytres plus brillants, à macule apicale soufrée, la tête non marquée de noir postérieurement et l'extrémité abdominale non marquée de foncé.

Malthodes boliviensis (n. sp.): Parum elongatus, subparalellus, nitidus, paulo pubescens, testaceus, antennis, apice excepto, capite, thorace, abdomine elytrisque, his apice flavis, pectoreque aut abdomine pro parte, tibiis tarsisque piceis aut brunnescentibus. Capite thorace paulo latiore, oculis validis, parum punctato, piceo, antice brunnescente; antennis villosis, parum gracilibus et elongatis, piceis, articulis ultimis flavis, articulo 2^e elongato, tertio paulo longiore; thorace brunnescente, breve et valde transverso, lateraliter subarcuato, marginato, angulis nullis, parum punctato; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, subparalellis, apice paulo dehiscentibus, piceis, humeris brunneis, apice flavo notatis, supra in disco impressis, parum distincte et irregulariter punctatis; infra corpore testaceo, pectore pro parte brunnescente; abdomine postice nigro-piceo; pedibus piceis, femoribus testaceis. — Long. 4 mm.

Distinct de *M. brasiliensis* Pic par l'aspect plus robuste, la coloration plus foncée du dessus du corps, les antennes flaves au sommet.

Dasytes binotaticollis (n. sp.): Parum elongatus, postice dilatatus, nitidus, griseo pubescens et supra longe fusco hirsutus, nigro-metallicus, capite antice, antennis ad basin, thorace, illo in disco nigro bimaculato, pedibusque testaceis. Capite breve, parum et sparse punctato: antennis gracilibus, thorace superantibus; thorace parum breve, sat lato, lateraliter arcuato, postice valde marginato, minute punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice dilatatis, parum fortiter, sat sparse, punctatis, paulo granulosis; pedibus gracilibus. — Long. 3 mm.

Voisin de *D. semilimbatus* Pic, mais élytres moins longs, plus élargis en arrière, plus foncés et tête grandement noire.

Haplamaurus opaciceps (n. sp.): Elongatus, glaber, nitidus, capite thoraceque alutaceis et subopacis, nigro-viridescens, capite antice, thorace, abdomine apice membrisque testaceis. Capite sat lato et parum breve, alutaceo. minute et sparse punctato, inter oculos biimpresso, oculis paulo prominulis, viride, epistome, labro palpisque testaceis; antennis testaceis, sat brevibus, apice crassioribus; thorace testaceo, breve, sat lato, postice paulo dilatato, marginato, alutaceo, minute et sparse punctato, postice lateraliter attenuato, medio subsinuato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, ante apicem paulo dilatatis, apice attenuatis et subrotundatis, diverse, pro parte fortiter, irregulariter et sparse punctatis; coxis et pedibus testaceis, infra corpore metallico. — Long. 4 mm.

Espèce distincte entre toutes par son prothorax testacé et alutacé. Peut se placer près de *H. aenescens* Gorh.

Melyrodes atricolor (n. sp.): Elongatus, postice paulo dilatatus, parum griseo pubescens, paulo nitidus, nigro-plumbeus, antennis ad basin pedibusque pro parte brunnescentibus. Capite dense ruguloso-punctato; antennis filiformibus, sat brevibus; thorace breve, sat lato, fortiter denseque ruguloso-punctato, antice transverse impresso, lateraliter marginato, fere recto, paulo crenulato; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, postice paulo dilatatis, marginatis, fortiter et dense perforato-punctatis. — Long. 2 mm.

Voisin de *M. perforatus* Gorh., mais plus foncé, prothorax à ponctuation plus forte, élytres plus élargis postérieurement.

Dromanthus Kraatzi (n. sp.): Oblongus, breve hirsutus, nitidus, rufus, elytris caeruleis, capite et membris nigris. Capite nigro, parum elongato, minute et sparse punctato, inter antennis bisulcato; antennis nigris, ad basin rufo tinctis, validis, pectinatis; thorace rufo, parum breve, sat lato, antice paulo, attenuato, postice subarcuato, parum punctato; elytris latis et brevibus, medio interne et externe plicatis, diverse, pro parte minute et sparse, punctatis; infra corpore, pygidio coxisque rufis, pedibus nigris. Long. 3 mm.

Diffère de *D. punctatus* Pic, par la forme plus trapue, les élytres plus courts, non fortement ponctués, le dessous du corps roux.

Attalus caeruleicolor (n. sp.): Oblongo-elongatus, postice dilatatus, griseo pubescens et longe hirsutus, nitidus, niger, supra caeruleus, membris pro parte testaceis. Capite fere impunctato, inter antennas impresso, oculis magnis; antennis elongatis, sat crassis, nigris, infra ad basin diverse testaceo notatis; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, postice medio fere recto, fere impunctato; elytris thorace paulo latioribus, postice plus minusve dilatatis, diverse elongatis, pro parte fortiter et sparse punctatis; infra corpore nigro, pedibus diverse brunneis aut nigris et femoribus ad basin par parte tibiisque plus minusve testaceis. — Long. 2—2,5 mm.

Voisin de *A. Germaini* Pic dont il se distingue, à première vue, par les élytres distinctement ponctués et de coloration bleuâtre.

Attalus Schenklingi (n. sp.): Oblongo-elongatus, breve hirsutus, nitidus, nigro-metallicus, antennis ad basin pedibusque testaceis. Capite lato, fere impunctato, oculis magnis, labro testaceo; antennis sat gracilibus, elongatis, testaceis, antice aut supra brunneis; thorace breve, sat lato; lateraliter arcuato, fere impunctato; elytris thorace paulo latioribus, postice latioribus, parum elongatis, minute, fere indistincte, punctatis; pedibus testaceis, sat validis. Variat. (v. nov. inapicalis) elytris antice et externe triangulariter testaceo notatis et ad suturam antice testaceo marginatis. — Long. 2,5 mm.

A placer près de *A. angulatus* Pic, en diffère par le prothorax moins large par rapport aux élytres.

Attalus goyasensis* var. *obliteraticollis (var. nov.): Thorace rufo, innotato, maculis nigris, anticis elytrorum reductis, scutello non attingentibus.

La forme type a le prothorax diversement marqué de foncé.

Attalus tricoloripennis (n. sp.): Oblongo-elongatus, breve hirsutus, nitidus, niger, antennis ad basin, infra thorace, illo in disco reducte nigro bilineato, abdomine elytrisque apice rufis, his transverse nigro bifasciatis et testaceo unifasciatis. Capite robusto, fere impunctato, oculis griseis; antennis elongatis et gracilibus, nigris, ad basin infra rufis; thorace breve, sat lato, lateraliter arcuato, fere impunctato; elytris, thorace paulo latioribus, sat elongatis, postice paulo latioribus, minute et parum distincte punctatis, tricoloratis, ad basin late nigris et ad medium nigro subsinuato-fasciatis, antice testaceo fasciatis, apice late rufis; infra corpore pedibusque nigris, abdomine rufo, pedibus gracilibus. — Long. 3 mm.

Espèce très distincte par la présence de bandes alternées noires et testacée sur les élytres tandis que le sommet est roux. A placer près de *A. goyasensis* Pic.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [16_1927](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Nouveaux Coleoptères exotiques. 246-255](#)