

pubescence blanche. Prosternum bombé, faiblement réticulé, à saillie large, tridentée, à pubescence blanche. Tous les tibias normaux, les postérieurs plus densément garnis de soies raides que les autres.

Cette espèce se distinguera facilement de toutes les autres du même groupe par les caractères suivants: 1^o par le sillon du pronotum bien marqué, 2^o par la surface rapeuse des élytres.

Habitat: Tipolti: Baïkal. — Un exemplaire, probablement ♀, provenant de l'ancienne collection Franklin Müller, actuellement dans la collection du Deutsches Entomologisches Museum. (Fig. 2).

Ueber *Cleptes nigriventris* Buysson (Chrysid.).

Von W. Trautmann, Lautawerk.

Buysson beschrieb 1898 (Contr. aux Chrysidés du Globe, 3. Serie p. 125 *Cleptes semiauratus* L. var. *nigriventris* im weiblichen Geschlecht. Ich erhielt außer den ♀♀ auch noch 4 ♂♂. Das unbeschriebene ♂ hat grünen Fühlerschaft, schwarze Geißel. Der Kopf, Pro-Meso-Metanotum ist grünblau, das Mittelsegment, die Schenkel der Beine stahlblau, Tibien und Tarsen braun. Die Behaarung ist beim ♀ schwarz, beim ♂ grau und schwarz gemischt. Das Abdomen ist in beiden Geschlechtern oben und unten schwarz, nur ein ♂ hat am 1. u. 2. Tergit braune Stellen. Das ♂ zeigt aber nur 4 sichtbare Abdomensegmente, unterscheidet sich hierdurch von allen mir bekannten Cleptiden. (Ich besitze noch eine andere Species aus Serbien mit 6 sichtbaren Abdomentergiten). Das 3. Abdomentergit ist bei dieser Art relativ sehr dicht punktiert, während *semiauratus* L. erst am 4. Tergit dichtere Skulptur zeigt. Auch hat *nigriventris* Buysson ein sehr langes 3. Abdomentergit, viel länger als das 2.

Das ♀ hat grüngoldenen oder feurig goldenen Kopf, Pro-Meso-Metanotum, Mesopleurae, schwarze Fühlerschäfte und Geißel, blaugrünes Mittelsegment, braune Legeröhre. Die Hüften und Schenkel sind schwarz, Flügel in beiden Geschlechtern schwach angeraucht. Das Pronotum hat am Ende eine Furche, in der aber die großen Gruben der *semiauratus* fehlen. Länge 6—8 mm.

Aus obigen Gründen dürfte die Artberechtigung dieser Form gegeben sein. El Soldado (Cordoba) leg. Seyrig 7.—21. Mai 1927.

Neuere Literatur.

Von Sigm. Schenkling (Berlin-Steglitz), Er. Schmidt (Berlin-Lichterfelde) und Walther Horn (Berlin-Dahlem).

General Catalogue of the Hemiptera: Herausgegeben von G. Horváth & H. M. Parshley. Verlag „Smith College“, Northampton,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [17 1928](#)

Autor(en)/Author(s): Trautmann W.

Artikel/Article: [Ueber Cleptes nigriventris Buysson \(Chrysid.\). 79](#)