

Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von C. v. Scheidt, Paruschowitz O./S.

Die Zusammenstellung soll als Ergänzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens von J. Gerhardt (III. Aufl., 1910) gelten.

Für alle aufgeführten Arten gilt, falls nicht anders angegeben, Paruschowitz O.-S. und Umgebung, Kreis Rybnik, als Fundort.

1. Neuheiten.

Oodes gracilis Villa. 1 Ex. 23. XI. 13, unter Laub gesiebt am Nordhang einer Wassergrabenböschung in der Nähe einer jenseits liegenden, mit Schilf in größerer Ausdehnung bewachsenen Teichwiese der prov. Heil- und Pflegeanstalt.

Ptinella testacea Heer. 1 Ex. 6. IX. 14, im Mulm unter Kiefernrinde alter gefälltter Stämme. (Einige entwischt.)

Cantharis livida ab. *scapularis* Redt. 1 Ex. 24. VI. 16, auf Brombeersträuchern im Kiefernwald.

Minyops carinatus var. *variolosus* F. 1 inkrustiertes Ex. 1908. Monat und Fangplatz nicht mehr feststellbar.

2. Verbreitungsergänzungen.

Cicindela silvatica L. mit a. e. *humeralis* Beuth. IV., V., VI., VIII und IX. an lichten Stellen des Kiefernwaldes, hfg.

Carabus catenulatus Scop. IV., V., VI., Kiefernwald, stellenweise hfg.

Carabus granulatus ab. *rubripes* Géh. V., Feld und Wald. n. s.

Carabus cancellatus var. *tuberculatus* Dej. V., n. hfg.

Carabus cancell. var. *tuberc.* ab. *Letzneri* Kr. V., s., hierunter ein fast blaues Ex.

Miscodera arctica Payk. 1 Ex. 9. VI. 19, im Kiefernwald, Jagen 24, in etwa 6-jähriger Schonung an mooriger Stelle.

Bembidion foraminosum Strm. V., Oder, Lubowitz, auf dem Ufersande.

Bembidion velox L. V., Oder, Lubowitz, auf dem Ufersande.

Bembidion argenteolum Ahr. und ab. *azureum* Gebl. V. 18, Oder, Lubowitz, auf dem Ufersande, mittags in der Sonne fliegend.

Bembidion litorale Ol. V., Ufersand der Ruda, Paruschowitz.

Bembidion ruficolle Gyll. V., Oder, Lubowitz, auf dem Ufersande.

Bembidion obliquum Strm. V., Oder, Lubowitz. s.

Ocys 5 striatus Gyll. 1 Ex. 26. IX. 12. 1 Ex. ohne Zeitangabe. 2 Ex. 15. VII. 19, unter Apfelbaumrinde bei *Eccopt. mali* und *rugulosus*.

- Chlaenius sulcicollis* Payk. 1 Ex. 28. IV. 12, im Käfergraben des Kiefernwaldes. In der Nähe feuchte Niederungen und ein kleiner Buchenhain. s. s.
- Harpalus distinguendus* Dft. V., s.
- Harpalus smaragdinus* Dft. V., VI., s.
- Harpalus fuliginosus* Dft. V., im sandigen Kiefernwald, n. s.
- Harpalus 4 punctatus* Dej. IV., V., Kiefernwald, n. hfg.
- Harpalus tardus* Pz. IV., IX., Kiefernwald, n. hfg.
- Harpalus anxius* Dft. IV., Kiefernwald, s.
- Acupalpus dorsalis* ab. *notatus* Muls. IV., n. s.
- Trichocellus placidus* Gyll. V., s.
- Amara spreta* Dej. IV., V., n. s.
- Amara famelica* Zimm. V., s.
- Amara infima* Dft. V., im sandigen Kiefernwald, n. s.
- Pterostichus cordatus* Letzn. 1 Ex. 13. VIII. 11, unter Steinen, Goldkoppe bei Freiwaldau.
- Agonum Mülleri* ab. *tibiale* Heer. V., s.
- Agonum gracilipes* Dft. VIII., z. s.
- Demetrius imperialis* Germ. III., in Rohrstengeln, s.
- Cymindis cingulata* Dej. IV., V., im sandigen Kiefernwald, unweit der Ruda, z. s.
- Cymindis vaporariorum* L. V., VI., Kiefernwald.
- Cephennium Reitteri* Bris. III., IV., XII., unter Laub, n. s.
- Cephennium thoracicum* Müll. noch nicht aufgefunden. Der Fundort Rauden dürfte zweifelhaft sein.
- Cholera spallica* Strm. V., 12, unter Laub gesiebt, s. s.
- Silpha granulata* Thunb. = *tristis* Jllig. V., VIII., n. hfg.
- Anisotoma axillaris* Gyll. 1. VI. 14, an Pilzen, n. hfg.
- Anisotoma glabra* Kugcl. VI., an Pilzen, n. hfg.
- Agathidium laevigatum* Er. V., VI., XI., unter Laub und Rinde.
- Sacium brunneum* Bris. IV., Kiefern- und Fichtenwald.
- Platysoma lineare* Er. V., VI., X., unter der Rinde abgestorbener Kiefern, z. s.
- Platysoma compressum* Hbst. 30. IV. 16, unter der Rinde von Erlenstubben (bei Xyleborus Pfeili Ratzb.)
- Dictyopterus aurora* Hbst. IV., V., an alten Stöcken im Kiefernwald, n. s.
- Pyropterus affinis* Payk. VII., an alten Stöcken im Kiefernwald, s.
- Platycis minuta* Fbr. VIII., IX., an alten Stöcken im Kiefernwald, s.
- Corticaria abietum* Motsch. 3. III. 18, an der Schnittfläche gefällter Kiefern.

- Sphindus dubius* Gyll. V., s., in Staubpilzen.
Dermestes Frischi ab. *uniformis* Rey. VII., an Maulwurf.
Athous rufus Deg. VII., in Kiefernstubben, z. s.
Poecilnota decipiens Mnh. VI., VII., s. s., vermutlich in Erlen.
Buprestis octoguttata L. VII., 1910, 11, 12, 13, 14 teilweise häufig auf ca. 8jährigen Kiefern bis zur Dunkelheit.
Hylecoetus dermestoides L., var. *Marci* L. und var. *morio* Fbr. IV., V., in Erlenstubben hfg. und Buchenstubben.
Calopus serraticornis L. V., in Kiefern, s.
Pyrochroa pectinicornis L. IV., V., in Erlenstöcken n. s. und Birkenstöcken n. hfg.
Metococcus paradoxus L. IX., in Erd-Wespennestern unter Baumstümpfen bei *Vespa vulgaris* s.
Melasia Perroudi Muls. IV., V., VII., im Moder alter Kiefernstöcke n. s.; mit *M. culinaris* noch nie zusammen angetroffen, sowie letzteren überhaupt noch nicht hier aufgefunden. Der Fundort Rauden für *culinaris* erscheint mir zweifelhaft.
Cortodera femorata ab. *flavipennis* Rtr. Kiefernwald, s.
Tetropium fuscum Fbr. VI., Kiefernwald, s.
Phymatodes angustus Kricchb. 1 Ex. 20. VI. 09, s. s.
Plagionotus arcuatus ab. *Reichei* Thoms. VII., s.
Monochamus galloprovincialis Ol. 1 Ex. 7. VI. 10, s. s., im Kiefernwald.
Pogonochaerus decoratus Fairm. III., Kiefernwald, n. hfg.
Strophosomus rufipes Steph. mit var. *capitatus* Deg., IV., V., auf jungen Kiefern, z. hfg. (XI., XII., I., im Gesiebe). 1913 in größeren Mengen als Schädling aufgetreten, speziell an 1- bis 2jährigen Kiefern.
Eccoptogaster Ratzeburgi Janson. V., in Bezirke, zeitw. hfg.
Hylastes linearis Er. 1 Ex. 9.V.15, im Käfergraben des Kiefernwaldes, s. s.
Xyleborus Pfeili Ratzb. IV., V., in Erlenstümpfen, s.
Xyloterus signatus Fbr. IV., in Birken, n. hfg.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [8_1919](#)

Autor(en)/Author(s): Scheidt C. v.

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna. 163-165](#)