

Eine neue Goldwespen-Art und -Varietät aus Deutschland,

beschrieben von Alexander Mocsáry in Budapest.

Ellampus puncticollis n. sp.

Mediocris, elongatus, viridi-cyaneus vel cyaneus, parcecinerio-alboque pilosus; vertice post stemmata, pro- et mesonoti disco, scutello postscutelloque plus minusve violascentibus; cavitate faciali profunda, laevi ac polita, viridi-aurata, lateribus faciei dense punctulato-coriaceis; temporibus subtus irregulariter subtiliterque subtransverse striatis; antennis tenuibus, nigro-fuscis, articulis duobus primis viridi-auratis, tertio proportionaliter brevi, quarto dimidio longiore, quinto quintoque simul sumptis brevior, genis brevibus, linearibus; fronte dense subtiliter, vertice post stemmata sat sparsim valde leviter punctatis, pronoti disco punctis profundis sparsis, magnitudine inaequalibus interstitiisque laevibus, mesonoti lobo medio antice laevi ac polito postice lobisque lateralibus valde sparsim, illo sat profunde, his leviter, scutello crassius punctatis, postscutello gibbo-convexo punctato-reticulato; abdominis segmentis dorsalibus laete viridibus, splendidis, tertio viridi-subaurato, secundo disco macula magna aeneo-nigra notato, segmentis duobus primis subtilissime, haud visibilibus, valde sparsim, lateribus evidentius, tertio densius crassiusque punctulatis, hoc margine apicali tenuiter nigro-aeneo, centro sat profunde triangulariter exciso; ventre viridi-subaurato; femoribus tibiisque laete viridibus, tarsis fuscis; alis fortiter infumatis, iridescentibus, basi hyalinis, tegulis aeneo-nigris, laevibus. — ♂ ♀; long. 5 mm.

var. *atratus* mihi.

Stirpi magnitudine, sculptura coloreque ex parte similis; sed facie mesopleurisque aeneo viridibus, fronte, vertice, pronoto, mesonoto, scutello, postscutello, abdominis segmento primo dorsali secundoque maxima parte atro-aeneis.

Ellampo aeneo Panz. similis et affinis; sed pronoti disco punctis profundis sparsis magnitudine inaequalibus, mesonoti lobo medio postice lobisque lateralibus quoque valde sparsim punctatis, non vero his partibus laevibus; var. *atratus* vero coloreque ex parte atro-aeneo, distinctus.

Diese neue Art und Varietät wurde von Herrn Franz Sickmann bei Iburg, Provinz Hannover, im Juli und August, von den Blättern des *Ribes rubrum* et *Vitis vinifera* in zahlreichen Exemplaren gesammelt und mir zur Beschreibung gütigst überlassen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Mocsary Alexander

Artikel/Article: [Eine neue Goldwespen-Art und -Varietät aus Deutschland, 291](#)