der Dipteren betrifft, nur auf meine eigenen. — Dass die beiden Gruppen in dieser Fassung natürliche sind, kann nicht bestritten werden, ob sie *Subordines* oder von minderm Werthe, ob sie weiter zu theilen seien, wird die weitere Untersuchung lehren. — Ich will zuletzt auch nicht unbemerkt lassen, dass Newman für *Amorpha dermatata* die Gattungen „*Syrphus*, *Oestrus*, *Musca* etc.“ als Typen auführt, woraus aber nicht gefolgert werden darf, dass diese Gruppe meinen *Cyclorraphen* entspräche, weil der Charakter, den Newman für die *Amorpha dermatata* feststellt, auch den *Stratiomyiden* zukommt, genau so wie bei Bouché. Da nun Bouché's Eintheilung schon im Jahre 1833 (Berlin. Acad.) erschien, so wäre umgekehrt Newman der Vorwurf zu machen, die Eintheilung Bouché's übersehen zu haben.

Wer daher für *Diptera cyclorrapha* den Namen *Amorpha dermatata* gebraucht, führt einen Irrthum in die Wissenschaft ein; denn Newman hat den Charakter jener absolut nicht gekannt. — Diese Bemerkung mögen hauptsächlich jene berücksichtigen, welche glauben, dass Katalog-Schreiber Systematiker seien.

Nachtrag

zum Verzeichnisse der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.

g. Thysanoptera.

Terebrantia: 282. *Phloeothrips armata*, Moskau, an den Blütenkörbchen von *Chrysanthemum leucanthemum*, *Achillaea millefolium*, *Anthemis tinctoria*, *Chamomilla vulgaris* etc., Lindeman, Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou p. 40—42, Fig. 19—20.

283. *Thrips secalina*, an Roggen, Gerste, Weizen, Thimothe gras in Mittelrussland, Lindeman, ebenda, p. 7—24, Fig. 1, 4—10.

h. Rhynchota.

Lygaeidae: 284. *Plinthisus elongatus*, Griechenland, Horváth, Revue d'Entomol. Caen, p. 218.

285. *Plinthisus lusitanicus*, Portugal, Horváth, ebenda, p. 216.

m. Lepidoptera.

Tineidae: 286. *Butalis flavilaterella*, Unterer Rheingau um *Helianthemum vulgare*, Fuchs, Entomol. Zeitung, Stettin, 47. Jahrg. p. 71.

- Tineidae: 287. *Coleophora agricolella*, Unterer Rheingau, Fuchs, Entomolog. Zeitung, Stettin, 47. Jahrg. p. 78.
288. *Coleophora bornicensis*, Rheinthal, auf Tanacetum vulgare, Fuchs, ebenda, p. 73.
289. *Lita proclivella*, Unterer Rheingau, in den Blättern von Artemisia absinthium, Fuchs, ebenda, p. 68.
- n. Diptera.
- Cecidomyiidae: 290. *Cecidomyia affinis*, Lothringen, aus Blätterschöpfen, deformirten Blüten und Blattrandrollungen von Viola silvestris Lnk., Kieffer, Zeitsch. f. Naturwissensch. 59. Band, p. 330.
291. *Cecidomyia betuleti*, Lothringen, aus den zwei jüngsten, nach oben zusammengelegten Blättern der Triebe von Betula alba L., Kieffer, ebenda, p. 326.
292. *Cecidomyia muricatae* England, aus deformirten Früchten von Carex muricata, Meade, Entomologist, p. 152.
293. *Cecidomyia raphanistri*, Lothringen, aus Blüthendeformationen von Raphanistrum silvestre Asch, Kieffer, Zeitschr. f. Naturwissensch. 59. Band, p. 324.
294. *Cecidomyia Schlechtendali*, Lothringen, aus Blattrollungen von Orobus montanus Bernh. (tuberosus L.), Kieffer, ebenda, p. 328.
295. *Cecidomyia viscariae*, Lothringen, aus deformirten Spitzen der blühenden Triebe von Viscaria vulgaris Rochl., Kieffer, ebenda, p. 332.
- p. Coleoptera.
- Chrysomelidae: 296. *Oedionychis cretica*, Insel Kreta (die Gattung bisher nur von Amerika und sehr vereinzelt von Madagascar und Siam bekannt), Jacoby, Entomolog. Zeitung, Stettin, 47. Jahrg., p. 215—216.
- Cerambycidae: 297. *Vesperus creticus*, Kreta, Ganglbauer, ebenda, p. 310.
- Buprestidae: 298. *Coroebus Oertzeni*, Morea: Kumani, Ganglbauer, ebenda, p. 309.

Kleinere Mittheilungen.

G. Gercke (Hamburg) beschreibt (Wiener Entomol. Zeitung, 6. Jahrg., 1887, p. 1—4 mit Abbildung) die einen Hamen bildenden Mundtheile der an der äussersten Südwestküste Schlesiens von ihm gefundenen Ephydrine *Canace ranula* H. Loew, sowie zwei eigenthümliche Bündel leichtgekrümmter Borsten oder Gräten, welche fächerartig ausgespreizt und eingeklappt werden können, ihren Sitz an den wulstigen Labellen der Rüsselöffnung haben und ihrer Funktion nach, ob bloss Luftfänger oder Strudelapparate, unergründet blieben. Im Darms und Schlunde fanden sich Diatomeen, seltener Bacillarien und glaubt Verfasser, die *Canace* mache auch auf Infusorien Jagd.

Th. Beling macht (Wiener Entom. Zeitung, 6. Jahrg., 1887, p. 61—63) einen neuen Feind der Gurken aus der Gruppe der Apterygogenea bekannt, *Smynturus cucumeris* Beling (? *Sm. solani* Curt.), welcher die Cotyledonen der Gurken derart benagt, dass an ihnen grosse, demnächst hell gefärbt erscheinende Gruben und hell umrandete Löcher entstehen, wodurch ganze Beete völlig vernichtet werden. Das nur 5—8 Zehntel Millimeter lange, schmutzig gelbgraue Insect wurde auch auf den Samenlappen von Kürbissen und auf Kartoffelkraut in ähnlicher Weise fressend gefunden und hüpfte beim Nachstellen gleich einem Erdflöhe eilig fort.

Litteratur.

- Tijdschrift voor Entomologie uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, onder Redactie van A. W. M. Van Hasselt, F. M. Van der Wulp en Ed. J. G. Everts. Deel 30 (Jaargang 1886—87), aflevering IV. **Inhalt:**
- Snellen, P. C. T., Aanteekeningen over Nederlandsche Lepidoptera. Pg. 209—226.
- Van Hasselt, A. W. M., Araneae exoticae quas collegit pro Museo Lugdunensi J. R. H. Neervoort van de Poll insulis Curaçao, Bonaire et Aruba. Pg. 227—244.
- Dirk ter Ibaar, Lijst van planten, waarop de in Nederland voorkomende Microlepidoptera te vinden zyn. (Vervolg en slot.) Pg. 245—292.
- Snellen, P. C. T., Boekaankondiging: Mémoires sur les Lépidoptères, rédigés par N. M. Romanoff, Tome III., St. Pétersbourg 1887. Pg. 293—296.
- Müller, Cl., Vierzehn neue Heteromeren, von Bradshaw im Zambesi-Gebiete aufgefunden und im Museum der Kgl. zool. Gesell-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Nachtrag zum Verzeichnisse der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas. 332-334](#)