Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XIV. Jahrg.

Juni 1888.

Nr. 11.

Zwei neue Tagfalter-Varietäten aus Kiukiang (China).

Von Eduard G. Honrath in Berlin.

Melanargia Halimede Mén. var. n. lugens.

Oberseite: Die weissen Felder an der Basis der Vorder- und Hinterflügel braunschwarz bestäubt. Die weissen Flecken sehr reducirt, schwach dunkel bestäubt und durchaus nicht reinweiss wie bei der Stammform.

Unterseite: Färbung der Vorderflügel der der Oberseite entsprechend, die der Hinterflügel mehr mit der Stammform übereinstimmend.

Charakteristisch sind auch noch die auffallend breit schwärzlich bestäubten Adern der Ober- und Unterseite.

Papilio Sarpedon L var. n. semifasciatus.

Die Hinterflügel haben statt der Mittelbinde nur den grossen weissen Vorderrandflecken und daran nur eine, besonders auf der Oberseite ganz schwache Andeutung eines zweiten Fleckens.

Diese beiden Formen erhielt ich von dem Naturalienhändler W. Watkins in Croyden (The Hollies Vicarage Road), Surrey, England.

Beiträge zur Käferfauna der Bucovina und Nordrumäniens

von Constantin von Hormuzaki in Czernowitz.

(Schluss).

Tomicidae.

Cryphalus piceae Ratzeb. Czernowitz; im März an Holzwerk in Häusern, oft in Anzahl. —

Taphrorychus bicolor Herbst. Czernowitz; besonders zahlreich an Hausmauern. —

Tomicus typographus L. Czernowitz; in Wäldern, selten. —

T. laricis F. Czernowitz; an frischen Brettern. —

T. suturalis Gyll. Crasna, in morschen Tannenstämmen am Runc. —

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Honrath Eduard G.

Artikel/Article: [Zwei neue Tagfalter-Varietäten aus Kiukiang \(China\). 161](#)