

macht schon auf die Undeutlichkeit des 3. und 4. Gliedes aufmerksam. Derselbe hat aber offenbar nicht dieselbe Art wie Erichson vor sich gehabt; sein *Monotropus Nordmanni* ist nach der Beschreibung auf die in unseren Sammlungen unter dem Namen *M. thoracicus* Faust i. l. verbreitete Art zu beziehen, die sich durch fahlgelbes Aeussere mit brauner Halsschildmitte auszeichnet, etwas kleiner (9—10 mm.) als die Erichson'sche Art ist und dieselbe charakteristische Klauenbildung hat. Bei jener Art sind die Fühler ebenfalls ungenau gegliedert und da Reitter diese Art vor sich hatte, wird daher die Angabe der 7 gl. Fühler stammen, das Erichson'sche Exemplar hat sie jedenfalls nicht. Der dreigliedrige Fühler dieses letzteren ist sehr kräftig, dick und so lang als der Stiel. Die Maxillartaster-Glieder sind dick, das letzte ist abgestutzt, schwach eiförmig. Der Scheitel ist gewölbt, runzlig mit stumpfem Querkiel, der Clypeus breit, vorn gerade abschneidend. Das Halsschild ist gleichmässig gerundet, an den Seiten schwach gesägt, hier behaart; ziemlich dicht punktirt, hinten scharf abgesetzt, in der Mitte vorgezogen. Die zahnlosen Krallen sind an der Wurzel schwach verdickt, fast zahnartig. Die rothbraunen Flügeldecken haben eine dunkle Naht. Das Pygidium ist gewölbt, glatt mit weitläufigen Punkten besetzt, unbehaart. Der Bauch ist nicht eingedrückt, trotzdem es ein ♂ ist. Die Hüften haben einen Hautsaum. Die Vorder-schienen sind 3 zählig, der obere Zahn ist sehr schwach. Ich nenne diese Type der Erichson'schen Gattung *Monotropus*: *Erichsoni*. — Zu *Monotropus* wird noch eine andere Art gezogen, die Schaufuss als *Rhizotrogus Staudingeri* beschrieben hat aus Spanien, sie hat ebenfalls ungezahnte Klauen und zum Theil undeutliche Fühlerstielglieder; jedoch kann ich hier nicht mehr als 8 Glieder zählen. Sie passt nicht ganz in den Rahmen der Gattung *Monotropus*, sodass ich sie als Untergattung abzweige und dazu noch den *Rhizotrogus laticollis*, gleichfalls aus Spanien, stelle, welcher, wie die vorige Art, ungezahnte Krallen und undeutliche Fühlerstielglieder hat, hier aber sind das 3., 4. und 5. Glied schwach geschieden, sodass man einen 9 gl. Fühler annehmen muss.

---

### The Genus *Perissoneura*.

By R. Mac-Lachlan in London.

In the Proceedings of the Zoological Society of London, 1883, p. 189, Mr. W. L. Distant described a new Genus

and Species of Cicadidae, from Celebes, under the name *Perissoneura maculosa*.

In the Entomologische Nachrichten, XVI, p. 190 (1890), Dr. Karsch published an article „Ueber die Singicadengattung *Perissoneura*, Distant“, in which two new species are described, viz: *P. paradoxa* and *P. acutipennis*.

But the Genus *Perissoneura*, Mac-Lach. (and a species *P. paradoxa*, Mac-Lach.) already existed.

In the Journal of the Linnean Society of London, Zoology, Vol. XI, p. 119 (1871), a new Genus and Species of Trichoptera, from Japan, were described as *Perissoneura paradoxa*.

Therefore the name of the Homopterous Genus *Perissoneura*, Distant, requires changing.

Lewisham, London, 25. Sept. 1891.

---

### Litteratur.

The Entomologist; an illustrated Journal of general Entomology. Edited by R. South. London. Vol. XXIV. June, July 1891. No. 337, 338.

### Inhalt:

White, F. B., Structure of the Terminal Abdominal Segments in the Males of the genus *Eupithecia*. (With 2 plates.) Pg. 129. — Bowles, E. A., The Variation of the Markings of *Papilio machaon*. Pg. 130. — Coste, Contributions to the Chemistry of Insect Colours. (Continuation.) Pg. 132, 163, 186. — Cockerell, A preliminary List of the Insect-fauna of Middlesex. Pg. 139, 156. — Entomological Notes, Captures etc. Pg. 143, 170, 193. — Societies. Pg. 149, 174, 197. — South, R., *Cucullia verbasci* and its Allies (with plate 3). Pg. 153. — Walker, F. A., Entomology of Granada and its Neighbourhood. Pg. 160. — Watkins, W., *Ornithoptera trojana* (with coloured plate). Pg. 177. — Norris, F. B., Notes on *Rhopalocera* in Corfu. Pg. 179. — Warren, W., Synonymic Notes, — *Pyrilidae*. Pg. 180. — Obituary. Pg. 199.

Supplement: Leech, J. H., New species of *Rhopalocera* from Western China. Pg. 57. — Jacoby, M., Descriptions of some new species of *Phytophagous Coleoptera*. Pg. 62.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Mac-Lachlan R.

Artikel/Article: [The Genus Perissoneura, 319-320](#)