

gross, wasserhell, nicht irisierend. Vorderrand unbeschuppt. Erste Längsader über der Erweiterung des Flügelhinterrandes etwa gleichweit vom Vorderrande und von der zweiten Längsader entfernt. Letztere fast gerade, mündet fast in die Flügelspitze, am Ende verloschen. Die 3. Längsader verzweigt sich jenseits der Mündung der ersten Längsader; die beiden Zinken sehr blass und den Hinterrand nicht erreichend. Die Lage derselben ist wie bei *Cecid. loticola* Rübs. (Vgl. Rübsaamen: Bonn. Verh. d. Nat. Ver. Jahrg. XLVII Taf. III Fig. 18). Zange des ♂ klein; die zwei oberen Lamellen am Grunde mit einander verwachsen, sich also miteinander bewegend; beide sind gleich gross und erreichen nur die Hälfte der Zangenglieder; die oberen mit 2 breiten, abgerundeten Lappen, die unteren mit 2 sehr schmalen. Die dritte Lamelle hat nur ein Drittel der Länge der Zangenglieder. Klauen spitz. Die Legeröhre ist wenig hervorstreckbar und zeigt am Ende eine fast rundliche Lamelle.

Vorkommen: Die Gallen, woraus diese Mücken gezogen wurde, sind auf *Tilia parvifolia* bei Bitsch in Lothringen gesammelt; sie kommen aber auch auf *Tilia grandifolia* vor. Sie wurden von v. Frauenfeld 1865 anfangs Mai bei Aachen entdeckt, weshalb auch Kaltenbach 1874 die Mücke, ohne sie zu kennen, *Cecidomyia Frauenfeldi* nannte. Dieser Name ist aber unzulässig, weil schon zuvor, nämlich 1868 eine *Cecidomyia Frauenfeldi* von Schiner beschrieben wurde; ferner auch schon deshalb, weil Kaltenbach die Mücke weder beschrieben noch gezogen hat; endlich kann das Insect wegen des unbeschuppten Flügelvorderandes sowie wegen des kleinen Tasterendgliedes nicht zu der Gattung *Cecidomyia* gehören. Abgesehen von der Rudow'schen Angabe wurde diese Deformation seit Frauenfeld und Kaltenbach nicht mehr erwähnt bis zum Jahre 1891, wo sie von Kieffer in seiner Arbeit: „Dipterocecides de Lorraine in: Feuille des Jeunes Naturalistes. Paris 1891. Separatabdr. p. 19“ aufgeführt wurde. Professor Dr. Fr. Thomas beobachtete sie in Thüringen, Sachsen und im Harz (Vgl. obiges Citat) und Herr Rübsaamen in der Mark.

### Litteratur.

Notes from the Leyden Museum, edited by F. A. Jentink. Vol. XIV. No. 1, 2 (Jan. April 1892.).

Entomologischer Inhalt:

I. Ritsema, C., Description of a new species of the Lucaenoid genus *Cyclommatus*, and List of the described species. Pg.

1. — II. Roelofs, W., Description d'une espèce nouvelle du genre *Eugithopus*. Pg. 7. — III. Candèze, E., Trois *Élaterides* nouveaux. — IV. Régimbart, Description de deux *Hydrocoptus* (*Dytiscidae*) nouveaux. Pg. 11. — VIII. Ritsema, C., A new *Lucanoid* beetle from Java. Pg. 31. IX. Roelofs, W., Observations sur les espèces du genre *Oxyopisthen* et des genres voisins. Pg. 33. — X. Ritsema, C., A new *Longicorn* beetle. Pg. 38. — XI. Bourgeois, J., Descriptions de trois espèces nouvelles de *Lycides* de Bornéo. Pg. 39. — XII. Grouvelle, A., Deux espèces nouvelles de *Coléoptères* de la famille des *Nitidulidae*. Pg. 43. — XIII. Ritsema, C., *Cyclommatus squamosus*, a new species of *Lucanid* from Borneo. Pg. 45. — XIV. Roelofs, W., Description de deux nouvelles espèces du genre *Onychogymnus* *Quedenfeldt*. Pg. 49. — XV. Ritsema, C., On two genera described by James Thomson in his *Systema Cerambycidae*. Pg. 54. — XVI. Janson, O. E., On *Taeniodera quadrilineata* and some allied species. Pg. 55. — XVII. Sharp, D., A new species of the *Staphylinid* genus *Trygaeus*. Pg. 61.

---

Transactions of the Entomological Society of London for the year 1892. Part I, II. (March, June 1892).  
Inhalt:

Swinhoe, Ch., New species of *Heterocera* from the *Khasia Hills*. Part II. (with plate 1.) Pg. 1. — Enoch, F., Additional notes and observations on the life-history of *Atypus piceus*. Pg. 21. — Bethune-Baker, G. T., Notes on *Lycaena* (recte *Thecla*) *rhymnus*, *tengstroemii* and *pretiosa*. (with plate 2.) Pg. 27. — Merrifield, F., The effects of artificial temperature on the colouring of several species of *Lepidoptera*, with an account of some experiments on the effects of light. Pg. 33. — Bateson, W., On variation in the colour of cocoons of *Eriogaster lanestris* and *Saturnia carpinii*. Pg. 45. — Meyrick, E., On the classification of the *Geometrina* of the European Fauna. (With plate 3.) Pg. 53—140. — Rothschild, W., On a little-known species of *Papilio* from the Island of Lifu, Loyalty Group. Pg. 141—142. (With plate 4.) — Bates, H. W., Additions to the *Longicornia* of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously-recorded species. With an introduction by F. Du Cane Godman. Pg. 143—183. (With plates 5, 6, 7.) — Eaton, A. E., New species of *Ephemeridae* from the Tenasserim Valley. Pg. 185—190. — Proceedings. Pg. I—XV.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Litteratur. 287-288](#)